



NAZIONALE

B. Prov.



230

NAPOLI

VITT. EM. III

BIBLIOTECA

28-A-15

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio



Paichetto



Num.° d'ordine

28-A-15



115
1
20

B. Prod
V.
231.

2



016040

OPERE

DEL CONTE

JACOPO RICCATI
NOBILE TREVIGIANO.

Tomo Terzo.



Per l'anno del 1764



IN LUCCA MDCCLXIV.

APPRESSO JACOPO GIUSTI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.



**SCHEDIASMI
FISICO-MATEMATICI.**

PREFAZIONE

DELL' EDITORE.

SI contengono nel presente Tomo terzo XXXIX. Schediasmi Fisico-Matematici del Conte Jacopo Riccati, i quali trattino alcuni, che o nei Giornali d'Italia, o ne' loro Supplementi, o negli Atti di Lipsia, o nei *Commentarj di Bologna*, o in qualche altra Opera furono già stampati, escono ora in pubblico la prima volta. Gli ho scelti da un numero molto maggiore, escludendo quelli, che o dall' Autore dopo aver riformate varie sue opinioni, erano stati rifiutati, o che erano rimasti imperfetti, o che versavano intorno subbietti di poca importanza, o che finalmente col totale loro spoglio avevano somministrata materia alle maggiori sue Opere. S' è per me giudicato sommamente importante il determinare a un di presso il tempo, in cui ogni Schediasma è stato composto, ed essendo la mia diligenza relativamente a quasi tutti felicemente riuscita, ho notata questa circostanza al principio dei nominati Schediasmi, non traslasciando altresì di mentovare l' Opera, in cui sono stati impressi, quando per l'addietro sieno comparsi alla pubblica luce. Una Dissertazione composta al principio di questo secolo meritava certamente più stima di quella, che le sarebbe dovuta, se fosse stata scritta cinquant'anni dopo, mentre che le Fisico-Matematiche Discipline sono state arricchite di

di tanti nuovi discoprimenti. Gli Schediasmi XI, XII, XIII scritti l'anno 1705., o in quel torno da un giovane, che non giungeva ai trent'anni, mostrano a chiaro lume il suo straordinario valore.

Nella Prefazione al Trattato della Separazione delle indeterminate nelle equazioni differenziali ho conghietturato, che l'Opera dell'acutissimo Signor Gabbriello Manfredi *De constructione aequationum differentialium primi gradus* uscita in Bologna l'anno 1707. gli abbia servito di stimolo per vie più internarsi nel Calcolo integrale. La citata Prefazione contiene la storia dei suoi felici ritrovamenti, ed in questo Tomo si leggono gli Schediasmi, in cui c'entrano le dette scoperte, i quali non enumererò partitamente avendone dei principali nel ricordato luogo parlato, ed essendo non pochi quelli, che in se racchiudono i commendati artificj. Fa uso l'Autore di un metodo di sua invenzione nello Schediasma XXXI. *Sopra le leggi delle resistenze, con le quali i mezzi fluidi ritardano il moto de' corpi solidi*, e questo metodo lo conduce ad una elegantissima costruzione. Ma non potendo essa a cagione delle quantità immaginarie abbracciare il caso, quando la resistenza s'eguaglia alla velocità u moltiplicata nella costante $2b$, la cui metà b sia minore della unità, ho con una opportuna Annotazione supplito nel detto caso alla soluzione del Problema: *Determinare nella Cicloide il moto d'un Pendolo, a cui si resista dal mezzo in ragione della velocità*. Non passerò sotto silenzio lo Schediasma V. *De' Polinomj* inferito dalla Dottissima Signora Contessa D. Maria Agnesi nelle sue Istituzioni Analitiche. In esso il Conte Jacopo insegna un metodo, che sarebbe generale, se non venisse frequentemente reso inutile dalle quantità immaginarie; col di cui mezzo si riducono alle note quadrature i Polinomj differenziali: Meritano pure d'essere distintamente nominati gli Schediasmi.

diasmi, VII. *Animadversiones in aequationes differentiales secundi gradus*, VIII. *Appendix ad Animadversiones in aequationes differentiales secundi gradus*, che ci additano la regola generale per distinguere, se ad una equazione differenziale si possa giungere assumendo, o non assumendo una prima differenza siccome costante. Ne parla con molta lode il Sig. Niccolò Bernoulli nella sua Risposta al Sig. Conte Giliò Carlo de Fagnani stampata nel Tomo IX. dei Supplementi degli Atti di Lipsia, Sezione III., Pag. 98.

Avendo il Conte Riccati inserito nell'Opera del Saggio intorno il Sistema dell'Univerſo le sue scoperte Astronomiche Lib. II., Parte I., Cap. V., VI., e VII., ci sono rimaste su questo argomento le *Riflessioni intorno le forze centrali tanto nel vuoto, quanto nel pieno* contenute nello Schediasma IV, il Capo V. *De Trajectoriis descriptis a viribus centralibus in vacuo* dello Schediasma XVI. *Scientia Dynamica Elementa*, e gli Schediasmi XVII. *In pleno tempore, quibus arcus trajectoria describuntur, non possunt esse arcus a radio vectore factis proportionalia*, XVIII. *Del Sistema Ticomico*, XIX. *Riflessioni sopra un principio usato dal Bradley per ispiegare l'aberrazione delle stelle fisse*. Gli osservi attentamente il Lettore, e vi scoprirà per entro degli originali penfamenti.

Non dobbò lasciar d'avvertire, che per determinare nello Schediasma XX. scritto l'anno 1735. la lunghezza d'un pendolo semplice isocrono ad un dato composto, si vale del metodo delle azioni, cioè a dire delle forze applicate agli spazj, fondamento principalissimo della Meccanica, che poscia è stato messo nel vero suo lume dal P. Vincenzo Riccati Figlio dell'Autore nel Dialogo delle forze vive, e della azione delle forze morte.

Delle speculazioni del Conte Jacopo intorno le comunicazioni del moto ne ho informato il Lettore nella Prefa-

fazione ai Principj, ed ai Metodi della Fisica. Resta da dir qualche cosa degli Schediasmi XXI, XXII, che trattano della stessa materia. Considerò egli nello Schediasma XXI. le comunicazioni del moto, che si fanno per via di attrazione, collocando un elastro fra due corpi, e supponendo, che il corpo agente tiri col mezzo dell' elastro il corpo paziente, e ciò coll' unica mira di far toccare con mano, che consumandosi fuor di dubbio una porzione della forza viva del corpo agente nello stirare l' elastro, non può sussistere la sentenza Cartesiana, che le forze vive sieno proporzionali alle quantità di moto, la quale ci guida necessariamente alla conseguenza, che nella distensione della molla nulla di forza viva si spenda. Per l' addietro i Fisico-Matematici anno rintracciate le leggi delle comunicazioni del moto fra i corpi o molli, o elastici perfettamente. Il nostro Autore ha mosso un passo di più nello Schediasma XXII, determinando i canoni della comunicazione del movimento in qualunque supposizione, o sieno ambo i corpi perfettamente molli, o perfettamente elastici, o di natura media fra le due estreme.

Somministrano la materia ai quattro seguenti Schediasmi le corde, o fibre elastiche. Gran lavoro ha costato all' Autore lo Schediasma XXIII. *Vera & germana virium elasticarum leges ex phaenomenis demonstrata*. Chi lo leggerà colla dovuta applicazione, lo troverà pregno di cose tutte massiccie, e sommamente importanti. Totalmente nuova è l' idea dello Schediasma XXVI. *Della proporzione, che passa fra le affezioni sensibili, e la forza degli obbietti esterni, da cui vengono prodotte*. Ecco ciò, che ne dice il P. D. Giovanni Crivelli nella Parte prima de' suoi Elementi di Fisica, pag. 174. *L' acutissimo Sig. Conte Riccati è il solo, ch' io sappia, che siasi proposto d'investigare la proporzione fra le affezioni de' nostri sensi, e la forza degli oggetti esterni*. Conciòssiachè

nei due lodati Schediasmi il Conte Jacopo si appiglia a certe troppe ristrette supposizioni, ho presa risoluzione di trattare più ampiamente in due Annotazioni gli stessi argomenti.

Ho tenuto discorso nella Prefazione al Saggio intorno il Sistema dell' Universo delle fruttuose meditazioni del nostro Autore in riguardo alle Resistenze. Si maneggia una tale materia negli Schediasmi XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXI., XXXII., e XXXIII. Mentre il fluido scacciato di luogo non retroceda, ma o sfugga prontamente dai lati, o seguiti la direzione del corpo, che in esso si muove, ha dimostrato il Conte Riccati, che le resistenze nascenti dalla inerzia della materia stanno nel primo caso come il quadrato, e nel secondo come il cubo dell' attuale velocità. Che se il fluido ritorna in dietro, e col suo urto ritarda vie più il movimento del solido, le resistenze sono regolate da leggi molto diverse. Valendosi il Conte Jacopo degli esperimenti fatti dal Cavalier Nevvton con massima accuratezza sopra i pendoli, che si vibrano nell' aria, ha trovato nello Schediasma XXX., che i due limiti delle resistenze vengono determinati per una parte negli archi grandi da un contrasto proporzionale al quadrato della velocità, e per l'altra in quell' arco minimo, ed ultimo, che sia di mezzo fra i confini del moto, e della quiete, da una opposizione, che si può prendere per costante.

Succedono tre Schediasmi, vale a dire il XXXIV. Osservazioni sopra il moto de' corpi solidi ne' mezzi fluidi, il XXXV. Delle pressioni, e degli equilibrij de' fluidi, il XXXVI. Difesa del Corollario II. della Proposizione XXXVI. del Libro II. dei Principj Matematici della Filosofia naturale del Cavaliere Isacco Nevvton. Gli Schediasmi XXXIV, e XXXVI ci pongono sotto gli occhi due controversie, l'una col P.
* Ab. D. Guido Grandi, l'altra primieramente col Sig. Pie-

b

ran-

rantonio Michelotti, e poscia col Sig. Daniele Bernoulli, S'accordavano l'Autore, ed il P. Grandi nel determinare la forza, che stimola al moto, eguale alla differenza fra i pesi del volume solido, e di un pari volume di fluido; ma poi si appigliavano a differenti opinioni, mentre si trattava di stabilire la massa posta in moto, mettendosi a computo dall'Ab. Grandi il solo corpo solido, e sostenendo il Conte Jacopo, che al corpo solido si dovesse aggiungere un egual volume di fluido. Mise questi così in chiaro nella sua seconda Scrittura la verità della sua proposizione, che il P. Grandi con ingenuità ben degna d'un vero Filosofo si dichiarò pienamente convinto. Non si può negare frattanto, che il P. Abate con acutezza da suo pari nella Risposta alle Osservazioni dell'Autore, non ponga la sua causa in quell'aspetto, ch'era il più favorevole. Un esito egualmente felice ebbe la seconda controversia; imperciocchè il Signor Daniele Bernoulli, che da prima negava costantemente la verità del Corollario Nevvtoniano difesa dal Conte Riccati, avendo poscia più posatamente meditato sopra la teorica dell'acqua, che scaturisce da un vaso, confessò sinceramente nella sua Idrodinamica, che nella ipotesi del Nevvton quando l'acqua è pervenuta ad una equabile velocità, la forza, che stimola l'acqua stessa ad uscir dal foro, s'egualgia al peso non della colonna fluida soprastante al buco, come per l'addietro avea sostenuto, ma bensì d'una colonna di doppia altezza, come assieme col Nevvton avea il Conte Jacopo dimostrato. Non farà discaro a chi legge, che nella Annotazione, che vien dietro allo Schediasma XXXVI, si ponga da me in maggior lume la verità del Corollario Nevvtoniano, facendo ricorso al metodo infallibile delle azioni. Egli è fuor di dubbio, che dalla azione della gravità dell'acqua contenuta nel vaso proviene la forza viva, e conseguentemente la velocità di quella parte di
flui-

fluido, che spiccia fuori pel buco. Dalla predetta azione per tanto io deduco e la velocità, colla quale esce l'acqua, e la forza libera e non impedita, che farebbe atta ad imprimerle il detto moto, la quale quando la velocità è divenuta equabile, giunge alla misura assegnatale dall'incomparabile Sig. Nevvton. Colla stessa occasione si determina da me la figura del gorgo, che forma la Natura in vicinanza del foro, affine di passare per gradi dalla picciola celerità, che ha l'acqua dentro del vaso, a quella molto maggiore, che acquista, mentre scaturisce pel buco.

Allo studio della Diottica s'era molto il nostro Autore applicato. Scrive egli nel Lib. III. Cap. III. dei Principj, e dei Metodi della Fisica, che in compagnia di un suo dotto Amico, cioè a dire del Sig. Conte Giovanni Rizzetti, avea soddisfatto a parecchi ardui, ed eleganti Problemi, ed in particolare al seguente fra tutti il più malagevole. Data qualunque lente composta di due segmenti di cerchio, data la proporzione fra le forze refragenti dei due mezzi fluido, e solido, e dato il punto lucido nell'asse della lente, tirare una linea, limite dei raggi refratti, e riflessi, di modo che tutti i raggi, che urtano nella lente fra l'asse, e la detta linea, si rifrangano, e quelli che urtano al di fuori della linea stessa, si riflettano. Fra le sue carte non si sono in tale materia trovati, salvo che gli Schediasmi XXXVII, e XXXVIII, i quali per altro fanno vedere quanto egli fosse penetrato addentro in sì fatte speculazioni. E' curiosa la proprietà della sfera dimostrata nello Schediasma XXXVIII. Tutti i raggi, che passando per un mezzo più raro urtano nella superficie d'una sfera più densa con una direzione parallela all'asse della stessa, patiscono una doppia rifrazione; di maniera che nessun raggio si riflette, mentre sta per far transito dalla sfera più densa al mezzo più raro.

Chiudono la serie dei XXXIX. Schediasmi otto lettere, quattro del P. D. Giovan Bernardo Pifenti C. R. S., ed altrettante del nostro Autore, che trattano *dell' Analogia fra i suoni, ed i colori, e del vero metodo di filosofare in Fisica*. Non sapea il Conte Jacopo condescendere alla soverchia indulgenza del Padre Pifenti verso le ipotesi, standogli sempre a mente, che giusta il detto del Galileo sono belle ed ingegnose, ma per lo più non dimostrate, ne dimostrabili.

I N D I C E

D E G L I

S C H E D I A S M I .

- S**chediasma I. *Soluzione generale del Problema inverso intorno a raggi osculatori, cioè data in qualsivisia maniera per l'ordinata l'espressione del raggio osculatore, determinare la curva, a cui convenga una tal espressione.* Pag. 1.
- S**chediasma II. *Data in qualsivoglia modo per la curva, che descrivesi, l'espressione del raggio combaciante, determinare la curva medesima.* p. 8.
- S**chediasma III. *Risposta ad alcune opposizioni fatte dal Sig. Giovanni Bernoulli alla soluzione del Problema inverso delle forze centrali nel voto in ragione reciproca de' quadrati delle distanze, pubblicata dal Sig. Jacopo Ermano nel secondo Tomo del Giornale de' Letterati d'Italia Articolo XV.* p. 20.
- A**nnotazioni del Sig. Niccolò Bernoulli Nipote del Sig. Giovanni sopra lo Schediasma del Sig. Co. Jacopo Riccati pubblicate nel Tomo decimonono del Giornale de' Letterati d'Italia Articolo VII. Coll'annessa Soluzione propria del Problema inverso delle forze centrali agenti in un mezzo non resistente, dedotta da principi medesimi del Sig. Newton. p. 29.
- S**chediasma IV. *Contrariposta alle Annotazioni del Sig. Niccolò Bernoulli inserite nel XX. Giornale d'Italia Articolo XIII., con un metodo di separare le indeterminate nell'equazioni differenziali, e con alcune riflessioni intorno le forze centrali tanto nel voto, quanto nel pieno.* p. 42.
- R**isposta del Sig. Niccolò Bernoulli Nipote del Sig. Giovanni a quelle cose, che il Sig. Conte Jacopo Riccati inserì nel Tomo XXI. del Giornale de' Letterati d'Italia all'Articolo VIII. p. 59.

Sche-

- Schediasma V. *De' Polinonij.* p.71.
- Schediasma VI. *De recta ratione analytice exprimendi lineam interceptam inter tangentem, & curvam.* p.79.
- Schediasma VII. *Animadversiones in aequationes differentiales secundi gradus.* p.83.
- Danielis Bernoullii Job. Fil. Med. Cand. Notata in præcedens Schediasma III. Co. Jacobi Riccati. p.88.
- Schediasma VIII. *Appendix ad Animadversiones in aequationes differentiales secundi gradus.* p.90.
- Danielis Bernoullii explanatio Notationum suarum, qua extant Supplem. Tom. VIII., Sect. II. p.97.
- Schediasma IX. *Della quadratura della Post-evoluta della Cicloide.* p.99.
- Schediasma X. *Della connessione, che passa tra la costruzione dell'equazioni Analitiche, e la quadratura d' infinite curve Algebraiche.* p.112.
- Schediasma XI. *De solutione aequationum Analyticarum, & Problematum Geometricorum per curvas simplicissimas.* p.119.
- Schediasma XII. *De modo construendi non ineleganter Problemata plusquam solida.* p.127.
- Schediasma XIII. *De analogia inter aequationes analyticas, & potestates logarithmicas.* p.149.
- Schediasma XIV. *Theoria proportionum per exponentes.* p.152.
- Schediasma XV. *De Organica Curvarum Trajectoria, atque Logarithmica. Construzione a Viro Celeberrimo Joanne Poleno inventa.* p.161.
- Schediasma XVI. *Scientia Dynamica Elementa.* p.163.
- Schediasma XVII. *In pleno tempore, quibus arcus trajectory describuntur, non possunt esse arcus a radio vectore factis proportionalia.* p.198.
- Schediasma XVIII. *Del Sistema Ticonico.* p.199.
- Schediasma XIX. *Riflessioni sopra un principio usato dal Bradley, per ispiegare l' aberrazione delle stelle fisse.* p.205.
- Schediasma XX. *Determinare la lunghezza d' un pendolo semplice isocrono ad un dato composto.* p.208.
- Schediasma XXI. *Delle comunicazioni del moto, che si fanno per via di astrazione.* p.213.
- Schediasma XXII. *Dei limiti, da' quali restano determinate le leg-*

- leggi della comunicazione del moto in qualunque ipotesi. p.228.
 Schediasma XXIII. *Vera, & germana virium elasticarum leges ex phaenomenis demonstrata.* p.239.
 Annorazione dell' Editore. p.258.
 Schediasma XXIV. *Sopra alcune proprietà delle corde elastiche.* p.276.
 Schediasma XXV. *Confutazione dell' ipotesi, che due corpi dotati di eguali quantità di moto urtando in due corde del tutto eguali, le ripieghino per eguali faette.* p.284.
 Schediasma XXVI. *Della proporzione, che passa fra le affezioni sensibili, e la forza degli obbietti esterni, da cui vengono prodorre.* p.287.
 Annorazione del Sig. Ab. Co. Girolamo Lioni. p.297.
 Annorazione dell' Editore. p.299.
 Schediasma XXVII. *Delle Resistenze.* p.323.
 Schediasma XXVIII. *Della Forza, colla quale i corpi fluidi urtano nei solidi, o sia della Resistenza, con cui i mezzi fluidi s' oppongono al moto dei solidi.* p.343.
 Schediasma XXIX. *Data in qualsivoglia modo la forza centripeta per la distanza dal centro, e messa la resistenza in ragione composta della velocità attuale duplicata, e della densità del fluido, investigare le leggi della discesa d' un grave.* p.349.
 Schediasma XXX. *Del moto dei pendoli a cicloide, posta la resistenza del mezzo in ragione duplicata dell' attuale velocità.* p.357.
 Schediasma XXXI. *Sopra le leggi delle resistenze, con le quali i mezzi fluidi risardano il moto de' corpi solidi.* p.376.
 Annorazione del Sig. Ab. Co. Girolamo Lioni. p.386.
 Annorazione dell' Editore. p.387.
 Schediasma XXXII. *Determinare il moto d' un pendolo a cicloide, supposta costante la resistenza del mezzo.* p.396.
 Schediasma XXXIII. *Determinare il moto d' un pendolo a cicloide, supposta costante la resistenza, che si oppone alle discese, ed agli ascendimenti verticali.* p.402.
 Schediasma XXXIV. *Osservazioni sopra il moto de' corpi solidi ne' mezzi fluidi.* p.405.

Sche.

Schedialma XXXV. <i>Delle preffioni, e degli equilibrij de' fluidi.</i>	P.413.
Schedialma XXXVI. <i>Difesa del Corollario II. della Proposizione XXXVI. del Libro II. dei Principi Matematici della Filosofia naturale del Cavalier Ifacco Newton.</i>	P.425.
<i>Annotazione dell' Editore.</i>	P.449.
Schedialma XXXVII. <i>De' focbi primarj, e fecondarj delle lenti sferiche.</i>	P.470.
Schedialma XXXVIII. <i>Omnes radii paralleli in fphæram incideres duplicem refractionem patiuntur.</i>	P.478.
Schedialma XXXIX. <i>Dell' analogia fra i fuoni ed i colori, e del vero metodo di filosofare in Fifica.</i>	P.479.

SCHE

SCHEDIASMA I. (a)

Soluzione generale del Problema inverso intorno a' raggi osculatori, cioè, data in qualsivisia maniera per l'ordinata l'espressione del raggio osculatore, determinar la curva, a cui convenga una tal espressione.

LE ordinate dalla curva ACD (Fig. 1.) partano tutte dal punto B, e sia BC = y , la sua differenza = dy , il minimo arco CI = dx , e CD elemento della curva = ds .

Supposto che il raggio osculatore CG = r sia dato in qualsivoglia forma per l'applicata BC, di modo che la relazione di r ad y possa esprimersi con una nota equazione; si prenda come costante la differenziale CI = dx , ed in questo caso il valore del raggio osculatore verrà determinato dall'equazione $r = \frac{yds^2}{dxds^2 - ydx\,ddy}$, ovvero $yds^2 = dxds^2 -$

$ydx\,ddy$, la qual formula mi fu lecito di prendere ad prestito dal Sig. Marchese dell'Ospitale; mentre essendo notissima a' Geometri, non giudico necessario dedurla dal metodo diretto degli infiniti.

Per liberare la premessa formula dalle seconde differenze, condotta all'ordinata BC la perpendicolare BF, chiamo p la subnormale BF, e q la normale CF, dalla qual denominazione si cavarole seguenti analogie.

$$\begin{array}{l} \text{CB} : \text{BF} :: \text{CI} : \text{ID} \\ y : p :: dx : dy \end{array} \quad \text{dunque} \quad \frac{pdx}{y} = dy, \quad \frac{ydy}{p} = dx.$$

$$\begin{array}{l} \text{BC} : \text{CF} :: \text{CI} : \text{CD} \\ y : q :: dx : ds \end{array} \quad \text{dunque} \quad \frac{qdx}{y} = ds.$$

Già che dunque $\frac{pdx}{y} = dy$, prese di nuovo le differenze in ordine alla pri-

ma ipotesi, supposta costante dx , avremo $\frac{pd^2x}{y} - \frac{dpdx}{y} = -ddy$, e so-

(a) Questo Schediasma è stato pubblicato l'anno 1712. nel Tomo undecimo del Giornale de' Letterati d'Italia, Articolo ottavo.

stituito questo valore nella formula generale, sarà $\frac{yds^2}{v} = dxds^2 + \frac{pdydx^2}{y}$
 $- dpdx^2$: ma $ds = \frac{qdx}{r}$; dunque $\frac{q^2dx}{r} = q^2dx - pydy - y^2dp$, ed essen-
do $dx = \frac{ydy}{p}$, sarà in conseguenza $\frac{q^2dy}{r} = q^2dy + p^2dy - ydp$. Trattan-
to si trova essere $p^2 = q^2 - y^2$, e $pdp = qdq - ydy$. e fatte le sostitu-
zioni, $\frac{q^2dy}{r} = 2qdy - ydq$, cioè moltiplicando tutti i termini per r , e di-
videndoli per q^2 , $\frac{ydy}{r} = \frac{2qdy - ydq}{qq}$, ed integrata l' equazione ,

$$\int \frac{ydy}{r} = b = \frac{y^2}{q}.$$

Tirata poi dal polo B alla CF la perpendicolare BK, faranno in
proporzione continua le rette CF, CB, CK; dunque $\frac{y^2}{q} = CK$, ch'io
chiamerò t , e conseguentemente $\int \frac{ydy}{r} = t \approx b$.

Altra Soluzione.

Così, o in simil maniera avrebbe a procedersi, quando si stimasse
proprio di valersi delle formule già ritrovate, o pure la nostra Analisi
ci conducesse ad una espressione implicata con le seconde differenze;
giacchè non è sempre concesso nello scioglimento d'una questione lo sco-
prire a prima vista la strada più facile. Per altro seguendo i vestigi
ed il metodo del dottissimo Sig. Jacopo Ermanno indicato nel settimo
Giornale d'Italia pag. 194., in due parole si soddisfarà al Problema
proposto.

Condotta dal punto B alla DG la normale BN infinitamente prof-
fima alla BK, stante il parallelismo delle due rette CM, BK perpendi-
colari alla retta CG per la costruzione, e dell'altre due CD, BN nor-
mali alla linea DG, l'angolo MCD sarà eguale all'angolo KBL, e di
più al CGD per la proprietà de' raggi oculari; dunque faranno simili
i due settori BKL, GCD, e così GC:CD::BK:KL: ma CD:DI::
CB:BK; dunque ex æquo perturbate GC, r: DI, dy:: CB, y: KL, dt
cioè $\frac{ydy}{r} = dt$.

COROLLARIO I.

Stimo superfluo l'avvertire, che l'accennata equazione può sempre ridursi ad una differenziale del primo grado, in cui sono separate le indeterminate; imperocchè si hà almeno trascendentemente per y , e le costanti la sommatoria $\int \frac{y dy}{r}$, ed essendo questa più, o meno la costante

$$b = t = \frac{y^2}{q}, \text{ sarà } q = \frac{y^2}{t}, \text{ cioè } q^2 = p^2 + y^2 = \frac{y^4}{t^2}, \text{ e } p = \frac{\sqrt{y^4 - t^2 y^2}}{t}$$

$$= \frac{y dy}{dx}, \text{ o pure } dx = \frac{t dy}{\sqrt{y^4 - t^2}}, \text{ il che ec.}$$

COROLLARIO II.

Se poi si desse in qual si sia modo per y , e le costanti la linea CH intercetta fra il punto della curva C, e la normale tirata dal centro osculatore G all'ordinata CB, si scioglierà facilmente il problema nella infra-scritta maniera. Posta CH = x , è manifesto dalla premessa soluzione essere $\frac{y dy}{r} = dt$, e verificandosi l'analogia CB, y : CK, t : GC, r : CH,

$$x, \text{ sarà } \frac{xy}{t} = r \text{ e sostituito in luogo di } r \text{ questo valore, avremo } \frac{dy}{t} = dt, \text{ ed integrando ec.}$$

COROLLARIO III.

Ma quando le curve cercate avessero relazione al loro asse, in quel caso ripetendo la nostra formula generale $\frac{q^2 dy}{r} = q dy - y dq$, dalla seconda parte dell'equazione dovrebbe sottrarsi la quantità $q dy$; onde l'espressione premessa si reduce alla seguente $\frac{q^2 dy}{r} = q dy - y dq$, o pure $\frac{dy}{r} = \frac{q dy - y dq}{qq}$, la quale sommata da $\int \frac{dy}{r} = \frac{y}{q} \pm b$. Similmente nelle curve all'asse data in qualunque forma per y la retta CH = x , sarà $\frac{dy}{x} = \frac{dy}{r} - \frac{dq}{q}$.

Se bene il Problema, a cui ho soddisfatto, è generale tanto per la sua estensione, quanto per l'uso; con tutto ciò molto più generale dello stesso Problema si è la maniera di scioglierlo, al progresso della quale fatta la debita riflessione, si scoprirà, che poste le differenze delle coordinate d'una curva eguali a dx , dy , e presa la prima come costante, essendo variabile la seconda, il che può farsi in qual si sia caso; se si combineranno in qualunque forma possibile le grandezze date per y , e le differenziali dx , dy , ddy , e di più le loro dignità, o prodotti, purchè nella formola non v'entri l'indeterminata x , o le quantità per essa date, sempre l'equazione differenziale del secondo grado potrà ridursi ad una del primo, valendosi delle normali, e funnormali, tangenti, e suttangenti, o d'altre rette analoghe, conforme richiederà la facilità del calcolo, e la maggior semplicità della soluzione. Fatta poi la riduzione, supposto che in ogni incontro non sieno separabili le indeterminate non farà questo difetto del metodo spiegato; ma piuttosto del metodo inverso delle differenziali del primo ordine, che non è per anche ridotto all'intera sua perfezione.

Eccone un'esempio de' più composti. Nel tentare un Problema di cui per ora darò la sola sintesi, riserbandomi ad altra congiuntura di pubblicarne l'analisi, mi sono incontrato nella seguente equazione d'una curva riferita al suo asse $yddy + dy^2 + dydx = \frac{ydy\sqrt{dx}}{\sqrt{dy}}$. Sia p la

funnormale della curva, e per le cose di sopra esposte avremo $yddy = dpdx - \frac{pdydx}{y}$. Fatta pertanto la sostituzione, $dpdx - \frac{pdydx}{y} + dy^2 +$

$dydx = \frac{ydpdx - pdydx}{y\sqrt{dy}} \cdot \sqrt{dx}$: ma $ydy = dx$; dunque fatta svanire la dif-

ferenziale dx , $\frac{dp}{dy} + dy = \frac{ydp - pdy}{y}$. A fine di separar le indeterminate dell'ultima equazione, sia $\sqrt{y} = z$, e $\sqrt{p} = u$, e fatta l'operazione, $zdu + zdz = zdu - ndz$, la qual espressione può ridursi col metodo del Sig. Beraulli; imperocchè posta $u = zt$, e fatta sparire con l'equazione sussidiaria la quantità u , sarà $\frac{dz}{z} = \frac{a-t}{a^2+t^2} dt$, e la costru-

zione dipenderà dalla quadratura del circolo, e dell'iperbola Apolloniana.

Ma

Ma forse si ridurrà l'equazione $ndu + zdz = zdz = zdu - ndz$ più elegantemente nel modo infraferitto. S' intenda descritta la curva MBC (Fig. 2.), e pongasi $AE = u$, ed EB normale ad $AE = z$, indi trasportata l'equazione della curva all'asse ad un'altra equazione riferita al punto A, si osservi essere il membro $zdu - ndz =$ al trilineo differenziale ABD $= mdu$, chiamata AB m , e dn il minimo arco BD; dunque $ndu + zdz = mdu$: ma $ndu + zdz = mdu$, ed in conseguenza $mdm = mdu$, ovvero $dm = du$. farà pertanto la curva MBC una logaritmica spirale. Presa dunque fra l'unità, e l'abscissa AE la media proporzionale AI, e fra l'unità, e la BE la media IF, per il punto F, ed altri determinati in simil maniera passi la curva LGF, e finalmente si descriva una nuova curva, la cui sunnormale sia data per l'applicata, come l'abscissa AI è data per l'ordinata IF, il che non farà difficile agli Analisti, e li avrà fatto quanto doveva farsi.

S C O L I O II.

Resta, che si metta in chiaro la costruzione di tutte le curve, che mirano un punto fisso, quando però siano separate l'indeterminate; giacchè per quelle, che anno relazione all'asse, la cosa è per se stessa facile, e piana. Io mi servo di questo modo meccanico. Suppongo, che la curva da descriversi sia riferita al suo asse, e la costruisco colle regole note; indi stando rigide le applicate restringo tutta la lunghezza dell'asse in un punto, di modo che si generi la convoluta: dico, che questa sarà la curva cercata.

Io non mi estendo in ispiegare più diligentemente sì fatta sorte di costruzione, perchè molti Geometri, fra quali Jacopo Gregorio, ed il Barovvio, anno parlato a bastanza di questo genere di convoluzione: aggiungo bensì, che con l'occasione di esaminar la materia, ho sciolto il seguente Problema, cioè: trovare una curva all'asse, che convoluta restituisca se medesima, ed ho scoperto essere questa una proprietà mirabile della Parabola ordinaria.

Sia la Parabola AC (Fig. 3.), il cui vertice A l'asse AF, ed il fuoco B, e presa nell'asse prolungato AD $= AB$, s'intenda condotta la perpendicolare DE. Dal punto C segnato ad arbitrio nella periferia della Parabola si tiri l'ordinata CE, e la CB al fuoco: dico, che fatta la convoluzione della figura DACE, si trasformerà questa nel trilineo ACB. Quanto è stato difficile lo scoprire l'accennata verità col mezzo dell'analisi, altrettanto riuscirà facile il dimostrarla per via di sintesi.

Faccendo poi passaggio dalla costruzione meccanica alla geometrica, sia la curva MBC (Fig. 1.) riferita al punto fisso A, la di cui ordinata $AB = y$, e l'arco infinitamente picciolo $BD = dx$, e si esprima la natura della curva con l'equazione $zdy = dx$, nella quale z si suppone data in qualsiasi modo per y , e le costanti. La linea AEL rappresenti l'asse della curva, e fatto centro in A, descrivasi alla distanza arbitraria AL eguale all'unità, o a qualche altra retta cognita, conforme alle

con-

condizioni della curva, l'arco di circolo LGF, e fatta la preparazione come nella Figura, pongasi l'elemento dell'arco LG, cioè $GF = du$.

Perchè i settori ABD, AFG sono simili, farà $AB, \gamma : BD, dx :: AF, a : FG, du$; dunque $dx = \gamma du$; ma $dx = x dy$; dunque $\frac{x dy}{\gamma} = du$,

ed integrando, $\int \frac{x dy}{\gamma} = u$. Si raccoglie dalla premessa soluzione, che

se la retta AI verrà posta $= m$, il minimo arco $FG = du$ potrà esprimersi in un'altra forma, e farà $du = \frac{dm}{\sqrt{a^2 - m^2}}$. Se dunque l'altro mem-

bro $\frac{x dy}{\gamma}$ con le debite sostituzioni potrà ridursi alla formula $\frac{dm}{\sqrt{a^2 - m^2}}$,

o ad altra equivalente, la curva MBC farà sempre Algebrica, ed in ogni altro caso trascendente.

ESEMPIO I.

La curva MBC abbia la sua sottangente costante $= a$; dunque $\frac{ady}{\gamma} = dx$, ed $\frac{ady}{\gamma} = au$, e sommata l'equazione, $a^2 = yu$, cioè $u = a : \gamma :: a : y$.

Costruzione. Sia la retta AL raggio dell'arco LF data di posizione, e tirata ad arbitrio la linea AF, sia come l'arco FL al semidiametro AL, così la stessa AL ad AB, ed il punto B farà nella curva cercata.

ESEMPIO II.

Sia proposta l'equazione della curva MBC $\frac{\gamma dy}{\sqrt{2ay - y^2}} = dx$, o pure

$$\frac{dy}{\sqrt{2ay - y^2}} = du = \frac{dm}{\sqrt{a^2 - m^2}}. \text{ Fatta pertanto } \gamma = a - n, \text{ si avrà}$$

$$\frac{d\gamma}{\sqrt{2a\gamma - \gamma^2}} = \frac{-dn}{\sqrt{a^2 - n^2}} = \frac{dm}{\sqrt{a^2 - m^2}}; \text{ dunque } n = m = a - \gamma.$$

Costruzione. Pongasi $FB = AI$, ed il punto B farà nella curva desiderata. La curva MCB è la più semplice fra l'Episcicloidis, e si ge-

7
 ora quando un circolo si rivolge sopra un'altro circolo eguale, essendo il punto A principio della rotazione. Nello stesso tempo si rifletta, che se si fosse descritta una curva all'asse con l'equazione $dx = \frac{ydy}{\sqrt{2ay-y^2}}$,

questa sarebbe stata la più semplice fra le Cicloidi, dal che ne segue, che l'Epicycloide suddetta è la convoluta della Cicloide ordinaria.

La curva del primo esempio verrebbe descritta da un mobile, che si portasse al suo centro con una forza in proporzione reciproca triplicata della distanza; quantunque in questa ipotesi potesse aver il suo luogo anche la spirale logaritmica: ma se un corpo con relazione al suo centro descrivesse l'epicycloide del secondo esempio, la forza centrale sarebbe reciprocamente come il quadrato-quadrato della distanza, ed il centro farebbe il punto A principio della rotazione.

Questa proporzione reciproca quadruplicata, che sin'ora non è stata considerata da' Matematici, non è arbitraria, o geometrica, ma reale, e fisica, non meno dell'altra tanto famosa, in vigor della quale anelano i corpi al loro centro con una legge, che serba la ragione reciproca de' quadrati. L'illustre Sig. Nevuton, ed alcuni altri Matematici Inglese anno fatta riflessione, che certi corpi, come i magnetici, vengono attratti dal centro, o per dir meglio, vengono spinti verso il centro con una proporzione maggiore della reciproca triplicata; e se non mi tradiscono alcune sperienze da me fatte con tutta la possibile diligenza, posso dire con coraggio, che si verifica la legge sopra esposta, e che di più sono tali, e tante le circostanze, che la confermano, ch'io non posso ragionevolmente metterla in dubbio.

Ma già che s'è fatta menzione delle forze centrali, gioverà forse per dar un saggio del nostro metodo, sciogliere il decantato Problema inverso delle forze predette nel voto. Sia data in qualsivoglia modo per l'ordinata y la forza centrale $f = \frac{ds^2 - yddy}{y^3 dx^2}$, mentre supponghasi dx come

costante. Assunta poscia la subtangente della curva $= z$, col mezzo dell'equazione $ydx = zdy$, fatta sparire in primo luogo la seconda differenziale ddy , indi la dx , si perverrà all'equazione $fdy = \frac{dy}{y^3} + \frac{dz}{z^3}$, la quale in-

tegrata, non omissa l'addizione delle costanti, darà la formula generale espressa con le sue differenze, non dissimile alle altre, che vanno per le mani degli eruditi.

SCHE-

SCHEDIASMA II.

Data in qualsivoglia modo per la curva, che dee descriversi, la espressione del raggio combaciante, determinare la curva medesima.

Quando mi cadde in pensiero di esporre in pubblico nel Tomo undecimo del Giornale de' Letterati d'Italia pag. 204. la mia soluzione del problema inverso intorno i raggi osculatori, altra mira non ebbi, salvo che di spianare un sentiero a coloro, che non li erano per anco internati ne' più profondi misterj del calcolo degl' infiniti; acciocchè potessero giugnere felicemente a soddisfare alle più ardue quistioni della pura, e della mista Geometria. Mi piacque allora di proporre il problema sotto la forma più semplice, e che più viene ad uso, supponendo, che il valore del semidiametro combaciante fosse dato in qualsivoglia maniera per una, o per l'altra delle coordinate: ma perchè bene spesso può intervenire, che la funzione del raggio diafi per le toccanti, per le normali, e per altre rette analoghe, e qualche fiata per la curva medesima, che ha da costruirsi; ho meco stesso divisato per compimento della materia d'aggiungere alla prima un'altra dissertazione.

PROBLEMA PRIMO.

S'intenda dunque descritta (Fig. 4.) la curva ACE, che abbia relazione al suo asse AB, ed il cui raggio osculante EG sia dato in qualunque maniera per l'arco AC. Pongo conforme il solito l'assissa $AB = x$, l'applicata $BC = y$, e la curva $AC = s$, ed in conseguenza i tre elementi CF, FE, CE faranno dx , dy , ds . Apreso sia il raggio $EG = r$ dato per AC, cioè a dire per s , la toccante $HC = t$, e la tangente $HJ = p$.

Primieramente egli è certo essere la formula esprimente il valore del

raggio osculatore, supposta ds costante $\frac{dx ds}{dy} = r$, la quale maneggia-

ta

Si raccoglie da una lettera del Sig. Bernardino Zendrini de' 18. febbrajo 1715. diretta all' Autore, e da una copia di quel tempo del presente Schediasma II, che aveva questo inserto nel Tomo ventesimo del Giornale de' Letterati d'Italia, e formare in esso l'Articolo X. Non essendo allora stampato, è comparso alla luce tradotto in latino ed arricchito d'una Appendice, finalmente l'anno 1737. nella Parte terza del Tomo secondo de' Comentarj dell'Istituto di Bologna. La Dottilissima Signora Contessa Donna Maria Agnesi dà un esempio estratto di questo Schediasma, e del superiore al fine del Libro IV. delle sue Istituzioni Analitiche, che uscirono in Milano l'anno 1748.

ta col metodo spiegato nella citata dissertazione avremo $\frac{yds}{dy} = s$ e

prese le differenze in ordine all'ipotesi di ds costante, $dt = \frac{dy^2 ds}{dy^2} - \frac{ydsdy}{dy^2}$,

vale a dire $\frac{dy^2 ds}{yds} - \frac{dy^2 dt}{r} = ddy$, o pure $dy^2 ds - dy^2 dt = \frac{ydxds^2}{r}$.

Ma essendosi messa la sottangente della curva $= p = \frac{ydx}{dy}$, o $\frac{pdy}{y} = dx$, se col mezzo di questa equazione si farà sparire nella formola principale la flussione dx , si avrà $d/dt - dydt = \frac{pds^2}{r}$, e collocando opportunamente in vece di ds il suo valore $\frac{tdy}{y}$, farà la premessa equazio-

ne ridotta alla equivalente $\frac{tdy - ydt}{tp} = \frac{ds}{r}$. Il secondo membro $\frac{ds}{r}$ può sempre sommarli almeno trascendentemente giacchè nel nostro caso r altro non è, se non se una funzione arbitraria della curva s .

Nel primo poi $\frac{tdy - ydt}{tp} = \frac{tdy - ydt}{t\sqrt{tt - yy}}$, surrogato in cambio di p il suo valore $\sqrt{tt - yy}$, si separano con facilità le variabili, conciossiachè posta $q = \frac{y}{t}$, ed istituite le debite surrogazioni, svaniranno ambo le variabili y, t , e resterà semplicemente $\frac{dq}{\sqrt{1 - qq}} = \frac{ds}{r}$.

In oltre se nella espressione $\frac{tdy - ydt}{tp} = \frac{ds}{r}$, per mezzo dell'equazione $pp + yy = tt$, farà che si dilegui la spezie t , ed in iscambio che comparisca la p , troverò $pdy - ydp = ds$, e fatta $\frac{y}{p} = z$, ne risulterà la formola libera dalla mescolanza delle variabili $\frac{dz}{1 + zz} = \frac{ds}{r}$.

Dalle cose fin qui dimostrate si raccoglie, che tanto il valore della curva s , quanto del raggio r , e della sommatoria $\int \frac{ds}{r}$ si vede noto

o algebricamente, o trascendentemente per x , e di conseguenza, disposta l'equazione come segue $ds = \frac{rdx}{1+zx}$, non si farà qualisiasi confusione

delle variabili: il che pure dee dirsi dell'altra equazione. $\frac{rdq}{\sqrt{1+q^2}} = ds$.

Ora si fa essere $ds = \frac{tdy}{y}$, e $y = q$; dunque $\frac{dy}{y} = \frac{rdq}{\sqrt{1-q^2}}$ ovvero $dy = \frac{rqdq}{\sqrt{1-q^2}}$. E chi volesse servirsi della formola $x = \frac{y}{p}$, con un picciolo

giro di computo scoprirebbe $ds = \frac{\sqrt{pp+yy} \cdot dy}{y} = \frac{\sqrt{1+zx} \cdot dy}{z} = \frac{rdx}{1+zx}$
e finalmente $dy = \frac{rxdx}{1+zx \cdot \sqrt{1+zx}}$.

Ed eccoci pervenuti a due nuove espressioni libere dalla complicazione delle indeterminate, in cui si ritrova l'elemento dy dell'applicata dato per le funzioni dell'arco s ; mentre le tre spezie q , x , r , combinate colla curva s formano altrettante equazioni, che si riducono a' luoghi conosciuti. Ristringendo per tanto i termini, le formole, che abbiamo per mano, si tramuteranno nella più semplice $dy = uds$, ovvero in un'altra equivalente $udy = ds$; imperciocchè, se l'ordinata y è data per la funzione $\int u ds$, ne segue, che la curva s sarà data altresì per una funzione dell'applicata, quale si è $\int udy$, essendosi già scoperta u data in qualche modo per y .

Posta $udy = ds$, sarà $u^2 dy^2 = ds^2 = dx^2 + dy^2$; dunque $\sqrt{u^2 - 1} \cdot dy = dx$, espressione generale, che abbraccia tutte le curve delle quali siamo andati in traccia nel problema, di cui si è data la soluzione.

Dee avvertirsi, che ambo le quantità differenziali $\frac{dq}{\sqrt{1-q^2}}$, $\frac{dx}{1+zx}$

si riducono alla flussione d'un arco di cerchio esposto o per il seno, o per la toccante. Quindi se l'elemento $\frac{ds}{r}$ sarà algebricamente somma-

bile, la rettificazione delle curve cercate, ed in conseguenza il valoré del semidiametro combaciante dipenderà dal tetragonismo del circolo, il quale tetragonismo c'entrerà, qualunque volta l'integrale $\int \frac{ds}{r}$ si ridur-

rà ai logaritmi, o a qualche quadratura di genere superiore. Ma se la sommatoria suddetta ricade nelle formole proprie degli archi circolari; allora tanto la misura della curva, quanto il valore del raggio può essere algebrico. In tal caso è fuor di dubbio, che le quantità s , r , q , z , si riguardano vicendevolmente con una data relazione analitica: ma che alla quantità u convenga una tal proprietà, è facile a dimostrarsi.

Atteſo che s , ed r ſi danno in ordine alla ipotefi algebricamente a cagion d'eſempio per z , e z per $\frac{y}{p}$, cioè per l'ordinata, e la ſuttangen-

te; ſi ricava ch'eſſendo $p = \frac{y^2}{x}$, farà $\frac{pdy}{y} = dx$. Queſto valore di dx

ſi ſurroggi nell'equazione generale delle curve $dx = \sqrt{uu-1} \cdot dy$, ed abbiati $\frac{p}{y} = 1 = \sqrt{uu-1}$, e ſi conchiuda eſſere u data per z , e con-

ſeguentemente per s . Non ſi dee frattanto ſtendere la riſleſſione ſino all'applicata y almeno generalmente: ed in fatti la rettificazione delle noſtre curve non ſi dà analiticamente per le coordinate, ſe non ſe in un ſolo incontro; mentre cioè l'equazione $dy = uds$ ammette integrazione algebrica nell'omogeneo di comparazione.

Sia per eſempio s in qualſivoglia forza data algebricamente per z , ed eſſendo $ds = \frac{zdy}{y}$, e $\frac{z}{y} = \frac{\sqrt{1+zz}}{z}$; dunque $dy = \frac{zds}{\sqrt{1+zz}}$. Pongafi s

$= z$, nel qual caſo ſarebbe il raggio oſculatore $r = 1 + ss$, e l'equazione generale ſi tranſformerà nella particolare $dy = \frac{zdz}{\sqrt{1+zz}}$, laonde in-

tegrando ommetteſſa l'aggiunta della coſtante, $y = \sqrt{1+zz}$. E pure $\sqrt{yy-1} = s = z$, ed $r = yy$. La equazione per tanto della curva per rapporto alle coordinate ſarebbe $\frac{dy}{\sqrt{yy-1}} = dx$, che ſi coſtituiſce ſuppoſta

la quadratura della iperbola.

Sia di bel nuovo $ds = z^{n-1} dz$, o ſia $s = \frac{z^n}{n}$, e $dy = \frac{z^n dz}{\sqrt{1+zz}}$

Queſta equazione farà analiticamente integrabile, ogniquálvolta l'eſponente n ſia un numero intero, ed impari: ma ſe ſoſſe pari, la ſomma-

toria dell'omogeneo di comparazione si avrebbe col mezzo dei logaritmi, o del tetragonismo iperbolico. Negli altri casi, posto cioè l'indice n o negativo, o rotto, l'affetto dal più, o dal meno, rimando il Lettore a quegli Analisti, che delle premesse formole an di proposito ragionato.

Queste osservazioni non sono affatto inutili; conciossiachè ci fanno chiaramente vedere, che bene spesso la espressione del raggio combaciante si riduce dalla funzione della curva a quella dell'ordinata.

C O S T R U Z I O N E .

Espongasi l'indeterminata AB (Fig. 5.), che si chiami s , e ci rappresenti gli archi variabili della curva cercata: e perchè una delle nostre fondamentali equazioni era $dy = wds$, in cui si dimostrava data per s , si metta l'applicata $BC = v$, e s'intenda descritta la curva AC ; egli è manifesto essere lo spazio curvilineo $CAB = \int wds = y$ coordinata della curva, che dee costruirsi.

Appresso dalla equazione $dy = wds$ si passi all'analogia $w:1::dy:ds$; ma s'era già stabilito $ds = ndy$, dunque $w, 1, n$ faranno tre quantità in proporzione continua. Facciasi pertanto come BC all'unità, così l'unità ad un'altra grandezza $= n$.

Quinci si descriva la curva AF , la di cui assissa AE s'uguagli al misilino $ACB = y$, e sia l'applicata $EF = \sqrt{nn-1}$, e conseguentemente

l'arca AFE uguale alla somma $\int \sqrt{nn-1} . dy = x$. Per la qual cosa le coordinate della curva, di cui andiamo in traccia, si esprimono, una cioè x per lo spazio FAE , e l'altra cioè y per lo spazio ABC .

Resta, che si determini geometricamente la curva AC . Per le cose superiormente dette si ha $\frac{ds}{r} = \frac{dz}{1+z^2}$, e per ottenere una più ele-

gante effezione, istituisco la preparazione seguente.

Col raggio IH descrivo il mezzo cerchio HLK (Fig. 6.), ed alla estremità H del diametro alzo la normale HUX , che per essere toccante del circolo, sarà $= z$, giusta le specie da me assunte. Quindi passando

alle integrazioni, $\int \frac{ds}{r} = \int \frac{dz}{1+z^2} =$ all' arco circolare HR : ma

quest' arco si può esprimere diversamente; conciossiachè, posta l'assissa $HP = q$, e l'applicata $PR = \sqrt{2q - qq}$, si trova la funzione $RT = \frac{dq}{\sqrt{2q - qq}}$; dunque $\int \frac{ds}{r} = \int \frac{dq}{\sqrt{2q - qq}} = HR$. Conseguentemente per

una funzione dell'arco stesso, ovvero dell'assissa $HP=q$ sarà data generalmente la curva s , la quale potrà esprimerfi per l'applicata PM d'una curva cognita HMN .

Appresso richiamata a memoria l'altra equazione, viene a dire $dy = \omega ds = \frac{rx dx}{1+2x \cdot \sqrt{1+2x}}$, essendo $\frac{rdx}{1+2x} = ds$; si avrà $\omega ds = \frac{2 ds}{\sqrt{1+2x}}$, o pure $\omega = \frac{2}{\sqrt{1+2x}}$. Verificandosi poi l'analogia

$IR = 1 : RP = \sqrt{2q-qq} : TU = \sqrt{1+2x} : UH = 2$, si scoprirà $\frac{2}{\sqrt{1+2x}} = \sqrt{2q-qq}$; dunque $\omega = \sqrt{2q-qq} = PR$. In ordine

a ciò paragonando la Figura 6. colla 5. si raccoglie, che le rette PM , PR faranno le ordinate corrispondenti della curva AC , cioè $PM =$ all'assissa $AB=s$, e $PR =$ all'applicata $BC = \omega$: lo che rimaneva ad investigarsi.

Nella costruzione generale si è ommessa l'aggiunta delle costanti, lasciando a' Geometri la cura di determinarle ne' casi particolari.

Soluzione seconda.

La formula del raggio osculante esposta colle seconde differenze si era $\frac{ds}{r} = \frac{ddy}{dx}$, nella quale veniva assunto siccome costante l'elemento

ds della curva, che dee costruirsi. Ora costituendo un'altra espressione equivalente, in cui le costanti non abbian luogo, ci si affaccia la seguente $\frac{ds}{r} = \frac{dsddy - dydds}{ds dx}$. Per far isvanire le seconde flussioni, ci si

presenti l'omogeneo di comparazione sotto quest' altro oggetto

$\frac{dy}{dx} \cdot \frac{ddy}{dy} - \frac{dds}{ds}$, indi si osservi, che le quantità $\frac{ddy}{dy}$, $\frac{dds}{ds}$ sono integra-

bili per via de'logaritmi, e la loro sommatoria si è $ldy - lds$, che fatta $= lp$, nascono le due equazioni $\frac{ddy}{dy} - \frac{dds}{ds} = \frac{dp}{p}$, e $dy = p \cdot ds$. Sarà

pertanto $\frac{ds}{r} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dp}{p}$; ma $p = \frac{dy}{ds}$, e $\frac{dy^2}{ds} = ds^2 = dx^2 + dy^2$; dunque

dx

¹⁴
 $dx = \frac{\sqrt{1-pp}}{p} \cdot dy$. Fatta opportunamente la sostituzione de' valori,

troveremo $\frac{ds}{r} = \frac{dp}{\sqrt{1-pp}}$, e scoperta questa equazione, in cui sono se-

parate le variabili, si proceda come nell'antecedente soluzione.

Nella formola $\frac{ds}{r} = \frac{dsddy - dydds}{dx dx}$ presa per costante ds , e messa

$dy = pds$, dopo le debite operazioni, tornerà in campo la espressione

$$\frac{ds}{r} = \frac{dp}{\sqrt{1-pp}}.$$

Pongasi espresso dy in figura di costante, onde abbiassi $\frac{ds}{r} = -\frac{dydds}{dx ds}$,

e fatta $ds = qdy$, o $dds = dydq$, e perciò $\frac{ds}{r} = -\frac{dy^2 dq}{dx ds}$, ed adoperare

le convenienti sostituzioni, perchè si dilegui col prodotto $dx ds$, si sco-

prirà $\frac{ds}{r} = -\frac{dq}{\sqrt{qq-1}}$.

Assumasi finalmente un'altra formola de' raggi osculanti, a cagion
 d'esempio $r = \frac{ds^3}{-dxddy}$, ovvero $\frac{ds}{r} = -\frac{dxddy}{ds^3}$, in cui si suppone co-

stante l'elemento dx . sia $z = \frac{dx}{dy}$, e $dz = -\frac{dxddy}{dy^3}$: di conseguenza

farà $\frac{ds}{r} = \frac{dy^2 dz}{ds^3}$: ma nella ipotesi di $dx = zdz$ avrassi $ds^3 = dx^3 +$

$+ dy^3 = 1 + zz \cdot dy^3$, e surrogato in cambio di ds^3 questo valore, ri-
 sulterà $ds = \frac{dz}{1+zz}$.

In qualunque maniera ci adoperiamo sempre interviene, nè può
 succedere altrimenti, che l'integrale $\int \frac{ds}{r}$ ha rapporto alla misura degli

archi circolari, la differenza de' quali ci viene espressa, o per via de' seni,
 o per mezzo della secante, o della tangente.

Solu-

Soluzione terza.

Dalle soluzioni analitiche passo ad una geometrica, che in un sol colpo tronca il nodo della questione, senza che ci sia bisogno di ricorrere alle formole da altri industriosamente scoperte.

Nella curva cercata, che suppongo descritta, segno le due porzioni infinite, ed uguali AC, CI (Fig. 7.), e tiro le due secanti infinitamente prossime LCE, KCI . Le due normali CG, IG alle due corde AC, CI s'uniscono nel punto G , e conseguentemente determinano il raggio combaciante CG dato per una funzione della curva. Quindi condotte dai punti C, I le ordinate CB, ID , e di più la fluizione CF dell'assisa parallela all'asse HD ; fatto centro in C alla distanza minima CI descrivo l'archetto IE , e col semidiametro CN eguale ad una qualunque costante, l'arco di cerchio NLK , il di cui elemento LK resterà intercelto dalle due secanti CAL, ICK .

Dalla preparazione si deduce essere simili i due settori CGI, KCL siccome simili al terzo infinitesimo ICE ; dunque assunto il semidiametro CN pari all'unità, si avrà $CI = LK$; ma CG si suppone data per $\overline{CG}$

la curva cCI ; dunque la curva medesima, ed il raggio combaciante sarà dato per l'arco LN , cioè, (supposta la rettificazione della periferia, e delle sue parti) per il seno LM , o pure per CM , e parimenti CI fluizione della curva per una quantità differenziale dell'arco LN , o dei seni corrispondenti LM, MC . Essendo poi simili i due triangoli LMC, CFE , o CFI , conformemente che le linee costituenti il primo triangolo serbano vicendevolmente una nota relazione; così lo stesso dee dirsi delle tre rette infinitamente piccole, che compongono il secondo triangolo: laonde abbiamo tutto ciò, ch'era necessario per descrivere la curva cercata.

E qui si noti, che sebbene il cerchio CNL si cangia di posizione, e che il suo centro C si applica successivamente ad ogni punto della curva cAI ; ciò non ostante la soluzione è libera da qualunque ombra di paralogismo. Oltre che il raggio CN è sempre lo stesso; quello che più importa si è, che in qualsivoglia positura il punto N sta sempre fisso, ed è la comune origine di tutti gli archi NL crescenti, o decrescenti, aggiunto, o sottratto, se così pare, un arco costante; onde la nuova origine si trasporta in un altro punto della periferia circolare, ma sempre ugualmente distante dal punto N . Concepisco, che l'ordinata CB parallela a se stessa vada radendo col suo punto estremo C la curva CAc , e trasferisca con seco il cerchio CNL ; acquistata ch'essa abbia la posizione, per esempio cb ; succederà bensì, che le secanti cl, ck taglino l'arco nl ne' due punti l, k diversi affatto dagli altri due L, K , che gli archi nl, NL non sieno fra loro eguali; ma il punto c sarà in ogni sito il centro del cerchio descritto col semidiametro $cn = CN$, ed il punto n lo stesso.

stessi stessissimo coll' altro N; laonde gli archi crescenti nl , NL avranno una comune origine.

C O S T R U Z I O N E .

Il progresso del discorso ci guida ad un' altra costruzione onninamente diversa da quella, che si è dedotta dalla prima soluzione del problema.

Ed in fatti, essendo la curva cercata il suo raggio combaciante l'arco NL , ed i due seni LM , MC tutte quantità date l' una per l' altra, cioè le due prime per la ipotesi, e le tre altre per il giro della preparazione, e pel raziocinio indi nascente; ne segue, che prolungata, occorrendo, l'ordinata CB , e lasciata cadere sopra essa dal centro G la perpendicolare GP , ci si presenteranno le seguenti analogie

$CL:LM::GC:CP::IC:CF$. Ma l'elemento CI della nostra curva si esprime per il prodotto del semidiametro osculante GC , nella fluzione circolare IK ; dunque $CI = GC:IK$, e conseguentemente
 $CL:LM::GC:CP::GC:IK:CF$.

Il primo analogismo ci fa vedere essere il co-raggio CP dato per una funzione dell' arco NL , o la seconda proporzione ci dà l'uguaglianza $CP:IK = CF$.

Con un simile andamento pervenuti alle analogie $IC:CM::CG:GP::CI:IF$, e messo in vice di CI il valore $GC:IK$, due illazioni ci si presentano: una, che l'altro co-raggio GP si rende noto per una funzione dell' arco NL : la seconda, che si ha l'equazione $GP:IK = FI$, e con ciò si fanno manifesti i valori delle due differenze CF , FI , e colle loro somme anco quelli delle due coordinate della curva in questione riferita all'asse HB .

Scendasi in una linea retta l'arco NLK , e segnato (Fig. 7., e 8.) in essa retta il punto n analogo al punto N , prendansi le assisse nl , nk uguali agli archi crescenti NL , NK ; e tirate le due normali lp , lq in figura di ordinate, mettasi la prima uguale al co-raggio CP , e la seconda all'altro co-raggio GP . Per i punti poi p , q , ed altri infiniti in simil maniera determinati descrivansi le due curve rp , sq ; egli è manifesto, che lo spazio elementare plk , la di cui sommatoria si è l'area mistilinea $lurp$, si trova uguale tanto al rettangolo $CP:KL$, quanto alla differenza CF dell' assissa spettante alla curva cercata CAI ; dunque facendo transito alle integrazioni, per la menzionata area $lurp$ si determinerà la suddetta assissa. Similmente l'area differenziale $q.k = GP:LK = FI$ ci dà per via delle sommatorie da una parte lo spazio curvilineo $lnsq$, e dall' altro l'ordinata BC della nostra curva integrale della fluzione FI . Per la qual cosa applicati all'unità i due spazi $lurp$, $lnsq$, esprimono, il primo l'assissa, ed il secondo l'ordinata della curva, di cui si va in traccia lo che ec.

PRO-

P R O B L E M A S E C O N D O .

Mentre s'intenda dato in qualunque modo per la curva *cAC* (Fig. 7.) il co-raggio *PC*, ch'io chiamerò *u*, si scioglierà agevolmente la quistione, servendosi delle cose premesse. Scelgo ad arbitrio una delle tre formule della seconda soluzione per esempio $\frac{ds}{r} = \frac{-dq}{q\sqrt{qq-1}}$; ma come *GC*

$\equiv r$: *CP* = *u*: *CI* = *ds*: *CF* = *dx*; dunque $uds = r$, ed in conseguenza

$\frac{ds}{u} = \frac{-dqds}{qdx \cdot \sqrt{qq-1}}$. Ma per l'ipotesi $ds = qdy$, e $dx = \sqrt{qq-1}$

dy; dunque avremo dopo le debite sostituzioni $\frac{ds}{u} = \frac{-dq}{q\sqrt{qq-1}}$.

Con lo stesso metodo, dato per la curva *cAC* l'altro co-raggio *GP*, scopriremo, posto *GP* = *z*, l'equazione $\frac{ds}{z} = \frac{-dq}{\sqrt{qq-1}}$. Quindi con-

chiuderemo, che siccome l'integrale $\int \frac{ds}{r}$ s'eguaglia ad una espressione dell'arco circolare; così le altre sommatorie $\int \frac{ds}{u}$, $\int \frac{ds}{z}$ si rinvencono eg-

uali a quantità, che ci portano alla quadratura dell'Iperbola, o ai logaritmi.

Nelle quistioni proposte l'espressioni del raggio combaciante, o d'ambo le sottosculatrici si suppongono date per le funzioni della curva, che dee descriversi, senza che c'entrino le coordinate; è perciò cosa chiara essere indifferente il considerare la nostra curva relativamente all'asse, o al foco. Ho prescelta la prima ipotesi siccome più semplice.

A P P E N D I C E .

Giacchè sto maneggiando le formole differenziali del secondo ordine; piacemi di soggiungere un metodo venutomi in mente, e di cui non credo, che il più generale possa proponersi; perchè si stende a tutte le classi delle flussioni, ed in ognuna d'esse abbraccia infiniti casi, ristretti però fra certi limiti, ed adempiute alcune condizioni, che io anderò succintamente esponendo. Ad una perfezione troppo eccellente, e superiore forse all'umano intelletto, si ridurrebbe il calcolo integrale,

Opere Ricc. Tom. II.

C

fe

se ci venisse fatto di comprendere sotto un solo canone tutte le possibili formole.

Dico per tanto, che se nell'equazioni differenziali del secondo grado, assunto, o non assunto un primo elemento siccome costante, non si rinviene l'una, o l'altra delle variabili finite x , o y colle loro funzioni; la formola è sempre riducibile alle prime similitudini. Già se n'è dato un saggio nello scioglimento de' premessi problemi. Generalmente poi si operi, come nel seguente esempio.

L'espressione de' raggi combacianti, messa dy costante, si è $-\frac{dx ds^2}{dy ds} = r$. Ora vogliasi, che il raggio r sia dato per una qualunque

potestà della tangente $t = \frac{y ds}{dy}$, onde abbiassi $r^m = \frac{y^m ds^m}{dy^m} = r$, e con-

seguentemente $-\frac{dx ds^2}{dy ds} = \frac{y^m ds^m}{dy^m}$. Prima d'ogni altra cosa egli è ma-

nifesto, che l'equazione è contenuta sotto il nostro canone; avvegnachè sebbene in essa si ravvisa la ordinata y alzata alla potestà indeterminata m ; non ci si trova però nè l'assissa x , nè taluna delle sue funzioni.

E perchè si è presa costante dy , per far irvanire la seconda differenza dds , facciassi $q dy = ds$, e differenziando, $dq dy = dds$, e messa in uso la sostituzione, $-\frac{dx ds^2}{dq dy^2} = \frac{y^m ds^m}{dy^m}$, ovvero $-\frac{dx}{dq} = \frac{y^m ds^{m-2}}{dy^{m-2}}$. In

luogo di ds^{m-2} si collochi il suo valore $q^{m-2} \cdot dy^{m-2}$, ed in vece di dx

l'altro valore $\sqrt{qq-1} \cdot dy$, onde ci si presenti la equazione

$$-\frac{dy \cdot \sqrt{qq-1}}{dq} = \frac{y^m q^{m-2} dy^{m-2}}{dy^{m-2}} : \text{la quale espurgata ci dà } -dy = \frac{q^{m-2} dq}{\sqrt{qq-1}}. \text{ Perciò l'applicata } y \text{ della curva da costruirli è data per } q,$$

ed a vicenda q data per y : ma $dx = \sqrt{qq-1} \cdot dy$; dunque integrando, la spezie x , che segna l'assissa, si rende nota per l'ordinata y : lo che cc.

In un caso particolare messo l'esponente $m=3$, onde i raggi osculanti sieno sempre come i cubi delle rispettive tangenti l'espressione $-dy = \frac{q^{m-2} dq}{\sqrt{qq-1}}$ ridurrassi alla seguente $-dy = \frac{q dq}{\sqrt{qq-1}}$, e sommando,

$$\frac{y}{2y^2} = \sqrt{qq-1}. \text{ Ometto la costante; perchè con aggiungerla non si}$$

di-

diversifica nè punto nè poco la natura della curva. Ma si è trovata
 $dx \sqrt{qq-1} \cdot dy$; collocato dunque in vece di $\sqrt{qq-1}$ il suo valore equiva-
 lente $\frac{1}{2y}$, farà $dx = \frac{dy}{2y}$, ed integrando, $x = c - \frac{1}{2y}$, e conse-

guenteimente $2xy = 2cy - 1$: luogo alla iperbola fra gli assintoti, della
 quale ci si affaccia una curiosa proprietà.

Già si è veduto, che se nelle equazioni differenziali del secondo
 grado non si ritrova l'indeterminata x , o l'altra y , c'è un metodo fer-
 mo di operare, che ci guida alle prime differenze: soggiungo, che in
 quelle del terzo ordine succede lo stesso, quando mancano amendue,
 e la equazione è libera dalle variabili finite.

Eccone un'esempio. Sia $dxddy + dx^2ddp = dx^4 + dy^4$; e sia stata
 assunta come costante dx . Pongo $pdx = dy$; dunque $dpdx = ddy$, e
 $dxddp = ddy$. Fatte le debite sostituzioni, avremo $dx^2ddp + dx^3dp =$
 $= dx^4 + dy^4$; ma $dy^4 = p^4dx^4$; dunque $dx^2ddp + dx^3dp = dx^4 +$
 $+ p^4dx^4$, e dividendo per dx^2 , farà $ddp + dx dp = dx^2 + p^4dx^2$. Così
 siamo giunti ad una espressione del secondo grado compresa dal canone
 testè stabilito. E proseguendo, metto $qdx = dp$, e differenziando nella
 ipotesi di dx costante, $dqdx = ddp$, ed in ordine a ciò, $dqdx + dpdx =$
 $= 1 + p^4 \cdot dx^2$, o pure $dq + dp = \frac{1 + p^4}{q} \cdot dx$: ma $dx = \frac{dp}{q}$; dunque

$dp + dq = \frac{1 + p^4}{q} \cdot dp$. Spesse fiate interviene, che le due variabili co-

struente l'equazione sieno imbrogliatissime, e pressochè impossibili a se-
 pararsi: ma questo non è difetto del metodo, che vado esponendo.
 L'intoppo nasce dalla teorica delle primarie differenze, che massime,
 rispetto allo sviluppo delle incognite, è lontana assai dalla ultima
 perfezione.

Avanzo cammino, e dico, che nelle formole differenziali del quarto
 ordine, per configuire generalmente, che sieno riducibili a quelle del
 primo, oltre le variabili finite anno da mancare o l'una o l'altra delle
 prime flussioni dx , dy colle loro funzioni. Dalle espressioni poi del quinto
 debbono restar escluse ambedue. In quelle del sesto, oltre le menzionate
 quantità finite, ed infinitesime, o l'una, o l'altra delle seconde differ-
 renze ddx , ddy colle loro funzioni, ed ambo in quelle del settimo, e
 così di mano in mano all'infinito.

Esempio del quarto ordine. Sia $d^4y + dxd^3y - dx^2ddy = 0$, e la co-
 stante assunta dx . Facciasi conforme il solito $pdx = dy$, e conseguen-
 temente $dpdx = ddy$, $dxddp = d^3y$, $dx^2dp = d^4y$; e sostituendo $dx^2dp +$
 $+ dx^3ddp - dx^2dp = 0$, ovvero $d^3p + dxddp - dx^2dp = 0$. In tal guisa
 siamo arrivati ad una equazione del terzo grado, in cui non si trova al-
 cuna quantità finita variabile. Si proceda dunque colla solita maniera,
 e dopo varie operazioni, mettendo $qdx = dp$, indi $2dx = dq$, si otterrà

C 2

la

la formola $xdx + xdq = qdq$, nella quale le indeterminate sono separabili per via de' metodi conosciuti.

Non è difficile render ragione de' premessi canoni conciossiachè non adempiute le accennate condizioni, giunti che saremo col giro del nostro metodo alle prime differenze, dopo aver fatto svanire le seconde, le terze ec., l'equazione indi nascente conterrà non solo le incognite principali x, y , ma di più le assunte p, q ec. colle loro flussioni. In tali incontri non si fa per lo più sviluppare le indeterminate, o ridurle alle integrazioni. Gioverà in sì fatti casi tentare la cosa per altre strade, e mettere in uso alcune particolari industrie con incertezza del buon esito.

SCHEDIASMA III.

*Risposta ad alcune opposizioni fatte dal Sig. Giovanni Bernulli alla soluzione del Problema inverso delle forze centrali nel voto in ragione reciproca de' quadrati delle distanze, pubblicata dal Sig. Jacopo Ermanno nel secondo Tomo del Giornale de' Letterati d'Italia
Articolo XV.*

IL dottissimo Sig. Jacopo Ermanno, mentre occupava il posto di Pubblico Professore di Matematica nell'Università di Padova inserì nel Tomo secondo del Giornale de' Letterati d'Italia una sua elegantissima soluzione del problema inverso delle forze centrali nel voto, limitando però la legge delle forze medesime alla proporzione reciproca duplicata delle distanze. Ebbe egli la mala sorte d'incontrare due famosi Avversari, l'uno in Italia, e l'altro di là da' Monti: e quantunque alle difficoltà messe in campo dal primo abbia soddisfatto l'Autore stesso, pubblicando replicate Dissertazioni in sua difesa (sopra il qual punto io non penso di prender partito per non far mie le altrui controversie) contuttociò succede ora il secondo senza dubbio più formidabile, ed è il Sig. Giovanni Bernulli, il cui solo nome basterebbe a dar peso alle opposizioni, quando nelle materie analitiche non si dovesse cedere il primo luogo alle dimostrazioni, e all'evidenza.

Nel comunicare che questi fece alla regia Accademia di Parigi due soluzioni generali del problema mentovato, che si trovano registrate nelle Memorie dell'anno 1710., v'aggiunse anche quella del Sig. Ermanno accompagnata però da un esame così severo, che ben si scopre aver lui preteso con l'altrui paragone dare un maggior risalto alle cose proprie. Ma s'io non m'inganno, mi pare, che un soggetto per altro
ver-

Leggesi un tale Schediasma nel Tomo XIX. del Giornale de' Letterati d'Italia, Articolo VII., impresso l'anno 1714.

versatissimo in sì fatte speculazioni, siasi lasciato sorprendere dalla prima apparenza, e che tutte le riflessioni derivino dal non avere ben ponderata la forza, e l'eleganza della soluzione controversa. Tutta dunque la disputa verterà, non sopra il problema sciolto, che non è soggetto ad opposizione; ma sopra la maniera di scioglierlo, conforme il genio di questo delicatissimo secolo, che avendo insieme congiunte l'Analisi e la Metafisica, non fa tanto conto della verità ritrovata, quanto del metodo, con cui si scopre, e si manifesta. Sarebbe desiderabile che il Sig. Ermanno prendesse sopra di se il carico della risposta: ma perchè dalla gratitudine, e dall'amicizia gli vengono tolte di mano fino le armi a difesa, mi sforzerò io, per quanto fo, e posso, di supplir le sue veci; ond'egli abbia almeno, di quanto rinfrescimento sia stata in Italia la sua partenza, e con quale parzialità si conservi la sua memoria.

Frattanto perchè il Lettore non abbia a mendicare altronde lo stato della questione, registrerò la soluzione del Sig. Ermanno tradotta fedelmente dalle citate Memorie dell'Accademia di Parigi.

Sia ABC (Fig. 9.) la curva cercata, LI il suo asse, S il centro delle forze, BC una particella infinitamente picciola della curva, sopra la qual particella prolungata prendasi CE = CB; dal punto E avendo tirata ED parallela a CS, e che incontri la curva nel punto D, sieno DF, CG, BH parallele a LI, dalle quali verrà incontrata in F, G la picciola retta EG parallela a BI, e che incontri la CG in C.

Ciò fatto, chiamisi SI = x , BI = y , si avrà SC = $\sqrt{x^2 + y^2}$, BH, o CG = dx , CA, o EG = dy , e conseguentemente CG = Cf , o DF = $-ddx$, EF = $-ddy$; ciò che darà il doppio del triangolo BSC, o CSD = $ydx - xdy$, ch'io suppongo costante; di maniera che i triangoli per la costruzione simili EDF, CSK renderanno ED = $-\frac{ddx \sqrt{xx + yy}}{x}$

Ora perchè il triangolo BSC è per ipotesi costante, s'avrà DE in ragione della forza centrale al punto C, cioè a dire in ragione di $\frac{1}{xx + yy}$

o in ragione di $\frac{ydx - xdy}{xx + yy}$, onde risulta l'equazione espressa con le se-

$$\text{conde differenze } -addx = x \cdot \frac{ydx - xdy}{xx + yy \cdot \sqrt{x^2 + y^2}} = ydx - xdy.$$

$$\frac{yxdx - x^2dy}{xx + yy \sqrt{xx + yy}}, \text{ il cui integrale si è } -dx = \frac{-y}{\sqrt{xx + yy}} \cdot \frac{ydx - xdy}{\sqrt{xx + yy}} =$$

$$ydy$$

$xydy - yjdx$, ovvero $-\frac{abx}{xx} = \frac{bxjdy - by^2dx}{xx \cdot \sqrt{xx+yy}}$, la cui sommatoria è pa-

rimente $\frac{ab}{x}$, o più generalmente $\frac{ab}{x} \pm c = b \frac{\sqrt{xx+yy}}{x}$ o pure $a = \frac{cx}{b}$

$= \sqrt{xx+yy}$. che è una equazione alle tre sezioni del cono, vale a dire alla parabola, se $b = c$; all'ellissi, quando $b > c$; ed all'iperbola, in caso che sia $b < c$.

Esaminiamo ora le opposizioni del Sig. Giovanni Bernulli. Per parlarvi con tutta libertà, dic'egli nella risposta al Sig. Ermanno, la vostra soluzione sembra fatta a disegno, adattata a ciò, che voi andavate cercando, ma che nel tempo stesso era da voi conosciuto. Infatti come mai senza una precedente notizia avreste potuto sapere, che per trovar l'integrale della vostra equazione

$$- ddx \frac{\sqrt{xx+yy}}{x} = \frac{ydx - xdy}{xx+yy}^2, \text{ bisognava}$$

ridurla a $- ddx = \frac{ydx - xdy}{xx+yy} \cdot \frac{ydx - x^2dy}{xx+yy \cdot \sqrt{xx+yy}}$? Di più come senza ciò

avreste voi saputo tirare l'integrale di quest'ultima equazione, ed in oltre l'integrale dell'integrale? poichè le indeterminate ci sono talmente complicate, che il voler separarle sarebbe intraprendere una fatica disperata: e certamente vi sarebbe riuscito impossibile il sommarle così confuse, come da voi è stato fatto, se non aveste subodorato, che le sezioni coniche, le quali v'erano sempre anzi gli occhi, soddisfacevano alla vostra equazione differenziale del secondo ordine da voi felicemente incamminata al termine del vostro viaggio, e che non vi è stato difficile di ridurre finalmente ad una equazione puramente algebrica.

Sin qui il Sig. Bernulli; ed io confesso di non sapere per quale strada sia pervenuto il Sig. Ermanno alla sommatoria bramata: so bene, che poco, o nulla gli sarebbe giovato l'aver in vista le sezioni del cono; mentre cangiando ipotesi, e prendendo di mira le curve medesime riferite al loro centro, o altre curve già conosciute per venire a capo della sua soluzione, gli sarebbe convenuto derivarla da principj diversi, come vedremo a suo luogo; e perciò questo profondo geometra ha limitata la sua scoperta a quel solo caso, in cui poteva più facilmente aver luogo riferendosi poi di darne una soluzione più generale, ma meno semplice, per essere involuta fra quantità trascendenti.

Per altro io sono rimasto attonito, in riflettendo, che il Sig. Bernulli giudica disperata la separazione delle indeterminate nella formola del Sig. Ermanno, ed in conseguenza la sua doppia integrazione, o sia riduzione a grandezze algebriche. Io bramerei, che tutte l'equazioni
dif.

23
differenziali fossero simili alla proposta, giacchè nel calcolo sommatorio non ci sarebbe più che desiderare, ed avremmo una volta ridotto alla intera sua perfezione il metodo inverso degli infiniti.

Sia dunque $\frac{ddx \cdot \sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{ydx - xdy}{xx + yy}$; egli è manifesto, che

essendosi presa $ydx - xdy$ costante, se divideremo la seconda flussione ddx per $ydx - xdy$, la grandezza, che ne risulta, sarà integrabile: quindi rigettate tutte le altre quantità nel membro corrispondente dell'equazione resta a vedersi, se ci sia modo di separar le variabili, e se fatta la separazione si possa pervenire ad una integrazione algebrica. Avremo pertanto l'equazione espressa nella seguente maniera

$$= x \cdot \frac{ydx - xdy}{xx + yy \cdot \sqrt{xx + yy}}$$

Nel secondo membro la quantità $ydx - xdy$ si fa sommabile com'è noto, mentre si divida per il quadrato y^2 , ed in conseguenza sarà —

$$\frac{ddx}{ydx - xdy} = \frac{xyy}{xx + yy \cdot \sqrt{xx + yy}} \cdot \frac{ydx - xdy}{yy} \cdot \frac{dp}{yy}$$

ed integrando, $\frac{x}{y} = p$ fatta in consonanza di ciò l'opportuna sostituzione,

$$\text{ne, si scoprirà essere } \frac{ddx}{ydx - xdy} = \frac{xyydp}{xx + yy \cdot \sqrt{x^2 + y^2}}$$

dell'equazione $\frac{x}{y} = p$ facciasi svanire l'una, o l'altra delle indeter-

minate x, y , e se nell'operazione ambedue si dileguano, come accade nel caso nostro, segno manifesto è, che le variabili senz'altro artificio si separano. Nell'esempio proposto sparisce x , colloando in sua ve-

$$\text{ce il valore } yp, \text{ e perciò } \frac{d^2x}{ydx - xdy} = \frac{y^3dp}{y^2p^2 + a^2y^2 \cdot \sqrt{y^2p^2 + a^2y^2}}$$

$$\frac{pdp}{a^2 + p^2 \cdot \sqrt{a^2 + p^2}} \cdot \text{Conseguita la separazione delle indeterminate nell'o}$$

mo-

omogeneo di comparazione, facilmente si scopre esser sommabile la funzione
 ne $\frac{pdp}{a^2 + p^2 \cdot \sqrt{a^2 + p^2}}$, che dà $\frac{-a}{\sqrt{aa+pp}}$, ed in conseguenza

$$\frac{-dx}{ydx - xdy} = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + p^2}} = \frac{-y}{\sqrt{xx + yy}}, \text{ surrogato in cambio di } p \text{ il suo}$$

valore $\frac{x}{y}$. Ed ecco la prima integrazione del Sig. Ermanno: facciamo

passaggio alla seconda. Conciossiachè $\frac{-dx}{ydx - xdy} = \frac{-y}{\sqrt{xx + yy}}$, farà

$$-dx = \frac{y}{\sqrt{xx + yy}} \cdot \frac{xdy - ydx}{x}. \text{ Pongo } \frac{y}{x} = q; \text{ dunque } xdy - ydx =$$

$$= x^2 dq, \text{ cioè a dire } -dx = \frac{yxdq}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \text{ e fatta svanire nel presente caso}$$

$$\text{la quantità } y, -dx = \frac{x^2 q dq}{\sqrt{aa + qq}}, \text{ e finalmente } \frac{-dx}{x} = \frac{q dq}{\sqrt{aa + qq}},$$

$$\text{si che sommando, } \frac{ab}{x} \pm c = b\sqrt{aa + qq} = \frac{b\sqrt{xx + yy}}{x}, \text{ che è la se-}$$

conda sommatoria del Sig. Ermanno.

Altramente.

Mi sia concesso di ridurre l'equazione controversa ad una formula più semplice, ed equivalente. Chiamerò z la retta $SC = \sqrt{xx + yy}$, e giacchè è costante la quantità $ydx - xdy$, si potrà denominare per brevità dt , essendo nel caso nostro la differenziale dell'area ABS proporzionale al tempo. Così avremo l'equazione trasformata $\frac{zdx}{x} = fdt$.

Pongo $dx = pdt$, e prese le seconde differenze, stando ferma la costante dt , $ddx = dpdt$; dunque $\frac{zdp}{x} = fdt$, ma $dt = ydx - xdy =$

$$= \frac{z}{\sqrt{zz - xx}} \cdot \frac{zdx - xdz}{x}, \text{ quando in vece della variabile } y \text{ venga so-}$$

sti-

stituito il suo valore $\sqrt{zx - xx}$; dunque $-dp = \frac{fx}{\sqrt{zx - xx}} \cdot \frac{25}{2dx - xdz}$.

Stabiliscasi $\frac{x}{z} = q$, ed in conseguenza $-dp = \frac{fxzqdq}{\sqrt{aa - qq}}$.

Sia in ordine all'ipotesi $f = \frac{a}{zx}$; dunque $-dp = \frac{qdq}{\sqrt{aa - qq}}$, ed

integrando, $p = \sqrt{a^2 - q^2}$. Era in oltre $dx = p dt = \frac{pz}{\sqrt{zx - xx}}$.

$\frac{zdx - xdz}{zq\sqrt{aa - qq}} = \frac{xxpdq}{ax \cdot \frac{dq}{qq}}$, o pure $\frac{dx}{ax} = \frac{dq}{qq}$, collocando in vece di p il

suo valore $\sqrt{a^2 - q^2}$; dunque integrando, $\frac{b}{x} \pm c = \frac{bx}{x}$: il che ec.

E qui si ponderi non succedere, almeno così facilmente, la separazione nell'equazione $-dp = \frac{fxzqdq}{\sqrt{aa - qq}}$, quando si muti la legge della

forza centrale, richiedendosi maggior industria in tutti gli altri casi possibili. Sia per esempio la forza in proporzione della distanza, cioè $f = z$, ipotesi, che va a terminare in curve già conosciute, e sono le sezioni del cono riferite al centro. Avremo pertanto $-dp = \frac{z^2/dq}{\sqrt{aa - qq}}$, o sia

$-dp = \frac{dq}{x^2 \cdot q\sqrt{a^2 - q^2}}$, e sostituendo in cambio di $-dp$ il suo valore $-\frac{ddx}{dt}$

farà $-\frac{ddx}{x^2} = \frac{dq}{q^2\sqrt{a^2 - q^2}} \cdot dt$.

Per quello che appartiene al secondo membro, poco ci è da riflettere; mentre la maniera di sommarlo è per così dire di comune giurisdizione: non così succede nel primo, che nella differenziale del secondo grado ci somministra un nuovo genere d'integrazioni dipendente dalla costante assunta $zdx - xdy$. Che gioverebbe a questo passo aver in vista le sezioni coniche, mentre non si scoprì prima il metodo di sommare l'espressione proposta? Io posso dire con verità, che forse non si

troverà strada per conseguire l'intento, senza che c'entrino, fatte le separazioni, quantità trascendenti. Da quest'osservazione si renderà manifesto, qual differenza passi tra le formule generali, e la particolare del Sig. Ermanno, ed in che principalmente consista la bellezza della sua soluzione.

Desiderava in secondo luogo il Sig. Bernulli, che dal Sig. Ermanno venisse fatta una prova della sua analisi, applicandola all'ipotesi generale, col determinare le curve in qualsivoglia sistema delle forze centrali, almeno supposte le quadrature. Non ha mancato questi di soddisfare ad una brama sì ragionevole, come ne rende una piena testimonianza il Sig. Varignon nelle lodate Memorie dell'anno 1710., e come si può vedere dal quinto Giornale d'Italia, Articolo XVI., in cui si legge registrata la soluzione generale. Tutto l'artificio consiste nel trasportare opportunamente l'equazione differenziale delle curve cercate dall'asse al foco: ma io mi sforzerò calcando un altro sentiero di giungere alla stessa meta, e terrò ferma l'equazione delle curve all'asse medesimo; con che forse m'accontenterò più da presso alla prima intenzione del Sig. Ermanno.

Giacchè $\frac{xdx}{x} = fdt^2$, e $x^2 + y^2 = z^2$, prendasi $xdx + ydy =$

$= xdx = pdt$, e passando alle seconde differenze, posta dt costante, $xdx + ydy + dx^2 + dy^2 = dpdt$; ma la costante $ydx - xdy$ dà $ydx = xdy$, ed in conseguenza $\frac{y^2 ddx}{x} = ydy$; ed essendo

in oltre $dx^2 + dy^2 = \frac{dz^2}{2z}$, come facilmente può dimostrarsi, avre-

mo, fatte le sostituzioni necessarie, $xx + yy \cdot \frac{ddx}{x} = \frac{z^2 ddx}{x} = dpz -$

$-\frac{dz^2}{2z} - dz^2$: ma $\frac{z^2 ddx}{x} = -fdt^2$, e $dt^2 = \frac{z^2 dz^2}{pp}$; dunque $-\frac{fz^2 dz^2}{pp} =$

$= \frac{z^2 dz^2}{p} - \frac{dz^2}{pp} - dz^2$, cioè $-fdz = \frac{pdp}{2z} - \frac{dz}{z^2} - \frac{ppdz}{z^2}$, o pure

$\frac{dz}{z^2} - fdz = \frac{zdp}{z^2} - \frac{p^2 dz}{z^2} = \frac{p}{z} \cdot \frac{zdp - p^2 dz}{z^2}$; sì che integrando,

$\frac{b}{2} - \frac{a}{2z} - \int fdz = \frac{pp}{2z}$, ovvero $\sqrt{bz^2 - a - 2z} \int fdz = p$, dal

che si rende manifesto la quantità p essere data per z , e le costanti.

Di vantaggio, giacchè $\frac{xdx}{p} = dt = ydx - xdy$, pongasi $\frac{x}{y} = q$;

dun-

$$\begin{aligned} \text{dunque } ydx - xdy &= y^2 dq; \text{ ma } xx + yy = z^2, \text{ e } x^2 = y^2 q^2; \text{ dunque} \\ z^2 &= a^2 y^2 + y^2 q^2, \text{ cioè } y^2 = \frac{z^2}{aa + qq}, \text{ e conseguentemente } \frac{dz}{z p} \\ &= \frac{dq}{aa + qq}. \end{aligned}$$

Separate con questo metodo le indeterminate, non sarà difficile passare alla costruzione, essendo noto, che l'integrazione della differenziale $\frac{dq}{aa + qq}$ dipende dalla rettificazione dell'arco circolare, e che le curve

faranno algebriche, ogni qual volta si potrà ridurre ad una simile espressione l'altro membro $\frac{dz}{z p} = \frac{dz}{2\sqrt{bz^2 - a - 2z^2} \int dz}$.

Dalle cose dette si scopre chiaramente, che la premessa soluzione non dissimile a quella del Sig. Bernulli nella conclusione, quantunque ritrovata con maniera affatto diversa, è bensì generale nell'estensione, ed abbraccia tutti i casi possibili; contuttociò non si debbono dissimulare le sue imperfezioni. Infatti quel comparire che fanno le stesse curve geometriche sotto espressioni meccaniche; quelle riduzioni, che restano a farsi, dopo scoperta la formula universale, e che sono più involute della soluzione principale, rendono a mio giudizio perplesso il fatto modo di procedere. Io resto persuaso, che se dagli Analisti si fosse tentato prima il problema inverso del diretto, non sarebbe loro forse caduto in pensiero, che sotto l'espressione $\frac{dz}{z p} = \frac{dq}{aa + qq}$, o altra equivalente, stessero nascoste curve

algebriche, e nel caso particolare di $f = bz^{-2}$, se non si fossero tolte di mira, non si sarebbero forse poste in luce le sezioni del cono.

Lasci dunque d'opponere il Sig. Bernulli essere particolare, limitata, e per questo capo mancante la soluzione del Sig. Ermanno; imperocchè si potrebbe rispondere in primo luogo, che non si trattava di sciogliere generalmente il problema già sciolto dall'illustre Sig. Newton per via delle quadrature, ma solo di vedere, come da tal fonte si derivassero le Trajettorie algebriche, e massime le sezioni coniche. Anno ciò intrapreso i Sigg. Bernulli, ed Ermanno, il primo col dedurre dalla soluzione generale il caso particolare, il secondo abbandonando la soluzione generale, e surrogandoci la particolare. Sin qui camminano del pari, e se voleva il Sig. Bernulli liberare la sua analisi dalla nota di particolare, ch'egli addossa, all'altrui; era d'uopo, che con una generale espressione c'integnasse a distinguere le curve algebriche dalle meccaniche in tutti i casi possibili: quistione proposta dal Sig. Ermanno, nè sciolta da chi si sia; dovendosi forse lasciare la lode di scioglierla a chi l'ha proposta. Direi in secondo luogo, ed il mio detto parerà forse troppo ardito a

taluno, doverfi far più conto della soluzione particolare del Sig. Ermanno, che delle universali pubblicate dagli altri. Il Problema generalmente non può sciogliersi, senza ricorrere alle quadrature, e quello che è più considerabile, senza che le stesse curve algebriche compariscano sotto la maschera d'espressioni trascendenti; onde per riconoscerle sia necessario valersi di certe operose riduzioni, che tuttora esercitano l'ingegno de' Geometri. Anche il caso nostro, che è pure il più privilegiato, ed è, per così dire, il caso della natura, ci si fa innanzi confuso con tutti gli altri nella formula generale meccanica; ha però la buona sorte d'essere l'unico, che possa maneggiarsi con equazioni analiticamente integrabili. Il Sig. Ermanno con una industria degna di lui ha saputo distinguerlo, e separarlo da tutti gli altri più misteriosi, che richiedono nuovo artificio per le riduzioni. Giudichino ora i Geometri, se sia più elegante l'espressione universale, o la particolare, e se debba farsi più stima della regola, o dell'eccezione.

Non occorre, ch'io m'affatichi in soddisfare all'altra difficoltà messa a campo dal Sig. Bernulli, che versava sopra il non essersi dall'Autore della soluzione alla sommatoria delle seconde differenze aggiunta la quantità costante espressa con le prime. Il dottissimo oppositore ha avuto la bontà di troncar questo nodo, e lo stesso Sig. Ermanno non l'ha lasciato senza risposta, come si può vedere dal sesto Giornale d'Italia, Art. 12.

Chiuderò la presente Dissertazione con applicar la mia maniera di separare le indeterminate alla seconda soluzione del lodato Sig. Bernulli. Dalla sua analisi viene egli condotto alla seguente equazione, in cui la forza centrale f si suppone data per x , $f = \frac{dy^3}{2x^3} + \frac{dx^2 dy - x dy dx + x dx dy}{2x^3 dy^3}$.

Per liberarsi dalla confusione delle variabili, osserva doverfi ridurre in compendio la formula col fare svanir due termini nel secondo membro dell'equazione. Arriva ingegnosamente al suo fine, prendendo come costante la quantità $y dx$, o pure $\frac{dx}{x}$; ma oltrechè non v'ha metodo fermo

per fissare le grandezze, che devono far figura di costanti; non so qual luogo potesse trovare in altri casi egualmente ardui quest'artificio.

Io procederei diversamente, facendo prima sparire le seconde flussioni; il che si otterrà facilmente, qualor si rifletta essere integrabile la quantità $dx dy - x dy dx$ divisa per il quadrato dx^2 ; onde avrassi $\frac{dy}{dx} = p$, e $x dx dy - x dy dx = x dx^2 p$. Quindi con l'aiuto d'una congrua

sostituzione liberata l'equazione dall'elemento dy , e dalle sue potestà, scopriremo essere $f = \frac{a}{2x^3} + \frac{a}{2x^3 p^2} + \frac{dp}{2x^3 p^2 dx}$, ovvero $f dx - \frac{dx}{2x^3} =$
 $= dx$

$$= \frac{dx}{2x^2p^2} + \frac{dp}{2x^2p^2} = \frac{a}{2x^2p^2} \cdot \overline{pdx + xdp}, \text{ e separate di bel nuovo le}$$

variabili, col supporre $xp = q$, $\frac{dq}{2q^2} = \frac{fdx}{2x^2} - \frac{dx}{2x^2}$, ed integrando

$$\frac{a}{4qq} = n - \frac{a}{4xx} - \int \frac{fdx}{2x^2}; \text{ ma } q^2 = x^2p^2; \text{ dunque } \frac{a}{4p^2} = nx^2 - \frac{1}{4}a - x^2$$

$\int \frac{fdx}{2x^2}$; così che p farà data per x , ed in conseguenza faranno anche separate le variabili nell'equazione assunta da principio $\frac{dy}{dx} = p$, o $dy =$

$$= p dx.$$

Io mi lusingo, che il Sig. Bernulli prenderà in buona parte questa mia risposta qual ella sia, parendomi nello stesso tempo d'aver favellato con libertà geometrica, e col rispetto dovuto al celebre Oppositore, come uno de' maggiori lumi, che abbiano le Scienze Matematiche, e che certamente non è il secondo fra gli Analisti del nostro secolo.

A N N O T A Z I O N I (*)

Del Sig. Niccolò Bernulli Nipote del Sig. Giovanni sopra lo scbedasma del Sig. Conte Jacopo Riccati pubblicato nel Tomo decimonono del Giornale de' Letterati d'Italia, Articolo VII, coll' annessa Soluzione propria del Problema inverso delle forze centrali agenti in un mezzo non resistente, dedotta da' principj medesimi del Sig. Newton.

A carte 186. linea 5. (a) Ebbe egli la mala sorte d'incontrare due famosi Avversarj, ec. Qui a torto il Sig. Conte considera il Sig. Gio. Bernulli Avversario del Sig. Ermanno, imperciocchè ei mai non s'oppose agli sforzi di questo: ciò che il Sig. Bernulli avvisò amichevolmente, non dee subito prenderli per un'opposizione. Chi sia l'altro famoso Avversario, che ad esso aggiunge, se non m'inganno, l'intendo; ma le sue obbiezioni fatte al Sig. Ermanno, che in parte abbiamo vedute, non sono da noi approvate.

In quel medesimo luogo lin. 27. (b) accompagnata però da un esame così severo, che ben si scopre aver lui preteso con l'altrui paragone dare un maggior risalto alle cose proprie. Una riflessione leggiera non è un esame severo, nè abbisognava a mio Zio dare un grado più eminente alla sua
fo-

(*) Si contengono queste Annotazioni nel Tomo XX. del Giornale de' Letterati d'Italia Articolo XIII.

(a) Nella presente edizione pag. 20. lin. 24.

(b) In questa edizione pag. 20. lin. 36.

soluzione. Il suo fine principale, quando esaminò la soluzione del Sig. Ermanno, non fu di confutare la medesima, ma piuttosto d'indi prendere motivo di comunicare la sua; e così solamente di passaggio accennò, che cosa potrebbe giustamente desiderare in quella del Sig. Ermanno: il che se s'è stato fatto malamente, giudichi lo stesso Sig. Ermanno.

A carte 192. lin.4. (c) *mentre cangiando ipotesi, e prendendo di mira le curve medesime riferite al loro centro gli sarebbe convenuto derivarla da principj diversi*, ec. Parla qui principalmente dell'ipotesi della forza centrale in ragione semplice diretta delle distanze: ma io mi maraviglio, che la soluzione in quest'ipotesi nè sia stata data dal Sig. Ermanno, nè benchè tentata sia potuta essere stata ritrovata dal Sig. Conte Rucato; la quale però più facilmente si deduce da' medesimi principj, come apparirà dalle cose, che sieguono.

In quel medesimo luogo lin.15. (d) *riserbandosi poi di darne una soluzione più generale*, ec. Questa sua soluzione generale mai non l'abbiamo veduta; se essa consiste in una certa equazione de' differenziali del secondo grado, ovvero dove l'indeterminate non giacciono ancora separate l'una dall'altra, in vero poco promuove la cosa; imperciocchè niente v'ha di più facile, che di arrivare ad un'equazione tale quale: non è poco sterminare i secondi differenziali, ovvero cavare l'equazione immediatamente dove vi sono i soli differenziali del primo grado; è molto separare l'indeterminate co' suoi differenziali l'una dall'altra; ma senza dubbio è cosa grandissima nell'applicazione alle ipotesi particolari determinare le specie delle curve: le quali cose tutte, se non m'inganno, fece mio Zio, e particolarmente l'ultima nell'ipotesi comune delle forze centrali reciprocamente proporzionali a' quadrati delle distanze.

Nel medesimo luogo lin.20. (e) *Il Sig. Bernulli giudica disperata la separazione*, ec. Non disse essere la cosa disperata, cioè impossibile, poichè la conosceva fatta, ed e' pure la fece: ma volle dire, che la via battuta dal Sig. Ermanno (cioè integrare le quantità differenziali composte di differenziali ancora mescolate) è assai scabrosa, e di tale natura, che atterisce l'Analista, prima che tenti, perchè subito a prima vista sospetta esservi sotto difficoltà forse maggiore di quella, che veramente v'è. Il Sig. Ermanno intanto non temette d'incontrare alcuna difficoltà nell'ipotesi comune, in quanto conobbe da altra parte, che la curva ricercata era una sezione conica. Se alcuno prima ch'egli pensasse a questo Problema inverso gli avesse solamente proposta questa equazione

$$\text{nuda} - ddx \sqrt{\frac{xx + y^2}{x}} = \frac{yax - xdy^2}{xx + y^2}, \text{ acciocchè determinasse a qual sorta}$$

di curva essa appartenesse, nascoftagli frattanto la fonte, onde scaturì, forse avrebbe subito disprezzata la cosa proposta, come avente più difficoltà, che utilità. A

(c) In questa edizione pag.22. lin.27.

(d) Nella presente edizione pag.22. lin.31.

(e) Pag.22. lin.34.

A carte 193. lin.4. (f) *Sia dunque*, ec. Il Sig. Conte Riccato quì, e nel seguente modo di sciorre a carte 197. e seguenti (g) destramente si serve degli ajuti, ed artifici prima scoperti da' miei Zii Jacopo, e Giovanni, e da' medesimi adoperati per ottenere la separazione dell'indeterminate coll'ajuto di certe sostituzioni (v. g. $\frac{x}{y} = p$, $\frac{y}{x} = q$, $dx = pds$,

$\frac{x}{z} = q$, e simili) che debbono essere fatte con destrezza; con che e'

mostra d'essere versatissimo nel calcolo degli Integrali, e di aver ben penetrate le loro regole; ed in vero in tale maniera, che fra i forestieri appena possa ritrovarsi alcuno, che gli levi la palma. Ma e' mostra anche, che siccome la memoria d'un animo grato doveva disturbare dalla difesa di se medesimo il Sig. Ermanno (com'egli medesimo disse di sopra) lo stesso ufficio d'urbanità avrebbe dovuto costringere il Sig. Conte Riccato, obbligato, sebbene non immediatamente, a' Signori Bernulli, in quale servirsi contro di loro de' sussidj del calcolo da essi nascente, nel quale ci sembra d'essere sì maschiamente versato.

A carte 195. lin.8. (h) *Ed in conseguenza* $\frac{dx}{ydx - xdy} = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + p^2}}$. In ol-

tre a carte 198. lin.7. (i) *ed integrando* $p = \sqrt{a^2 - q^2}$. In questi luoghi il Sig. Co. Riccato commette il medesimo errore, che nel Sig. Ermanno notò mio Zio, quando cioè integrando l'equazioni differenziali, trascura di accrescere l'uno, o l'altro membro dell'equazioni integrali, di una certa quantità costante; imperciocchè se bene in questi esempj una tale aggiunta non muta la specie della curva, in altri casi però può alle volte rendere la natura della curva sterminatamente differente; onde non può senza paralogismo trascurarsi, nè trascurata si può certamente affermare, che la curva ricercata è una sezione conica, benchè quì per accidente accada, che l'addizione niente muta nella natura della curva. Aggiungasi, che non appare se non finalmente dopo molte operazioni, che non si muti la specie della curva.

A carte 205. lin.7. (k) *non così succede nel primo*, ec. Quì il Signor Conte si mostra imbarazzato, e vuole piuttosto lasciare il Problema da sciogliere, che tormentarsi con uno sforzo vano; e contento di questa esclamazione: *Che gioverebbe a questo passo*, ec. afferma esser la cosa impossibile. Io posso dire con verità, seguita a dire il Sig. Conte, che forse non si troverà strada per conseguire l'intento, senza che c'entrino, fatte le se-

(f) Nella presente edizione pag.23. lin.4.

(g) In questa edizione pag.23. lin.17. e seg.

(b) In questa edizione pag.24. lin.2.

(i) In questa edizione pag.25. lin.4.

(k) In questa edizione pag.25. lin.17.

separazioni, quantità trascendenti. Tuttavia darò a divedere ciò non essere impossibile, e mostrerò come senza la presente separazione possa essere sciolto il Problema inverfo delle forze centrali, quando sono supposte direttamente proporzionali alle distanze, cioè prendendo le coordinate sull'asse. Comunicherò anche un altro metodo di mio Zio per la soluzione del medesimo Problema, dove l'indeterminate compariscono separate, e potcia l'equazione viene integrata senza la vista di quantità trascendenti.

I. Poichè nella figura del Sig. Ermanno ED $\frac{-ddx\sqrt{xx+yy}}{x}$ esprime la forza centripeta, convien fare $-\frac{ddx\sqrt{xx+yy}}{x} = \sqrt{xx+yy}$ (ovvero piuttosto per osservare l'omogeneità per $ydx - xdy =$ ad una quantità costante) $= \frac{ydx - xdy}{a^2b} \sqrt{xx+yy}$, e perciò $-\frac{ddx}{x} = \frac{ydx - xdy}{a^2b} \cdot$ Moltiplicando poi per $x dx$, si ottiene $-dx d \ln x = \frac{ydx - xdy}{a^2b} \cdot x dx$, e prendendo gl' integrali, $\frac{ydx - xdy}{a^2b} \cdot x dx = \frac{xx \cdot ydx - xdy}{a^2b}$, laonde $dx = \frac{ydx - xdy}{\sqrt{aab - cxx}}$, e $\frac{dx}{xx\sqrt{aab - cxx}} = \frac{ydx - xdy}{xx\sqrt{a^2bc}}$ presi un'altra volta gl' integrali, $-\frac{\sqrt{aab - cxx}}{bx\sqrt{a}} = \frac{y}{x\sqrt{bc}} - \frac{1}{a}$; l'equazione ridotta avrà due dimensioni, d'onde ap-

pare, che la curva ricercata è una sezione conica.

II. Altamente più facilmente, e più elegantemente osserva mio Zio, che il Problema può essere sciolto, risolvendo le forze in due collaterali. Risolvansi la forza centrale in due altre, le cui direzioni facciano un dato angolo (v. gr. retto) LPM (Fig. 10.). Per lo centro C delle forze si tirino le rette CA, CB parallele a quelle direzioni. Egli è manifesto, che il mobile descrive la medesima curva PG, o sia egli sollecitato solamente da una forza tendente al punto C, o in luogo di questa da due altre tendenti costantemente l'una alla retta CA, l'altra alla retta CB, cioè ognuna delle quali conservi una direzione costante, l'una alla

CB,

CB, l'altra alla CA parallela. In oltre è chiaro, che il concorso di queste due forze non impedisce, che s'avvicini all'una, e all'altra delle due rette CB, CA con quelle stesse velocità rispettivamente, colle quali e s'accosterebbe, se levata l'una forza, l'altra sola lo spingerebbe; cioè il mobile P ha tanta velocità per accostarsi alla CB secondo la direzione PL, quanta ne avrebbe nel punto M, scendendo nella retta AC da una conveniente altezza, e con una sola forza uguale a quella, che spingerebbe il medesimo mobile attratto verso CB; e scambievolmente egli ha anche tanta velocità per avvicinarsi alla CA nella direzione PM, quanta ne avrebbe nel punto L, se cadesse da un conveniente punto B della quiete per la retta BC cacciato da una forza uguale a quella, che spinge il medesimo mobile verso la retta CA. Ora la velocità di accostarsi alla CB, e la velocità per ritirarsi dalla retta CA, tutte e due sono fra di loro come le picciolissime linee percorse insieme in quelle direzioni, cioè come $Pn : np$, ovvero (chiamata CMx , MPy) come $-dx : dy$. La seconda dunque si riduce a questo, che primieramente sieno determinate le curve delle velocità ARD, BSE, cioè le cui ordinate MR, LS disegnino le velocità ne' punti M, L, se il mobile separatamente scendesse ora da A, ora da B nelle rette AC, BC; e poscia si cerchi la curva PG di tale natura, che condotte da qualsivoglia suo punto le coordinate PM, PL, e prolungate, fino che s'ighino le curve delle velocità ne' punti R, S, sia sempre $MR : LS :: Pn : np :: -dx : +dy$. Per applicare ciò al caso presente, dove la forza centrale è come la stessa distanza CP, e per conseguente le forze laterali, nelle quali essa si risolve secondo le direzioni PL, PM, come le rette medesime PL, PM, ovvero come CM, CL: è noto, il che può anche facilmente ritrovarsi, che le curve delle velocità ARD, BSE sono quadranti di circoli descritti col centro C, e co' raggi CA, CB; laonde se CA si chiama a , e CB b , farà $MR (\sqrt{aa-xx}) : LS (\sqrt{bb-yy}) :: -dx : +dy$, e perciò

$$\frac{-dx}{\sqrt{aa-xx}} = \frac{dy}{\sqrt{bb-yy}}, \text{ ovvero } \frac{dx}{\sqrt{aa-xx}} + \frac{dy}{\sqrt{bb-yy}} = 0, \text{ ma, come}$$

fanno anco i principianti, $\frac{dx}{\sqrt{aa-xx}}$ è il differenziale dell'angolo DCR,

e $\frac{dy}{\sqrt{bb-yy}}$ è il differenziale dell'angolo ECS: quindi perchè

$$\int \frac{dx}{\sqrt{aa-xx}} + \int \frac{dy}{\sqrt{bb-yy}} = \text{ad una costante, egli è manifesto, che}$$

gli angoli DCR, ECS presi insieme sono uguali ad un dato angolo co-

fonte; ovvero aggiunto il comune ECD, tutto l'angolo SCR sarà costante, se per avventura non cade la retta CS per diritto su la retta CR, il che avviene, quando $DCR + ECS = ACD =$ al retto. Concepiamo dunque, che SCR, o sia angolo, o sia linea retta, giri intorno al punto C, e che in qualsivoglia sito sieno tirate da' punti R, S le rette RP, SP parallele alle rette CB, CA; descriverà il punto dell'intersezione P la curva PG ricercata, la quale troverassi essere un'ellissi, adoperando la sola Algebra ordinaria, il cui centro coincide col centro medesimo delle forze. Che se in oltre le rette SC, RC s'incontreranno per diritto, saranno i raggi CA, CB de' circoli ARD, BSE i semiasse coniugati dell'ellissi, ma se le medesime rette fanno l'angolo SCR, intendasi condotto per lo punto C il diametro d'un circolo passante per li tre punti S, P, R; il punto C dividerà questo diametro (d'una lunghezza costante) in due parti ineguali, le quali danno le lunghezze de' semiasse coniugati. Di che non conviene, ch'io faccia qui la dimostrazione, la quale spontaneamente si presenta dinanzi a chi seriamente ci pensa.

Se per avventura non piace al Sig. Co. Riccato, che abbiamo preso di sopra come noto essere $\frac{dx}{\sqrt{aa-xx}} + \frac{dy}{\sqrt{bb-yy}}$ i differenziali degli angoli, e

per questa cagione un'altra volta accusa (come fece, benchè male a proposito, contra la soluzione generale del Sig. Giovanni mio Zio, registrata nelle Memorie di Parigi) aver esso avuta in mente l'ellissi come l'obbietto principale, al quale dirizzati avea i suoi pensieri, chiamando in aiuto quell'insolita (benchè a noi abbastanza palese, e famigliare) differenziazione, ed integrazione degli angoli, altramente non avrebbe potuto sapere, che sotto quest'espressione $\frac{dx}{\sqrt{aa-xx}} + \frac{dy}{\sqrt{bb-yy}} = 0$ sta-

va nascosta la curva algebrica, non che l'ellissi: Se, dico, il Sig. Co. Riccato per avventura disapprova quelto modo di procedere; eccome un'altro puramente analitico, ch'io presento, acciocchè egli veda un'altra volta, che s'inganna, quando stima, che il caso particolare, dove le forze sono reciprocamente proporzionali a' quadrati delle distanze, sia il solo e l'unico, che trattare si possa coll'equazioni analiticamente integrabili; imperciocchè per fare nel nostro caso la medesima cosa, goderà, spero il Sig. Co. Riccato, quando vedrà, che la nostra espressione $\frac{dx}{\sqrt{aa-xx}} +$

$\frac{dy}{\sqrt{bb-yy}} = e$, forse contro la sua speranza può essere integrata, adope-

rando solamente le comuni regole del calcolo sommatorio, ma con qualche destrezza utile anche in altre occasioni, maneggiate. Si moltiplichì
pri-

primiciante l'equazione per $\sqrt{aa-xx}$, e per $\sqrt{bb-yy}$, ed otterraffì
 $dx \sqrt{bb-yy} + dy \sqrt{aa-xx} = 0$ e perciò $\int dx \sqrt{bb-yy} +$
 $+ \int dy \sqrt{aa-xx} = \text{ad una quantità costante } ac$. Di poi si moltiplichi
 anche per xy , e si otterrà $\frac{y \cdot x dx}{\sqrt{aa-xx}} + \frac{xy dy}{\sqrt{bb-yy}} = 0$; laonde anco farà.

$$\frac{\int y \cdot x dx}{\sqrt{aa-xx}} + \frac{\int x \cdot y dy}{\sqrt{bb-yy}} = \text{ad un'altra quantità costante } ac; \text{ ma è}$$

$$\frac{\int y \cdot x dx}{\sqrt{aa-xx}} = -y \sqrt{aa-xx} + \int dy \sqrt{aa-xx}, \quad \frac{\int x \cdot y dy}{\sqrt{bb-yy}} = -x$$

$$\sqrt{bb-yy} - \int dx \sqrt{bb-yy}; \text{ dunque } \frac{\int y \cdot x dx}{\sqrt{aa-xx}} + \frac{\int x \cdot y dy}{\sqrt{bb-yy}} (= ac) =$$

$$= -y \sqrt{aa-xx} - x \sqrt{bb-yy} + \int dy \sqrt{aa-xx} + \int dx \sqrt{bb-yy}; \text{ quindi}$$

di $ac - \int dy \sqrt{aa-xx} - \int dx \sqrt{bb-yy}$, cioè $ac - ac = -y \sqrt{aa-xx}$

$- x \sqrt{bb-yy}$ equazione algebrica, che si riduce nella seguente maniera.

Sia $c = e = b$, e si trasporti o l'una parte, o l'altra parte dell'ultimo membro dell'equazione nel primo, talchè si abbia $ab - x \sqrt{bb-yy} = y \sqrt{aa-xx}$, ovvero quadrando, $aabb + bbxx - 2abx \sqrt{bb-yy} = aayy$, e trasportando, $aabb + bbxx - aayy = 2abx \sqrt{bb-yy}$, e quadrando un'altra volta, $a^4b^2 + 2aabbxx + b^4x^2 - 2a^2bbyy - 2aabbxxyy + a^4y^2 = 4aabbxx - 4aabbxxyy$. Si levi da ciascun membro $4aabbxx - 4aabbxxyy$, e si otterrà $a^4b^2 - 2aabbxx + b^4x^2 - 2a^2bbyy + 2aabbxxyy + a^4y^2 = bb - bb$. $4aabbxxyy$ cavata da ciascun membro la radice quadrata, otterremo finalmente $aabb - bbxx - aayy = \pm 2axy \sqrt{bb-bb}$, cioè un'equazione all'ellissi, e certamente riferita al centro. Da ciò non solamente si vede, che la curva ricercata è la sola ellissi, ma eziandio, che il centro delle forze è nel centro della figura QEI.

A carte 204. lin. 8: (1) che le curve saranno algebriche ogni qual volta ec. Non basta acciocchè le curve sieno algebriche, che ciascun membro dell'equazione dipenda dalla rettificazione dell'arco di qualche

E 2

cir.

(1) Nella presente edizione pag. 27. lin. 7.

circolo; è necessario di più, che gli angoli sottesi da questi archi sieno commensurabili, altramente dalla loro comparazione non nasce alcuna equazione algebrica.

In quel medesimo luogo lin. 14. (m) *Soluzione non dissimile a quella del Sig. Bernulli nella conclusione, quantunque ritrovata con maniera affatto diversa*, ec. Questo metodo non è tanto diverso da quello di mio Zio, che non si veda facilmente essersi servito il Sig. Co. Riccato di questo medesimo come di regola, alla quale aggiunse il suo metodo, vestito solamente d'un abito un po' diverso.

Nel medesimo luogo citato lin. penult. (n) *contuttociò non si debbono diffimulare le sue imperfezioni; ec.* Questa soluzione non ha imperfezione alcuna, anzi sarebbe stata perfettissima anco per approvazione del Sig. Co. Riccato, se avesse avuto Autore il Sig. Ermanno.

A carte 205. lin. 11. (o) *non sarebbe loro forse caduto in pensiero, che sotto l'espressione, e nel caso particolare di $f = bz^{-2}$, se non si fosse tolte di mira, non si farebbero forse poste in luce le sezioni del cono.*

Questo ritorcimento (col quale credette forse il Sig. Co. Riccato di pungere mio Zio) quanto sia ingiusto, e quanto poco faccia a questo proposito, avrebbe potuto avvertire esso Sig. Conte, se avesse voluto osservare, che per gli altri casi particolari mio Zio cavò dalla sua formula, o soluzione universale le curve avanti di lui da niuno ritrovate. Per esempio nel caso particolare di $f = bz^{-1}$, cioè dove le forze centrali sono reciprocamente proporzionali a' cubi delle distanze; chi avanti di mio Zio ritrovò, o nominò oltre alla spirale logaritmica quell'altra spirale iperbolica, di cui ne diede la descrizione nel medesimo luogo citato dal Sig. Co. Riccato nelle Memorie di Parigi dell'anno 1710, a carte 533. oltre ad infinite altre curve sì algebriche, che trascendenti, le quali dedotte dalla sua soluzione universale pubblicò negli Atti di Lipsia l'anno 1713. nel mese di Marzo, a carte 129. Dica ora il Sig. Co. Riccato, come mio Zio abbia presentito, che sotto la sua espressione generale stava nascosta la spirale iperbolica insieme coll'altre curve, ch'egli comunicò al pubblico de' Letterati; ovvero ci mostri in che modo quelle sono venute alla luce, imperciocchè non si può dire, ch'egli le avesse già avanti avute in mente. Senza dubbio il Sig. Co. Riccato non ha lette quelle cose, che mio Zio pubblicò in questa materia negli Atti di Lipsia, e nelle Memorie di Parigi l'anno 1711, altramente avrebbe più benignamente giudicato della bellezza, e dell'eccellenza del suo metodo, il quale lodò grandemente anche il Sig. Ermanno medesimo, e lo preferì a quello del Sig. Newton, specialmente perchè ha luogo, anche se si considera la resistenza del mezzo. Frattanto stupisco, dopo avere di sopra a carte 204. (p) conosciuto, che dalla dipendenza, o riduzione all'arco circolare di ciascun

mem.

(m) Nella presente edizione pag. 27. lin. 8.

(n) In questa edizione pag. 27. lin. 11.

(o) In questa edizione pag. 27. lin. 18.

(p) In questa edizione pag. 27. lin. 22.

membro dell'equazione, si può concludere essere la curva algebrica, che non abbia dubitato di dire, che forse mai non sarebbero venute alla luce le sezioni coniche, se già non fossero state conosciute avanti, come aventi la proprietà ricercata: imperciocchè, che cosa è più naturale, che ritrovata l'algebraicità della curva, ricercar poscia qual sia quell'equazione algebrica, che esprime la natura della curva? Invita quasi spontaneamente a questa ricerca l'equazione differenziale del Sig. Giovanni mio Zio, la quale, come confessa esso Sig. Co. Riccato, rinchiude una manifesta comparazione di due archi circolari diversamente dall'equazione del Sig. Ermanno, la quale, per la confusione delle indeterminate non dando alcun indizio certo di successo felice, potrebbe subito disanimare l'Analista impaziente. Del rimanente benchè questa soluzione generale applicata al caso particolare $f = bz^{-1}$ conduca ad un'equazione involupata di quantità trascendenti, niente però impedita, che queste (purchè sieno algebriche comparabili, come sono per esempio gli archi circolari, i logaritmi, &c.) possano trattarsi con un'integrazione puramente analitica, come la quantità assolutamente integrabile: il che poichè forse non crede il Sig. Co. Riccato, e per questa sola ragione vuole posporre la soluzione generale di mio Zio alla soluzione particolare del Sig. Ermanno, perchè questa consiste in una equazione assolutamente integrabile, quella al contrario in un'equazione, che contiene quantità trascendenti, vo applicare l'artificio sopra adoperato nella risoluzione del caso particolare $f = z$ (nel quale da queste quantità trascendenti con un'integrazione puramente analitica, si cava un'equazione algebrica per la curva desiderata) al caso presente $f = bz^{-1}$. Era arrivato mio Zio (vedansi le Memorie di Parigi dell'anno 1710., a carte 527.) a questa equazione differenziale $dx =$

$\frac{dx}{\sqrt{bb-xx}}$. Sia p una perpendicolare calata dal punto L alla retta AO

(vedasi la figura a pag. 524.) e sarà $Ll(dx) = \frac{adp}{\sqrt{aa-pp}}$, laonde $\frac{dz}{a}$, ov-

vero $\frac{dx}{\sqrt{bb-xx}} = \frac{dp}{\sqrt{aa-pp}}$, e moltiplicando in croce $dx \sqrt{aa-pp} =$

$dp \sqrt{bb-xx}$, e prendendo gl'integrali $x \sqrt{aa-pp} + \int \frac{xpdp}{\sqrt{aa-pp}} = p \sqrt{bb-xx}$

$+ \int \frac{pdx}{\sqrt{bb-xx}}$ ma è $\frac{pdx}{\sqrt{bb-xx}} = \frac{xpdp}{\sqrt{aa-pp}}$, e per conseguenza $\int \frac{pdx}{\sqrt{bb-xx}} =$

$=$

$$= \frac{3^8}{\sqrt{aa-pp}} \pm ae; \text{ dunque levate via le quantità eguali, si scoprirà } \\ \pm ae \pm p \sqrt{bb-tt} = t \sqrt{aa-pp}, \text{ equazione puramente algebrica,}$$

la quale prudentemente maneggiata, come di sopra s'è fatto, riducesi a questa $aart + bbbp - aate = 2apt \sqrt{bb-ee}$. Ora questa giunto il solito cangiata in un'altra, che esprima la relazione fra le coordinate della curva ricercata, mostrerà esser ella un'ellissi, o un'iperbola, o una parabola riferita al foco.

A carte 206. lin. 9. (q). *Se voleva il Sig. Bernulli liberare la sua analisi dalla nota di particolare, ec.* Non capisco, che cosa si voglia il Sig. Co. Riccato: forse la soluzione di mio Zio ha il difetto di particolarità, perchè non supera l'impossibile? poichè io stimo egualmente impossibile determinare con un'espressione generale le curve algebriche per qualsivoglia data legge di forze centrali, e dare una regola generale, colla quale subito si possa conoscere, se qualche data equazione algebrica di qualsivoglia grado si possa ridurre col mezzo della divisione. Ed in vero il Sig. Co. Riccato ci promette una cosa troppo magnifica, quando dice, che quella questione forse potrà essere sciolta dal Sig. Ermano, al quale si debba cedere la gloria dell'invenzione. Egli è certamente manifesto ciò, che già aveva avvisato mio Zio nelle Memorie di Parigi a carte 226., cioè che senza esitanza può dichiararsi allora essere algebrica una curva, quando ambedue le membra d'un'equazione disegnano i differenziali di archi, o piuttosto di angoli commensurabili; ma determinare sempre, se qualche quantità differenziale possa essere ridotta al differenziale dell'arco, o dell'angolo, è una difficoltà scabrosissima, nè quella supererassi, prima che si ritrovi la regola d'integrare tutto quello, ch'è integrabile: cosa a dir vero da desiderare, ma non da sperare.

In quel medesimo luogo lin. 20. (r) *Il mio detto parerà forse troppo ardito..... pubblicare dagli altri.* Anzi sembrerà non che ardito, ma paradossale, che la soluzione particolare abbia ad essere più stimata, che la soluzione universale. Ma quando vedrà il Sig. Co. Riccato, che quella ragione, per la quale pronunziò questa sentenza, è di niun peso, se pure avrà mostrato qui la maniera di trattare con un'integrazione analitica quelle medesime quantità trascendenti, che somministrò la soluzione generale, e cangerà spero parere, e ritratterà le parole un po' più abbasso a cart. 207. (s) troppo precipitosamente proferte: *Ha però la buona sorte d'esser l'unico, che possa maneggiarsi con equazioni analiticamente integrabili.... e se debba farsi più stima della regola, o dell'eccezione; parte, perchè ho già dimostrato non esser l'unico il caso; ma essercene un'altro analiticamente*

te

(q) Nella presente edizione pag. 27. lin. 31.

(r) In questa edizione pag. 27. lin. ult.

(s) In questa edizione pag. 28. lin. 9.

re Integrabile, quando le forze centrali sono direttamente proporzionali alle distanze; parte poichè è chiaro dalle cose fin qui dette, che indarno si predica la singolare destrezza del Sig. Ermanno nel distinguere il caso più facile dagli altri tutti, come più misteriosi, poichè è falso, che questo caso sia più misterioso di quel primo sciolto dal Sig. Ermanno, essendo anzi molto più facile. Si aggiunga, che non scelse quel caso il Sig. Ermanno, ma gli fu proposto da mio Zio in occasione che aveva osservato, che il Sig. Nevvton nella prima edizione de' suoi principj matematici (dappoichè nelle tre proposizioni 11. 12. 13. del primo Libro aveva ritrovato, che le forze centripete de' corpi mossi nelle sezioni coniche, tiranti all'ombelico della figura, sono reciprocamente come i quadrati delle distanze) nel corollario 1. prop. 13. aveva assunta senza dimostrazione la proposizione inversa, cioè essere sempre qualche sezione conica avente l'ombelico nel centro delle forze, quella curva, nella quale il corpo si muove con una forza centripeta reciprocamente proporzionale al quadrato della distanza, la quale proposizione volle però stabilire con qualche dimostrazione il Sig. Nevvton nella seconda edizione.

A carte 208. lin. 9. (r) *Non v'ha metodo fermo, ec.* Sembra quì il Sig. Co: Riccato abbandonare il suo uffizio, poichè ciò che nel Sig. Ermanno grandemente loda, ed innalza (e per questo fine unicamente compose la sua scrittura, quasi che esso Sig. Ermanno abbia sciolto il suo caso particolare con una singolare destrezza) vitupera nel Sig. Bernulli; nè contento di quell'artificio, che diede, benchè, come il chiamò lo stesso Sig. Conte, ingegnoso, non dubita di domandargli un metodo fermo, o generale. Ma se mio Zio rendesse al Sig. Co: Riccato le sue parole così dicendo: *Il Sig. Ermanno arriva ingegnosamente al suo fine, moltiplicando, o dividendo ambedue le membra della sua equazione per certe quantità indeterminate per renderla due volte integrabile: ma oltrechè non v'ha metodo fermo per fissare le grandezze, per le quali bisogna moltiplicare, e dividere l'equazione proposta, non so qual luogo potesse trovare in altri casi egualmente ardui quest'artificio: che direbbe?* Ma che più, non si serve forse esso Sig. Conte di questi artifici particolari, de' quali per avventura non sa di esser tenuto a' Sigg. Bernulli, quando a carte 209. (u) chiama in ajuto le sostituzioni congrue ($\frac{dy}{dx} = p$, $xp = q$) per separare le quantità variabili; ma non dà rego-

la certa, e fissa, per mezzo della quale si faccia convenientemente una sostituzione, acciocchè le quantità variabili in qualsivoglia equazione proposta si separino l'una dall'altra. Cessi dunque il Sig. Co. Riccato di preferir la soluzione particolare alla soluzione generale, ovvero permetta al Sig. Bernulli, che goda in questa simile occasione quel medesimo privilegio, per lo quale la particolarità può rapire la gloria all'universalità.

A

(r) Nella presente edizione pag.28. lin.28.

(u) In questa edizione pag.28. lin.33.

A carte 210. lin. 8. (x). *Io mi lusingo, che il Sig. Bernulli prenderà in buona parte ec.* Perdoniamo, e chiediamo vicendevolmente perdonanza; diamo volentieri la libertà Geometrica al Sig. Cos. Rucato, la quale e' pure non ci negherà; il che non impedirà, che non conosciamo, ed ammiriamo la sua acutezza nella Geometria, e la singolare facilità di penetrare queste cose difficilissime.

Darò in luogo d'aggiunta una nuova soluzione di questo Problema inverfo, dedotta da' medesimi principj Nevvtoniani, e la sua applicazione al caso particolare delle forze reciprocamente proporzionali a' quadrati delle distanze.

Sia nella fig. 11. C il centro delle forze, A il punto, dal quale si parte il mobile, AB la sua direzione in questo luogo, e cominci il mobile a muoversi nel punto A con quella velocità, che acquisterebbe cadendo dall' altezza data DA, sollecitante qualche forza uniforme, ed eguale alla centripeta agente nel medesimo luogo A; e sia E qualche punto preso nella traiettoria ricercata, EF la direzione del mobile in questo punto; CB, CF le perpendicolari alle AB, EF; EG sia un' arco di cerchio descritto col raggio CE, la curva HIK quella, che determina la legge delle forze centripete, cioè tale, che le sue applicate AI, GK esprimano le forze centripete sollecitanti nelle distanze CA, CG (ovvero CE); e si chiamino AD = a AC = b, CB = c, CE = CG = x, CF = z, AI = g, GK = f. Per quelle cose, che dimostrò il Sig. Nevvton propof. 9. e 40. del Lib. I., se si fa l'aja ALHI = al rettangolo ADMI, farà l'aja ALHI all'aja GLHK, come il quadrato della velocità in A al quadrato della velocità in E; cioè perchè le velocità sono reciprocamente come le perpendicolari calate dal centro delle forze alle tangenti (il che dimostrò anche il Sig. Nevvton nella seconda edizione de' suoi Principj coroll. 1. propof. 1. Lib. 1.)

$$ag : \int -f dx + ag :: 2z : cc \text{ e perciò } 2z = \frac{agcc}{\int -f dx + ag} \text{ la qual equa-}$$

zione poichè involge la natura della tangente, l'ulterior sua riduzione dipende dal metodo inverfo delle tangenti. Nel caso particolare quando $f = \frac{bbg}{xx}$, l'equazione ritrovata $2z = \frac{agcc}{\int -f dx + ag}$ si muta in questa $2z =$

$$\frac{agc}{\int -bbdx} = \frac{agc}{\frac{bb-b+a}{xc}} \quad (\text{si sottrae dall'integrale } \frac{bb}{x} \text{ la quantità } b, \text{ perchè}$$

$$x=b, \text{ l'aja AIGK, ovvero } \int -f dx \text{ dee divenire } = 0) = \frac{agcx}{bb-bx+ax}$$

Che

(x) In questa edizione pag. 29. lin. 7.

Che poi quest'ultima equazione sia alle sezioni coniche, così si fa palese: v'ha una notevole proprietà delle sezioni coniche, che se da uno de' fuochi si cala una perpendicolare nella retta toccante in qualche punto la sezione del cono, il quadrato di questa perpendicolare sta al quadrato del semiasse minore, ovvero alla differenza de' quadrati del semiasse maggiore, e della metà della distanza de' fuochi, com'è la retta tirata dal punto del contatto a quel foco, alla retta tirata dal medesimo punto del contatto all'altro foco: la quale proprietà facilmente si può così dimostrare. Sieno nella fig. 12. C, B due fuochi, GH la tangente: CH perpendicolare alla medesima si prolunghi, fino che incontri la prodotta BG in D, alla quale conduca dal punto C la perpendicolare CE. Per l'angolo DCG tagliato in due parti eguali dalla tangente, e per l'angolo retto H, sarà DH=HC, DG=GC, e DB=GC+GB=all'asse maggiore. Ma è CBq=CDq (4. CHq)+DBq=2BD. DE; in oltre per li triangoli simili DHG, e DEC è DG (GC): DH (HC):: CD (2CH): DE = $\frac{2CHq}{GC}$; perciò CBq = 4CHq

$$+ DBq = \frac{4BD \cdot CHq}{GC}, \text{ ovvero } \frac{DBq - CBq}{4} = \frac{BD - GC \cdot CHq}{GC}$$

$$\frac{GB \cdot CHq}{GC}, \text{ e } CHq = \frac{1}{4} DBq - \frac{1}{4} CBq :: GC : GB. \text{ Quindi se si chiama}$$

$$zà CH=z, GC=z, DB=p, CB=q, \text{ farà } zz = \frac{\frac{1}{4}pp - \frac{1}{4}qq}{p-x} \cdot x \text{ la}$$

$$\text{qual equazione è simile alla ritrovata, e con essa coincide, se si pone } p = \frac{bb}{b-a}, \text{ e } -\frac{1}{4}qq = \frac{acc}{b-a}; \text{ il che mostra, che la curva ricercata è una sezio-}$$

$$\text{ne conica, il cui lato retto } = \frac{4acc}{bb}, \text{ ed il trasverso } = \frac{bb}{b-a}, \text{ e che in ispe-}$$

zie la curva è una parabola, se $a=b$, cioè a dire se la velocità, con la quale il corpo comincia a muoversi in A, è uguale a quella, che acquisterebbe cadendo per un'altezza eguale alla distanza CA, spingendolo in tutti i punti la medesima forza centripeta, che spinge nel punto A; ma la curva sarà un'ellissi, se il mobile uscirà dal punto A con un velocità minore; e un'iperbola, se il medesimo mobile uscirà con una velocità maggiore.

P R O B L E M A

proposto a' Geometri d'Italia.

Il punto C nella fig. 13. è il centro delle forze, BbC la curva, le cui appliche BA, ba esprimono le forze centripete giusta le diverse distanze
Opere Rucc. Tom. III. F CA,

⁴²
CA, Ca, ed insieme i tempi; che consuma il mobile principiando la caduta da punti A, a, e scendendo per le distanze AC, aC; si ricerca, che curva sia questa AbC, ovvero in qual ipotesi di forze i tempi delle discese per AC, aC da' punti A, a della quiete sieno proporzionali alle forze agenti nelle distanze CA, Ca?

SCHEDIASMA IV. (*)

Contrarispòsta alle Annotazioni del Sig. Niccolò Bernulli inserite nel XX. Giornale d'Italia Articolo XIII., con un metodo di separare le indeterminate nell'equazioni differenziali, e con alcune riflessioni intorno le forze centrali tanto nel voto, quanto nel pieno.

LA presente Dissertazione servirà di risposta alle Annotazioni, che s'è compiaciuto di fare il dottissimo Sig. Niccolò Bernulli sopra la mia difesa della soluzione del Sig. Jacopo Ermanno, e per mia parte sarà certamente l'ultima: sì perchè eternar non si debbono i litigj, quantunque letterarj e moderati; come pure perchè da quanto s'è detto, e da quanto io sono per dire, potranno i Matematici formar un retto giudizio intorno la nostra controversia: anzi ho tale fiducia della mia causa, che ne rimetterei di buona voglia agli stessi Signori Bernulli la decisione. Infatti dall'un canto anno eglino (sparte così) a larga mano le loro dovizie, che corrono rischio di moltiplicarsi gli Avversarj, dal numero de' quali io bramo, che mi cancellino: giacchè niuno può ufcir di briga, se non più docto, e per dir così, più Geometra. Dall'altro anno risposto con tanta gentilezza, ch'io vorrei poter cedere il campo, e darmi per vinto: ma finalmente ad ogni costo si dee sostenere l'interesse della verità, e per farlo con la dovuta moderazione, metterò in non cale alcune espressioni, che potrebbero degenerare in contestazioni inutili, e procurerò a misura delle mie forze, che la risposta sia più dottrinale, che contenziosa.

Il primo capo della nostra disputa versava sopra la doppia integrazione nella nostra formola del Sig. Ermanno

$$\frac{-ddx \cdot \sqrt{xx+yy}}{x} = \frac{ydx - xdy}{xx+yy}^2$$

E qui è necessario, che il Sig. Niccolò Bernulli s'imprima saldamente nella memoria le seguenti parole del Sig. suo Zio, che le indeterminate ci sono talmente complicate, che il voler separarle è intraprendere una fatica disperata, e riesce impossibile il sommarle così confuse; onde inferi, che

(*) Questo Schediasma fu stampato l'anno 1715. nel Tomo XXI. del Giornale de' Letterati d'Italia, Articolo VIII.

che il Sig. Ermanno non ne sarebbe venuto a capo, se non avesse sempre avute innanzi gli occhi le sezioni del cono. 43

Io mi credeva d'aver pienamente soddisfatto alla difficoltà, con esporre un metodo fermo, per cui in due diverse maniere si potesse conseguire la bramata sommatoria; e mi pareva, supposto ciò, di dover con ragione cancellare la premessa espressione dal catalogo delle disperate. Nulladimeno contro l'evidenza d'un' analitica dimostrazione si persiste per parte de' Signori Bernulli tenacemente nella prima opinione: ma che rispondono mai?

Mi formano un'elogio, di cui tanto più rendo loro grazie, quanto so di non meritargli; indi dicono, che disperato non significa impossibile, ma difficile e scabroso: che il Sig. Ermanno s'è lasciato guidare per un sentiero malagevole ad una formula, che atterrisce l'Analista; perchè a prima vista sospetta esserci sotto difficoltà maggiore di quella, che veramente c'è: che in tanto non tentate d'incontrarne alcuna nell'ipotesi comune, in quanto conobbe da altra parte, che la curva ricercata era una sezione conica: che se gli fosse stata messa sotto gli occhi la nuda equazione, senz' indicargli la fonte, onde scaturì, avrebbe forse disprezzata la cosa, come avviene più difficoltà, che utilità. Aggiungono, che io, per ridurre l'espressione, mi sono destramente servito degli ajuti prima scoperti da Signori Jacopo, e Giovanni Bernulli, e che se non altro, un ufficio d'urbanità avrebbe dovuto costringermi a non rivolgere contro di loro i fustidj del calcolo da essi nate.

Questo rimprovero inaspettato m'ha sforzato a pensare alla replica, e ad esaminare nel tempo stesso le loro preposizioni: per altro io, che sopra d'ogni cosa mi pregio di decilità, farci rimasto pago di qualunque risposta.

Primieramente io non saprei, nè lo sapranno i Sig. Bernulli stessi dare al termine di disperato più benigna interpretazione, quanto col dire, che per formula differenziale disperata s'intenda quella, alla cui integrazione non si perviene con l'ajuto dell'arte, ma con un' anticipata cognizione, o più per fortuna, che per industria. Quando abbiamo in mano un metodo certo, non ha più luogo la supposta disperazione. Qual' Analista mai sarà così impaziente, che non voglia applicare, purchè gli sia noto, il metodo generale al caso particolare? tanto più, quanto che la mia maniera di separare le incognite non è sì fattamente operosa, che possa stancare un Geometra delicato. Interroghiamo il Sig. Giovanni, s'egli numera fra le disperate la sua seconda formula $2fx' dy = dy^2 + dx^2 dy - xdy ddx + adx ddy$.

Abbia la bontà di riflettere, ch'essa non è meno composta di quella del Sig. Ermanno; che l'indeterminate ci sono egualmente confuse; e che si può ritorcere contro la sua equazione tutto ciò, che egli ha saputo scrivere contro l'altrui. Risponderà senza dubbio di rò, e si farà forte con dire essere da lui stato scoperto il modo di svilupparla. Ma non ho io fatto altrettanto nella formula controversa, e forse di più? mentre finalmente la maniera Bernulliana è limitata, e non può stendersi all'espres-

sione del Sig. Ermanno: dove all'incontro la mia abbraccia l'una, e l'altra, come fondata sopra un principio più generale. Accetteremo dunque l'ingenua confessione del Sig. Niccolò, che l'equazione, di cui si parla, era più difficile in apparenza, che in verità: e conchiuderemo, che s'era disperata presso il Sig. Giovanni, non era tale presso di noi, e molto meno presso il suo chiarissimo Autore.

In secondo luogo, se crediamo a questi Signori, per sommare la nostra formula, altro non si richiedeva, fuorchè di mettere opportunamente in opera i sussidj del calcolo integrale da loro prima scoperto. Se così è, io bramerei capire, come un'espressione dipenda per l'una parte da canoni noti, e dall'altra si faccia passare per disperata. Gli artificj divisi non erano forse di comune giurisdizione? per qual causa dunque non poteva servirsene il Sig. Ermanno al pari d'ogn altro, e qual necessità aveva mai di prender di mira le curve del secondo grado? Era superfluo, ch'egli accompagnasse la sua formula con una deduzione, mentre altro non avrebbe fatto, che rammentare al Sig. Bernulli i suoi artificj. Ma quello, che io non so intendere, si è, come se la prenda il Sig. Niccolò contro il Zio, e lo accusi, in vece di difenderlo, quasi che non abbia saputo far uso de' proprj principj. In fatti, se con gli ajuti Bernulliani, per detto del Sig. Niccolò, si può sviluppare una formula, che il Sig. Giovanni giudica disperata, ne segue, che o il Zio s'è trovato imbarazzato in applicarceli, o che sono insufficienti i decantati artificj, e falsa l'asserzione del Nipote. Comunque la cosa si sia, parmi d'aver favellato con più modestia, quando mi sono espresso, essersi il Sig. Giovanni lasciato sorprendere dalla prima apparenza.

In terzo luogo è necessario, ch'io mi purghi del rimprovero addossatomi, ed esponga almeno in compendio il metodo, di cui mi sono servito, e di cui non so d'esser debitore ad altri, che a me medesimo. Per dedurre la cosa da più alti principj, debbo premettere, che la separazione delle indeterminate m'è paruta sempre un giuoco d'ingegno, in cui abbia più luogo la pratica, la pazienza, la sorte, che l'arte, ed il metodo. Fra le insuperabili difficoltà, che rendono involuta l'operazione, non è forse la minima il poter restituire all'equazione que' termini che nel prendere le differenze ordinariamente svaniscono. M'è noto il grand'uso delle sostituzioni derivate dall'Analisi volgare in quella degl'infiniti; ma finalmente tra le innumerabili, che possono farsi, chi m'addita quell'unica, che può guidarmi più speditamente alla meta. So, che oltre molti artificj adattati da' Geometri a casi particolari, si trova registrata negli Atti di Lipsia 1696. la formula più generale dell'incomparabile Sig. Leibnizio, ampliata poscia l'anno 1697. dal Sig. Giovanni Bernulli, a cui, omettendo per brevità le più limitate, s'aggiunga la maniera del famoso Sig. Jacopo Bernulli estesa fino alle terze differenze nella soluzione del Problema degl'Isoperimetri; e quella del lodato Sig. Giovanni, là dove tratta del solido della minima resistenza; e finalmente l'ultima d'un insigne Italiano, cioè del Sig. Gabbriello Manfredi inserita ne' nostri Giornali. Contuttociò gl'illustri Autori de' metodi accennati conoscono ab-

bastanza la loro circoscrizione, senza ch'io m'affatichi in dimostrarla; e per dir vero si danno infinite espressioni, in cui con poco dispendio si separano le variabili, e pure sono per altro così ostinate, che non lasciano vincersi da' canoni mentovati.

A me nel maneggiare, come accade, varie formule, è riuscito o per ventura, o per arte di scoprire un modo facile per conseguire l'intento, che va accompagnato da tre circostanze importanti. La prima, che con la sua generale estensione abbraccia tutte le altre maniere sinora pubblicare, o almeno ne fa far uso come d'aiuti sussidiarj. La seconda, che arriva speditamente al suo fine, quand'anche nell'atto del differenziare sieno spariti alcuni membri dell'equazione. La terza, che valendosi delle sostituzioni, nel tempo stesso c'insegna, quali sieno le legittime, e quali le inutili.

Ecco tre canoni, su cui si fonda. Si dee primieramente disporre l'equazione proposta in maniera, che le quantità differenziali restino accompagnate rispettivamente dalle loro indeterminate, o si faccia, per così dire, una dimezzata separazione, rigettando ne' comuni moltiplicatori, o divisori quelle grandezze, che turbano l'operazione; indi presa la sommatoria della differenziale così preparata, composta di due ignote, si dee porre uguale ad una variabile assunta, o col mezzo d'una equazione ausiliaria dare una nuova forma alla principale. Finalmente fatta osservazione a ciò, che succede, dee iterarsi l'operazione, sino a tanto che si conseguisca la bramata separazione, o si veda essere la formula contumace, e superiore alla nostra industria.

A questo passo mi si conceda di protestare altamente, che io non presumo d'integrar l'integrabile, ma solo di stendere in parte i confini del computo sommatorio. Conosco esserci alcune formule, che non ammettono la nostra preparazione, altre in cui tutti i tentativi messi in opera per separare le ignote, non servono, che a maggiormente imbrogliarle; e quantunque in certi casi non manchino ripieghi per superare gl'impicci, con tuttocìò resterà sempre da farsi più di quello, che s'è fatto. Chi fa? forse si danno certe formule, alle quali si potrebbe dare il nome di sovra trascendenti, con le indeterminate sì fattamente miste, e confuse, che non ammettono separazione veruna, e vogliono essere costrutte per una serie, e non per una quadratura. Sia questa un'idea ben fondata, o pure un sogno, poco importa; mentre in materia sì ardua bramerai piuttosto d'udire l'altrui parere, che di proponere il mio.

E S E M P I O I.

Sia $\frac{x^3 dy + y^3 dx}{xx + yy \cdot \sqrt{xx + yy} - xxy}$ = dz nella qual'equazione la

quantità z è una funzione arbitraria di x , ovvero di y . Metto da parte la quantità $x : xx + yy \cdot \sqrt{xx + yy} - xxy$, che è un'aspezione comune a due

ter-

46
termini, che compongono la prima parte dell'equazione. Resterà la differenziale nuda $x^2 dy + y^2 dx$. Divido dx per x^2 , e dy per y^2 , sicchè $x^2 y^2 \frac{dx}{x^2} + \frac{dy}{y^2} = x^2 dy + y^2 dx$, e la nostra formula prenda il nuovo aspetto,

cioè $\frac{x^2 y^2}{xx + yy} \cdot \frac{dx + dy}{\sqrt{xx + yy - x^2 y^2}} = dz$. Ottenuta questa dimi-

diata separazione, in cui le due flussioni dx, dy si veggono combinate semplicemente con le funzioni delle loro fluenti x^2, y^2 , e gli altri termini dell'equazione costituiscono una quantità quasi costante, che fa figura di comune

moltiplicatore, pongo $\frac{dx + dy}{x^2 y^2} = -dp$, ed integrando, $\frac{a}{2xx} + \frac{a}{2yy} = p$.

Sarà pertanto $\frac{-x^2 y^2 dp}{xx + yy \cdot \sqrt{xx + yy - x^2 y^2}} = dz$, e surrogando in cambio

di x per esempio il suo valore dato per y , e p , avremo $\frac{-dp}{2p \cdot \sqrt{2p - a}} = dz$: il che ec.

Raccogliasi, che presa ad arbitrio una quantità in qualsivoglia modo data per p , come $p = \frac{a}{2qq} = \frac{a}{2xx} + \frac{a}{2yy}$, o pure $\frac{xy}{\sqrt{xx + yy}} = q$, troveremo

mo $\frac{dq}{\sqrt{aa - qq}} = - \frac{dp}{2p \cdot \sqrt{2p - a}} = dz$, onde in un batter d'occhio si

scoprono le infinite sostituzioni, che servono alla bramata separazione. Tutte le altre possibili sono inutili, e lasciano le variabili più di prima implicate.

ESEMPIO II.

Pongasi l'equazione già preparata $x^m \cdot xdx + ydy = x^n \cdot ydx - xdy$, ovvero $y^{m-n} \cdot xdx + ydy = x^n \cdot \frac{ydx - xdy}{y}$. Pongo $\frac{x}{y} = q$, ed $xx + yy = pp$,

ed in conseguenza $xdx + ydy = pdp$ ed $\frac{ydx - xdy}{yy} = dq$. Fatta la doppia

sostituzione, sarà $y^{m-n} \cdot pdp = dq$. La dignità y^{m-n} può rappresentarsi
nella

nella seguente maniera y^{n+r} , ponendo $m-2 = n+r$; dunque $\frac{y^{n+r}}{x^n} \cdot p \, dp = dq$:

ma essendo $\frac{y}{x} = \frac{a}{q}$ farà altresì $\frac{y^n}{x^n} = \frac{a^n}{q^n}$; dunque $y^n p \, dp = q^n dq$. Frattanto

in virtù della doppia equazione $x = yq$, e $xx + yy = pp$ collocando in vece di xx il suo valore $y^2 q^2$, avremo $y^2 q^2 + y^2 = p^2$, cioè $y =$

$$= \frac{p}{\sqrt{aa + qq}}, \text{ ed in conseguenza } y' = \frac{pt}{aa + qq^2}; \text{ onde finalmente}$$

fiamo pervenuti ad una equazione libera dalla mistione delle indetermina-

$$\text{te } p^{n+r} \, dp = \frac{\frac{p}{2}}{aa + qq} \cdot q^n dq.$$

ESEMPIO III.

Considero una formula, che può maneggiarsi col metodo del Sig. Bernulli dell'anno 1697., cioè a dire $\frac{xy + ydx}{a + x} = du$, in cui y si sup-

pone data in qualsivoglia modo per u . Metto $xy = p$; dunque $ydp - p \, du = y \, du$. Preparo di bel nuovo l'equazione nella seguente forma

$$p \cdot \frac{dp - du}{y} = du. \text{ Prendo } l p = \int \frac{du}{y} l q, \text{ ovvero } l \frac{p}{q} = \int \frac{du}{y} x, \text{ dun-}$$

$$\text{que } \frac{p}{q} = a^x, \text{ e } dq = \frac{du}{ax}.$$

Tralascio d'addurre esempi nell'equazioni differenziali del secondo ordine, giacchè s'è fatta l'applicazione del modo, che dee tenersi all'espressioni de' Sig. Bernulli, ed Ermanno.

Non tocca a me il decidere, che conto debba farsi di questo metodo: io poca, o nessuna lode ne spero. Mi basta, che esso mi liberi dalla nota impostami gratuitamente da' Signori Bernulli. Mi dicano in qual libro, in qual Giornale, in qual registro d'Accademia si trovi questa maniera d'operare, acciocchè io sappia con chi per avventura mi sono incontrato, ed a chi si debba il pregio dell'invenzione: se bene la cosa è per se stessa di così poco momento, che io mi persuado non poter esserci fra' Geometri, chi si curasse gran fatto d'averla scoperta. Resti dunque a' Sig. Bernulli la gloria d'occupare il primo posto fra' promotori del cal-

calcolo degl'infiniti, e mi si conceda, che nel caso nostro non trovano luogo le loro sublimi fatiche.

Le cose dette chiamano un'altra necessaria riflessione. Nel ponderare, che io feci il modo, con cui il Sig. Giovanni sviluppa la sua seconda formula, dissi non esserci metodo fermo per fissar le grandezze, che debbono far figura di costanti, e che non sapeva io, che luogo potesse avere in casi egualmente ardui quest'artificio. Il Sig. Niccolò non impugna il detto, ma contra di me lo ritorce, accusandomi, che io abbia abbandonato il mio ufficio, e messe in pratica le sostituzioni, senza dar regola certa, per cui si faccia convenientemente una sostituzione, acciocchè le quantità variabili in qualsivoglia equazione proposta si separino l'una dall'altra.

Se si pretende, che il mio metodo abbia ad applicarsi a tutte l'equazioni possibili, si pretende troppo; basterà, che possa adattarsi a qualche caso, che si chiamava disperato. Dirò bensì, ch'io non mendico la sostituzione da farsi, e che la mia preparazione mi somministra quella precisa quantità, che in cambio delle altre dee surrogarsi.

M'era quasi dimenticato d'un'altra difficoltà messa a campo da Signori Bernulli. M'imputano un paralogismo per aver seguitati i veltigj del Sig. Ermano, e per avere nel prendere gl'integrali omeffo d'aggiungere le quantità costanti. Il peggio si è, che anche nella presente risposta sono caduto nello stesso fallo. Orsù abbiano la pazienza di leggere ciò, che da me è stato scritto nella prima difesa alla pag. 207. a); e vedranno, ch'io ho prevenuta in maniera l'opposizione, che non so come abbiano avuto coraggio di toccar questo punto. Per ora rispondo, che è stata mia intenzione di spiegar un metodo, e non di sciogliere un Problema.

Professa in oltre il Sig. Niccolò, che nello stendere a tutti i casi possibili l'equazione particolare del Sig. Ermano, abbia io inorpellato il metodo del Sig. suo Zio. Non è poco, che mi sia riuscito di far tanto, e se il modo non fosse così palesemente diverso, potrebbe dir ciò che vuole. Non desiderava forse il Sig. Giovanni, che dal Sig. Ermano venisse fatta una prova della sua analisi, applicandola all'ipotesi generale? In qualunque forma si sia soddisfatto ad una brama sì ragionevole, non possono giustamente pretendere di vantaggio. Per maggiormente persuaderli sappiano, che non ho battuto altra strada, che quella da me spianata nel mio Schediasma, in cui ho sciolto il problema inverso de' raggi osculatori pubblicato nell'undecimo Giornale d'Italia pag. 205. (b), prima che mi fossero capitate sotto l'occhio le speculazioni del Sig. Bernulli, e che mi potessi sognare d'inorpellare i suoi metodi. Tutto il giro consiste nel trasportare in qualche occasione più ardua l'equazione delle curve dall'asse al foco, e indi di nuovo per altra strada dal foco all'asse: Si degnino d'osservare l'esempio pag. 213. (c).

Per

(a) In questo Tomo pag. 28.

(b) Leggasi il citato Schediasma, in questo Tomo alla pag. 1.

(c) E nella presente edizione pag. 26.

Per far la seconda traslazione, che sembra la più difficile, e sopra di cui ha versato l'industria del Sig. Giovanni, io non ho adoperate, che due semplicissime equazioni note a tutti i Geometri senza chiamar in soccorso qualisiasi preparazione. Nella curva BCD (fig. 14) considerata nello stesso tempo relativamente al foco, ed all'asse, non è egli certo, che il quadrato CD dell'elemento della curva è uguale tanto ai due quadrati CE, ED, quanto a i due altri AG, GC? Chiamando AG x , GC y , AC z , e l'arco minimo CE du , avremo $dz^2 + du^2 = dx^2 + dy^2$, e $x^2 + y^2 = z^2$. Ora l'equazione della curva al foco venga generalmente espressa dalla formula $pdx = du$, in cui p è una data funzione di z , e farà $pdz^2 + p^2dz^2 = dx^2 + dy^2$, e collocato in vece di dy il suo valore nascente dall'equazione $x^2 + y^2 = z^2$, vale a dire $\frac{zdz - xdx}{\sqrt{zz - xx}}$, troveremo

$$\text{mo } dz^2 + p^2dz^2 = dx^2 + \frac{zdz - xdx}{\sqrt{zz - xx}}, \text{ la qual equazione espurgata}$$

con le trasposizioni, e con una semplice estrazione della radice prima, passa nella seguente $pdx = \frac{zdz - xdx}{\sqrt{zz - xx}}$ e separate le variabili col porre

$$x = zq, \frac{pdx}{z} = \frac{dq}{\sqrt{aa - qq}}.$$

Il metodo del Sig. Ermanno consiste in notare l'uguaglianza fra le due quantità $zadu$, e $ydx - xdy$, il che si ricava dalla tola interpretazione della figura, essendo l'arca BGC, meno il triangolo AGC, uguale al trilineo BCA, ed in conseguenza eguali i loro elementi.

Quande poi si voglia costruire la premessa equazione, ci si presenta la preparazione del Sig. Bernulli; giacchè il membro $\frac{dq}{\sqrt{aa - qq}}$ ricerca la descrizione d'un arco circolare di raggio costante. E di fatto per questa via nel luogo sopraccitato sono venuto in cognizione, che l'epitricloide corrisponde alla legge di forza centrale in ragione reciproca quadruplicata delle distanze.

Nel secondo punto principale della nostra controversia si cercava, in che pregio dovesse tenerli la soluzione particolare del Sig. Ermanno; e non è paradossò il mio, come si sforzano di spacciarlo i Signori Bernulli, quand' ho avuto coraggio di preferirla, o almeno d'uguagliarla alla soluzione generale, per due motivi di somma importanza; sì perchè ha un non so che di singolare, come vedremo a suo tempo; sì perchè non resta involupata fra quantità trascendenti.

Opere Ricc. Tomo III.

G

E'

E' massima comunemente ricevuta da' Geometri antichi, e moderni, non essere lieve fallo contro l'arte, quando un problema si scioglie per genere improprio. Viene censurato chi maneggia per li luoghi solidi un problema piano, chi soddisfa ad una quistione lineare con curve di grado troppo elevato; e pure tutte queste curve non escono fuori della linea delle algebriche. Che farà dunque il trattare un caso algebraico con curve meccaniche, che sono totalmente differenti di genere? Non vorrei però, che mi credessero così scrupoloso, quasi che io disprezzassi universalmente simil sorta di soluzioni. Io le accetto per buone, quando non ne trovo di migliori; mentre nulla rileva per qual sentiero si pervenga allo scoprimento d'una sublime verità. Lodo chi le adopera, e lodo molto più chi sa destramente schivarle: e qui dee notarsi, che la nostra disputa non cade sopra la bontà, ma solo sopra l'eleganza della soluzione.

Pare, che mi si ammetta il principio, e che si tenti di eluderlo con due risposte. Primieramente dicono, che quantunque le formule dipendano dalla comparazione di due archi circolari commensurabili, contuttociò non è difficile il ridurle ad equazioni puramente algebriche; e si servono d'un metodo ingegnoso, che nulla più, adattandolo poscia con pari sagacità agli esempj controversi. Chi mai ha negato ciò? non ci voleva un gran che a capire, che se sotto la sembianza d'espressioni meccaniche si nascondono curve geometriche, egli è d'uopo, che si possa levar loro la maschera, e ravvistarle per quelle che sono, almeno in alcuni incontri più manifesti. Era noto, che da due quantità logaritmiche si fa passaggio a due ordinarie, e non esserci quadratura per composta che sia, che non serva ad una curva algebrica, quando il membro corrispondente si possa ridurre ad una espressione simile con una congrua sostituzione. Ho detto simile, e mi par d'aver detto a bastanza per essere inteso in una materia sì conosciuta, tuttochè il Signor Niccolò Bernulli m'abbia a torto per questo capo aceusato di paralogismo.

Ciò non ostante la risposta non tronca il nodo. Siaci pure il metodo per ottenere la bramata riduzione, ed anche più generale di quello, che in fatto si sperimenta; non sarà sempre meglio lo sfuggire, se pur si può, la comparazione delle grandezze trascendenti, che andare in traccia del modo, che dee servire a ridurle? in quella guisa appunto, che in una quistione d'Analisi volgare meriterebbe più lode colui, che la maneggiasse con quantità reali, e commensurabili, di quello, che v'introducesse le irrazionali, e le immaginarie, se bene insegnasse poi la maniera di convertire le prime in commensurabili, e le seconde in reali.

Rispondono secondariamente i Signori Bernulli, che non è tanto singolare l'ipotesi comune considerata dal Sig. Ermanno, che non ce ne sia un'altra al pari privilegiata; cioè, quando le forze centrali serbano la ragione delle distanze, nella quale l'equazione viene integrata senza la vista di quantità trascendenti. Saggiungono, ch'io mi sono trovato imbarazzato, ed ho voluto lasciar piuttosto il problema da sciogliere, che tormentarmi con uno sforzo vano, e farò le meraviglie, perchè dal Sig. Ermanno non sia stata estesa a questo caso la propria soluzione. Suppli-

fco-

scono essi alla mancanza, e registrano due soluzioni, la prima derivata dalla formula del Sig. Ermanno; la seconda, tutto lavoro del Sig. Giovanni, procede per mezzo d'angoli ridotti geometricamente, ed analiticamente a grandezze algebriche.

In questa occasione à lodati Matematici anno ommesse, o troncate alcune mie asserzioni, e finto di non intendermi per più facilmente impugnarli. Sia tutto vero ciò, che propongono, è cosa notabile, che scandagliato da essi tutto il fondo della lor Geometria, non anno saputo rinvenire che un solo caso, oltre il già ponderato, in cui si possa procedere per quantità puramente algebriche; onde la nostra ipotesi lascerebbe bensì d'essere singolare, ma non d'essere privilegiata. Potrei far vedere, che non mi trovo imbarazzato, quanto essi credono, e potrei dilatare ad altri casi più composti la formula del Sig. Ermanno, se lo stimassi opportuno. Aggiugnerei di non aver mai negato, che non abbia ad avere il suo uso in qualche sistema particolare di forze centrali, o col preparar l'equazione, o col ridurre ad algebriche le quantità trascendenti, o coll'infinuare nell'espressione destramente le grandezze presupposte dalla predetta artificial riduzione.

Ho detto generalmente non esserci strada di distinguere le curve geometriche, senza che c'entrino quantità meccaniche. Nell'atto stesso di prorompere, com'essi vogliono, nelle mie esclamazioni, e di recare l'esempio delle sezioni coniche ritegite al centro, m'esprimo, che nulla gioverà averle in vista, mentre non si scuopra prima il metodo di sommare l'espressione proposta; e poco dopo conchiudo, che dalla mia osservazione si renderà manifesto, qual differenza passi tra le formule generali, e la particolare del Sig. Ermanno: tanto è vero, che io parlava generalmente. Alla pag. 207. (d) sostento essere il caso nostro l'unico, che possa maneggiarsi con equazioni analiticamente integrabili; ma nel luogo stesso soggiungo, che esso è compreso con tutti gli altri nella formula generale meccanica, e che per distinguerlo non c'è bisogno di riduzione. Da tali espressioni, e molto più dal mio modo di procedere alla pag. 200. (e) chiaramente spicca la mia intenzione. Nell'equazione del Sig. Ermanno conservata nella sua purità, e non alterata da preparazioni, o da riduzioni, per l'una parte le variabili non si separano, nè si dà una doppia integrazione algebrica, storchè nell'unico caso della forza centrale in proporzione reciproca de' quadrati delle distanze; per l'altra in tutti gli altri casi possibili si richiede nuovo artificio, che generalmente non è noto, senza che s'incontrino quantità trascendenti; avvegnachè in qualche incontro certi giuochi d'analisi possano supplire al bisogno; dunque l'accennata ipotesi seguirà a godere il privilegio della sua singolarità.

Frattanto il Sig. Niccolò dà alla luce una maniera di sua invenzione, con cui soddisfa al caso medesimo senza l'aiuto delle quantità meccaniche. Se bene la sua soluzione non va immune da ogni neo di peti-

G 2

zion

(d) In questa edizione pag. 28.

(e) Nella presente edizione pag. 25.

sion di principio: nulladimeno io, che mi sono proposto la difesa, e non l'offesa, risponderò, che il caso, e non il modo è stato chiamato da me *angolare*.

Si querelano i Signori Bernulli d'una mia innocente espressione, cioè, che se non si fossero tolte di mira, non si farebbero forse poste in luce le sezioni del cono. Vogliono, che sia una puntura, che vada a ferire ingiustamente il Sig. Giovanni; benchè io tutt'altro avessi in vista, ed abbiano la bontà di credermelo, suorchè il mentovato Signore. Per far poi comprendere, che non m'è uscita a caso la parola di bocca, riflettano all'epoca della grand'opera Nevvtoniana, in cui il problema diretto si trova sciolto da tanto tempo, e m'imenderanno, senza che di vantaggio mi spieghi. La difficoltà non consiste, com'essi pensano, nel paragonare insieme due archi circolari; ma nel ridurre la differenziale proposta a quella d'un arco di cerchio: e la cosa è per se stessa, almeno presa universalmente, sì ardua, che da loro viene giudicata impossibile.

O qui si che danno in esclamazioni: mi rimproverano, che accuso di particolarità la soluzione del Sig. Giovanni, perchè non supera l'impossibile; che presumo d'integrare l'integrabile, e che prometto cose troppo magnifiche. Io nulla prometto del mio: odano, come s'esprime il Sig. Ermanno nel VII. Giornale d'Italia pag. 227. „ Egli è certissimo, „ ch'avvegnachè il problema inverso delle forze centrali nel voto generale, „ ralmente considerato è meccanico, niente di meno infiniti sono i casi „ particolari, che rendono il problema algebrico, e somministrano curve „ costruibili senza le quadrature delle figure curvilinee. Si domanda „ dunque una formula generale, che racchiuda tutti i casi possibili, che „ somministrano curve geometriche costruibili indipendentemente dalle „ quadrature. A molti parerà forse impossibile il problema, ma per disingannarli darò qui la formula desiderata, dimandandone solo la dimostrazione, e la costruzione delle curve, a cui compete. „ Aggiungo poscia la formula, che si può vedere nel luogo citato, e ch'io trasalisco per brevità. Pareva, che il Sign. Ermanno prevedesse fin d'allora ciò, che doveano dire un giorno i Signori Bernulli, e se ben so, che egli con la loro acutezza, veduta la formula, ne penetreranno il misterio, non resterà però, che non abbiano giudicata impossibile la questione: e mi credano, che non gioverà interpretare questo vocabolo, come anno fatto quello di disperato. Non farà pertanto picciola lode di questo insigne Geometra, che i suoi sforzi, per adottare la frase Bernulliana, tant'oltre s'estendano, che superino l'impossibile, e che egli sia arrivato fin dove i Matematici di prima sfera nè pure speravan di giungere. Premesso ciò, io mi contento, che m'accusino a loro talento di parzialità.

Ora capiranno, che non potea riuscirmi nuova, ne la spirale iperbolica scoperta prima col metodo diretto dal Sig. Varignon, nè le infinite curve algebriche rispondenti alla legge di forza centrale in ragione inversa de' cubi delle distanze. Per darne un saggio mi fermerò su quest'ultimo punto, mettendo in chiaro l'analisi occultata dal Sig. Bernulli negli Atti di Lipsia 1713., a cui professa essere pervenuto per certi compendj di calcolo a lui noti.

Li.

Limitando dunque l'espressione generale delle forze centrali col porre nella nostra ipotesi $f = \frac{g}{y^3}$, troveremo $dx = \frac{dy}{\sqrt{c^2 y^4 + b^2 - a^2}}$, equazione

unica, che abbraccia curve infinite, secondochè si va alterando la relazione delle costanti.

Primieramente sia $c^2 = 0$, e l'equazione apparterrà alla spirale logaritmica, ed anche al cerchio, quando nella stessa ipotesi fosse $b^2 - a^2 = 0$.

Secondariamente posta c^2 uguale ad una quantità positiva, e $bb = aa$, farà $dx = \frac{dy}{cy}$, o pure $\frac{y dx}{dy} = \frac{a}{c}$, di maniera che nella curva sarà sempre

costante la subtangente, proprietà, che conviene alla spirale iperbolica.

In terzo luogo messe da parte le limitazioni, e considerata la nostra formula con tutti i suoi termini, possiamo concepire la quantità bb maggiore, e minore dell'unità a^2 , e presa $b^2 - a^2 = g^2$, può essere la g^2 o affermativa, o negativa. Tolta per mano la seconda supposizione, esaminiamo che conseguenze se ne deducano.

Assunto il raggio $AF = g$ (Fig. 15.), e tirato l'arco di cerchio KFI , si verificherà l'analogia $AC, y : CE, dx :: AF, g : FG, dz$; dunque $g dx = y dz$, e fatta nella formula l'opportuna sostituzione $\frac{dx}{g} =$

$$= \frac{dy}{y \sqrt{c^2 y^4 - g^2}}. \text{ Pongo } cy = s; \text{ dunque } \frac{dy}{y \sqrt{c^2 y^4 - g^2}} = \frac{dz}{g} = \frac{ds}{s \sqrt{ss - gg}};$$

e moltiplicando i membri dell'equazione per g^2 , $g dz = \frac{g^2 ds}{s \sqrt{ss - gg}}$; ma

condotta la retta AK asse delle curve cercate, e preso l'arco $KG = z$, e la sua differenza $GF = dx$, la sommatoria di $g dx$, vale a dire gz , farà un arco di cerchio, per esempio KH in proporzione all'arco KG , come $g : a$. Di più è noto essere l'integrale $\int \frac{g ds}{s \sqrt{ss - gg}}$ un arco pure di cir-

colo, il cui raggio è g , e la secante s , cioè a dire in forza dell'equazione premessa l'arco KH sopra determinato; dunque dato l'arco KH , farà data la sua secante $AL = s = cy$, e la secante AL farà all'ordinata AC delle curve cercate in proporzione costante: il che, ec.

COROLLARIO I.

L'arco KH si è supposto minore di KG , perchè nella formula generale alla quantità dy s'è premesso il segno negativo, e le forze sono state considerate come centripete: ma cangiando sistema, e supponendole centri-

centrifughe, la quantità b^4 si trasforma in negativa, ed allora g^4 è necessariamente maggiore dell'unità. Sarà pertanto d'uopo il prendere l'arco KG in data proporzione di minore ingualità all'arco KI, e condotta la secante AN, determinare l'applicata AC, che sia sempre ad AN in ragione costante.

COROLLARIO II.

Variata la relazione di GK ad HK, ovvero IK, si muta la natura; ed il grado della curva BCD. Se le due quantità a e g serbano fra loro una ragione, o irrazionale, o trascendente, è fuor di dubbio, che sono meccaniche le curve descritte; ed all'incontro algebrache, se la proporzione è razionale, e come di numero a numero. Ora si sa, che a misura della divisione, e moltiplicazione degli archi si muta l'equazione locale, ed il grado della curva. Così faranno infinite le curve geometriche, che soddisfanno al quisito.

COSTRUZIONE.

Sia GAK (Fig. 16.) asse delle curve, A il polo. Prendo l'arbitraria costante AB, e tiro ad AB la normale BD. Descritto col raggio variabile AK l'arco di cerchio KDFL, pongo l'arco KD intercetto fra le due perpendicolari BD, BK all'arco maggiore KF per le forze centripete, o all'arco minore KC per le centrifughe in ragione costante: i punti F, C faranno alle curve cercate.

Mi persuado essere diversa dalla mia l'analisi del Sig. Bernullii mentre somministra bensì le curve stesse, ma in posizione differente, e riferite ad un'altro asse. Per vedere l'accordo di queste due costruzioni, che a prima vista non apparisce, facciasi come l'arco KD all'arco KF; così il quadrante KE all'arco KL, vale a dire in proporzione costante; e tirato dal polo A il nuovo asse AL, sopra di cui s'alzi la perpendicolare AH=AB, la linea HS condotta parallela ad AL taglierà l'arco IL=ED. Perchè dunque KE:KL::KD:KF, o pure KE:KD::KL:KF, sarà altresì ED:DK::LF:FK, ovvero ED=IL:LF::KD:KF; sarà perciò LI ad LF in ragione costante, come appunto richiede la costruzione Bernulliana.

Resta, che si prenda per mano il quarto caso, e suppongasi assertivo il quadrato b^4 , e nello stesso tempo maggiore dell'unità, ovvero negativa la costante aggiunta c^4 : ma perchè da quel che s'è detto riesce facile il determinare le curve col mezzo de' logaritmi, e della rettificazione degli archi circolari, non ne parleremo di vantaggio.

Per chiudere la presente Dissertazione con qualche particolare, che abbia aria di novità, giacchè il Sig. Niccolò Bernulli ha fatto menzione nelle sue Note delle forze centrali nel pieno, credo non mi farà disdetto l'estendere le speculazioni del Sig. suo Zio, come questi ha ampliate le Nevvtoniane, pubblicando con l'occasione, che favorevole mi si presen-

ta,

ta, alcune mie riflessioni in tal proposito, comunicate fin l'anno 1712. a' Signori Ermanno e Zendrini. E se bene io le ho dedotte da certe formule di mia maniera, tuttavia per non fare il già fatto, e per isfuggire il tedio d'una prolissa dimostrazione, adotterò quelle del Sig. Giovanni, che non saranno sospette.

Osserva egli acutamente al suo solito, che posta la densità in ragione reciproca della distanza, e la resistenza del mezzo in duplicata della velocità, non viene descritta dal mobile la spirale logaritmica nell'unico caso, in cui sia la forza centrale in proporzione inversa del quadrato della distanza, ma di più quando la forza è come qualsivoglia potenza della distanza medesima o diretta, o reciproca. Non è la sola spirale dotata d'una sì bella proprietà; altre curve infinite di numero, e quello ch'è più, di natura algebriche vantano un simile privilegio, purchè si vada opportunamente alterando la legge della resistenza. Eccone la dimostrazione.

Sia la curva BCD (fig. 17.) trascorsa dal mobile nel pieno con una data ipotesi di forza, e di resistenza. AC è l'ordinata $= y$, CE un arco minimo descritto intorno il centro A $= dx$, CD l'elemento della curva $= ds$, CM il raggio osculatore, CL il co-raggio, o come io lo chiamo, la sottoosculatrice $= x$. Dal polo A si tiri la retta AN normale a CM, e s'appelli z l'intercetta CN.

Le formule del Sig. Bernulli, che perfettamente s'accordano con quelle del Sig. Ermanno sono le seguenti. $uu = fx$, $\pm Rds + udu = \pm fdy$, nelle quali R significa la resistenza, u la velocità, f la forza centrale data per una funzione arbitraria dell'applicata.

Venga proposto di determinare tutte le curve infinite, in cui le due flussioni udu , fdy si rimirino con una proporzione costante.

Conciosiachè $udu:fdy::a:xb$; dunque $xbudu = fdy$, ed integrando

$buu = \pm g \pm \int fdy = \pm g \pm p$, posta $p = \int fdy$, che sarà data in conseguenza per y . Di più essendo $u^2 = fx$, sarà altresì $\pm g \pm p = \pm bfx$, o pure $\frac{dy}{x} = \frac{b f dy}{\pm g \pm p} = \frac{bdp}{\pm g \pm q}$; ma per le cose dimostrate

nella mia soluzione del problema de' raggi osculatori $\frac{dy}{x} = \frac{dt}{t} = \frac{bdv}{\pm g \pm p}$;

dunque sommando, si scoprirà z essere data per p , ovvero per y e si farà facilmente transito alla costruzione delle curve desiderate.

COROLLARIO

Che se fosse $-fdy = udu$, allora, come ha notato il Signor Bernulli, restando il solo termine $Rds = 0$, le curve si descriverebbero nel vuoto; onde la nostra maniera di procedere ci suggerisce una

NUO-

nuova formula generale con le variabili separate per le forze centrali in un mezzo non resistente.

Molte importanti riflessioni si potrebbero dedurre da' premessi principi, che io riterbo a miglior congiuntura. Presentemente limitando la formula col supporre $f = by^m$, ed ommessa l'addizione della costante g nel prendere l'integrale, la premessa analisi ci farà scoprire, essere proprietà comune delle nostre curve l'avere la sottoiscultrice all'ordinata in proporzione costante. In fatti essendo $udu: by^m dy:: a: ab$, cioè a dire $abudu = by^m dy$, sarà integrando $bu^2 = \frac{by^{m+1}}{m+1} = b/cz = bby^m z$, vale a dire

$$\frac{y}{m+1} = bz.$$

Giacchè dunque $y = cz$, abbiamo $\frac{dt}{t} = \frac{dy}{z} = cdy$, ed integrando

$t = by^c$; la quantità b è una costante arbitraria. Per iscoprire l'equazione generale delle curve abbracciate dalla formula, osservo verificarsi il seguente analogissimo (E, $dx: CD, ds:: CN^2, CA, y$ dunque $ax = tds = by^c ds$, ed in conseguenza $dx = \frac{by^{c-1} dy}{\sqrt{aa - by^{2c-2}}}$.

Preso AK asse delle curve, e dalla distanza AF = a descritto l'arco JFK, avremo AC, $y: CE, dx:: AF. a: FG, du$, e perciò $ydu = dx$, e $du = \frac{by^{c-2} dy}{\sqrt{aa - by^{2c-2}}}$.

Sia $by^{c-2} = q$, e fatta la dovuta sostituzione, $c-1. du = \frac{dq}{\sqrt{aa - qq}}$.

COSTRUZIONE.

Facciasi come $c-1$ ad a così l'arco FK all'arco HK, ovvero IK, e tirate le normali HP, IQ, sarà data la relazione dei seni AP, AQ all'ordinata AC in virtù dell'equazione $by^{c-1} = q$.

Variato l'esponente c si cambia la natura della curva, e dall'espressione generale oltre ad infinite curve meccaniche, vengono comprese infinite geometriche, mentre la ragione di c ad a sia razionale; fra le quali molte curve note, come la parabola riferita al foco, l'iperbola al centro, il circolo ad un punto preso nella circonferenza, e la più semplice fra le epicloidi al principio della rotazione. Dee eccettuarli il caso di $c = a$, che dà la spirale logarithmica.

Ora

Ora nell'ipotesi assunta la formula Bernoulliana $\approx R ds + \overset{37}{adu} = \pm \int dy$ si trasforma nella seguente $\approx R ds = \pm A y^m dy$, ed essendo nelle nostre curve l'elemento $ds = \frac{dy}{\sqrt{aa-bby^{2c-2}}}$, avremo

$$\pm \frac{R}{\sqrt{aa-bby^{2c-2}}} = \pm A y^m. \text{ Sia la resistenza in ragione composta della}$$

densità del mezzo, e di qualsivoglia potenza della velocità, cioè $R = Du^n$; ma essendo $u^2 = By^{m+2}$, sarà altresì $u^2 = Cy \frac{mn+n}{2}$ e final-

$$\text{mente } \pm \frac{D}{\sqrt{aa-bby^{2c-2}}} = \pm Cy \frac{mn-n+2m}{2}. \text{ Le lettere } A, B,$$

C, G dinotano quantità costanti surrogate in luogo d'altre più composte.

Primieramente sia, giusta la comune ipotesi, la resistenza in ragione duplicata della velocità, cioè $n = 2$ e l'esponente $\frac{mn-n+2m}{2} = -1$.

Lo sparire che fa in quest'incontro l'esponente m indice della forza centrale dinota, che in sua vece si può sostituire qualsiasi numero, e più generalmente qualsiasi quantità determinata: da che si raccoglie essere proprietà comune delle nostre curve, che posta la densità $D = \frac{1}{\sqrt{aa-bby^{2c-2}}}$,

e la resistenza come il quadrato della velocità, verrà sempre dal mobile descritta una medesima curva, quantunque si muti la legge della forza centrale, e si prenda o come costante, o ad arbitrio come qualsivoglia dignità della distanza. Che se fosse $c = 1$, di modo che la quantità

$\sqrt{aa-bby^{2c-2}}$ sia costante, diventando l'esponente $2c-2=0$, allora la curva farebbe una logaritmica spirale, che cade sotto la nostra universal espressione, e la densità reciprocamente come la distanza.

Cota maravigliosa si è, che nel voto, mutata la legge della forza, si cambia l'indole della curva, ed ogni supposizione richiede una linea diversa; dove all'opposto nel pieno una sola curva soddisfa a tutte le supposizioni.

In secondo luogo sia la resistenza come la velocità, cioè $n=1$; dunque $\pm \frac{D}{\sqrt{aa-bby^{2c-2}}} = \pm Gy \frac{1+m}{2}$. Sia $m = 1$, in maniera che

$y^{\frac{1}{2}}$ sia costante, ed in tutte le nostre curve la densità sarà come

$\sqrt{aa-bby^{2m-2}}$, e determinando la formula ad esprimere la logarithmica spirale, la densità diventa costante; e se nella curva stessa fosse $m = -1$, la densità farebbe come y^{-1} , cioè come la forza centrale in ragione reciproca della distanza; ma in questo caso farebbe costante la velocità, la qual proprietà conviene a tutte le nostre curve; imperocchè essendo $u^2 = fz$, e $z = \frac{y}{c}$, e per la supposizione $f = by^{-2}$, sarà parimente $u^2 = \frac{b}{c}$.

La densità poi è come $\sqrt{aa-bby^{2m-2}}$ non solo nel caso di sopra espres-

so, ma ripetendo la formula generale $\frac{\pm D}{\sqrt{aa-bby^{2m-2}}} = \pm Gy^{\frac{-nm-n+m}{2}}$

ogni qual volta sia costante il secondo membro dell'equazione, e sia $-nm = n + 2m = 0$, il che si verificherà, quando sia $n = \frac{2m}{m+1}$; onde se m

$= -2$, come nella comune ipotesi, avremo $n = 4$, e così discorrendo.

Finalmente sia costante la forza centrale, ed $m = 0$, troveremo

$\frac{\pm D}{\sqrt{aa-bby^{2m-2}}} = \pm Gy^{\frac{n}{2}}$, e nella logarithmica la densità com $y^{\frac{n}{2}}$.

Non mi fermerò a determinare i casi dell'ascendimento, e della discesa, come nè meno gl'incontri, che cangiano le forze di centripete in centrifughe, essendo stati questi punti chiaramente spiegati dal Sig. Bernulli, che non si può desiderar di vantaggio. Basterà, che lasciate l'altre conseguenze, dia fine col fissare i canoni delle forze centrali per le nostre curve in un mezzo non resistente. Sarà sempre $\pm f dy = \frac{dt}{t^3}$; ma by^2

$= t$; dunque $\pm f dy = \frac{cdy}{bby^{2m+1}}$, cioè $\pm f = \frac{c}{bby^{2m+1}}$.

Non ad altro oggetto ho pubblicate queste mie meditazioni, che starebbero meglio soppresse, se non per far vedere a' Matematici Oltremontani, ed in ispecie al Sig. Niccolò Bernulli, che anche in Italia si spende da' Geometri qualche ora d'ozio in materie così sublimi, senza che egli si prendesse la briga di risvegliarli con un problema, e che gl'Italiani pensano quanto gli altri, ma non anno tanto prurito di farsi Autori.

Rio

*Risposta del Sig. Niccolò Bernulli Nipote del Sig. Giovanni
a quelle cose, che il Sig. Conte Jacopo Riccati inserì
nel Tomo XXI. del Giornale de' Letterati
d' Italia all' Articolo VIII.*

Sarebbe stato da desiderare, che il Sig. Conte Riccati non avesse mai eccitata quella contesa inutile, che è fra lui, e me, o che si fosse acchetato alle risposte, che diedi nelle mie annotazioni alle obbiezioni, colle quali ei senza cagione attaccò mio Zio, o almeno avesse risposto alle mie

Si è stimato di far cosa grata al Lettore ristampando le Annotazioni del Sig. Niccolò Bernulli allo Schediasma III., come altresì la presente Risposta contenuta nel Tomo XXIV, Articolo IV. del Giornale de' Letterati d' Italia; acciò che non gli restasse che desiderare per intendere compiutamente la controversia fra l'Autore, ed i Signori Giovanni, e Niccolò Bernulli. Alla lettera del Sig. Jacopo Ermanno al Sig. Giovanni Bernulli inserita dal Sig. Niccolò nella sua Risposta si può contrapporre la seguente dello stesso Sig. Ermanno al Sig. Bernardino Zendrini, che la comunicò al nostro Autore con una sua in data de' 29. Giugno 1719. Ecco il paragrafo della lettera. „ Ho veduto la bella Risposta del Dottissimo
„ Sig. Conte Riccati in mio favore alle opposizioni del Sig. Gio: Bernoulli alla soluzione del Problema inverso delle forze centrali nel voto.
„ Mi riconosco tanto più obbligato alla bontà di questo Dottissimo Gentiluomo, quanto maggiore è l'affetto, che ha voluto palesarmi con
„ espressioni non solo a me onorevolissime, ma nè meno da me meritare,
„ e con cattar briga col Sig. Bernoulli poco usato a soffrire le altrui opposizioni. Prego V. S. di far conoscere al detto Sig. Conte, riverendolo
„ in mio nome, questi miei sinceri sentimenti di gratitudine, fin a tanto
„ che io abbia il modo di farlo da mia posta con le lettere, non bastandomi
„ il tempo di farlo. Il Sig. Conte ha benissimo compreso il motivo dell'
„ esame da lui stimato così severo della mia soluzione consaputa. Non ho
„ risposto alla critica del Sig. Bernoulli, perchè non l'ho stimato necessario,
„ conoscendo io medesimamente il motivo del Sig. Bernoulli, e potendo soffrir
„ benissimo, che un Uomo tale dica la verità, preferendo la sua soluzione
„ alla mia. Come egli è mio amico, non ho stimato opportuno, nè ben fatto
„ ingraziarlo con esso lui per un motivo di sì poca rilevanza. Ma come il
„ Sig. Conte ha voluto supplire alle mie veci, non posso non ringraziarlo
„ di vero cuore. La risposta parmi soda, e dottissima, poichè è ripiena
„ di riflessioni degne di lui. E'li ha ottimamente indovinato l'artificio,
„ con cui sono arrivato all' integrazioni consapute, col porre come fa $\frac{x}{y}$

„ = p , e poi $\frac{y}{x} = q$, o supposizioni simili a queste.

H 2

mie annotazioni con quelle modestia, ch'egli loda in noi (di che gli rendiamo moltissime grazie) nè avesse tante volte con replicate parole accusato mio Zio d'ignoranza, come avesse disperato dell'integrazione d'una certa formula, che facilmente avrebbe potuto integrare, se avesse saputo servirsi de' propri sussidj; nè mi avesse apposto per lo Problema, che proposi a' Geometri d'Italia, ch'io aveva prurito di farmi Autore. Egli avrebbe potuto fare tutte queste cose, senza che niente perdesse della sua riputazione il nostro comune amico Sig. Ermanno, il quale, sono fermamente persuaso, che sia per disapprovare questa contesa; e facendo ciò, non ci avrebbe data occasione alcuna di sospettare, che abbia mossa la contesa a mio Zio per puro fine di contraddire. Imperciocchè che cosa importano a lui quelle cose, che gli amici con lettere familiari si comunicano, o delle quali amichevolmente si avvisano? Certamente s'egli non avesse avuto prurito di farsi Autore delle parole, forse meno diligentemente proferite, come spesso volte accade nelle lettere familiari, mai non avrebbe cercata occasione di contendere. Niega mio Zio aver detto, che la formula del Sig. Ermanno è disperata; il Sig. Conte Riccato afferma. E quale utilità ricaverà il Pubblico da questa contestazione? Spiega mio Zio le sue parole in quel modo, ch'io notai nell'Articolo XIII. del Tomo XX. del Giornale a carte 319. (a), cioè essere il loro senso, che cotali formule atterriscono l'Analista, il quale sospetta esserci sotto maggiore difficoltà, di quella, che veramente v'è, e che però potrebbe sospettare alcuno, che il Sig. Ermanno avesse dedotta la sua integrazione da qualche precedente notizia, che esso ha avuta dalla curva ricercata; queste parole contengono conghiettura, e non una seria affermazione. Non disse mio Zio, la vostra soluzione è fatta a disegno, ma sembra fatta a disegno; le quali sole parole mostrano, che mio Zio non ha assolutamente dichiarata impossibile la formula Ermanniana. Conceduto dunque al Sig. Ermanno, come concedo facilmente, che abbia dedotta la sua integrazione da qualche metodo a priori, solamente ne seguirebbe, che mio Zio non avrebbe bene conghietturato, ma non già, che esso si fosse lasciato ingannare dalla prima apparenza, di modo che credesse, che qualche formula integrabile non si potesse integrare. A torto il Signor Conte Riccato a carte 307. vuole renderci ridicoli, perchè dicemmo, che il disperato non significa impossibile: ognuno che leggerà le mie parole a carte 319. (b) ritroverà essere ciò falsissimo: imperciocchè ivi dissi tutto il contrario con parole chiarissime, e spiegai il disperato per l'impossibile. Le mie parole sono queste: *Non disse essere la cosa disperata, cioè impossibile, poichè la conoscerò fatta, ed ei pare la fece*, ec. Quindi appare quanta gloria abbia riportata il Sig. Conte Riccato, cercando qualche cosa da contraddire, e quanto la sua risposta sia più dottrinale, che contenziosa. Ciò farà poi anche più evidente, se esamineremo, che cosa risponda il Sig. Conte alla seconda obbiezione fatta al Sig. Ermanno. Incolpa d'errore mio Zio, e me; quello, per-

(a) In questo Tomo pag. 30.

(b) Nella presente edizione pag. 30.

perchè opposte al Sig. Ermanno, che abbia trascurato d'aggiungere all'uno, e all'altro membro dell'equazione la quantità costante nella prima integrazione; me, perchè opposti a lui, che aveva seguitate le pedate del Sig. Ermanno, ed aveva parimente tralasciata la quantità costante da aggiungere nel prendere gl'integrali. Comanda, che noi leggiamo quelle cose, che ha scritte a carte 207. (c), e crede d'aver prevenuta l'opposizione in tale maniera, che ammira il nostro ardimento, perchè un'altra volta abbiamo toccato questo punto. Ho lette quelle cose, che sono scritte a carte 207., ma non vi ho ritrovati spaventati, che mi disturbino dal non fare una simile obbiezione al Sig. Conte Riccato. Confesso, che questa obbiezione niente leva alla soluzione del Sig. Ermanno, la quale lo stesso mio Zio lodò come buona, e degna della sua penetrazione; ma ne siegue dalla dimenticanza di quest'aggiunta, che il Sig. Ermanno avanti di aggiungere questa quantità costante, non avrebbe dovuto affermare per cosa certa (come fece nel principio della sua lettera, che è inserita ne commentarj di Parigi dell'anno 1710.) di avere ritrovato, che le sole sezioni del cono soddisfarebbono al Problema, il che solamente gli era stato proposto da ricercare da mio Zio. Imperciocchè quasi aggiunta avrebbe potuto mutare la natura della curva, e se bene in questo caso non muta le sezioni coniche in altre curve di più alto grado, muta però la specie delle sezioni coniche. Per esempio se $b=c$, la curva quistita sarà un'iperbola, e non una parabola, come asserì il Sig. Ermanno, se quell'aggiunta non sarà nulla. Effe Sig. Ermanno, conobbe nella sua risposta a mio Zio scritta a 6. di Dicembre 1710., che quest'aggiunta avrebbe potuto mutare la natura della curva, e che la sua soluzione potrebbe parer a qualcheduno adattata al quistito per consiglio; poichè egli così favella: $\equiv$ Gratum mihi fecisti, quod cogitata tua super analysim meam inversi problematis virium centralium in speciali hypothesi harum virium quadratis distantiarum reciproce proportionalium aperire voluisti: videtur tibi solutio mea ex consilio ad quæstum accomodata, quod quidem non miror, cum tibi solutionis fundamentum nondum expresserim. Sed scias nunc velim me ex suppositione $ax=ry$ didicisse, quod formula mea, ut feci, disponenda, & quod ex iis præcise quantitativis, quas mihi recenseres, integralia sumenda sint. Sed quid pluribus? en tibi totum processum calculi. Aequatio differentialis secundi gradus resolven-

da hæc erat.
$$-\frac{addx\sqrt{xx+yy}}{x} = \frac{ydx - xdy}{xx+yy} \cdot \frac{1}{xx+yy},$$
 quæ factis sub-

stitutionibus ope $ax=ry$, mutatur in
$$-\frac{addx\sqrt{aa+tt}}{t} = \frac{ydt^2}{aa+tt},$$
 & $ydx =$

$$x dy = \frac{y dt}{a} = \text{const. unde } -addx = \frac{y t dt^2}{aa+tt} = a \cdot \frac{y dt}{a} \quad \text{sd}$$

(c) In questo tomo pag. 48.

$$\frac{ydx}{aa+tt\sqrt{aa+tt}}; \text{ unde cum } \frac{ydx}{a} \text{ constans sit, liquet sponte sua abque}$$

$$\text{ulla accomodatione ad quæsitum, æquationem integrabilem esse, eritque}$$

$$-dx = \frac{ydx}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{aa+tt}}.$$

Hic libenter fateor me festinanter nimis quantitatem constantem integrali ipsius — ddx adungere omis- se, idque paulo post observans, quam meas ad te dedissem, metuebam fore ut alix curvæ, quam sectiones conicæ, exirent, sed metus omnis evanuit, ubi calculus prosecutus eram, &c. =

Siccome dunque non si può negare, che mio Zio abbia giustamente opposto al Sig. Ermanno, che la sua soluzione, benchè buona, sia però difettosa in quella parte, e che esso non sia stato certo senza questa aggiunta fatta, che le sole sezioni coniche soddisfanno al quistito; così io ho meritamente accusato il Sig. Conte Riccato, perchè ha trascurato nelle sue prime integrazioni d'aggiungere a ciascun membro la quantità costante. Nè li giova la scusa, colla quale dice di non aver voluto sciorre il Problema, ma solamente mostrare il metodo dell' integrazione. Imperciocchè come può egli esser sicuro dell' esito del suo metodo, se prima non fa quelle cose, che ricerca il calcolo? Non può dubitare alcuno, che per l'aggiunta della quantità costante forse s'impedisce la seconda integrazione? Ma benchè ciò non accada, però avanti di aver fatta l'aggiunta non siamo certi, che la seconda integrazione non venga impedita, perlochè senza paragolismo in questi, e simili casi non si può tralasciar di fare quest'aggiunta.

In quanto all'altra contesa, che mosse il Sig. Conte Riccato dell'eleganza della soluzione Irmanniana, e Bernulliana, e quale di queste due soluzioni debba preferirsi; di ciò a noi non appartiene disputare, poichè da tale disputa la repubblica letteraria non ricaverà alcuna utilità. Ne giudichino i Geometri. Egli è però necessario, che io cancelli l'ignominia, che il Sig. Conte Riccato volle imprimere alla soluzione Bernulliana. Veramente è una cosa ridicola, che esso nieghi l'eleganza a questa soluzione, perchè si serve della comparazione degli archi circolari. Egli vuole, che questo sia un picciolo errore, ma però simile, e anzi maggiore di quello, che commetterebbe quegli, che volesse costruire un problema piano co' luoghi solidi, o un problema lineare colle curve di un grado più alto, le quali curve essendo però che non cessano d'essere algebriche. ne segue, che sia un'errore molto più grande trattare un caso algebrico colle curve meccaniche. Pare, che il Sig. Conte adopersi più appostatamente il sofisma. Gli Antichi incolpavano quelle, che costruiscie il problema piano co' luoghi solidi, o un problema piano colle curve d' un grado più alto; e l'Cartesio condanna quello, che costruiscie colle curve meccaniche un problema costruibile colle curve algebriche; condann-

danna purè il Cartesio quello, che per la soluzione del suo problema dimanda, che queste sorte di curve possano esser descritte. Hi dunque bisogno mio Zio della medesima dimanda per la sua soluzione? No: le quantità trascendenti non entrano nella soluzione del problema, ma solamente nel calcolo; gli archi circolari possono esser comparati, senza che sia bisogno di descrivere qualche curva meccanica. In oltre se per la costruzione del Problema avesse bisogno della descrizione di qualche curva meccanica, non però subito seguirebbe, che una tale soluzione dovesse posporre ad un'altra, che fosse fatta colle curve algebrache. Imperciocchè è noto da poco in quà, che molte curve meccaniche più facilmente si costruiscono, che molte curve algebrache, e che i Geometri celeberrimi del giorno d'oggi anno meritamente ripreso lo stesso Cartesio, perchè escluse dalla Geometria cotali curve meccaniche, e preferiscono la soluzione, la quale si fa più facilmente, e più elegantemente con una curva meccanica facile da costruire, a quella che non si farebbe, se non con fatica con una curva algebrica. S'inganna dunque molto il Signor Conte, quando pensa, che sia sempre meglio schifare nel suo calcolo le quantità trascendenti, che investigare il metodo di comparare fra di loro queste quantità; e anche quando crede, che meriti maggior lode quegli, che tratta qualche quistione d'analisi volgare colle quantità reali, e razionali, che colui, il quale introduce le quantità irrazionali ed immaginarie, benchè di poi mostrasse il metodo di ridurre cotali quantità alle ordinarie. Stupisco, che il Sig. Conte tanto abborrisca questa sorta di quantità, che non voglia ammetterle nel calcolo, se non forzato da una somma necessità. Certamente il buon Analista niente si curerà, che le quantità entranti nel calcolo sieno reali, o immaginarie, razionali, o irrazionali, algebrache, o trascendenti, anzi preferirà le ultime alle prime, se vedrà, che il problema possa sciorirsi più facilmente, più elegantemente, o più brevemente con queste, che con quelle. Potrei ciò dimostrare con molti esempi, ma ne addurrò un solo. La soluzione generale del Problema: data la tangente di qualche arco, ritrovar le tangenti degli archi multipli, e summultipli, la quale diede mio Zio negli Atti di Lipsia l'anno 1714 a carte 274, e nella quale introdusse i logatitmi immaginari, non dee forse preferirsi inquanto all'eleganza a tutte l'altre, che finora abbiamo vedute? Giudichino di questo i periti Geometri. Certamente non dubito, che sieno per essere del mio sentimento, e che lo stesso Sig. Ermanno farà per condannare il Sig. Conte Riccato, perchè abbia incautamente accusato mio Zio d'un error grande in Geometria, per avere adoperato nella sua soluzione la comparazione di due archi circolari. Anzi sono persuaso, che il Sig. Ermanno per questa sola ragione non posporre la soluzione Bernulliana (la quale grandemente lodò nella sua lettera sopracitata con queste parole: *== Geminam tuam ejusdem problematis solvendi methodum magna cum voluptate perlegi, quarum prior perelegans mihi visa est, & Newtoniana multo simplicior; id tamen non efficit, ut alteram, quæ per differentialia secundum da procedat, minus æstimem, cum satis egregium artificium separanda-*

rum

„rum differentialium, easdemque pfecta integrandi contineat, adeo ut
 „tibi me olstrictum etiam, hoc nomine agnoscam, quod eam mecum
 „communicare dignatus es „ alla sua; ma nè anche per l'altra ragione,
 che adduce il Sig. Conte: a carte 327. (d), cioè perchè la sua soluzione
 ha un non so che di singolare, cioè (come spiega esso Sig. Conte a
 carte 324. lin. 2.) perchè verso sopra un caso singolare, per distin-
 guere il quale dagli altri più misteriosi (come dice a carte 207.) (e) ci fu
 bisogno d'una singolare industria, essendo questo caso l'unico, che possa
 maneggiarsi coll'equazioni analiticamente integrabili. Non abbisognò al-
 cuna industria per distinguere dagli altri questo caso, come propostogli
 da mio Zio; anzi questo caso non è l'unico, che possa maneggiarsi con
 equazioni analiticamente integrabili, come notai a carte 323. (f). Ma che
 cosa rispose a queste due cose il Sig. Conte Riccati? Alla prima niente
 ha potuto rispondere. Alla seconda risponde, che noi abbiamo dissimula-
 to il vero senso delle sue parole, e che abbiamo tralasciate, o troncate
 alcune sue asserzioni; il che apparirà poi esser falso. Dappoi francamente,
 e senza ragione ci dilleggia il Sig. Conte dicendo a carte 331. (g), che è
 cosa assai notevole, che scandagliata fino al fondo la nostra Geometria,
 non abbiamo potuto ritrovare altro, che un solo caso oltre il già consi-
 derato, nel quale possiamo procedere con quantità puramente algebriche;
 onde conchiude, che la detta ipotesi rimane privilegiata, benchè forse
 (se fosse vero ciò, che abbiám detto) cesserebbe d'esser singolare. Io
 veramente non aspettava dalla modestia del Sig. Conte Riccati una tale
 obbiezione: altramente avrei portati molti casi dove può farsi la medesi-
 ma cosa. Nel resto chi gli ha detto, che per ritrovare il caso predetto,
 nel quale le forze si suppongono proporzionali alle distanze, e che per
 ritrovare questo caso unico, abbiamo consumata tutta la nostra Geome-
 tria? Addotto un caso, non si escludono gli altri. Per dimostrare, che
 l'ipotesi delle forze reciprocamente proporzionali a' quadrati delle distanze
 non sia la sola, nella quale si può procedere con una integrazione analiti-
 ca senza quantità trascendenti, non bastava forse ancora aver portato un
 caso, nel quale possa farsi il medesimo, e anzi quel tal caso, che ci offerì
 il Sig. Conte, e che egli ebbe per disperato? Indarno risponde, che e' non
 ebbe per tale questo caso, ma che facilmente avrebbe potuto estendere la
 formula Ermanniana ad altri casi più composti, se avesse giudicato ciò
 opportuno. Perchè dunque tentò questo caso, se non giudicò opportuno
 il perfezionarlo? Le sue parole sono sì chiare, che non può dolerli, che
 noi abbiamo loro affisso un falso senso. A carte 207. (h) favellando
 del caso del Sig. Ermanno adopera queste parole: *Ha però la buona sorte*
d'ef-

(d) In questo Tomo pag. 49.

(e) Qui il Sig. Bernulli cita un luogo della prima risposta del C. S., che in
 quella edizione si legge a carte 28.

(f) Nella presente edizione pag. 32. 34.

(g) In questo Tomo Pag. 51.

(h) Citasi un passo della prima risposta, che si legge in questo Tomo alla pag. 28.

d'esser l'unico, che possa maneggiarsi con equazioni analiticamente integrabili. E a carte 260. (i) parlando del caso presente: io posso dire con verità, che forse non si troverà strada per conseguire l'intento, senza che c'entrino, fatte le separazioni, quantità trascendenti. Queste parole, per talasciarne altre simili, con sufficiente chiarezza dimostrano, che egli ha ereditato esserci il solo caso del Sig. Ermanno, il quale possa maneggiarsi con una equazione puramente analitica. Forse vuol dire, che il senso delle sue parole sia questo; cioè che certamente anche in altri casi la formula Ermanniana si può analiticamente integrare, ma non già senza una previa riduzione, o preparazione; che nel solo caso sciolto dal Sig. Ermanno questa formula conservata nella sua purità, nè mutata con alcune preparazioni, o riduzioni è analiticamente integrabile, e che in tutti gli altri casi si richiede un nuovo artificio generalmente incognito; imperciocchè così intendo quelle cose, che sono scritte a carte 333. (k). Ma il Sig. Conte Riccato non riceve alcun suffragio da questo suo rifiuto. Per integrare l'equazione Ermanniana $\frac{ddx \sqrt{xx+yy}}{x} = \frac{1}{xx+yy}$, ovvero (a

cagione di $ydx - xdy =$ ad una quantità costante) $= \frac{ydx - xdy}{xx+yy}^2$ non si

serve forse il Signor Conte Riccato di varie sostituzioni, e moltiplicazioni? Non mutò forse anche il Sig. Ermanno la sua equazione differenziale-differenziale colle sostituzioni, e moltiplicando l'uno, e l'altro membro per $\frac{x}{\sqrt{xx+yy}}$, e dividendo per xx ciascun membro dell'equazione

risultante da questa differenziale-differenziale? Abbiamo avuto bisogno di maggior artificio per risolvere il caso delle forze direttamente proporzionali alle distanze, cioè per integrare l'equazione $\frac{ddx \sqrt{xx+yy}}{x} = \sqrt{xx+yy}$, ovvero $\frac{ddx}{x} = 1$? forse la moltiplicazione per $x dx$ conser-

va meno nella sua purità l'equazione, che la moltiplicazione per $\frac{x}{\sqrt{xx+yy}}$? E' forse questa riduzione così insolita, ed incognita? E non

cade subito sotto gli occhi d'ognuno, che nell'equazione $\frac{ddx}{x} = 1$.

Opere Ricc. Tom. III.

I

(tra-

(i) Luogo della prima risposta in questo Tomo pag. 25.

(k) Nella presente edizione pag. 51.

(traslascio qui la quantità costante $\frac{ydx - xdy}{a^2b}$, perchè non v'ha bisogno

di conservare l'omogeneità, prima di aver fatta l'integrazione) l'altro membro non si può integrare, se non si moltiplica per qualche differenziale, e che non possa moltiplicarsi per altra quantità differenziale, che per $x dx$, acciocchè l'uno, e l'altro membro divenga integrabile. Ma egli è chiaro, che il Signor Conte Riccati non ha inteso queste sorte di riduzioni, il che farebbe cosa ridicola, poichè la maggior parte dell'integrazioni non si fa se non per cotali moltiplicazioni, e divisioni; ma si ricava dalle carte 206. e 207. (l), che il Sig. Conte ha inteso quelle faticose riduzioni, delle quali v'ha bisogno per levare la maschera delle espressioni trascendenti alle curve algebriche, e che il suo sentimento fu, che in tutte l'altre ipotesi, oltre quella che pone le forze in ragione reciproca duplicata delle distanze, le curve algebriche appaiono sotto tale maschera, e perciò abbiano bisogno d'una tale faticosa riduzione. Essendosi dunque dimostrato, che la curva dell'ipotesi $f = z$ non comparisce sotto una tale maschera, ed il medesimo si potrebbe dimostrare di molte altre ipotesi, se fosse necessario; ne siegue, che il Sig. Conte abbia malamente attribuito questo privilegio alla sola ipotesi predetta $f = z$. Questi sono stati i capi principali della nostra disputa. Ci sarebbero ancora molte cose da avvisare, le quali trapassò sotto silenzio, per non dar occasione al Sig. Conte di prolungar la contesa, e di scordarsi della sua promessa di non voler più rispondere; però prima di finire questa mia risposta, che parimente prometto esser l'ultima, toccherò solamente alcune espressioni, colle quali esso Sig. Conte volle pungere mio Zio, e me. A carte 322. (m) dice, ch'io non ho negato esserci verun metodo certo di determinare le quantità, che debbono esser assunte per costanti, acciocchè nella seconda formula di mio Zio $2f x' dy' = dy^2 + dx^2 dy - x dy ddx + x dx ddy$ svaniscano le due membra della seconda parte; ma che io ho solamente ritorto il detto, e che però l'ho ammesso tacitamente. Rispondo, che noi abbiamo un metodo fermo per far ciò in questo caso, ed in altri simili, dove è stato differenziato fino a secondi differenziali, e dove nella seconda differenziazione non è stata presa alcuna differenziale per costante, e che non ci sia bisogno (come c'parla a carte 323.) (n) di mendicare quella quantità, che dee averci per costante. Ma egli non è necessario, ch'io esponga questo metodo; basta che abbia potuto giustamente ritorcere il detto del Sig. Conte Riccati; essendo vero, che egli non dà alcuna regola certa, e fissa, qual sostituzione debba farsi convenientemente, acciocchè nell'equazioni egualmente difficili si separino d'insieme le indeterminate. Nè può fug-

gi-

(l) Passi della prima Risposta in questo Tomo pag.28.

(m) Nella presente edizione pag.42.

(n) Nella presente edizione pag.48.

gire questo ritorcimento con questa protesta, che non promette d'integrare tutto quello, che è integrabile, ed estendere il suo metodo a tutte l'equazioni possibili, e che basti, che l'abbia esteso a qualche caso, che è stato considerato come disperato. La prima cosa mai non gli è stata dimandata da alcuno, e la seconda non basta per rimuovere il ritorcimento, e perchè egli è falso, che quel caso sia stato considerato per disperato, e perchè nel medesimo modo avrei potuto rispondere, che basta che mio Zio abbia applicato al caso presente il suo artificio d'integrare questa sorta d'equazioni differenzio-differenziali. Dice in vero a carte 323., (o), che la preparazione, della quale si serve, gli somministra precisamente quella quantità, che dee sostituirsi in luogo dell'altra; ma questa asserzione è troppo precaria, tali preparazioni succedono in pochissimi casi, e quando succedono, non somministrano altre sostituzioni, che quelle, le quali sono state già molto tempo conosciute, e primieramente adoperate da' miei Zii Jacopo, e Giovanni. Facilmente qui mi crederà quegli, che avrà lette quelle cose, che negli *Arti di Lipsia*, ed altrove da per tutto sono state fin qui pubblicate sopra il calcolo differenziale, ed integrale, e ritroverà a chi debbanfi tali sostituzioni, ed altri artifizj di questo calcolo. In vero se due uomini sublimi, il Sig. Marchese de l'Hospital, e il Sig. Leibnizio, si sono degnati di conoscere, che questo calcolo dee grandissima parte della sua propagazione all'industria de' Bernulli, non mi riprenderà il Sig. Conte Riccato, nè mi accuserà di parzialità, perchè ho detto, che esso se non immediatamente, almeno mediatamente è obbligato a' Bernulli; e lascio giudicare a' lettori, che cosa debba dirsi di quella franca asserzione, con la quale contende il Sig. Conte Riccato a carte 322. (p) che le sublimi fatiche de' Bernulli non vagliano tanto, che possano aver luogo nel presente caso. A carte 323. (q) accusa la mia soluzione di petizione di principio: non capisco, che cosa si voglia qui il Sig. Conte Riccato. Quegli si dice commettere petizione di principio, che senza dimostrazione, assume ciò, che è in questione. Ho io forse fatto questo? Ho io assunto senza dimostrazione, che le sole sezioni del cono soddisfanno al quisto, come fece il Sig. Ermanno? Forse dirà il Sig. Conte, che io ho ben sì dimostrato, che quest'equazione $22 = \frac{arc\ x}{bb - bx + ax}$ conviene alle sezio-

ni coniche, ma non alle sole sezioni del cono? Ma non vede il Sig. Conte, che questa mia equazione $22 = \frac{arc\ x}{bb - bx + ax}$ in qualsivoglia caso

determinato, cioè posto per le lettere a, b, c , qualche valore determinato, dee convenire ad una sola curva, poichè egli è impossibile, che il

I 2

Pia-

(o) In questo Tomo pag. 48.

(p) In questa edizione pag. 48.

(q) In questa edizione pag. 51.

ciprocamente proporzionali a' cubi delle distanze; e siccome in questa ipotesi mio Zio ha scoperte le curve da niuno avanti nominate, come la Spirale Iperbolica (la quale non capisco, perchè il Signor Conte Riccato a carte 336. (r). abbia detto, che è stata la prima volta scoperta con metodo diretto dal Sig. Varignon, poichè nè il Signor Varignon, nè alcun altro aveva avanti mio Zio fatta menzione di questa curva) ed altre sì algebriche, come meccaniche; così colla medesima facilità per l'ipotesi delle forze reciprocamente proporzionali a' quadrati delle distanze egli avrebbe potuto scoprire le sezioni coniche, benchè queste curve prima non fossero state nominate da altri.

A carte 334. (u) dice il Sig. Conte Riccato, che la difficoltà di questo Problema inverso generalmente considerato non consiste, come noi crediamo, nella comparazione di due archi circolari, ma nella riduzione della differenziale proposta alla differenziale dell'arco circolare. Non capisco, perchè egli c'incolpi, che noi abbiamo in ciò creduto diversamente da lui, essendo certo, che noi abbiamo detto la medesima cosa, che egli a carte 342. (x). cioè la cosa difficilissima, che s'incontra in questo Problema, è la riduzione della differenziale proposta alla differenziale dell'arco, o dell'angolo; il che dipoi esso Sig. Conte contraddicendo a se medesimo confessa, quando dice, che la cosa è per se stessa, almeno presa universalmente, sì ardua, che da noi è giudicata impossibile. Le mie parole registrate a carte 342. del Tomo ventesimo sono queste: *Ma determinare sempre se qualche quantità differenziale possa essere ridotta al differenziale dell'arco, o dell'angolo, è una difficoltà scabrosissima, ec.* Anzi ci dà una puntura, riprendendoci, perchè abbiamo giudicata quella cosa troppo difficile, e più da desiderare, che da sperare. Ma che che sia della formula, che dice di aver pubblicata il Sig. Ermanno nel Tomo VII. del Giornale a carte 227., e che noi non abbiamo veduta, desidererei di vedere la dimostrazione di quella formula; imperciocchè ripetendo un'altra volta questa cosa, sono persuaso, che non possa darsi alcuna formula generale, che comprenda tutte le curve algebriche, le quali soddisfanno a qualsivoglia ipotesi data delle forze centrali, se prima non si mostra insieme il metodo di ridurre in qualsivoglia caso le membra della nostra equazione alla differenziale dell'arco circolare, o, che è la medesima cosa, d'integrare quasi tutto ciò, che è integrabile, il che principalmente è quello, che al dì d'oggi desideriamo per la perfezione del calcolo integrale. Non credo necessario rispondere molte cose all'ultima riprensione, che mi fece nel fine della sua scrittura. Il giusto lettore giudicherà qual conto debba farsi di quella riprensione, ed a chi debbasi attribuire il prurito di farsi Autore, se a quello, il quale per promuovere la scienza propone qualche problema, o lo risolve proposto, o più tosto a quello, che non mai provocato attacca un altro con una pub-

(r) Nella edizione presente pag. 52.

(u) In questo Tomo pag. 52.

(x) In questo Tomo pag. 38.

pubblica scrittura? Che vi sieno in Italia molti infegni Geometri, i quali lodevolmente tono vertati in quelli tublumi calcoli, io non mai l'ho ignorato, ed a questo fine proposi a loro il Problema, acciocchè comunicati con noi i metodi, ci nascesse qualche occasione d'imparare da essi. Avvisarono gli Autori di questo Giornale all'Articolo X. del Tomo ventefimoprimo, che da molte parti d'Italia erano state mandate molte soluzioni di questo Problema, le quali tutte convengono nell'assegnare per la curva ricercata delle forze una Parabola cubica del primo grado. Non v'ha dubbio, che questa Parabola soddisfi al quesito; ma poichè so, che il Signor Ermanno (al quale proposi mio Zio due anni avanti questo Problema, e che dimostrò, che quando la curva de'tempi è del genere delle Parabele, anche la curva delle forze dee essere del genere delle Parabele) nominò questa curva a molti suoi amici Italiani, prima che uscisse il Tomo ventefimo del Giornale, dai quali poi potete arrivare a molti questa notizia; preghiamo quelli, i quali da se medesimi anno ritrovata la soluzione di questo Problema, che si degnino di pubblicare la loro Analisi, o almeno di dimostrare, se la Parabola cubica sia la sola curva, che risponda al quesito, o no. S'ingannano questi Geometri, quando dicono, che questo Problema non contiene alcuna difficoltà. Conobbe esso Sig. Ermanno, che il Problema era difficilissimo; e faremo molto obbligarli a quello, che ci darà la dimostrazione analitica dedotta *a priori* senza petizione di principio.

P. S.

Terminata questa risposta, arrivò a noi comodamente la lettera del Sig. Ermanno spedita da Francfort il dì undecimo dell'Ottobre passato, il cui contenuto aggiungerò qui, acciocchè sappia il Sig. Conte Riccati, che è stata molto spiacevole al Sig. Ermanno la contesa, che egli mosse a mio Zio. Così scrive il lodato Sig. Ermanno a mio Zio. „ Quod Comae Riccatus schediasma in publicum miserit Diario Veneto inferum, quo solutionem meam particularem inversi problematis virium centralium adversus structuras tuas iueretur, diu post demum rescivi quam prodidisset, id quod molestum mihi accidit; alioqui si de proposito ejus mihi quicquam constitisset, litteras ad ipsum dedissem rogatus, ut ab eo abstineret. Nam si solutionem meam apologia indigere credidisset, talem egomet ipse conscribere potuissem; sed quia quae monuisti, potius ad elegantiam spectant, quam quod methodum feriant, minime necessum duxi specimen illud meum, licet publice reprehensum, publico scripto defendere. „ Soggiunge poi il Sig. Ermanno in quella medesima lettera, che v'ha una sola cosa nelle mie annotazioni inserite nel Tomo ventefimo del Giornale, alla quale e' dee rispondere. Dice dunque, che il Sig. Conte Riccati non ha certamente dette di lui cose vane, e troppo magnifiche, quando ha promesso, che una volta darà il Sig. Ermanno la soluzione generale del Problema inverso delle forze centripete per le curve algebriche; e dice di aver fat-

« questa cosa nel suo libro a carte 398. §. XIII., ed a carte 399. dove ha data una doppia soluzione del Problema già tempo da lui proposto nel Tomo sesto del giornale di Venezia. *Exhibere generalem formulam virium centralium pro omnibus curvis algebraicis in infinitum, & generalem aequationem pro curvis, quibus formula virium centralium conveniant;* e per conseguenza e' dice, che io ho malamente creduto, che questo Problema sormonti i limiti della possibilità. Poichè dunque poco fa ci è stata portata questa sublime opera del Sig. Ermanno de Viribus, & Motibus Corporum, della cui recente edizione mi rallegro e col Pubblico, e con l'Autore medesimo, non ho trascurato di leggere subito il luogo sopracitato; ma fuori della mia speranza ho ritrovato, che il Problema, di cui ivi esibisce l'Autore la soluzione generale per le curve algebriche, è più tosto diretto, che inverso. Io però non nego, che sia per essere di grande uso la formula delle forze centrali, che egli ha data; imperocchè da quella formula possono dedursi innumerabili scale delle forze centrali, alle quali tutte soddisfacciano le curve algebriche. Ma ritrovare per qualsivoglia data scala delle forze centrali tutte le curve algebriche soddisfacenti, egli è un problema assai più difficile, anzi tale, la cui soluzione spero, che sia per giudicar meco impossibile anche lo stesso Sig. Ermanno, considerata la cosa più attentamente.

SCHEDIASMA V. (*)

De' Polinomj.

COL nome di Polinomj differenziali appello le frazioni, che anno per numeratore la flussione dx , e per denominatore un aggregato di potestà, gli esponenti delle quali costituiscano una progressione aritmetica, che va a terminarsi nel nulla. E mentre questa condizione non si adempia, bisognerà supplire qualche termine affetto dal coefficiente $= 0$.

Ab-

(*) Da una lettera de' 17. Novembre 1725. dal Dottissimo Sig. Abbate Giuseppe Suzzì scritta all'Autore si ricava, ch'egli in quel tempo lavorava intorno al presente metodo. Si legge poi in una lettera de' 19. Luglio 1729. del rinomato Padre D. Ramiro Ramoinelli diretta al Conte Iacopo, che gli rimandava inchiuso il Problema dei Polinomj. Questo Schediasma adunque è stato composto fra il 1725, ed il 1729. La celebratissima Signora Contessa D. Maria Agnesi a istanza dell'Autore lo inserì nelle sue Istituzioni Analitiche pubblicate in Milano l'anno 1748. Tomo II., pag. 691., e ne fanno particolare menzione li Signori Dortous de Mairan, e de Montigny nell'onorifico estratto della lodata Opera scritto per ordine della Real Accademia di Parigi, e segnato sotto li dì 6. Dicembre 1749.

$$\frac{x^{2m} + ax^m + b^p}{x^{2m} + ax^m + b^p} = \frac{zx + 2A + a \times z + AA + aA + b^p}{x^{2m} + ax^m + b^p}.$$

Dee farsi in maniera, che spariscano le quantità $AA + aA + b$, prendendole $= 0$, e ne' casi, in cui A non è quantità immaginaria, succede ottimamente la riduzione. E giacchè $x^m = z + A$, e prese le dif-

$$\text{ferenze, } m z^{m-1} dz = dx, \text{ ed } x = z + A^{\frac{1}{m}}, \text{ dunque } \frac{dx}{m x^{m-1}} = \frac{dz}{m \times z + A^{\frac{m-1}{m}}}.$$

In passando alle necessarie sostituzioni, onde nella nostra formula principale in cambio di x , e delle sue funzioni resti surrogata la variabile assunta z colle sue funzioni, troveremo

$$\frac{dx}{x^{2m} + ax^m + b^p} = \frac{dz}{m \times z + A^{\frac{m-1}{m}} \times z z + 2A + a \times z}, \text{ e liberando la quantità } z, \text{ che moltiplica il binomio } z + 2A + a \text{ sotto il segno, farà}$$

$$\frac{dx}{x^{2m} + ax^m + b^p} = \frac{z^{m-1} dz}{m \times z + A^{\frac{m-1}{m}} \times z z + 2A + a}.$$

Il caso più semplice vuole l'esponente p eguale all'unità, essendo l'altro m qualsivoglia numero intero, o rotto, affermativo, o negativo; e fatto per brevità $2A + a = g$, l'espressione generale passa nella particolare

$$g \times \frac{z^{m-1} dz}{z + A^{\frac{m-1}{m}}} + z \times \frac{z^{m-1} dz}{z + A^{\frac{m-1}{m}}} = m dy.$$

Istituisco una prima divisione, partendo cioè il numeratore della frazione per lo suo denominatore, ed il primo quoziente sarà $\frac{z^{-1} dz}{g \times z + A}$, e fatta la moltiplicazione, e la sottrazione, conforme la

$$\frac{z^{-1} dz}{g \times z + A}$$

pratica ordinaria, il residuo sarà $-\frac{dz}{g}$ essere partito per lo denominatore, e perciò

$$\frac{z^{-1} dz}{g \times z + A} = \frac{z^{-1} dz}{g \times z + A} - \frac{-dz}{g \times z + A}$$

Il primo termine del secondo membro è già ridotto alle quadrature note, e l'altro termine facilmente vi si riduce, ponendo $z + A = u$, e fatte le debite sostituzioni, avremo

$$\frac{-dz}{g \times z + A} = \frac{u^{-m+1} du}{g \times u + gA}$$

Seguitando la nostra ricerca, sia l'esponente p eguale a qualsivoglia numero positivo, ed intero: per ottenere l'intento basterà prolungare alquanto l'operazione. Ripigliata per mano la formula generale

$$\frac{yx}{x^m + ax + b} = \frac{z^{-1} dz}{m \times z + A} \times \frac{z^{-1} dz}{z + g}$$

e posto per esempio $p =$ al binario, si ridurrà alla seguente

$$\frac{z^{-1} dz}{g \times z + A} + \frac{z^{-1} dz}{g \times z + A} + \frac{z^{-1} dz}{g \times z + A} = m dy$$

Di.

Divido come sopra il numeratore di questa frazione per lo suo de- ⁷⁵
nominatore, ed il primo quoziente sarà $\frac{z^{-m} dz}{g^g \times z + A^{\frac{m-1}{g}}}$, e dopo le neces-

sarie operazioni avremo il residuo $-\frac{2z^{-1} dz}{g} - \frac{dz}{g^g}$ da essere nuovamente

per l'intero denominatore diviso. Istituisco una seconda divisione nella
frazione

$$\frac{-2z^{-1} dz}{g^g \times z + A^{\frac{m-1}{g}} + 2g^g z \times z + A^{\frac{m-1}{g}} + g^g z \times z + A^{\frac{m-1}{g}}}$$

e dopo le debite operazioni si avrà il residuo $\frac{4dz}{g} + \frac{2zdz}{g^g}$ da partirsi

per l'intero denominatore. Nascerà pertanto la seguente equazione

$$\frac{z^{-m} dz}{z + A^{\frac{m-1}{g}} \times z + g^g} = \frac{z^{-m} dz}{g^g \times z + A^{\frac{m-1}{g}}} - \frac{2z^{-1} dz}{g^g \times z + A^{\frac{m-1}{g}}} +$$

$$\frac{4z^{-1} \times dz}{g^g \times z + A^{\frac{m-1}{g}} \times z + g^g} + \frac{2zdz}{g^g \times z + A^{\frac{m-1}{g}} \times z + g^g}$$

I primi due termini nell'omogeno di comparazione sono due bi-
nomj, e gli altri due possono facilmente ridursi alla forma del binomio,
facendo $z + A^{\frac{m-1}{g}}$, ovvero $z + g^g = n$. Ne' casi più composti, in cui si
mette $p = 3, 4, 5$ cc., cresce il tedio del calcolo, ma il metodo non
ci abbandona.

Esso metodo si estende a tutti i polinomj in infinito, mentre p sia
numero intero, e positivo, perchè se fosse negativo, ed intero, la cosa
riesce talmente facile, che non occorre favellarne. Per applicare il me-
todo, altro non si richiede, che replicare la sostituzione $x = z + A$,
 $z = u + B$, facendo sempre svanire que' termini, ne' quali le sole quan-
tità costanti si ritrovano; laonde per cagion d'esempio si riduca il qua-
drinomio al trinomio, e questo al binomio. In oltre è d'uopo di valersi
di tempo in tempo d'una dimezzata divisione, perchè non abbiano a
turbarci gli esponenti negativi, che bene spesso ci si presentano nel nu-

meratore della frazione. Fra tanto il modo di operare si mostra più speditamente cogli esempj, che coi precetti.

Sia il quadrimio $\frac{dx}{x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + c} = dy$. Le costanti

$$\begin{aligned} a, b \text{ possono essere } = 0. \text{ Pongo } x^m = x + A, \text{ ed avrassi} \\ x^m + ax^{m-1} + bx^{m-2} + c = x^3 + 3Ax^2 + 3AAx + A^3 \\ + ax^2 + 2aAx + aAA \\ + bx + Ab + c. \end{aligned}$$

Faccio $A^3 + aAA + Ab + c = 0$, e così determino il valore della costante assunta A . Quindi ripetute le operazioni come nel trinomio, trovo

$$\frac{x^{-1} dx}{x + A} = \frac{1}{x + A} \times \frac{x^{-1} dx}{x^2 + gx + b}.$$

Le specie g, b sono costanti surrogate in luogo d'altre più composte, e stante che p è un numero positivo, ed intero, alzo il trinomio $x^2 + gx + b$ alla potestà p .

Dopo ciò intraprendo tante divisioni, quante sieno bastanti per fare, che laddove nel numeratore ci sia l'esponente negativo, nel denomina-

tore non si rinvenga altra quantità, che il binomio $x + A$, e metto da parte sì fatte frazioni, che trascurati i coefficienti, saranno analoghe alla seguente $\frac{x^{-1} dx}{x + A}$, posto n qualsivoglia numero positivo ed intero. Gli altri termini sono rappresentati dalla formola generale

$$\frac{x^n dx}{x + A} = \frac{1}{x + A} \times \frac{x^n dx}{x^2 + gx + b}.$$

Ripeto dunque l'operazione, facendo $x = n + B$, indi fatto sparire l'ultimo termine, conforme il solito, e surrogati in cambio di x , e delle sue funzioni i valori esposti per la nuova indeterminata n , arriveremo

alla

Abbiasi per esempio il trinomio $\frac{dx}{x+2\sqrt{x+2}}^P$. Faccio $x^{\frac{1}{2}} = z + A$,

dunque $x + 2\sqrt{x+2} = z^2 + 2Az + 2z + AA + 2A + 2$. Mettendo $AA + 2A = 0$, trovo $A = \sqrt{-1} = -1$; ed ecco in campo una grandezza mista di reale, ed immaginario, e procedendo a norma del metodo, avremo

$$\frac{z^{-1} dz}{z + A} \times \frac{1}{z^2 + 2A + 2}^P = \frac{z^{-1} dz}{z + 2\sqrt{-1}}^P +$$

$+\frac{A z^{-1} dz}{z + 2\sqrt{-1}}^P$. Perchè si tolgano di mezzo le immaginarie, mutiamo ma-

niera, e nella grandezza $z^2 + 2A + 2 \times z + AA + 2A + 2$ facciamo, che si dilegui il termine di mezzo $2Az + 2z$, ponendolo $= 0$, onde sia $A = -1$, e di più $AA + 2A + 2 = 1$, e la formula farà, come segue

$$\frac{dz}{z-1} \times \frac{1}{z^2+1}^P = \frac{z dz}{z^2+1}^P = \frac{dz}{z^2+1}^P, \text{ e ne due binomj dell'}$$

omogeneo di comparazione, che sono equivalenti agli'altri due già considerati, non s'incontra difficoltà.

SCHE-

SCHEDIASMA VI.

De recta ratione analytice exprimendi lineolam interceptam inter tangentem, e curvam.

CLARISSIMO VIRO JOSEPHO SUZZIO

S. D.

JACOBUS RICCATUS.

GRatulor mihi, Eruditissime Suzzi, sententiam illam meam, quam a liis curis distractus, & ex tempore in medium protuli, veluti semen fecundo solo commissum in largam, atque uberem segetem excrevisse. Gratulor tibi, quod rem difficultatibus implicitam ita perfeceris, ut quid addam, quid demam, quid emendem prorsus non inveniam. Ne tamen vel tibi, vel mihi deesse videar, unicam observationem ad computum differentio-differentialem facientem tuo examini submittere decrevi.

Magnus Nevvtonus in prima editione Principiorum Mathematicorum Philosophiæ naturalis lib. 2. prop. 10. hoc arduum problema sibi proposuit. Tendat uniformis vis gravitatis directè ad planum Horizontis, sitque resistentia ut medii densitas, & quadratum velocitatis conjunctim, requiratur tum medii densitas in locis singulis, quæ faciat ut corpus in data quavis curva moveatur, tum corporis velocitas in iisdem locis. Dum quæstioni perplexa, & difficili aggressionem satisfacere conatur, se hominem esse ostendit, & canonem generalem variis curvis, & præsertim semicirculo (Fig. 18.) applicando, a proposito excidit; putavit enim resistentiam ad gravitatem in dato circumferentiæ punto G se habere ut abscissa OB ad semidiametrum OK. Sed cum priores curvæ a posterioribus perficiantur, in secunda aurei Operis editione inadvertentiam sustulit, veramque proportionem, ut tripla abscissa ad circuli diametrum substituit.

Antequam correctio Nevvtoniana prodiret, eandem spartam in Actis Lipsiensibus pro Anno 1713. ornandam suscepit Clarissimus Vir Johannes Bernoullius, at Illustris Angli errore notato, dum in ejus originem sollicitè inquirere, sequentia protulit. „Error iste, qui tanto Viro excidit, non quidem in ipsa ejus solutione latet, quam justam esse, & ab omni paralogismi vitio immunem, quanquam non parum detortam, & intellectu difficilem, sed quærendus ille est in ipso applicandi modo, qui eo
la.

Questa lettera è stata pubblicata dal Sig. Abb. Suzzi nella sua opera Disquisitiones Mathematica stampata in Venezia appresso Domenico Lovisa l'anno 1715.

laborat, quod in serie, quæ exprimit DG terminum quemlibet sumas pro aliqua indeterminatæ DG differentiali, seu ut ipse vocat fluxione tanti gradus, quantæ dimensionis existit littera o in ipso termino, quod in primo, & secundo verum esse potest, in reliquis verò minimè: „ Verum Nevvtonus emendationem aliter instituit; totam enim propositionem principalem reformat, nova formulâ subrogata, sed eandem applicationem, posthabita Bernoulliana animadversione, costanter retinet.

Quæstio non est, Eruditissime Suzzi, utrum termini, qui ex repetita differentiatione quantitatum indeterminatarum oriuntur, ab his diversi sint, quos series Nevvtonianæ subministrant. Sed ex calculo manifestum est, & optime ostenditur a Bernoullio. Difficultas porius in hoc sita est, utrum lineola FG inter tangentem, & curvam, cujus valorem loco citato Nevvtonus investigandum sibi proposuit, exponi debeat, ut ipse vult, per tertium suæ seriei terminum, an per secundam differentiam ordinatæ BC juxta Bernoullii sententiam. Hunc longissimè a veritate aberrare pro certo habeo, quamquam vix affirmare audeo tantum Virum in errorem incidisse. Ut autem saltem tibi fidem faciam, hæc accipe.

Ne a circulo, quem præ manibus habemus, discedamus: porius CK = a, OB = x, BD = dx, BC vel DI = y, ordinata DG ipsi BC indefinite proxima a sequenti serie more Nevvtoniano exprimitur DG =

$$-\frac{xdx}{y} - \frac{aadx}{2y^2} - \frac{a^2xdx^2}{2y^3} \text{ \& cæ.}$$

in qua primus terminus exponit totam DI, secundus ejus portionem IF, tertius cum infinitis sequentibus interceptum FG. Summa autem omnium terminorum post tertium ad tertium terminum relata proportionem habet minorem quacunque data; igitur lineola FG per solum tertium terminum secundum Nevvtonum exponitur.

Modo ex æquatione locali circuli aa - xx = yy sumpta prima differentia, habebimus - xdx = ydy, vel - xdx : y = dy, & rursus differentiansdo, accepta dx pro constante, $-\frac{dx}{y} + \frac{xdxdy}{yy}$ = ddy : & loco dy ejus valo-

rem - xdx : y subrogando, $-\frac{dx}{y} - \frac{xxdx}{y^2}$ = ddy, hoc est -

$$\frac{y y dx - x x dx}{y^2} = ddy; \text{ sed } yy + xx = aa; \text{ ergo } -aadx : y^2 = ddy. \text{ Secun-}$$

da igitur differentia applicatæ BC, seu - aadx : y² ad tertium terminum - aadx : y² seriei Nevvtonianæ proportionem habet duplam, & cum jam a te demonstratum sit interceptam FG dimidium esse secundæ differentiæ ddy, vel - aadx : y², patet hanc lineolam optime exprimi a Nevvtono

no per tertium terminum suæ seriei, & malè à Bernoullio per secundam differentiam ordinatæ BC.

Ut veritas clarius elucescat, tangens CF prorogetur usque quò concurrat cum axe producto in puncto R, & intercepta FG, quæ ad secundum fluxionum ordinem spectat, vocetur ddx . Cum sit OB: BC:: BC: BR, erit subtangens BR = $y:x$: est autem RB: BC:: CI: IF, hoc est $\frac{y}{x}$:

$y :: dx: \frac{xdx}{y}$ = IF; ergo invento valore ordinatæ GD, qui habetur sub-

trahendo quadratum OD, hoc est $x + ddx^2$ quadrato radii, erit DI - DG - FI = FG, scilicet in terminis analyticis $y - xdx - \sqrt{y^2 - 2yxdx - ddx^2}$

= ddx , vel $y - xdx - ddx = \sqrt{y^2 - 2yxdx - ddx^2}$, & quadrando, $y^2 - 2yxdx +$

$\frac{xxdx}{y} - 2yddx + \frac{2xdxdx}{y} + ddx^2 = y^2 - 2yxdx - ddx^2$, & deletis de-

lendis, & reducta æquatione, $\frac{xxdx}{y} + ddx = 2yddx + \frac{2xdxdx}{y} - ddx^2$

vel $\frac{xxdx + yddx}{2y^2} = \frac{adddx}{2y^2} = ddx + \frac{xdxdx}{y} - \frac{dddx}{2y}$. Porro in homo-

geneo comparationis sublatis termino secundo, & tertio, qui respectu primi evanescent; secundus enim ad tertium, & tertius ad quartam classem differentialium pertinet, remanet intercepta FG, seu $ddx = \frac{adddx}{2y^2}$,

prout Nevvtonus ope suæ progressionis invenerat.

Sicut igitur Illustris Anglus per tertium terminum suæ seriei cum omnibus subsequenteribus, qui tertio infinite minores sunt, designat interceptam FG, quæ determinat angulum contactus FCG a tangente, & chorda contentum, seu curvaturam, quam curva obtinet in puncto C, ita per quartum terminum exponit variationem curvaturæ, per quintum variationem variationis, & sic deinceps.

Neque putandum cum eximio Geometra Nicolao Bernoullio (Vide Com. Ac. Regiæ Parif. pro anno 1711.) olim Professore Putavino, ex his, quæ tradidit Nevvtonus tractatu de Quadratura curvarum perinde esse juxta celeberrimi Angli sententiam sumere differentias more consueto, ac illas ex seriebus eruere, ita ut terminus quilibet in progressionem haberi

Opere Ricc. Tgm.III.

L

de-

debeat pro differentia tot gradus, quot unitates continentur in exponente quantitatis dx .

Tam crassus error acutissimo Analystæ nimis liberaliter affingitur. Optimè Nevvtonus fluxiones ab incrementis distinguit. Fluxiones vocat, quas Leibnitiani differentias appellant, & Prop. prima ita inveniendas docet, ut ejus methodus a vulgari non differat, præter quam in signis arbitrariis. Incrementa, vel differentiæ apud ipsum sunt quantitates minimæ, puta FG, quæ licet plerumque fluxionibus æquales non sint, sunt tamen semper ipsis proportionales, atque has per serierum terminos investigat. Sed ipsum audiamus in ultimo Scholio citati libelli de Quadratura.

„Quantitatum fluentium fluxiones esse primas, secundas, tertias, quartas, aliasque diximus supra. Hæ fluxiones sunt ut termini serierum

infinitarum convergentium. Ut si z^n sit quantitas fluens, & fluendo evadat

$$z + \frac{z^n}{n}, \text{ deinde resolvatur in seriem convergentem } z^n + n z^{n-1}$$

$$+ \frac{n(n-1)}{2} z^{n-2} + \frac{n^3 - 3nn + 2n}{6} z^{n-3} \text{ \& cæt., terminus pri-}$$

mus hujus seriei z^n erit quantitas illa fluens, secundus $n z^{n-1}$ erit ejus

incrementum primum, seu differentia prima, tertius $\frac{n(n-1)}{2} z^{n-2}$ est

ejus incrementum, seu differentia secunda, cui nascenti proportionalis est

$$\text{ejus fluxio secunda, quartus } \frac{n^3 - 3nn + 2n}{6} z^{n-3} \text{ erit ejus incremen-}$$

tum tertium, seu differentia tertia, cui nascenti fluxio tertia proportio-
nalis est; & sic deinceps in infinitum. „

Quid clarius Eruditissime Suzzi? Non fallitur ergo Nevvtonus, dum fluxiones ab incrementis sejungit, & diversa ratione nobis exhibet. Fallitur Bernoullius, dum quantitatem FG, aliasque ejusdem generis per secundam fluxionem exprimit.

Neque audiendus egregius Johan. Bernoullius, qui censuram de feri-
ebus Nevvtonianis ita concludit. „Judicet itaque æques Lector, quid tenendum sit de usu hujus regulæ, quam deprædicat Auctor p. 264. in sol-
vendis istiusmodi problematibus, quandoquidem usus tam facile in abu-
sum degeneret. „Dicendum potius, quod asseruit Nevvtonus in prima
editione, & in secunda confirmavit. „Unde obiter patet usus non conten-

men-

anendus harum ferierum in solutione Problematum, quæ pendet a tangentibus, & curvatura curvarum. „

Hæc dicta sint ad dirimendam litem inter Clarissimos Geometras Nevvtonum, & Bernoullios, qua in re si forte decipior, saltem haud turpe erit cum tam illustri Mathematico errasse. Vale

Castrifranci 3. Septem. An. 1735.

SCHEDIASMA VII. (*)

Animadversiones in æquationes differentiales secundi gradus.

Reductio æquationum differentialium secundi ordinis plerumque est adeo perplexa, atque involuta, ut Analytiam minus attentum frequentissime eludat. Dum Synthetice viæ insistimus, & a primis Fluxionibus ad altiorum gradum ascendimus, cum assumatur tamquam constans vel nota differentia, vel nulla, ex difficultates, de quibus sermo erit, vix occurrunt; quæ tamen evitari nequeunt, si problema aliquod proponatur secunda elementa involvens, & analytica methodo procedendum sit. Infinitas dari formulas differentio-differentiales, ad quas pervenitur, nulla adhibita constante, nemo profecto ignorat: totidem quoque exhiberi posse, ad quas pervenire non conceditur, nisi constante in subsidium vocata, acutiores non laret Analytici: at quomodo ab invicem dignosci queant, & qua ratione tractandæ sint, non ita compertum, neque obvium puo; cum tamen sublimioris Geometriæ officium sit inspicere, quousque, & quibus in circumstantiis expressiones istæ solutionem admittant.

Sit ex. gr. construenda curva, in qua quælibet abscissæ dignitas se habeat directe ut secunda differentia ordinatæ, & inverse ut similis differentia ejusdem abscissæ, quæ curva exponitur per æquationem differentialem secundi ordinis $x^m dx = ddy$: ajo nullam curvam inter possibiles quæstioni satisfacere, si a primis ad secundas Fluxiones fiat transitus, absque eo quod aliqua prima differentia usurpetur pro constante, nec juvabit, salva æqualitate, æquationes ipsas quomodocumque alterare, sive

L 2

per

(*) Lo Schediasma del C. I., e le Annotazioni del Sig. Daniele Bernoulli comparvero alla luce delle stampe l'anno 1732. nel Tomo VIII. Sezione II. de' Supplementi d'gli Atti di Lipsia. S'adverte il Lettore essersi corretto un errore o di penna commesso dall'Autore nello trasferire lo Schediasma, o pure di stampa, ponendo c' in cambio di v' ; falsa lezione per l'uno, o per l'altro degli addotti motivi insinuati nei Supplementi suddetti. Abbiamo pure effettuate due correzioni ricordate dal C. I. nel seguente Schediasma VIII.

per additionem terminorum æqualium, sive per valorum substitutionem: & ex opposito, constante determinata, inveniuntur quidem curvæ problematis conditionem implentes, sed numero infinitæ, & indole differentes; utpote quæ variantur ad arbitrarie constantis mutationem. Posteriores hæc expressiones, quæ sub falsa specie nobis imponunt, a veris, atque legitimis discernere, videtur esse profundioris indagandis; nihilominus certum, & quantum subjecta materia patitur, generale Criterium Mathematicis examinandum propono, quod saltem usui erit in his omnibus casibus, in quibus nos calculus integralis haud deserit.

Porro ad formulas primis tantum differentiis implicitas revocantur æquationes omnes differentiales secundi gradus, ad quas, sive assumpta, sive non assumpta constante, perventum est, & in quibus secundæ fluxiones cum primis, & cum finitis magnitudinibus quomodocumque miscantur, dummodo alterutra ex indeterminatis fluentibus cum suis functionibus æquationem propositam non ingrediatur: quod dicendum pariter de illis expressionibus, quæ ad hanc formam aliqua adhibita industria redigi possunt: cæterum in reliquis, quas progressus noster non complectitur, ad aliquos casus particulares se extendere potest Analystarum solertia; at si quis canonem generalem inveniret, is profecto esset mihi magnus Apollo. Interim consideranda venit æquatio catholica (A) $zdx = dy$, in qua omnes formulæ differentiales primi gradus continentur; cum litera z designet magnitudinem utcumque datam per functiones coördinarum x , & y . Transito ad altiores differentias, nulla assumpta constante, proditque æquatio (B) $zddx + dx^2 = ddy$, quæ, dum in eodem statu permanet, nullo negotio integratur. Quod si ipsius forma immutetur, subrogatis valoribus ab expressione (A) mutuo acceptis, tunc infinitæ formulæ oriuntur, quæ majus artificium postulant. A simplicioribus exemplum peto: loco ipsius dx substituaturs quantitas æqualis $dy : z$, & primus terminus æquationis (B) multiplicetur per dignitatem $z^m dx^m$, reliqui vero per æquivalentem dy^m , unde resultet nova æquatio (D) $z^{m+1} ddx + dy^{m+1} dz : z = dy^m ddy$.

Hujusmodi formulæ expedite reducuntur ope alicujus constantis, quod ut fiat quantum fieri potest, generaliter designo pro constante fluxionem $dx : q$, est autem q magnitudo quomodocumque data per indeterminatas x , y , & constantes. Pono $dx : q = dp$, & cum sit $dx : q$ constans, erit pariter constans dp . Hinc in æquatione $dx = qdp$ transiundo ad secundas differentias, habebimus $ddx = dqdp$. Præterea statuo $dy = ndp$, & sumptis secundis differentiis in eadem hypotesi constantis dp , erit $ddy = dndp$. Subrogatis in expressione (D) valoribus ut supra determinatis, & inventis, oriatur æquatio

$z^{m+1} q^m dqdp^{m+1} + z^{m+1} dz : z = dy^m dndp^{m+1}$, & dividendo per dp^{m+1} , $z^{m+1} q^m dq + z^{m+1} dz : z = dy^m du$, & summando per regulas vulgares, non omitta constantis g additione, $g + q^{m+1} : m+1 =$

$u^{m+1} : m+1 \cdot z^{m+1}$, quæ æquatio dat $u = z \cdot q^{m+1} + gm + s^{m+1}$,
& quia $dy = udx = udx : q$, opportuna adhibita substitutione, occurrit

æquatio reducta (E) $dy = q^{m+1} + gm + s^{m+1} \cdot zdx : q$.

Ex hoc operandi modo sponte fluunt nonnulla consecutaria.

Si determinata magnitudine z , æquatio (E) construat per quadraturas quando fieri potest, & indeterminatæ sunt separabiles, manifestum puto curvas infinitas nostræ formulæ respondere, variatur enim natura curvæ, ob mutatam constantem $dx : q$, & quilibet valor quantitatis q novam semper æquationem localem, sive algebraicam, sive transcendentelem subministrat.

2. Quamquam alterato valore magnitudinis q curvæ diversæ originem ducant, certum tamen est in quacumque hypotesi locum invenire inter ipsas curvam, ut ita loquar, principalem dependentem ab æquatione fundamentali (A) $zdx = dy$, nam si fiat æqualis nihilo constans g , quam addidimus integrando, statim æquatio (E) transit in æquationem (A). In hoc casu nihil refert, quænam differentia $dx : q$ accepta sit pro constante, cum evanescente g , etiam quantitas q evanescat.

3. Si æquatio (E) ulterius differentietur, non restituet expressionem (D) nisi duobus in casibus; vel ponendo $g=0$, & procedendo ad secundas differentias nulla constante assumpta, multiplicatis tamen terminis per quantitates æquivalentes, ut supra factum est; vel iterum differentiendo, determinata prius pro constante fluxione $dx : q$. Utrumque patet relegendo analyticos vestigia. Cæterum æquatio (E) rursus differentiata, neutra conditione impleta, formulam toto cælo diversam ab expressione (D), quam reducendam assumpsimus, exhibet.

4. Idem omnino contingit, sumpto pro constante elemento $dy : q$; nam operationem juxta traditam methodum instituendo, quam brevitati consulens omitto, deveniemus ad æquationem reductam $dx = dy : z =$

$dy \cdot \frac{1}{gm + s^{m+1}} : q$ respondentem nostræ formulæ (D), in quo pariter notandum; quod facta constante superaddita $g=0$, prodit expressio fundamentalis (A) $zdx = dy$.

5. Denique ex dictis colligi posse videtur, quod proposita nuda formula differentiali secundi gradus (D) $z^{m+1} dx^m dx + dy^{m+1} dx : z = dy^m dy$, putarem ex asse me satisfacisse Analystæ quantumvis moroso, observando ad hanc expressionem perveniri potuisse, vel nulla assumpta constante, quo in casu locum invenit æquatio integralis $zdx = dy$, vel designando pro constantibus fluxiones $dx : q$; $dy : q$, & tum summatorias esse $dy =$

$$\frac{q^{n+1} + g^{n+1}}{x^{n+1}} \cdot x dx : q : dx = dy : x - dy \cdot \frac{gm + g^{n+1}}{x^{n+1}} : q. \text{ Adderem}$$

æquationem unicam $x dx = dy$, quæ differentiata absque constantis beneficio transit in æquationem (D), ab aliis infinitis artificio supra explicato distingui posse, quia semper eadem manet in quacunque constantis suppositione, reliquæ vero variata constante mutationi sunt obnoxie.

Supereff ut videamus, utrum in aliis expressionibus, & præcipue in æquatione (F) $x^n ddx = ddy$ respondente problemati ab initio proposito assignatæ conditiones adimpleantur, an scilicet inveniri possit æquatio differentialis, quæ non mutetur ad mutationem constantis, & quæ rursus differentiatâ, nulla constante assumpta formulam (F), saltem terminis additis, vel subductis, aut valoribus subrogatis, salva æqualitate restituat. Fit igitur de more $dx = qdp$, eritque propter constantem dp , $ddx = dqdp$. Sit iterum $dy = ndp$, hoc est $ddy = dndp$ & substituendo $x^n dqdp = dndp$. seu $x^n dq = dn$, &c

integrando $\int x^n dq + g = n$; sed $dy = ndx : q$; ergo $dy = \int x^n dq \cdot dx : q + g dx \cdot q$.

Hic noto, quod facta $g = 0$, & reducta ultima æquatione ad simpliciorum formam, videlicet $dy = \int x^n dq \cdot dx : q$ quilibet valor ipsius q æquationem, & curvam diversam subministrat, nisi fortasse poneretur exponens $n = 0$, quod assumptam hypothesin evertit. Idem dicendum statuta constante fluxione $dy : q$, ex quibus infero frustra queri æquationem differentialem primi ordinis, quæ propositum præstare queat, & formulam (F) $x^n ddx = ddy$, sine constantis auxilio, restituere; nam si daretur talis æquatio, prodere se deberet in quacunque constantis suppositione, cum tamen nostra analysis contrarium ostendat.

Constat igitur problema propositum, nempe curvam invenire, in qua data dignitas abscissæ sit semper directe ut secunda fluxio ordinatæ, & reciproce ut similis fluxio ejusdem abscissæ, solvi non posse, si curvæ quæsitæ talem proprietatem obtinere debeat, sumptis secundis differentiis nulla constante determinata, & ex opposito curvas infinitas satisfacere, si modo una, modo altera constans usurpanda sit.

Non erit abs re aliud exemplum in medium asserre, & sequentem formulam (G) $x^n ddx = x dx^2 + dx^2 + x dx^2$ examini subijcere. Hanc sub canone nostro non comprehendendi, videtur primo aspectu colligi ex eo, quod æquatio utramque indeterminatam x, z , cum suis functionibus contineat: verum si fiat $z dx = dy$, nova expressio (H) $x^n ddx = ddy + dy^2$ ex hac substitutione resultans juxta regulas supra explicatas solutionem non respuit.

1. In primis designo pro constante differentiam dx , unde fit $ddx = 0$. Evanescente igitur termino $x^n ddx$, remanent $- ddy = dy^2$, vel $- ddy : dy$

$= dy$, & integrando $\log: dx: dy = y$, vel $dx: dy = e^y$, hoc est $dx = e^y dy$, & tandem $dx: x = dy$, quæ æquatio dat logarithmicam vulgarem.

2. Statuo tanquam constantem alteram differentiam dy , in qua hypothesi, existente $ddy = 0$, erit $x^m ddx = dy^2$. Pono $dx = sy = cdy$, c constans est sive affirmativa, sive negativa, & s variabilis determinanda. Transco ad secundas differentias, & sese offert æquatio $ddx = ddy$. Hinc

substituendo, $x^m ds = dy$: sed $dy = dx: s + c$; igitur $sds + cds = x^{-m} dx$,

& summando, omissa inutili constantis g additione, $ss: 2 + cs = x^{-m+1}$:

$-m+1$, seu $s + c = \sqrt{2x^{-m+1}: -m+1} + cc$: atqui $dx = s + c$.

$dy = dy \cdot \sqrt{2x^{-m+1}: m+1} + cc$, igitur $dx: \sqrt{2x^{-m+1}: -m+1} + cc = dy$.

3. Quæro utrum logarithmica inventa num. 1. adhibita constante dx , locum pariter habere possit in suppositione constantis dy num. 2. usurpata. Facta

constante $c = 0$, periculum facio, an forte quantitas $\sqrt{2x^{-m+1}: -m+1}$ possit esse æqualis magnitudini x . Quoniam hinc inde quadrando,

$2x^{-m+1}: -m+1 = xx$, igitur $2x^{m+1} = -m+1 \cdot xx$, & cum

eadem quantitas debeat esse tam in coefficiente, quam in exponente binario æqualis, sequitur ad æqualitatem non perveniri, nisi ponendo $-m+1 = 2$, quo in casu determinatur valor exponentis $m = -1$.

In formula (H) $x^m ddx = ddy + dy^2$ limitando, ut dictum est, valorem exponentis $m = -1$, tunc ad æquationem $x^{-1} ddx = ddy + dy^2$ pervenire possumus nulla assumpta constante, ejusque summatoria in hac hypothesi est æquatio differentialis ad logisticam $dx: x = dy$; non ascendendo ad secundas differentias absque constantis auxilio, habebimus $ddx: x = dx^2$: $xx = ddy$: sed dx^2 , ergo $ddx: x = ddy + dy^2$.

5. Quod si valor ipsius m non sit æqualis quantitati negativæ -1 , ad expressionem (H) nullo modo pervenire conceditur, nisi aliqua fluxio tanquam constans determinetur.

6. Precedendo autem generaliter, ut supra factum est, repeto æquationem (H) $x^m ddx = ddy + dy^2$. Sumo pro constante elementum $dx: q = dp$, & statuo pariter $dy = ndp$, ut obtineam rursus differentiendo $ddx =$
 dq

$dqdp; ddy = dudp$, & substituendo, $x^m dqdp + dudp = dy^m = dudp + udydp$, & dividendo per dp , $x^m dq = du + udy$; sed $dy = udx = ndx$; q ; igitur $x^m dq = du + undx$; q .

7. Methodus generaliter separandi variables in hac expressione, etiam si quantitas q detur quocunque modo per functiones solius ignotæ x , pro desperata habenda est. Moneo tamen, quod si fiat exponent $m = -1$, simplicior indeterminatæ u valor prodit æqualis fractioni $q : x$; nam loco ipsius u hoc valore subrogato, omnes termini in æquatione se mutuo destruant. Hinc collocata in æquatione subsidiaria $dy = adp = ndx$; q hoc valore, redit æquatio ad logarithmicam $dy = dx$; x , quæcunque fuerit constans assumpta per magnitudinem dx ; q expressa.

Denique manifestum est, nostrum operandi progressum in maximam difficultatem separationis indeterminatarum ultimo desinere. Hanc spartam olim exornandam suscepi, specimenque aliquod in Diario Italico exhibui: sed aut ego fallor, aut negotium tam subtile, tam arduum, ex quo potissimum pendet calculi infinitorum optata perfectio, non nisi conjunctis viribus promovendum est. Ut igitur ad hanc inquisitionem profundioris analysis, & Geometriæ cultores excitem, sequens problema propono.

In superiori formula $x^m dq = du + undx$; q , dato ad libitum exponente m , statuatur quantitas $q = x^n$. P. to qua ratione determinandi sint valores alterius exponentis n , ut succedat indeterminatarum separatio, & æquationis constructio per solas quadraturas.

*Danielis Bernoulli, Job. Fil. Med. Cand. Notata
in præcedens schediasma.*

ILLUSTRASS. CO. JACOBI RICCATI.

Animadversiones has in æquationes differentiales secundi gradus ab Autore acceptas Frater meus Nic. Bernoulli, apud Italos h. t. agens, transiit ad Patrem, quem nomine Autoris rogavit, ut illas una cum scriptis suis Actis inferendas Lipsiam deferri curaret. Perlectis, priusquam mitterentur, Riccatianis Animadversionibus, sequentia in illas mihi observata fuerunt.

Recte quidem asserit Ill. Riccatus, sæpiissime difficulter methodo; quam vocant a priori, formulam integrari, cujus integratio a posteriori nullo negotio exhiberi potest: sed exemplum, quo illud probare contendit, scopo, quem habet, non sat bene respondere videtur. Æquatio diffe-

rentio-differentialis exempli loco allata hæc est $(D) z^{m+1} dx^m ddx +$

$dy^{m+1} dz$; $z = dy^m ddy$, quam peractis nonnullis substitutionibus deduxit ex æquatione differentiali $z dx = dy$. Hæc enim æquatio (D) differentialis secundi gradus haud magno negotio a priori reducitur ad æquationem simpliciter differentialem, nimirum hoc modo. Æquatio (D) æqui-

(D) æquivalet huic $dx^n ddx = dy^n z^{n-1} ddy - dy^{n+1} dz$, quæ positis $dy = q$, & $ddy = dq$ (ut integrabilitas terminorum eo melius pateat) degenerat in hanc $dx^n ddx = q^n z^{n-1} dq - q^{n+1} z^{n-1} dz$, quæ integrata dat $\frac{1}{m+1} dx^{n+1} = \frac{1}{m+1} q^{n+1} z^{m-n-1} + \frac{C}{m+1} dy^{n+1}$

(per $\frac{C}{m+1} dy^{n+1}$ intelligo quantitatem constantem arbitrariam reliquis

terminis homogeneam) & tandem resubstituto pro q valore dy , habebitur æquatio differentialis gradus primæ $dx^{n+1} = \frac{1}{m+1} dy^{n+1} z^{m-n-1}$

+ $\frac{C}{m+1} dy^{n+1}$, seu $dx^{n+1} = dy^{n+1} z^{m-n-1} + C dy^{n+1}$; posito

autem $c=0$, posteaque reducta æquatione habetur $z dx = dy$. Q. E. F. Errat quique ex inadvertentia Illi Riccatus, cum æquivalentem statuit æquationem $\log: dx: dy = y$ huic æquationi $dx: dy = 1$; illa enim est pro logarithmica, hæc pro linea recta, siquidem 1, seu unitas ad quamcumque potestatem, sive determinatam, sive indeterminatam elevata nil nisi ipsam producit unitatem. Auctor in animo haud dubie habuit dicere æquationem $\log: dx: dy = y$, sumptis logarithmorum numeris, abire in hanc $dx: dy = n$, ubi per n non quidem ipsa unitas, sed talis intelligendus est numerus, cujus logarithmus est unitas, adeo ut Auctori contigerit confundere unitatem cum numero, qui unitatem habet pro logarithmo, quem numerum designo per n . Postea transformat æquationem $dx: dy = n$, (loco 1 substituiam semper n) in hanc $dx = n dy$, ex qua colligit $dx: x = dy$, id quod verum quidem est, sed patet Cl. Riccatum hanc consequentiam formando supponere $x = n$, quæ jam est ipsissima æquatio pro logarithmica, uti dudum hoc ostendit Parens meus, vid. Act. 1697. p. 294. unde liquet Riccatum delabi in petitionem principii, dum supponit æquationem esse pro logarithmica, quod id ipsum est, quod demonstrare sibi proposuit.

Ostendit tandem doctiss. Riccatus, quam necessaria sit separationis indeterminatarum doctrina, in qua excolenda multus fuit, strenueque, ut audimus, etiamnum se exercet non sine successu egregio; quin & stimulos admovent Mathematicis, ut conjunctis viribus negotium hoc promovendum amplectantur. Hunc in finem iidem problema proponit dignum a se habitum, cuius solutionem tentent. Perſcribit Frater meus, se illud soluisse; sed præter ipsum alii quoque existunt solutores, solutionem enim eruerunt Pater, & Patruelis Nic. Bernoulli, pariter ac egomet; eorum vero analyses nondum vidi, excepta illa a Parente excogitata, quæ ra-

ratione operationis, & in procedendi modo a mea diversa est. Interim nos singuli sua quisque metho utentes in eosdem valores exponentis incidimus, unde suspicor, alijs non dari separabilitatis casus, quam quos per diversas vias deteximus; solutionem addo, ne tamen alijs idem tentandi occasionem adimam, illam characteribus occultis involvo, revelaturus significationem, quando tempus postulaverit.

Solutio problematis ab Illustriss. Riccato propositi characteribus occultis involuta.

24a, bb, bc, 8d, 33e, 5f, 2g, 4h, 33i, bl, 21m, 26n, 16o, 8p, 5q, 17r, 16s, 25t, 32u, 5x, 3y, +, -, =, ÷, 4, 2, 1-

SCHEDIASMA VIII. (*)

Appendix ad Animadversiones in æquationes differentiales secundi gradus.

Cum suadente doctissimo, & amicissimo Viro Nicolao Bernoullio tunc temporis apud nostrates agente, qualescunque meditationes meas de æquationibus differentialibus secundi ordinis ad illustrem Patrem Johannem Basileam transmissem, ut nonnisi ipso probante Actis Eruditorum Lipsensium infererentur; hæc cum Annotationibus egregii Juvenis Danielis Bernoullii, ejusdem Nicolai Fratris, in publicam lucem prodire. Quanquam autem me tanto scholiaste dignum haud putarem; suspicor tamen illum minus attentum se præbuisse, & instituti mei rationem nullo modo fuisse assecutum.

Propositum mihi non fuit ex separatione indeterminatarum laudem quærere; hæc enim investigatio ab intentione mea longissime aberat, ut sequentia verba fatis superque indicant, quæ nulla interpretatione in alium sensum detorqueri possunt. Observabam (infinitas dari formulas differentio-differentiales, ad quas pervenitur nulla adhibita constante: totidem quoque exhiberi posse, ad quas pervenire non conceditur, nisi constante in subsidium vocata: at quomodo ab invicem dignosci queant, & qua ratione tractandæ sint, non ita compertum, neque obvium putabam). Exemplo deinde allato, quod mihi subministrabat formula $x^m dx = ddy$, ita pergebam. (Posteriores hæcæ expressiones, quæ sub falsa specie nobis imponunt, a veris, atque legitimis secernere, videtur esse profundioris in-

(*) Fu' impresso questo Schediasma negli Atti di Lipsia dell'anno 1723.

indagationis: nihilominus certum, &, quantum subjecta materia patitur, generale criterium Mathematicis examinandum propono, quod saltem usui erit in his omnibus casibus, in quibus nos calculus integralis haud deserit.)

Porro generale criterium in hoc consistit, ut assumpta ad libitum æquatione differentiali secundi ordinis, cujus integratio sit in nostra potestate, si, quacunque usurpata constanter, eadem semper summatoria nobis occurrat, aut saltem, deletis constantibus, quas integrando addidimus, occurrere queat; signum est ad nostram æquationem differentio-differentiallem perveniri, absque eo quod necesse fuerit constantem adhibuisse. Quod si oppositum contingat, concludere par est, sine constantis beneficio, propositam formulam per secundas differentias expressam ab æquatione elementa tantum prima involvense deduci non potuisse. Canonis hujus utilitas manifeste se prodit; cur enim infinita Problemata proponi non possunt, quæ secundas differentias necessario involvant? Quomodo autem ab hujusmodi questionibus Analytici se expediet, nisi noverit, quibus in casibus æquationes constantis assumptionem supponant, aut gigni queant, nulla usurpata constante?

Hinc ut methodo inservirem, & Analytici minus peritis morem gererem, (non enim solis Bernoulliis canimus.) Synthetica via, &, ut ajunt, a posteriori procedere constitui, ut deinde relictiis vestigiis, rem a priori perficerem. Eligendum itaque exemplum fuit, quod in quacumque constantis hypothesei integrationem non respueret, & propositum ex omni parte responderet. Hoc autem, ni fallor, obtinui rursus differentiendo formulam (A) $z dx = dy$, & post aliquas substitutiones in sequentem transformando (D) $z^{m+1} dz + dy^{m+1} dz = z^m dy$, quam inter simpliciores numeravi, ejusque reductionem opere constantis $dx = q$ tali pacto sum assecutus. (Pono $dx = q = dp$, est autem q quomodocunque data per indeterminatas x & y , vel earum functiones, & cum sit $dx = q$ constans, erit pariter constans dp . Præterea statuo $dy = u dp$, & sumptis secundis differentiis, erit $ddx = d^2 dp$, $ddy = d^2 u dp$, surrogatis in expressione (D) valoribus ut supra determinatis, orietur æquatio $z^{m+1} q^m d^2 u dp^{m+1} + z^{m+1} dz dp^{m+1} = u^m d^2 u dp^{m+1}$, & dividendo per dp^{m+1} , $z^{m+1} q^m dq + u^{m+1} dz = u^m du$, & summando, non omissa constantis g additione, $g + q^{m+1} = \frac{1}{m+1} = u^{m+1} = \frac{1}{m+1} \cdot z^{m+1}$, quæ

æquatio dat $u = z \cdot \frac{1}{q^{m+1} + g m + g} : \text{ \& quia } dy = u dp = u dx : q,$
opportuna adhibita substitutione, occurrit æquatio reducta (E) $dy =$

$\frac{1}{q^{m+1} + g m + g} \cdot z dx : q$, vel si fiat constans addita $g = 0$, $dy =$
 $z dx$. Q. E. F.)

Cum igitur sancitus canon, ad quem tanquam ad scopum collineant animadversiones meæ, & de quo apud Eruditum Adolescentem (quod mirum profecto est) altum ubique silentium, in tuto sit, & extra censuræ jactum positus, exemplumque canonis illustrando adhibitum optime procedat; nescio quid ipsi in mentem venerit, ut me dixisse putet. (Recte quidem asserit Ill. Riccatus, methodo, quam vocat, a priori sepius difficulter formulam integrari, cujus integratio a posteriori nullo negotio exhiberi potest.) Id si dixissem, verum utique dixissem, sed extra chorum saltando, & propositionem in medium afferendo ab instituto meo profusus alienam. Addit (sed exemplum, quo illud probare contendit, quem habet, non sat bene respondere videtur, æquatio enim differentio-differentialis exempli loco allata hæc est (D) $z^{m+1} dx^m ddx + dy^{m+1} dz$; $z = dy^m ddy$, quam peractis nonnullis substitutionibus, deduxit ex æquatione differentiali $z dx = dy$.) Profecto ut constat ex dictis, exemplum finem alium toto cælo diversum respicit: & ineptus equidem fuisset si formulam inversa methodo, & a priori a me jam integratam, pro desperata vendidisset. Interim videamus, quomodo defectum meum supplere contendat Juvenis nimis fortasse ingeniosus.

(Hæc æquatio, inquit (D) differentialis secundi gradus haud magno negotio a priori reducitur ad æquationem simpliciter differentialem, nimirum hoc modo. Æquatio (D) æquivalens huic $dx^m ddx = dy^m z^{m-1} ddy - dy^{m+1} z^{m-2}$, quæ positis $dy = q$, & $ddy = dq$, ut integrabilitas terminorum eo melius pateat, degenerat in hanc $dx^m ddx = q^m z^{m-1} dq - q^{m+1} z^{m-2} dz$, quæ integrata dat $\frac{1}{m+1} dx^{m+1} = \frac{1}{m+1} q^{m+1} z^{m-1}$

$+ \frac{C}{m+1} dy^{m+1}$ (per $\frac{C}{m+1} dy^{m+1}$ intelligo quantitatem constantem arbitriariam reliquis terminis homogeneam) & tandem resubstituto pro q valore dy , habebitur æquatio differentialis gradus primi $\frac{1}{m+1} dx^{m+1} =$

$$\frac{1}{m+1} dy^{m+1} z^{m-1} + \frac{C}{m+1} dy^{m+1}, \text{ seu } dx^{m+1} = dy^{m+1} z^{m-1} + c dy^{m+1};$$

posito autem $c = 0$, posteaque reducta æquatione, habetur $z dx = dy$. Q. E. F.)

Pace acutissimi Scholiastis sit dictum, hoc nihil aliud est, quam actum agere. In ejus integrali $dx^{m+1} = dy^{m+1} z^{m-1} + c dy^{m+1}$ fiat $dx = dx : q$; id enim permittit indeterminata arbitraria q ; erit igitur $dx^{m+1} = c dx^{m+1} : q^{m-1} = dy^{m+1} z^{m-1}$, vel $\frac{q^{m+1} - c}{m+1} dx^{m+1}$

$= \frac{dy^{m+1}}{x^{n+1}}$, & extracta hinc inde radice $\frac{q^{m+1}-c^{n+1}}{q^{n+1}-c^{m+1}}$, $q \cdot dx : q = dy : x$.

Conferatur modo hæc formula cum nostra (E), scilicet.

$$dy = \frac{z dx}{q} \cdot \frac{q^{m+1} + gm + g^{\frac{1}{m+1}}}{q}, \text{ \& patebit nullum aliud intercedere}$$

diferimen, nisi quod magnitudo constans, quam vocat $-c$ Clariss. Bernoullius, a me designatur per $gm + g$. Tota ergo differentia in hoc sita est, quod iste methodo particulari, ego vero generali, quæ ad casus infinitos difficiliore extenditur, rem sum prosequutus, ita instituti mei ratione postulante.

Quod si nonnisi de præmissa æquatione (D) sermo fuisset, ita secundæ differentiæ ad primas nullo negotio redigi poterant. Formula transeat in sequentem $\frac{dx^m ddx}{dy^{m+1}} = \frac{ddy}{dy} - \frac{dx}{x} = \frac{dp}{p}$; igitur $dy = xp$,

& subrogando in primo termino loco ipsius dy^{m+1} ejus valorem x^{m+1} . p^{m+1} , erit $dx^m ddx = p^m dp$, & integrando, $\frac{dx^{m+1}}{m+1} + \frac{cdx^{m+1}}{m+1} = \frac{p^{m+1}}{m+1}$,

vel $dx^{m+1} + cdx^{m+1} = p^{m+1} = dy^{m+1} : x^{m+1}$. Q. E. F.

Verum ut methodi generalis, quam nonnullis exemplis pro re nata aptandam censui, fecunditatem demonstrem, observo ad distinguendas æquationes differentio-differentiales, ad quas pervenitur, nulla ex primis fluxionibus usurpata tanquam constante, necesse non esse eas integrare in quacunque constantis suppositione, sed sufficere, ut habeatur summatoria saltem in aliqua particulari hypothesi, assumendo pro constante illam magnitudinem, cujus ope formula proposita facilius ad prima elementa reduci queat: imo si nihil aliud investigandum sit, quam utrum ad exhibitam expressionem pervenire possimus, nullo elemento primi ordinis pro constante designato, id consequi licet, etiamsi assumptæ æquationis integratio non sit in nostra potestate.

Ut dicto fidem faciam, sit formula $x ddx = u dy + \omega dy^2$. Quantitates x , u , ω usurpantur pro arbitrariis functionibus coordinatarum x , & y . In primis statuatur tanquam constans fluxio ϕ , & ob id, cum sit $ddy = 0$, erit $x ddx = u dy^2$. Fiat $dx = p dy$, & $ddx = dp dy$; igitur $x dp dy = \omega dy^2$, vel $dp = \frac{\omega dy}{x}$, & integrando omissa constantis additione,

$$p = \int \frac{\omega dy}{x}; \text{ sed } p = dx : dy \text{ ergo (A) } dx = dy \cdot \int \frac{\omega dy}{x}. \text{ Iterum cum sit}$$

dp

94
 $dp = \frac{\omega dy}{z}$, & $dy = dx : p$; ergo $pdp = \omega dx : z$ & summando, $p^2 = z$

$\int \frac{\omega dx}{z}$, vel $p = \sqrt{z \int \frac{\omega dx}{z}}$ & collocando pro quantitate p valorem $dx :$

dy , habebimus (B) $dx = dy \cdot \sqrt{z \int \frac{\omega dx}{z}}$.

Sumatur modo in formula principali constans dx , & fit $ddx = 0$; igitur $-nddy = \omega dy^2$. Fiat de more $dy = qdx$, & $ddy = dqdx$. Hinc $-nddy = -ndxdq = \omega dy^2$: sed $dy^2 = q^2 dx^2$; ergo facta substitutione, $-dq : q^2 = \omega dx : u$, & summando neglecta ut supra constantis additione, $\frac{1}{q} = \frac{dx}{dy} = \int \frac{\omega dx}{u}$, & tandem $dx = dy \int \frac{\omega dx}{u}$ (C).

Rursus cum fit $-ndqdx = \omega dy^2$, & $dx = dy : q$; igitur $-dq : q = \omega dy : u$, & integrando, Log. 1: $q = \int \frac{\omega dy}{u}$, scilicet 1: $q = dx : dy$
 $= c \int \frac{\omega dy}{u}$, hoc est (D) $dx = c \int \frac{\omega dy}{u} dy$.

Comparentur modo expressiones A, B, quæ pendent ab usurpata constante dy , cum expressi nibus C, D originem ducentibus ex alterius constantis dx assumptione. Quoniam ex æquatione (A) habemus $dx = dy \int \frac{\omega dy}{z}$, & ex æquatione (C) $dx = dy \int \frac{\omega dx}{u}$, & utraque æquatio ex ca-

none generali in eandem curvam desinere debet, si ad nostram æquationem secundi gradus nulla adhibita constante perventum sit; ergo $dy \int \frac{\omega dy}{z} = dy \int \frac{\omega dx}{u}$, hoc est $dy : z = dx : u$. Hac æqualitate

servata, quemcumque valorem obtineat altera quantitas y , ad æquationem $zddx = zdxddy : dy + \omega dy^2$, in qua loco ipsius u facta est debita subrogatio, pervenire possumus absque constantis auxilio.

Iterum comparantur æquationes (B), & (C), hoc est $dx = dy \sqrt{z \int \frac{\omega dx}{z}}$, & $dx = dy \int \frac{\omega dx}{u}$, eritque $\sqrt{z \int \frac{\omega dx}{z}} = \int \frac{\omega dx}{u}$, & differentiendo, $\omega dx : z = \frac{\omega dx}{u} \int \frac{\omega dx}{u}$, vel $\frac{u}{z} = \int \frac{\omega dx}{u}$.

In

In hoc quoque casu facta opportuna substitutione, haberi potest formula principalis per secundas differentias expressa, & ad quam pervenire licet nulla assumpta costante. Aliæ operationes, & comparationes institui possunt, sed hæc ulterius proficui non vacat, cum lucusque dicta satis superque methodi usum ostendant.

Redeo ad doctissimum Danielem Bernoullium, qui secundo loco inadvertentiæ me accusat, dum ab æquatione Log. $\frac{dx}{dy} = y$ transio ad

sequentem $\frac{dx}{dy} = x^y$. Legendum porro erat $\frac{dx}{dy} = e^y$, quem errorem

in notis sive ipsarum similitudini, sive meæ inscribendo, vel exscribendo oscitantæ tribuam, nescio. Hoc unum scio, consequentiam esse legitimam, & cum defectus non in re, sed in speciebus consistat, corrigendus potius erat quam notandus; hanc enim veniam damus & petimus vicissim, ut lapsum in signis negligamus, nisi in paralogisum conclusionis desinat. Vix huiusmodi errores vitari possunt, & data occasione admoneo in mea Dissertatione p. 69. n. 4. (a) pro æquatione $dx =$

$dy; q. \frac{m}{mg + g} x^{\frac{n}{n+1}}$ hanc aliam substituendam esse $dx = dy; z =$
 $dy. \frac{m}{m + g} x^{\frac{n}{n+1}}; q.$

Similiter pag. 70. (b) §. *Supereſt*, post ea verba (assignatæ conditiones adimpleantur) legendum est an scilicet inveniri possit æquatio differentialis, quæ non mutetur ad mutationem constantis, & quæ rursus differentiata &c. Ita sensus, qui nullus erat, fit planus, & apertus, atque humanissimo Scholiasti gratias ago, quod correctioni locum dederit, & defectum sive scripturæ, sive impressionis mihi non imputaverit.

Fateor interim me conicere non potuisse, quid sibi velit laudatus Bernoullius his verbis. (Postea transformat æquationem $dx:dy = n^y$ (loco x^y substituam semper n^y) in hanc $dx = n^y dy$, ex qua colligit $\frac{dx}{x} = dy$,

id quod verum est, sed patet, Cl. Riccatum hanc consequentiam formando supponere $x = n^y$, quæ est ipsissima æquatio pro logarithmica, uti dudum hoc ostendit Pater meus Vid. Acta 1697. p. 293. unde liquet Riccatum delabi in petitionem principii, dum supponit æquationem esse pro logarithmica, quod id ipsum est, quod demonstrare sibi proposuit.)

Quod formula $dx = e^y dy$ in alteram $dx: x = dy$ transire queat, non ut demonstrandum assumpsi, sed ut notum supposui. Quid pluribus verbis

(a) Nel presente Tomo pag. 89.

(b) pag. 86.

bis opus erat in re tam facili? Mirari subit Clarissimi Juvenis nimiam fortasse confidentiam; quomodo enim hariolari potuit me ad deductionem processisse, nonnisi subrelando x pro quantitate exponentiali e^x , & ob id petitionem principii admittendo? Cum de methodo reductionis verba non fecerim, Bernoulliana oppositio mera suspicio est, quæ nulli conjecturæ innitur & sola negatione eliditur. Sed ipsi in re satis obviamorem geramus. Quoniam $dx = e^x dy$, fiat $e^x = z$; igitur $1 = \log. z$, & differentiando, $dy = \frac{dx}{z}$; scribo z , pro e^x , & dx pro dy ; ergo $dx = \frac{dz}{z}$,

& integrando, $z = x + a$, quo valore substituito in formula $dy = \frac{dx}{z}$

altera oritur $dy = \frac{dx}{x+a}$, vel $dy = \frac{dx}{x}$, posita $a=0$. Aequatio itaque $dx = e^x dy$ transit in sequentem $\frac{dx}{x} = dy$ Q. E. D.

Quod attinet ad Problema, nempe in formula $x^m dx = dn + n dx$;

dato exponente m , determinare valores alterius exponentis n , ut succedat indeterminatarum separatio, illud non ea mente proposui, ut Mathematicis veteranis, & præcipue Geometricæ, ut ita loquar, Bernoulliorum familiæ impervium putarem. Cum enim ejus solutionem invenerim, dum adhuc utrum solvi posset ambigerem, cur ab alijs, quos de successu certiores feceram, enodationem non expectarem? Noveram insuper Cl. Virum Nicolaum Bernoullium laudati Johannis filium huic quaestioni, quam ipsi amice communicaveram, elegantissime satisfacisse. Problema igitur non e trivio petitur, & quod novam requirit industriam, cui bono in publicam lucem emissem, ex nostra dissertatione colligi potest. Non enim id factum, ut quemquam lacefferem, quod profecto ab ingenio meo nimis alienum est; sed ut comparando inter se varias methodos, quibus Viri doctissimi propositum assecuti fuissent, aliquid luminis indeterminatarum separationi affunderetur. Vix fieri potest, ut singuli Analystæ eadem progressionem utantur, & ut methodus unico tantum Problemati inserviat. Quod si viri Clariss. Bernoullii solutiones inventas Geometris non invident, calculi integralis fines etiam in hac parte proferent, & mihi aliquid accedet laudis, quod occasio saltem fuerim, ut talia ederentur.

DANIELIS BERNOULLI.

Explanatio Notationum suarum.

Primum, quod obiter notavi in Riccatianis Animadversionibus, versatur circa æquationes (B), ac (D), quas æquali fere facilitate integrari observaveram, ac propterea vix conciliari posse verba Cl. Riccati, quibus posterioris integrationem *majus artificium postulare*, prioris vero *nullo negotio absolvi* asserit, atque hoc pacto fieri transmutationem formulæ (B) in alteram (D) quodammodo inutilem, utpote quam non alio instituit fine, quam ut posterioris integratio fieret magis ardua: utque adnotationem meam suffulcirem, ostendi, quam facile sit æquationem differentialem secundi ordinis (D) ad simpliciter differentialem reducere. Quid vero in ista reductione desiderandum sit, prorsus ignoro, nec adeoque video, quo titulo, me actum egisse, dicere queat Doctissimus Riccatus in sua Appendice. Quod si ipse insignis vir loco formulæ (D) aliam dedisset, sui integrationem densiori velo occultantem, non solum extra memoratam se positurus fuisset censuram, sed & simul melius ingeniosissimæ suæ methodi æquationum reducendarum præstantiam manifestaturus, hocque unicum fuit, quod desideravi, dum dicerem, *recte quidem asseris* Ill. Riccatus, *sapissime difficulter methodo, quam vocant a priori formulam integrari, cujus integratio a posteriori nullo negotio exhiberi potest: sed exemplum, quo illud probare contendit, scopo, quem habet, non sat bene respondere videtur*: quæ verba non ita interpretanda velim, ut fecit Cl. Riccatus, quasi nimirum credidissem, scopum primum ipsi fuisse, exemplo monstrare, quam difficile sit a priori integrare formulas, quarum integratio a posteriori constet; facile enim quilibet perspicere potest, Virum Acutissimum in animo habuisse, ostendere, quomodo dignosci ab invicem queant æquationes differentiales secundi gradus, quæ pro sua reductione constantis positione opus habeant, vel non habeant; optimeque instituto suo præcipuo defunctus est. Attamen hoc non impedit, quin digressionem illam, qua æquationi (B) aliam inducit formam, videatur eo fine fecisse, ut novam exhiberet formulam, veluti (D), majus integrationis artificium postulantem, & cujus simul integratio a posteriori pateret: nec male hic applicantur verba ipsissima Clariss. Riccati: *dum synthetica via insistimus, eæ difficultates, de quibus sermo erit, vix occurrunt, quæ tamen evitari nequeunt, si problema aliquod proponatur secunda elementa involvens, & analytica methodo procedendum sit.*

N

Non

La presente spiegazione delle sue Annotazioni la fece inserire il Dottissimo Signor Daniele Bernoulli negli Atti di Lipsia dell'anno 1729. si legge parimente nelle Esercitazioni matematiche dello stesso Sig. Bernoulli stampate in Venezia per Domenico Lozusa l'anno 1724.

Non credidissem, hanc meam in Riccatianas Animadversiones adnotationem, ipsum Riccatum parum, vel nihil offendentem, tanta explicatione indigere, nec illam dignam existimassem, de qua vel verbulo mentionem moverem, nisi magnam partem Doct. Riccati Appendicis in ipsius refutationem collineare vidissem.

Secunda mea notatio indicat errorem, quem ex inadvertentia in Animadversiones Riccatianas irrepsisse, atque corrigi posse, dixi, si pro x scribatur n , ubi per n intelligitur numerus, cujus logarithmus est unitas. Hinc conqueritur Cl. Riccatus in appendice sua de mea sincera agendi ratione, inquires tales errores corrigendos esse, non notandos. Mihi sane videor id ipsum fecisse, quod desiderat; correxi enim errorem eundemque indicavi, non notavi, expressis innuens verbis, errorem irrepsisse ex inadvertentia; melius meo quidem iudicio fecisset confitendo talem inadvertentiam, nec summis viris ignominiosam, quam errorem attribuendo oscitantæ in exscribendo: vix enim verisimile est in eundem calami errorem bis incidere, atque dum se ex inadvertentia purgare conatur, obscuritatis se accusat: nam si loco unitatis scripsisset litteram e , definiendum fuisset, quid intellectum velit per litteram illam a novo introductam, & mox aliam significationem accepturam, in sequentibus enim per e intelligit quantitatem quamcumque constantem.

Tertia mea in Doctissimi Riccati Animadversiones notatio pertinet ad ipsius demonstrationem, qua ostendere sibi proposuit, formulam $— ddy = dy^2$ logarithmicam repræsentare. Nemini certe demonstrationem illam perlegenti suspicionem non movebit Cl. Riccatus, se in illa idipsum supposuisse, quod ostendere sibi proposuerat: unde mihi videor non absque ratione indicasse, latere petitionem principii in demonstratione Riccatiana.

Verum ipsa demonstrationis verba secundum Auctoris mentem correctâ transcribam; *remanent*, inquit Cl. Riccatus, $— ddy = dy^2$, vel $— ddy : dy = dy$, & integrando $\log. dx : dy = y$. vel $dx : dy = e^y$, hoc est $dx = e^y dy$, & tandem $dx : x = dy$, quæ æquatio dat logarithmicam vulgarem.

In huiusmodi demonstrationibus, ni fallor, quælibet æquatio ita ex præcedenti deduci debet, ut deductionis principium sit simplex, & omnibus obvium: hoc ipsum in memorata demonstratione egregie observatur; ubique enim talis inter duas proximas æquationes elucelcit connectio, ut transformationis fundamentum simplicissimum sit, atque vel primis tyronibus obvium. Quis itaque non eodem modo comparatas iudicet duas ultimas æquationes $dx = e^y dy$, & $dx : x = dy$, atque credat unica opus esse per se clara substitutione, ut ex priore habeatur formula posterior? Hoc autem si sit, necessario transformationis fundamentum est suppositio æqualitatis inter x , & e^y ; etenim diviso primo æquationis penultimæ membro per x , & altero per e^y , obtinetur æquatio posterior, unde manifesto ponitur $x = e^y$, quæ æquatio Logarithmicam repræsentat, adeo ut in Riccatiana demonstratione id ipsum supponatur, quod est in questione.

Ex-

Expositam meam notationem ut eluderet Riccatus, quærit, *quomodo hariolari poterim*, se ad deductionem processisse non nisi subrogando x pro c' ? Hariolatione sane opus non est, ubi sola contemplatio demonstrationis sufficit: nisi enim longam multarum substitutionum concatenationem instituere velit, nunquam formulam $dx = c'dy$ transire faciet in alteram $dx: x = dy$ absque petitione principii; talem vero transformationum seriem, si tanquam notam, & obviam ponere velit, tota demonstratione superfedere potuisset; nam longe magis obviam puto transi- tionem primæ formulæ in penultimam, quam hujus in ultimam. Vitio itaque petitionis principii si libera esset demonstratio, insigni defectu laboraret. Sed huic sive vitio, sive defectui optime medetur Vir Eruditissimus in appendice sua, ubi demonstrat *identitatem* inter æquationes $dx = c'dy$, & $dx: x = dy$, quam equidem demonstrationis partem male ante omissam esse (si modo, ut dicit, consulto omisit) ex eo constare potest, quod illa sola multum excedat reliquum demonstrationis. Quod si forsitan nimium, & intempestivum brevitatis studium omissionis illius causa fuerit, potuisset eadem brevitatem, & iisdem fere verbis totam demonstrationem abolvere (nisi forsitan Paternorum scriptorum allegationem sistidisset) hoc modo: *remanet* $-ddy = dy^2$, vel $-ddx: dy = dy$, & integrando $log. dx: dy = y$, vel $dx: dy = c'$, hoc est $dx = c'dy$, & rursus integrando $x = c'$, (est enim $c'dy = dc'$, vid. *Alg. Lips.* 1697. p. 291.). *qua æquatio dat Logarithmicam ordinariam; vid. Alg. cit. p. 294.*

SCHEDIASMA IX.

Della quadratura della Post-evoluta della Cicloide Lettera dell' Autore al Sig. Bernardino Zendrini.

IL Problema proposto, e sciolto da VS. Eccellentiss. mi sembra uno dei più difficili della Geometria, ed io conoscendo la sua perizia in queste profonde speculazioni, stimava superfluo il tentarne lo scioglimento, dopo d'esserli ella internata nella materia. Contuttociò per secondare il suo invito, e per ricavar forse qualche nuovo lume dalla diversità de' metodi, le mando la mia soluzione tal quale ella possa essere.

Sii dunque data qualsivoglia curva ABD (Fig. 19.) la di cui evoluta sia AHF, e la post-evoluta DMI; egli è certo, che tirata dal punto B preso ad arbitrio la tangente GBM, la retta GB sarà uguale alla curva AB, e la retta BM alla curva BD, dunque la linea intiera GBM sarà uguale a tutta la curva ABD; e perchè ciò sempre succede, in qualsivoglia sito della curva si prenda il punto B; ne segue, ch'ogni tangente terminata da una parte nell'evoluta, e dall'altra nella post-evoluta

luta è sempre uguale alla curva ABD, ed in conseguenza costante.

Ciò supposto, tirata dal punto A la linea Aa parallela alla DE tangente della curva data nel punto estremo D, e descritto dal centro A l'arco di cerchio INa, il di cui raggio sia uguale alla curva ABD, o alla sua tangente GM, dimostra il Sig. Gio: Bernoulli negli Atti di Lipsia al Mese d'Agosto dell'anno 1695., che l'arco INa è uguale alle due curve AGF evoluta, e DMI post-evoluta.

Nel nostro caso l'arco predetto sarà un quadrante di circolo, perchè le due linee AE, DE, che toccano la cicloide ne' punti estremi A, e D, formano un angolo retto nel punto E. In oltre il semidiametro Aa uguale alla periferia della cicloide farà doppio della linea AZ diametro del circolo generatore, e perciò la circonferenza del quadrante farà uguale alla circonferenza del circolo generatore. Se dunque da questa circonferenza io sottrerrò la curva AHF, la quale per essere una cicloide simile alla prima è dupla del diametro AZ, rimarrà la curva DMI eguale alla periferia del circolo generatore, meno il doppio del suo diametro.

Stimo inutile l'avvertire, che nella maniera stessa si può determinare la misura di qualsivis porzione della curva DMI.

Questo, com'ella vede, è un semplice Corollario della proposizione universale del Sig. Bernoulli. S'incontra maggior difficoltà nella quadratura dell'area DEI, mentre osservo, che la sua formula riesce molto composta, non ostante le varie sostituzioni opportunamente inserite. In queste angustie io foglio trasmutare il mistilineo, di cui si desidera la quadratura, in un altro più semplice, se pure la trasmutazione è possibile.

Nel Problema, che abbiamo per le mani, giacchè mi si presenta l'occasione di stendere la speculazione del Sig. Bernoulli, Ella mi permetta di discorrere generalmente nella seguente maniera.

La linea GBM tocchi la curva ABD nel punto B, e tirata dal punto A centro dell'arco circolare INa la linea APN parallela alla predetta tangente, si prenda la linea AP uguale alla curva AB, o alla porzione BG della tangente; per il punto P, ed altri infiniti determinati nel modo stesso passi la curva APQa.

Dico, che l'area APQa è uguale al mistilineo compreso dalle due curve ABD, AHF, e dalla tangente DF.

Prendasi il punto g infinitamente prossimo al punto B, ed alla seconda tangente H'L sia parallela la linea AQO.

Perchè le due linee Gg, Hg sono parallele alle due linee AP, AQ, l'angolo PAQ sarà uguale all'angolo GgH: ma la linea $gG = BG$ per la minima distanza de' due punti B, g, è anche uguale alla linea AP per la costruzione; dunque i due triangoli APQ, GgH sono uguali. Ma il triangolo APQ è l'elemento dell'area APQa, ed il triangolo GgH è l'elemento del mistilineo AgDFHA; dunque queste due superficie saranno uguali, il che dovea dimostrarsi.

Di

Di vantaggio tirata dal punto A la linea APN ad arbitrio, la quale intersechi la curva sopra descritta APa nel punto P, e l'arco circolare nel punto N, prendasi la linea AR uguale alla PN, e per il punto R, ed altri similmente trovati passi la curva ARI.

Dico, che l'area ARI è uguale al mistilineo contenuto dalle due curve ABD, DMI, e dalla tangente AI. La tangente GI è uguale al raggio AN: ma per la costruzione GB=AP; dunque PN=AR=BM. Per il rimanente s'applichi la sopra posta dimostrazione.

Suppongasì ora, che la curva ABD sia una cicloide, dico, che la curva APQa sarà un semicircolo. Intendasi sopra il diametro AZ descritto il semicircolo generatore AVZ.

La linea BG tocca la cicloide nel punto B; dunque sarà parallela alla corda AV; ma la corda PA è uguale, e parallela alla tangente BG per la costruzione; dunque per la proprietà nota della cicloide sarà doppia della corda AV. Essendo pertanto Aa doppia di Az; dunque come Az ad Aa, così AU ad AP; ma il punto U è nella circonferenza del cerchio generatore; dunque il punto P è nella periferia d'un altro circolo, ch'ha il diametro doppio del primo, il che dovea dimostrarsi.

Resta, che s'indaghi la natura della seconda curva ARI; Sia AR=a; AX, ovvero KR=y, XR, ovvero AK=x; AN=a.

Gia che AR=a; dunque RN=a-x; ma AR=PN per la costruzione; dunque RN=AP=a-x. Per la natura del semicircolo APa

$$Aa : AP :: AP : Af$$

$$a : a-x :: a-x : \frac{a^2-2ax + x^2}{a}$$

Di più stante li triangoli simili AXR, AfP,

$$AX : AR :: Af : AP$$

$$y : a :: \frac{a^2-2ax + x^2}{a} : a-x,$$

e ridotta l'equazione,

$$ay - xy = \frac{a^2x - 2ax^2 + x^3}{a},$$

è diviso l'uno, e l'altro termine per a-x, farà $y = \frac{ax - x^2}{a}$,

e $dy = \frac{adx - 2xdx}{a}$. Ma la $x = \sqrt{2x - y}$; dunque $x = \frac{2}{a} \sqrt{2ax - 2x^2}$.

Quindi $xy = \frac{axdx - 2x^2dx}{a} \sqrt{2ax - 2x^2}$. Per ritrovare più speditamente

l'in-

l'integrale di questa equazione pongo $AP = RN = a - z = t$, e fatte l'opportune sostituzioni trovo

$$xdy = dt \sqrt{aa - tt} - \frac{3tdt \sqrt{a^2 - tt}}{a} + \frac{2t^2 dt \sqrt{a^2 - tt}}{aa}. \text{ S' avverta, che}$$

$$aP = \sqrt{a^2 - tt}, \text{ e che l'elemento dello spazio } aPQa = \frac{-dt \sqrt{a^2 - tt}}{2}; \text{ dun-}$$

que $\int -dt \sqrt{a^2 - tt} = a$ due segmenti aPQ_2 , d'onde si vede l'integrazione del primo termine dell'omogeneo di comparazione. Quanto al se-

$$\text{condo, egli è integrabile, essendo } \int -\frac{3tdt \sqrt{a^2 - t^2}}{a} = \frac{aa - tt}{a} = \frac{aP}{Aa}.$$

Per ridurre il terzo, si denomini $Af = u$, e avremo $u = \frac{tt}{a}$. Facendo

dunque svanir la t , si avrà $du \sqrt{au - uu}$, la cui integrale ci dà il semi-

segmento $AePfA$; dunque $\int xdy = -2 \cdot aQP_a + AePfA + \frac{aP^3}{Aa} - G$,
la quale G è la costante da determinarsi opportunamente.

Prima di passar oltre dichiariamo il metodo da usarsi per rinvenire lo spazio ARI . Se dal centro C del circolo generatore della cicloide condurrò una parallela all' AI , essa toccherà la nostra curva ARI , e il punto del contatto dividerà in due parti. In virtù della nostra formula ritroviamo prima lo spazio rinchiuso tra la parte sinistra, e le due coordinate; indi quello, ch'è ferrato dalle stesse coordinate, dalla parte destra della curva, e dalla retta AI . Sottraendo poi il primo dal secondo di questi spazi, rimarrà lo spazio ricercato ARI .

A ritrovar il primo convien riflettere, che nel punto A , in cui dev'essere $\int xdy = 0$, s'annullano tutte e tre le x , y , z , e la linea AN viene a coincidere coll' Aa . Dunque il segmento aQP_a insieme colla corda AP s'annienta, ed il semisegmento $AePfA$ diviene eguale al semicircolo AP_a ; dunque $0 = APQ_aA - G$, o sia $G = APQ_aA$. Quindi la vera

$$\text{formula sarà } \int xdy = -2 \cdot aQP_a + AePfA + \frac{aP^3}{Aa} - APQ_aA.$$

Fissiamo or la costante necessaria a determinare l'altro spazio. Quando questo svanisce, la $y = 0$: ma tanto la x , quanto la z

$x = AI = a$, e la AN viene a cadere sopra la AI; dunque il semise-
gmento $AePfa$ s'annulla, la Pa diviene $= Aa$, ed il segmento $aQP a$ si
tramuta nel semicircolo $APQ aA$. Sarà dunque $0 = -2 \cdot APQ aA +$

$\overline{Aa}^2 G$, o sia $= -2 \cdot APQ aA + \overline{Aa}^2$, le quali determinazioni ci dan-

no la vera formula $\int x dy = -2 \cdot a QPa + AePfa +$

$$\frac{\overline{aP}^3}{Aa} + 2 \cdot APQ aA - \overline{Aa}^2.$$

In amendue le formule si faccia $y = AC = \frac{a}{4}$, e sarà $x = \frac{a}{2} AZ$.

In quest'ipotesi i punti R, P si congiungono in uno, e la corda AP sarà
eguale al raggio del circolo APa , e per conseguenza lato dell'efagono i-
scritto; dunque aP lato del triangolo equilatero iscritto, a cui sarà egua-
le la doppia Pf. Si chiami $= B$ quel segmento nel circolo APa , che
vien contenuto tra la terza parte dell'intera circonferenza, e la sua cor-
da, ch'è il lato del triangolo equilatero iscritto, e questo lato si chia-
mi C. Nelle nostre supposizioni sarà $aQP a = B$, ed $AePfa = \frac{1}{2} B$.

Perciò nella supposizione di $y = \frac{a}{4}$ avremo il primo spazio $\int x dy =$

$$= \frac{1}{2} B + \frac{C^3}{a} - APQ aA, \text{ ed il secondo de' detti spazj sarà } \int x dy =$$

$$= \frac{1}{2} B + \frac{C^3}{a} + 2APQ aA - \overline{Aa}^2, \text{ e quello sottraendo da questo,}$$

$$\text{resterà lo spazio } ARI = 3APQ aA - \overline{Aa}^2.$$

Io non m'inoltro di vantaggio; perciocchè se dall'area ARI io
sottrerrò l'area ABDEA eguale al semicircolo generatore AUZ, rimarrà
l'area cercata DEI.

Ella è pregata a confrontare questa con la sua soluzione, mentre
io non avendo l'analisi della sua, non so come ottenere l'intento.

*Paragrafo d' una Lettera del Sig. Bernardino Zendrini
all' Autore.*

IN esecuzione de' reveriti comandi di VS. Illustrissima ecco l' analisi della quadratura della post-evoluta. Sia (Fig. 19.) $AZ = 2r$, $AY = x$, $AV = \sqrt{2rx}$, a cagione del circolo AVZ , $VZ = \sqrt{4rr-2rx}$, l'arco $AcV = u$, e l'altro $UTZ = Z$, MB a causa della cicloide $= 4r - 2\sqrt{2rx}$. Sia pure per abbreviare $\sqrt{2rx-xx} = p$, $\sqrt{2rx} = q$, e $\sqrt{4rr-2rx} = m$. Sarà dunque per causa de' simili settori ZST , BML ; $ZV = \sqrt{4rr-2rx}$: $ST = \frac{rdx}{\sqrt{2rx}}$:: $BM = 4r - 2\sqrt{2rx}$: $ML = \frac{\sqrt{2rx}}{\sqrt{4rr-2rx}}$

$$\frac{2rdx}{\sqrt{2rx-xx}} - \frac{2rdx}{\sqrt{4rr-2rx}} = 2du + 2dm, \text{ per causa che } du =$$

$$\frac{rdx}{\sqrt{2rx-xx}}, \text{ e } dm = \frac{-rdx}{\sqrt{4rr-2rx}}.$$

$$\text{Di più BML} = ML \cdot \frac{1}{2} BM = \frac{2du + 2dm}{2} \cdot 2r - q = 4rdm + 4rdm,$$

$$- 2qdu - 2qdm. \text{ Ora } qdu = \frac{rdx \cdot \sqrt{2rx}}{\sqrt{2rx-xx}} = \frac{rdx \cdot \sqrt{2r}}{\sqrt{2r-x}} = \frac{2r^2 dx}{\sqrt{rr-2rx}}$$

$$= 2r \cdot \frac{rdx}{\sqrt{4rr-2rx}} = - 2rdm; \text{ dunque } - 2qdu = 4rdm, \text{ e } 4rdm + 4rdm$$

$$- 2qdu - 2qdm = 4rdm + 8rdm - 2qdm, \text{ ed integrando, sarà lo spazio}$$

$$IAbBMI = 4ru + 8rm + 2 \int - qdm = 8CVcA + 4VcAV + 8rm - P;$$

la qual costante P si troverà nella seguente maniera. Se $AY = 0$, lo spazio $IAbBMI$ sarà $= 0$; per lo che fa di mestieri, che la di lui espressione sia in tal caso $= 0$, ed i membri $8CVcA$, e $4VcAV$ in questa supposizione spariranno: ma $8rm = 8CA$. ZR diventa $= 8CA$. $AZ =$

$$4AZ^2; \text{ dunque } P = 4AZ^2; \text{ e perciò sarà } IAbBMI = 8CVcA + 4VcAV + 4AZ \cdot ZV - 4 \cdot AZ^3.$$

Che

Che se supponiamo cadere il punto V in Z ritroveremo tutto lo spazio IABDMI = a dodici semicircoli AcVZ — quattro quadrati del diametro AZ; e per conseguenza lo spazio DMIE = ad undici semicircoli AcVZ — quattro quadrati del Diametro AZ; il che ec.

Venezia li 21. Marzo 1710.

Si seguita a trattare con differente metodo della quadratura della Post-evoluta della Cicloide.

LEMMA PRIMO.

Sia il quadrante di circolo ACB (Fig. 10.), e sopra il raggio AC intendasi descritto il semicircolo ADC. Esca dal punto A qualsivisia corda AD, e condotta dal punto D la tangente DK, la quale concorrerà necessariamente con la linea AK perpendicolare alla corda AD, si tirino le due rette DM, DC: dico, che le tre linee CD, DA AK sono proporzionali.

L'angolo KDM per la proprietà della tangente è retto, come altresì è retto l'angolo ADC nel semicircolo; dunque se dall' uno, e dall' altro si sottrarrà l'angolo comune ADM, sarà l'angolo KDA uguale all'angolo MDC, ovvero all'angolo MCD, stante l'uguaglianza delle due rette MD, MC. Saranno pertanto simili li triangoli KDA, ACD, mentre oltre gl'angoli uguali KDA, ACD, altro eli angoli KAD, ADC retti; dunque come CD a DA; così DA ad AK: il che ec.

COROLLARIO.

Quindi sia AI = a, DI = x, che sarà la corda della nuova curva, che abbiamo ad esaminare, DA = a - x, DC = $\sqrt{2ax - x^2}$; il valore della sotttangente AK espresso per x si scoprirà = $\frac{a^2 - 2ax + x^2}{\sqrt{2ax - x^2}}$;

LEMMA SECONDO.

Supposta la preparazione dell' antecedente Lemma, alla retta DI intercetta fra le due circonferenze del quadrante, e del semicircolo pongasi eguale l'AG, e per il punto G, ed altri infiniti trovati nella stessa maniera passi la curva BGA, questa sarà la linea, che deve presentemente considerarsi.

O

Sia

Sia proposto da qualsivoglia punto G tirar la tangente GO. La linea KAO sia perpendicolare alla corda ADG, e la retta DK tocchi il semicittolo nel punto D. Prendasi la seconda corda ALF infinitamente prossima alla prima corda ADG, e dal centro A si descrivano li minimi archi DE, GH. Chiamo la costante AI = a, l'indeterminata AG = x la sua differenza FH = dx, l'altra indeterminata AD per l'ipotesi = a - x, la sua differenza EL = -dx, la suttangente del semicircolo data, cioè AK = t, la cercata AO = s.

Già che sonò simili li triangoli LED, DAK;

$$DA : AK :: LE : ED$$

$$a-x : s :: -dx : \frac{-sdx}{a-x}$$

Di più per la similitudine de' triangoli, o settori ADE, AGH

$$AD : AG :: DE : GH$$

$$a-x : x :: \frac{-sdx}{a-x} : \frac{sdx}{a^2-2ax+x^2}$$

Finalmente per esser simili li due triangoli FHG, GAO

$$FH : HG :: GA : AO$$

$$dx : \frac{-sdx}{a^2-2ax+x^2} :: x : s,$$

è ridotta l'equazione, $t = \frac{-sx^2}{a^2-2ax+x^2}$

Il segno negativo preposto alla quantità $\frac{-sx^2}{a^2-2ax+x^2}$ indica, che la suttangente

te AO deve prenderfi dalla parte opposta della suttangente semicircolare AK.

L E M M A T E R Z O.

Sia qualsivoglia curva AGB, ch'abbia relazione al punto A, la di cui suttangente presa nella perpendicolare alla corda AG sia AO. Fatto centro in A, descrivasi l'arco GR, ed al punto R pongasi la perpendicolare RP uguale alla suttangente AO, e s'intenda descritta la curva APSU, la quale passi per il punto P, e per altri punti determinati nella stessa maniera; dico, che lo spazio ABV è duplo dello spazio AGB.

Intendasi condotta un'altra corda AF infinitamente vicina alla corda AG, e dal centro A descritto l'arco FT; l'applicata TS sia uguale alla

la füttangente corrispondente al punto F, e finalmente si tiri la linea PQ parallela all'asse. Il triangolo FHG è simile al triangolo GAO; dunque

$$FH = TR : HG :: GA : AO = RP;$$

dunque il rettangolo TP è uguale al rettangolo AGH, cioè doppio del triangolo rettangolo AGH: ma il rettangolo TP è l'elemento dello spazio ABV, e il triangolo AGH è l'elemento dello spazio AGB; dunque lo spazio ABV è doppio dello spazio AGB: il che ec.

Proposizione Prima.

Sia la curva AGB quella stessa, che fù descritta nel secondo Lemma, e supposta la costituzione del Lemma precedente, abbia ad indagarsi l'equazione locale della curva APV. L'applicata RP s'appelli y , l'abscissa AR = AG x , e per lo stesso Lemma secondo la füttangente

$$AO = RP \text{ sarà } \frac{yx^2}{a^2 - 2ax + x^2} = y, \text{ cioè } yx^2 = a^2 - 2ax + x^2 \cdot y.$$

In luogo di y si collochi il suo valore espresso per x conforme il Corollario del primo Lemma, cioè $\frac{a^2 - 2ax + x^2}{\sqrt{2ax - x^2}}$; dunque

$$\frac{a^2 - 2ax + x^2}{\sqrt{2ax - x^2}} \cdot x^2 = \frac{a^2 - 2ax + x^2}{\sqrt{2ax - x^2}} \cdot y, \text{ e diviso l'uno, e l'altro mem-}$$

bro per $a^2 - 2ax + x^2$, s'avrà la seguente equazione

$$\frac{x^2}{\sqrt{2ax - x^2}} = y: \text{ il che ec.}$$

COROLLARIO.

Dall'equazione locale $\frac{x^2}{\sqrt{2ax - x^2}} = y$, ovvero $\frac{y^2}{2ax - x^2} = y^3$ si rap-

peglia la linea APV essere la cissoide di Diocle descritta in un quadrante di circolo, essendo uguali le linee AB, BV.

La quadratura poi della cissoide dipendente da quella del circolo, essendo notissima, stimo superfluo l'investigarla.

La curva AGB (Fig. 21.) descritta nel quadrante ACB può estendersi fuori del quadrante; imperocchè compiuti li circoli CBLM, e CDAE, nell'altro semicircolo CEA s'applichi la corda arbitraria AE, la quale prolungata tagli la circonferenza maggiore in K, di poi prendasi la retta AH eguale ad EK intercetta tra le periferie del circolo maggiore, e minore; ed il punto H con altri similmente trovati sia alla curva BHF; farà questa la continuazione della curva AGB. Chiamata dunque AH x conforme il consueto, la corda AE farà $x-a$, mentre era prima $a-x$.

Questa mutazione non varia in conto alcuno il valore della suttangente, come si può vedere dal calcolo, e per conseguenza la suttangente farà sempre
$$= \frac{x^2}{\sqrt{2ax-x^2}}.$$

Presa pertanto AQ=BM, e descritto il semicircolo ANQ diviso in due quadranti BNA, BNQ, se nel quadrante BNA si formerà la cissoide AON; lo spazio cissoideale ABN farà doppio dello spazio AGB, come si è dimostrato. Prolunghisi la cissoide in P, di modo che l'intera cissoide ANP sia quella, che appartiene al semicircolo, è manifesto, che lo spazio cissoideale infinito AQRPN è doppio del curvilineo AGBHF. E perchè lo spazio intero cissoideale è triplo del semicircolo ANQ, ne segue, che il curvilineo AGBHF farà triplo del quadrante BNA. La curva AGBHF si nomini concoide circolare, già che ha qualche similitudine con la concoide di Nicomede, se supporremo, che la retta, asintoto della concoide, si tramuti in una circonferenza di cerchio.

Proposizione Seconda.

Sia lo spazio curvilineo IPXO (Fig. 22.) diviso in minimi trapezi di base uguale LR, MT ec., e concepiscansi le parti della curva, cioè RP, TR ec.; ed i loro seni PQ, RS ec. flessibili a guisa d'un filo; potrà, dunque, stando rigide l'applicate LP, MR, il trapezio LMRP cangiarsi nel trilineo AGF, se supporremo; che li punti L, ed M s'uniscano in un sol punto. Che se ciò si praticcherà in ogni trapezio, di modo che tutti li punti della divisione dell'asse si congiungano in un punto, nascerà la nuova curva AGB ed il punto A rappresenterà il concorso di tutti li punti I, L, M, N, O. Giacomo Gregorio chiama la figura AGB involuta, ed evoluta la figura IXO, delle quali si verificano le seguenti proprietà.

1. Tramutandosi il rettangolo minimo LQ nel settore di circolo AGH, ed essendo l'angolo AGH retto, e la linea AG per l'ipotesi uguale ad LP; il rettangolo LQ farà doppio del settore AGH; e perchè

chè ciò si verifica di tutti gli altri rettangoli, e settori; ne segue, che lo spazio IXO sarà in proporzione dupla allo spazio AGB.

2. Per la costruzione la minima curva PR è uguale alla minima curva FG; dunque le due curve IPX, AGB saranno uguali.

3. Il triangolo GHF è simile, ed uguale al triangolo PQR; imperocchè questi triangoli hanno tutti i lati corrispondenti eguali, e retti li due angoli alli punti Q, H: onde fatto l'angolo GAK retto, e tirate dalli due punti analoghi G, P le tangenti GK, PZ, saranno tra loro simili li due triangoli GAK, PLZ: ma la linea GA è uguale alla PL; dunque anche le due suttangenti AK, LZ saranno uguali.

Supposto tutto ciò, sia la nostra curva AGB, la quale si consideri come involuta, e si cerchi la natura della sua evoluta IPX. Chiamata al solito la corda AG x la suttangente AK sarà $= \frac{x^2}{\sqrt{2ax-x^2}}$. Egli è

dunque evidente per le premesse, che dobbiamo trovare una curva, ch'abbia relazione al suo asse, nella quale possa l'applicata $LP=x$, la suttangente LZ sia sempre $= \frac{x^2}{\sqrt{2ax-x^2}}$

Sia per tanto $LP=x$; $QR=dx$; $IL=y$ $PQ=dy$; dunque

$$RQ : QP :: PL : LZ$$

$$dx : dy :: x : \frac{x^2}{\sqrt{2ax-x^2}},$$

cioè a dire mutata l'analogia in equazione, $dy = \frac{x dx}{\sqrt{2ax-x^2}}$, la qual

equazione differenziale è costitutiva della cicloide, come dimostra il Sig. Gio: Beraoulli negli atti di Lipsia al Mese di Maggio dell'anno 1697., ed il semidiametro del circolo generatore è uguale alla linea AB.

Ora sia descritta l'intera conoide circolare AGBHF (Fig. 21.) l'area della semicicloide, il di cui semicircolo generatore è BCM, sarà dupla dello spazio AGBHF, ed il perimetro della stessa semicicloide sarà eguale alla curva AGBHF, ed in conseguenza il curvilineo AGBHF sarà triplo del quadrante BAC, come si è trovato di sopra, ed il perimetro della nostra curva sarà doppio della sua base AF.

Che se poi si desiderasse la misura dello spazio AGB, concepiscasi (Fig. 23.) descritta la soprannominata cicloide QFI, e dal punto B centro del semicircolo generatore si tiri l'ordinata BF, e dal punto F cada la linea FD perpendicolare alla base; il trilineo cicloidale IDF sarà

farà doppio dello spazio AGB, e la curva IF uguale alla curva AGB.

S C O L I O.

Questo secondo modo di misurare lo spazio compreso dalla nostra curva s'accorda perfettamente con il primo. Nella semicicloide QFI si prenda ad arbitrio il punto H, dal quale tirate l'ordinata HR, l'abscissa HS, e la tangente HK, prendasi la normale RO uguale alla suttangente SK, ed il punto O con altri infiniti nello stesso modo determinati sia ad una nuova curva ANOP; dico, che questa sarà la cissoide: imperocchè posta $SH=AR=x$, per la natura della cicloide la suttangente SK farà $= \frac{x^2}{\sqrt{2ax-x^2}}$; ma per la costruzione $SK=RO$; dunque

$$RO = \frac{x^2}{\sqrt{2ax-x^2}} = y, \text{ la qual equazione appartiene alla cissoide;}$$

Quindi si deduce per il metodo delle tangenti di Barrov, che lo spazio cissoidale ABN inscritto nel quadrante farà uguale al trilineo DEI, e l'area dell'intera cissoide farà uguale all'area della semicicloide, cioè tripla l'una, e l'altra del comune semicircolo generatore ANQ.

Proposizione Terza.

Data qualsivoglia curva ABD (Fig. 19.), la di cui evoluta sia AHF, e la post-evoluta DMI, prendo ad arbitrio il punto B, e tiro la tangente GBM, questa sarà sempre costante, ed eguale alla curva ABD. Dal centro A descrivasi il settore del circolo AIE, il di cui semidiametro AI sia uguale alla tangente GM, e l'angolo $a^1 I$ eguale all'angolo DEI formato dall'incontro delle due rette AE, DE, che toccano la curva ne' punti estremi A, D. Dimostra il Sig. Giovanni Bernoulli negli atti di Lipsia dell'anno 1695. al mese d'Agosto, che l'arco INa è uguale alle due curve AHF, DMI, cioè alla somma de' perimetri dell'evoluta, e della post-evoluta.

Io m'inoltro di vantaggio, e trasferisco la speculazione da' perimetri all'aree. Prendo il punto g infinitamente prossimo al punto B, e tiro la seconda tangente HgL, di poi dal punto A centro del settore intendansi condotti i due semidiametri AN, AO paralleli alle due tangenti GM, HL. Si faccia $AP=BG$, ed $AQ=gH$, e per li punti P, Q ed altri similmente ritrovati passi la curva APQa. Dico, che l'area APQa è uguale al mistilineo compreso dalle due curve ABD, AGF, e dalla retta DF.

L'angolo PAQ si è fatto uguale all'angolo GgH, e le linee AP, AQ uguali alle tangenti BG, gH, giacchè per la distanza infinitamente pic-

piccola il punto g cade sopra il punto B ; dunque il triangolo GBH è uguale al triangolo PAQ ; ma il triangolo GBH è l'elemento dello spazio $ABDEFGA$, ed il triangolo PAQ è l'elemento della figura $APQa$; dunque questi curvilinei saranno tra loro uguali: il che ec. Di più perchè $AN = GM$, ed $AP = BG$; dunque $PN = BM$, e per la stessa ragione $Qo = gL$. Facciasi $AR = PN$, ed $Ar = Qo$, e li punti R, r con altri infiniti siano ad una nuova curva $ArRI$: dico, che lo spazio $ArRI$ è uguale al curvilineo compreso dalla curva ABD , dalla sua post-evoluta DMI , e dalla tangente AI . La dimostrazione è evidente, mentre il triangolo elementare RAr è sempre uguale al triangolo LgM : il che ec.

S C O L I O.

Suppongo in ordine al Problema proposto, che la curva ABD sia una cicloide, il di cui semicircolo generatore sia AVZ . L'angolo DEI sarà retto, e per conseguenza l'arco INa uguale all'evoluta, ed alla post-evoluta insieme, farà un quadrante, ed il raggio Aa uguale al perimetro della cicloide sarà doppio della linea AZ , diametro del semicircolo generatore. La curva poi evoluta AGF , la quale è una cicloide, è uguale al raggio Aa ; dunque il perimetro della post-evoluta DLI sarà uguale al quadrante INa meno il raggio Aa .

L'area della post-evoluta DEI + il complemento della cicloide $ABDE$ = al semicircolo generatore AVZ è, come si è detto, uguale all'area $ArRI$; onde supposto, che la curva $ArRI$ sia la medesima, che abbiamo considerata nelle proposizioni antecedenti, come dimostreremo, è manifesto esser nota l'area dello spazio DEI .

Acciò dunque sia manifesto, che la curva $ArRI$ è la porzione della conoide circolare inclusa nel quadrante, deve dimostrarsi, che la curva $APQa$ è un semicircolo.

Perchè la corda AP , la quale taglia il semicircolo generatore della cicloide nel punto V è parallela alla tangente BG ; dunque per la natura della cicloide, e della sua evoluta, la tangente BG farà doppia della corda AV : ma PA è uguale a BG per la costruzione: dunque PA farà doppia di AV : ma il diametro aA è doppio del diametro ZA ; dunque

$$AZ : Aa :: AV : AP. \text{ ovvero}$$

$$AZ : AV :: Aa : AP;$$

dunque il punto P è al semicircolo: il che ec.

Già che dunque la quadratura della post-evoluta della cicloide dipende dalla misura del curvilineo $ArRI$; è manifesto, che la quadratura della post-evoluta non può averli se non supposta la quadratura della cicloide, e per conseguenza quella del circolo.

SCHEDIASMA X. (*)

Della connessione, che possa tra la costruzione dell'equazioni Analitiche, e la quadratura d' infinite curve Algebriche.

DUE forti di curve Algebriche possono distinguersi, avuto riflesso alla loro equazione locale. In alcune le coordinate x , ed y sono talmente separate, e distinte, che tutti i termini, che formano l'equazione, devono chiamarsi semplici, cioè a dire, non si dà alcun membro nell'equazione costitutiva della curva, in cui si trovi l'una, e l'altra delle indeterminate. Altre poi sono composte da termini misti, ne quali l'indeterminate in tal maniera si legano, ch'una si moltiplica per qualche potenza dell'altra, e riesce spesse volte difficile il separarle. Le sezioni del cono ce ne somministrano l'esempio; imperocchè se si proporrà l'equazione $ax + x^2 = y^2$, la quale è all'iperbola, tutti i termini sono semplici, mentre esaminandoli ad uno, ad uno si scopre, che dove si trova l'indeterminata x , non ha luogo l'altra indeterminata y . All'opposto nell'equazione $a^2 = ay + xy$, che pure appartiene all'iperbola fra i suoi asintoti, l'ultimo membro è misto, già che in esso s'incontrano ambe l'indeterminate x , ed y insieme moltiplicate, di maniera che sene forma il loro rettangolo. La medesima considerazione si può applicare alle curve di grado più elevato.

Le curve del primo genere, come che servono con la lor. quadratura per sommare l'equazioni differenziali, nelle quali è riuscito di separar l'indeterminate; così sono state attentamente considerate da' Promotori del Metodo Leibniziano. Si è tentato di quadrarle, o almeno di ridurre ad una quadratura più semplice, specialmente con l'uso dei logaritmi veri, ed immaginari; sopra di che vi sono frà l'altre l'acutissime osservazioni del Signor Giovanni Bernoulli negli Atti di Lipsia dell'anno 1703.

Poco, o nulla è stato scritto intorno le curve del secondo genere, se non in quanto anno procurato i Geometri di quadrarle col mezzo di qualche serie, o pure di trasformarle in curve del primo genere col separare l'indeterminate, nel che per il più s'incontra una somma difficoltà.

Con l'occasione, che mi fu proposto un Problema da sciogliere, mi sono fatto a contemplare più da vicino la natura di queste curve, e finalmente ho scoperto, che vi è una gran connessione tra la loro quadratura, ed il trovare in termini Algebratici la radice d'una data equazione Analitica, e perchè già si sa, che l'equazioni Analitiche sono di

va-

* Questo Schediasma è stato composto l'anno 1710., come consta da una lettera 21. Marzo 1710. del Sig. Bernardino Zendrini all'Autore.

varie forti, cioè alcune semplici, altre del secondo grado, o quadratiche, altre del terzo, o cubiche, e così in infinito; tutte queste anno il loro uso, e servono a misurare infiniti curvilinei.

Io non pretendo, che questo metodo sia universale, perchè ciò farebbe un presumer troppo; solo ne porterò alcuni esempj, che daranno qualche lume alla presente materia.

Principierò dunque dall'equazioni semplici.

Siano p , e q in qualsiasi modo date per x , e propongasi l'equazione $p + qy = y$, in cui l'applicata y non superi la prima dimensione, mentre l'abscissa x ascende a maggiori dignità.

Supposto $p + qy = y$, sarà anche $p = y - qy$, cioè $\frac{p}{a-q} = y$. La spe-

zie a indicherà in appresso sempre l'unità. In luogo dell'ultimo membro dell'equazione, nel quale si trova la sola indeterminata y , sostituirassi il suo valore $\frac{p}{a-q}$, e l'equazione premessa si trasformerà nella seguente

$\frac{p}{a-q} = p + qy$, ovvero $\frac{p}{a-q} - \frac{p}{q-q^2} = y$. Fingasi y uguale alla dis-

senza d'altre due indeterminate r , ed s ; dunque $\frac{p}{q-q^2} - \frac{p}{q} = r - s$,

e per conseguenza supposta l'uguaglianza fra li termini corrispondenti, il che è arbitrario, avremo due equazioni locali a due nuove curve, cioè $\frac{p}{q-q^2} = r$, e $\frac{p}{q} = s$.

Quello che si possa dedurre da questa formula generale, non può esser ignoto agli Analisti, con tutto ciò eccone un'esempio particolare.

Sia $q = x$, $p = x^m$, e la lettera m esprima un numero positivo, ed intero. L'equazione locale della curva, di cui si desidera la quadratura sarà $x^m + xy = y$, la quale per la premessa operazione è stata ridotta alla quadratura delle due curve $\frac{p}{q-q^2} = r$, e $\frac{p}{q} = s$.

In luogo di p , e q s'intenda sostituito il loro valore espresso per x , e le predette due curve si cambieranno nelle seguenti

$\frac{x^m}{a-x} = r$, ed $x^{m-1} = s$.

La seconda equazione $x^{m-1} = s$, è costitutiva d'una delle infinite parabole. La prima poi $\frac{x^{m-1}}{a-x} = r$, o pure $x^{m-1} + xr = r$ non è

diversa dall'equazione della curva proposta da principio, se non in questo, che la dignità di x si è abbassata d'un grado.

Sia di vantaggio $x^{m-1} = p$, ed $x = q$; dunque s'avrà l'equazione di prima $p + qr = r$, la quale trattata con la stessa maniera si risolverà in altre due curve $\frac{p}{q-q^2} = y$, e $\frac{p}{q} = z$, cioè sostituiti i valori di p , e

q , $x^{m-1} = z$ ad una dell'infinite parabole, ed $\frac{x^{m-1}}{a-x} = y$, ovvero

$x^{m-1} + xy = y$, la qual equazione, se si metterà al confronto della prima equazione proposta $x^m + xy = y$, non vi si scoprirà altra differenza, fuori che la potenza di x è due gradi più depressa.

Si continui lo stesso modo d'operare, fin a tanto che la potenza di x si tolga affatto di mezzo, e si tramuti in una costante, ed allora avremo l'equazione $a + xy = y$, la qual, com'è noto, appartiene all'iperbola Apolloniana descritta fra li suoi asintoti.

Dall'Analisi se ne cava il seguente canone generale. Prendasi una serie d'infinite parabole principiando dal rettangolo, gli esponenti delle quali vadano crescendo conforme la serie naturale dei numeri, per esempio, $a = x$, $x = x$, $x^2 = x$, $x^3 = x$, e così in infinito, e raccolte in una somma l'area di tutte queste infinite parabole, alle quali s'aggiunga l'area dell'iperbola poco avanti mentovata, avremo la misura dell'area dell'infinite curve $x^m + xy = y$, avuto riguardo; che l'esponente m superi d'una sola unità l'esponente dell'ultima parabola.

Sia la curva $x^4 + xy = y$. All'area dell'iperbola di sopra espressa aggiungo l'area del rettangolo, del triangolo, e delle due parabole quadratica, e cubica, nella quale mi fermo, stante che il suo esponente 3 è minore d'una sola unità del numero quattro, ch'è l'esponente nella nostra curva. Dico, che l'aggregato di tutte quest'aree è precisamente uguale all'area della curva proposta.

Che se poi col nostro metodo si proseguirà nell'analisi, di maniera che la potenza di x non solo si cambi in una costante, ma in oltre di positiva diventi negativa; si scoprirà la quadratura dell'infinite curve espresse con questa generale equazione $\frac{a}{x^m} + xy = y$; avvertendo solo,

che in questo caso la serie delle parabole si trasformerà in una serie d'iperbole, delle quali tutte una certa porzione dovrà essere sottratta da par-

parte dell' area iperbolica $a + xy = y$, conforme richiederà la natura della curva proposta.

Per esempio, se da parte dell' area infinita $a + xy = y$ io sottrerrò porzione limitata dell' iperbola ordinaria, la di cui equazione è $a = xz$ avrò la misura della curva $\frac{a}{x} + xy = y$, e se da questa io sottrerrò di

nuovo un segmento d' un'altra iperbola solida, la di cui equazione sarà $a = x^2y$, avrò la quadratura della curva $\frac{a}{x^2} + xy = y$, e così in infinito.

Non mi estendo di vantaggio sopra questa materia, lasciando a' Geometri il determinare ne' casi particolari il rimanente.

S C O L I O .

Sò benissimo, che la quadratura delle infinite curve $x^m + xy = y$ si poteva ottenere con il metodo comune, separando l' indeterminato; imperocchè essendo $\frac{x^m}{a-x} = y$, s'io supporrò $a - x = z$, farà anche a

$= x$; dunque la curva comparirà sott' un'altra forma $\frac{a-z}{z} = y$, ed

in conseguenza potrà misurarsi con il metodo ordinario. S' avrà di più la misura del solido, che si generà, fatta la rotazione della figura intorno l' asse, con alzare l' uno, e l' altro membro al quadrato. Contuttociò ho battuta una strada diversa, per aver a mio giudizio una soluzione più elegante.

Non devo tralasciare frattanto la misura del solido, che si genera, quando il curvilineo si gira intorno una linea tirata parallela alla base dal vertice, o quasi vertice della figura. Sia $x^m + xy = y$, e faciasi $y = p + q$; dunque $x^m = p$, la qual equazione è ad una parabola. Dunque $xy = aq$. Ma xy è l' elemento del tronco analogo al predetto solido; dunque si avrà la sua misura, supposta la quadratura della curva, la quale è nota per le cose dette.

Passo all' equazioni quadratiche, nelle quali la coordinata y si trova non solo moltiplicata per le costanti, ma di più elevata al quadrato.

S' intenda per esempio data l' equazione costitutiva d' una curva $p + 2qy = y^2$. Le lettere p , e $2q$ esprimono le quantità in qualsivoglia maniera date per x , e le costanti.

Posta per tanto l' equazione $p + 2qy = y^2$, farà $p - y^2 - 2qy$, ed aggiunto all' uno, e all' altro membro dell' equazione, conforme il metodo comune degli Analisti, il quadrato q ; farà $p + q^2 = y^2 - 2qy + q^2$,
P 2 ed

ed estrarra la radice quadrata, $\sqrt{p+q^2} = y-q$, ovvero $\sqrt{p+q^2} + q = y$ ed alzati ambidue i membri al quadrato, $p + 2q^2 + 2q\sqrt{p+q^2} = y^2$. Si scopre adunque chiaramente, che tanto il termine y , quanto il suo quadrato y^2 è dato per le quantità p , e q , cioè a dire per x .

Ciò fatto riassumo l'equazione proposta $p + 2q = y^2$, ed in vece di y sostituisco il valore trovato, e perciò

$$p + 2q = p + 2q^2 + 2q\sqrt{p+q^2},$$

ed espurgata l'equazione,

$$y = q + \sqrt{p+q^2}.$$

Sia la quantità $y = r + s$, dunque avrà luogo una doppia equazione $q = r$, e $\sqrt{p+q^2} = s$, o pure $p + q^2 = s^2$.

Immaginiamoci ora $p = x^m$, e $2q = x^n$, e ch'essendo m , ed n numeri positivi, ed interi, sia m doppio di n . In luogo di $2q = 2r$ avremo $x^n = 2r$, la qual'equazione è ad una parabola, ed in vece di $p + q^2 = s^2$, avremo $x^m + \frac{x^{n+2}}{4} = s^2$; e perchè m si suppone dop-

pio di n , $x^m + \frac{x^{n+2}}{4} = \frac{s^2}{4}$ ad un'altra parabola. Tutte dunque

le curve infinite espresse per la general'equazione $x^{2m} + x^n y = y^2$ sono assolutamente quadrabili.

Quando poi l'esponente m non fosse duplo di n , la soluzione dipenderà dalla quadratura d'una dell'infinite iperboli.

Sia per esempio $x + x^2 y = y^2$. Questa curva si risolverà in due equazioni $x^2 = 2r$ alla parabola Appolloniana, ed $x + \frac{x^2}{4} = s^2$ ad una

iperbola.

Non istimo proprio d'aggiunger altro, quand'anche gli esponenti fossero numeri rotti, o negativi, mentre questi casi sono tanto chiari, che non meritano d'essere spiegati.

Ripeto la formula generale $q = r$, $p + q^2 = s^2$. Sia $p = x - \frac{x^2}{4}$, e $2q = x^2$. Dunque nella prima equazione $q = r$, posto in vece di q il suo valore $\frac{x^2}{2}$, avremo un'equazione alla parabola $x^2 = 2r$. Nella

secon-

seconda $p+q^2=s^2$, sostituiti i valori di p , e q .

$$x - x^2 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^2}{4} = s^2, \text{ ovvero } x - x^2 = s^2,$$

la qual' equazione è al circolo, e per conseguenza la curva $x - x^2 = bx^4 + x^2y = y^2$, nella quale per conservar la legge degli omogenei si prenderà la costante a quadrupla di b , dipenderà dalla quadratura della parabola, e del cerchio.

Dato frattanto qualsiasi valor di p , e q , se non riuscirà di ridurre la curva a qualche quadratura nota; sarà sempre vero, che con questo metodo si ridurrà almeno alla quadratura d' una curva, che non avrà nella sua equazione locale termini misti, e nella quale le differenziali saranno sempre separate, il che mi pare possa essere di qualche uso nel metodo degli infiniti.

S C O L I O.

Sia la soprapposta equazione $p + 2q = y^2$, ed in luogo di y si colochi il suo valore $\sqrt{p + q^2} + q$; dunque $p + 2q\sqrt{p + q^2} = y^2$. Prendasi $y^2 = r^2 + s^2 + t^2$, e s' avranno le seguenti equazioni $p = r^2$, $2q^2 = t^2$, $2q\sqrt{p + q^2} = s^2$, le quali servono per ritrovare la misura del solido fatta la rotazione intorno l' asse, e sopra d' esse si possono fare le medesime riflessioni.

Con lo stesso metodo si possono trattare le curve, nelle quali l' indeterminata y ascende alla terza dimensione, accompagnata da tutti, o da parte de' suoi gradi parodici; il che se non ad altro serve a trasformare le curve in altre, nelle quali saranno separate l' indeterminate.

Il disesso però consiste in questo, che non s' è ancora scoperto un metodo universale per trovar la radice di tutte l' equazioni Analitiche, che possono proporsi, e che l' Algebra Cartesiana non s' inoltra all' equazioni, che formontano il quarto grado.

Propongo per ultimo la curva, che mi fu proposta da quadrare, e che mi ha data occasione di stendere le presenti speculazioni, nella soluzione del qual Problema si vedrà, come qualche volta sia bene d' unir diverse maniere, per conseguire il fine desiderato.

Si dimanda la quadratura della curva costituita dall' equazione locale $x^3 - xy = ay$. nel qual caso il valore dell' indeterminata y sarà $= \frac{x^3}{a^2 + x^2}$, e sostituito questo valore in luogo di y , avremo l' equazione

$$x^3 - xy = \frac{x^3}{a^2 + x^2}, \text{ e divisi tutti i termini per } x^2, x - y = \frac{x}{a^2 + x^2}, \text{ o } x - x$$

$\frac{x}{a+x^2} = y$. Pongasi $y = s-r$, e l'equazione predetta si risolverà in

altre due equazioni, cioè $x = s$ al triangolo, e $\frac{x}{a+x^2} = r$, ovvero $x =$

$r+rx^2$, o pure $\frac{a}{r}x = a+x^2$. Sia $\frac{a}{r} = 2z$; dunque $2zx - x^2 = a$. Ora

quest'ultima equazione ha due radici vere, e per conseguenza in due forme si può esprimere il valore di x , cioè

$$x = \frac{1}{2} \sqrt{2z^2 - a} = x.$$

Perchè dunque $x = \frac{1}{2} \sqrt{2z^2 - a} = x$; dunque $2z^2 = 2x \sqrt{2z^2 - a} - a = x^2$.

Riassumo la soprapposta equazione $2zx - x^2 = a$, ovvero $2zx = a + x^2$, ed in luogo di x^2 collocato il suo valore, ho la seguente equazione

$$2zx = a + 2z^2 = 2x \sqrt{2z^2 - a} - a,$$

ed espurgata l'equazione, $x = z = \frac{1}{2} \sqrt{2z^2 - a}$.

Prendo $x = \frac{1}{2} q + p$, e così dividendo l'equazione in due altre; la prima delle quali è $z = p$, ed in luogo di z sostituito il suo valore $\frac{a}{2r}$, farà $a = 2rp$ all'iperbola Apolloniana.

La seconda equazione è $\sqrt{2z^2 - a} = q^2$, e sostituito il valore di $z = \frac{a}{2r}$, avremo $\frac{a^2}{4r^2} - a = q^2$, ovvero $\frac{a^2}{4} - ar^2 = r^2 q^2$, o pure

$$a^2 b^2 - a^2 r^2 = r^2 q^2.$$

Io non m'inoltro di vantaggio con l'analisi, perchè so, che quest'ultima equazione locale unita all'equazione costitutiva del quadrante del circolo compone l'equazione locale della conoide di Nicomede, la di cui quadratura dipendendo, com'è stato da altri dimostrato, da quella del quadrante, e d'un settore iperbolico, abbiamo ottenuto l'intento, e ridotta la curva da principio proposta $x^2 - x^2 y = y$ alla quadratura dell'iperbola.

SCHEDIASMA XI.

De solutione aequationum Analyticarum & Problematum Geometricorum per curvas simplicissimas.

Problematum Geometricorum in certas veluti classes distributio, non solum veteribus, sed & recentioribus necessaria visa est Analytici. Antiqui Mathematici praemissa problematum partitione in plana, solida, & linearia, legem sanxerunt, teste Pappo Alexandrino libro quarto Math. Collect., quae a posteris communi suffragio recepta est, scilicet videri quodammodo peccatum non parvum esse apud Geometras, cum problema planum per conica, aut linearia invenitur, & ut summam dicam cum ex improprio solvitur genere. In veterum methodo duo inter cetera desiderabam. Primo evidens, atque indubitatum criterium, quo propositae quaestiones secerni possent, planae nempe a solidis, & solidae a linearibus. Hoc illis notum fuisse res in incerto est, licet enim de locis acutissimas elucubrationes ediderint, tamen ex eodem Pappo manifestum est, Archimedem in opusculo de lineis spiralibus, & quod magis miror, Apollonium libro quinto Conicorum problema planum per conici sectiones construxisse. Displicet secundo loco vetustiores Geometras imperfectam problematum divisionem tradidisse, namque sub genere linearium, locos, & quaestiones cujuscumque gradus, & ordinis comprehensas video, nulla adhibita distinctione inter simpliciores, & magis compositas, nulla separatione facta Mechanicarum a Geometricis, vel, ut nunc loqui amant, transcendentium ab Algebraicis.

His incommodis obviam ivere nostri temporis Analystae, postquam magnus ille Franciscus Vieta faciem praetulit, speciosam Algebram Geometriae conjungendo. Hac metodo problemata plana a solidis, & haec a plursquam solidis feliciter distinxerunt, sed cum illa resolvere per curvas simplicissimas, & in suas classes dirimere aggressi sunt, scopum non attigisse infra clarissime demonstrabo.

Carolus Renaldinus vir alioquin in re Analytica exercitissimus in suo Geometra promotus cujuscumque problematis constructionem perfecit per lineas curvas ejusdem cum problemate ordinis, & gradus. Sic aequationem ad septimam dignitatem ascendente solvit per curvas septimi gradus, & illius, quae pervenit ad decimam potestatem, per curvas decimi gradus solutionem exhibuit, eadem servata in ceteris methodo.

Hoc

* *L'uniformità del carattere minuto, che si osserva negli originali di mano dell'Autore, e la similitudine di alcune frasi servono di fondamento per credere, che gli Schediasmi XI, XII, e XIII. sieno stati scritti in tempi poco l'uno dall'altro distanti. Peggia il Lettore ciò, che per noi si dice del tempo, in cui il C. J. ha composto lo Schediasma XII.*

Hoc nihil aliud est, nisi Mathematicas leges evertere, & contra geometricam simplicitatem præstare per plura, quod per pauciora absolvi potuisset. Artificis officium est, non solum viam detegere, quæ ducat ad propositæ quæstionis enodationem, sed insuper simplicissimam eligere, & assumere curvas, quantum fieri potest, minus compositas, & depretiosiores gradus ad problema construendum, & demonstrandum. Porro laudatus Auctor problemata solida per lineares locos, & plana per solidos construxit. E. G. radicem æquationis quadraticæ affirmative affectæ sub latere determinavit per intersectionem lineæ rectæ cum Hyperbola, prima siquidem ex suis lineis Medicæis Hyperbole Apolloniana est, quam æquilateram appellant, quod illum non animadvertisse satis mirari non desino.

Feliciores auspiciis rem aggressus Renatus Cartesius, tentavit æquationes Analyticas in ordinem redigere, & problemata in sua genera distribuere. Observavit acutissimus vir, æquationes, quæ latus ignotum, aut quadratum non excedunt, primum, & simplicissimum problematum genus constituere, quæ plana a Geometris dici consueverunt. Similiter oriri tunc secundum genus problematum, scilicet solidorum, quando quantitas ignota ad tertiam, vel quartam potestatem ascendit; unde perperam contrita analogia, putavit æquationes quintæ, & sextæ potestatis ad tertium problematum genus pertinere; septimæ, & octavæ ad quartum; nonæ, & decimæ ad quintum, & sic in infinitum.

Hinc colligo ex mente Cartesii non variari problematum genus, quando fit transitus a potestate impari ad parem proxime maiorem, sed solum quando dignitas par ad imparem uno gradu altiore affurgit, & numerum determinantem problematis genus semper duplo esse minorem exponente maximæ potestatis in æquatione contentæ, elevatæ, si opus fuerit, ad gradum parem.

Suspicio etiam ex eo deceptum Cartesium, quod sciret æquationes quadraticas ad simplices, & laterales reduci facili methodo, & tam venteribus, quam recentioribus familiari, quadrato-quadraticas autem ad cubicas deprimi posse per climaticam paraplerosin Vietæ peculiarem, quod artificium aliis verbis Cartesius enunciat; unde ratus regulam generalem esse, & obtinere in his casibus, in quibus occurrunt æquationes graduum elatiorum, in sua sententia confirmatus est, legemque constituit duas potestates proximas, licet diversi gradus, unicum tantum problematum genus componere.

Primum præjudicium secundo occasionem præbuit, nam cum putasset Cartesius, æquationes graduum parium, in quibus una tantum ignota quantitas invenitur, ad æquationes graduum imparium proxime minorum reduci, idem omnino contingere in æquationibus localibus curvarum constitutivis, in quibus duæ ignotæ quantitates reperiuntur, nimis confidenter pronunciavit. Interim ex hoc sorte derivavit locorum in suas classes distributionem, existimavitque æquationes locales ad tertiam, & quartam potestatem ascendentes, & curvas ex his oriundas unius, atque ejusdem generis esse, quod intelligendum de æquationibus,

bus, & curvis quintæ. & sextæ; septimæ, & octavæ dignitatis, & de cæteris eodem modo.

Reliquum erat, ut his jactis fundamentis unicuique problematum generi curvas proprie convenientes aptaret Cartesius, quod ita præstitit. Cum supposuisset, ut supra admonuimus, curvas tertii, aut quarti gradus ejusdem esse generis, atque ordinis; sicuti etiam curvas quinti, & sexti, septimi, & octavi gradus &c., indifferens esse judicavit, quibus lineis quis utatur, dummodo ad idem genus pertineant, libertateinque Geometris concessit in proposita quæstionis enodatione adhibendi E. G. curvas vel cubicas, vel quadrato quadraticas. Hinc constructioni problematum ad quintam, & sextam potestatem ascendentium curvas tertii, aut quarti gradus destinavit, & si æquatio ad septimam, vel octavam dignitatem perveniat, per curvas quinti, aut sexti gradus, si ad nonam, & decimam per curvas septimi aut octavi gradus solutionem exhibuit, & sic uniformi in infinitum methodo, adeo ut genus curvarum constructioni problematis inservientium sit uno gradu depreßius genere problematis.

Petrus Fermatius Analystarum sui temporis facile princeps Cartesianam hypothesein ex parte probavit, ex parte correxit. Præmissam tam problematum, quam locorum in classes distributionem retinuit, sed æquationum localium, quæ sunt curvarum constitutivæ, a gradu pari ad inæqualem proxime minorem depreßionem, tamquam impossibilem jure merito rejecit, deinde problemata cujuscumque generis per lineas simpliciores construere docuit, quod nec fecerat, nec fieri posse existimaverat Cartesius. Summa methodi, quæ apud ipsum Auctorem videri potest, huc redit, ut idem omnino sit determinare curvas solutioni problematis congruentes, ac problema in suo genere constituere, idque obtineri potest, æquationem ab affectione sub latere liberando, dehinc utrumque membrum deprimendo, alterum per simplicem divisionem, alterum per radices extractionem. Ascendat æquatio ad septimam, aut octavam potestatem, tum per ea, quæ superius tradita sunt, problema erit quarti generis; igitur illius constructionem exhibere possumus per intersectionem curvarum quarti gradus. Perveniat æquatio ad undecimam, vel duodecimam dimensionem, & problema ad sextum genus pertineat; illius solutionem dabimus per lineas sexti gradus, nempe cubo-cubicas juxta Fermatium: Nec difficilis erit applicatio regulæ ad cæteras æquationes in infinitum. Verum quidem est, quandoque Fermatiu in casibus particularibus problematum constructionem inventasse per lineas adhuc minus compositas, specimenque exhibuit in tentatione mediarum proportionalium, sed nec canones generales reddidit, neque suæ methodo innixus generales reddere poterat.

Analystæ omnes, quotquot in manus meas pervenerunt, qui post Fermatium, & Cartesium floruerunt, horum vestigia sequuti sunt, præter clarissimum Bernoullium, qui (a) defectus distributionis Cartesianæ notavit.

Ricc. Opere Tom. III.

Q

Ego

(a) Vide Añ. Erud. An. 1696., M. Junii.

Ego vero, ut problemata tandem suis sedibus restituantur, & geometricæ simplicitati consulatur, in Cartesio, & Fermatio aliqua immutanda, aliqua corrigenda censeo, quod sine dispendio famæ tantorum virorum me executurum profiteor.

In primis dico illos imperfectam, & insufficientem tradidisse problematum partitionem, nam & problemata generis ejusdem ad diversa genera pertinere arbitrati sunt, & problemata diversi generis sub eodem genere collocarunt. Ut res clarius intelligatur, tanquam notum suppono problemata omnia, cujuscumque tandem sint gradus, & ordinis, ad unicum genus contrahenda esse, quando solvi possunt per curvas ejusdem gradus. Sic æquationes cubicæ, & biquadraticæ unum problematum genus constituunt, videlicet solidorum, quia per conic sectiones explicantur. Pari jure, cum æquationes omnes, quæ ad septimam, octavam, & nonam potestatem assurgunt, per curvas tertii gradus constructi possint, & debeant, ut infra constabit, evidens est problemata ab his derivata sub unico genere comprehendendi. Idem obtinet in æquationibus a decimo tertio gradu usque ad decimum sextum, quarum omnium constructio per curvas quarti gradus exhibetur. Quam congruenter igitur citati scriptores illas sub diversis generibus collocarint, aliorum esto judicium.

Iterum superius notavimus Cartesium, cui Fermarius consensit, æquationes nonæ, & decimæ potestatis ad idem genus revocasse, attamen mihi constat æquationes, quæ nonum gradum non excedunt, per curvas tertii gradus solutionem admittere, quod non contingit in his, quæ ad decimam potestatem ascendunt. Neque reponant prædictas æquationes explicabiles esse per lineas septimi, aut octavi gradus juxta Cartesium, vel per curvas quinti juxta Fermarium, adeoque sub eodem genere reponendas; quis enim non videt tunc problemata ex improprio solvi genere? Distinctio generum, non a quibuscumque curvis solutioni problematis inservientibus, sed a simplicissimis petenda est, adeoque problemata plana, & solida genere non differrent; nam extra dubitationem est, omnibus planis quæstionibus per loca solida satisfieri posse.

Secundo loco non placet locorum linearium Cartesianæ, aut Fermatianæ distributio, & satis intelligere non possum, qua ratione mori prædicti Auctores curvas E. G. tertii, & quarti gradus ad idem genus spectare existimaverint. Ego semper lineas cubicæ quadrato-quadraticis simpliciores arbitratus sum, neque Geometram abolverem, qui curvas biquadraticas in subsidium vocaret ad quæstionem enodandam, quæ facile per cubicæ solvi potuisset; nam si curvæ tertii, & quarti gradus ejusdem essent ordinis, sicuti etiam curvæ quinti, & sexti; septimi, & octavi & cæter., ex vi analogiæ idem statuere oporteret in lineis primi, & secundi gradus, & sic problemata plana cum solidis turpiter confunderentur. Deinde æquatio, quæ ad septimam, aut octavam dignitatem ascendit, solvitur non solum per duas curvas tertii gradus, sed insuper per alias duas, quarum altera est quarti gradus, altera secundi. Si igitur curvæ tertii, & quarti gradus essent æque simplices, cum aliunde con-

stat,

Ret, lineam secundi gradus esse minus compositam, quam lineam tertii, sequeretur secundam solutionem esse simpliciore[m] prima, quod quam verum sit, alii viderint. Firma ergo, atque inconcussa regula sit, variari locorum plusquam solidorum genus ex hoc præcise, quod varietur curvarum, vel æquationum localium gradus.

Ex dictis colligere licet, non bene a laudatis Auctoribus determinatas esse curvas unicuique problematum generi proprie convenientes. Proponatur æquatio ascendens ad decimam quintam dignitatem, hanc explicaret Cartesius per curvas decimi tertii, aut decimi quarti gradus, Fermatius vero per curvas octavi, ego autem pronuncio illius solutionem exhiberi posse per curvas quarti gradus. Assurgat æquatio ad dimensionem trigessimam tertiam: hujus constructionem dabit Cartesius per curvas trigessimæ primi, aut trigessimæ secundi gradus; at Fermatii sectator per curvas decimi sexti; ego insua clarissimè ostendam datæ æquationis solutionem pendere a curvis sexti gradus, quod magnum esse in Analyti geometrica compendium, nemo veritatis amator poterit inficiari.

Ut datæ publicæ fidei satisfiat nostram methodum explicemus.

A. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 & cxt.

B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 & cxt.

Exponatur series A quadratorum ab unitate incipientium, quibus à regione scribatur altera series B numerorum. precedentium ordine naturalis; evidens est numeros secundæ progressionis respondentes quadratis primæ, semper illorum quadratorum esse radices. Hinc quadrata in prima serie disposita exprimunt quarumcumque æquationum exponentes, vel si mavis, cuiuscumque æquationis gradum; numeri autem secundæ seriei designant gradum curvarum idonearum ad huiusmodi æquationes explicandas. Primum quadratum est unitas, cui in serie B etiam unitas applicatur, quod indicat æquationes primi gradus, hoc est simplices, & laterales, solvi debere per lineas primi gradus, nempe rectas. Secundum quadratum est quatuor, cui in altera serie respondet ejus radix; nempe binarius, ex quo inferitur omnes à secunda ad quartam, quarum exponentes sunt 2, 3, 4, admittere constructionem per curvas secundi gradus. Tertium quadratum est novem, cuius radix ternarius; per curvas igitur tertii gradus omnium æquationum, quæ quartum gradum superant, nonnumque non excedunt, solutio exhiberi potest. Idem de aliis esto iudicium.

Quapropter quadratum utcumque sumptum in superiori progressionem denotat maximum gradum, ad quem pervenire potest æquatio, ut solutionem recipiat per curvas, quarum gradus, & natura innotescit ex numero correspondenti seriei inferioris, qui semper est ejusdem quadrati latus. E. G. numerus quinque indicat, omnes æquationes, quæ vigesimam quintam potestatem ab illius quadrato denominatam non transcendunt, quomodocumque affeiantur, per curvas quinti gradus solvendas esse.

Hæc tamen prima determinatio non est numeris omnibus absoluta. Diximus supra æquationes locales curvarum constitutivas eo simpliciores

se, quo ad minorem gradum ascendent. Sic minus composita censeri debet Problematis constructio, quæ sit E. G. per duas curvas, alteram secundum, alteram tertii gradus, quam illa, in qua utraque curva adhibita ad tertium gradum pertineret. Cum igitur definitum sit, omnes æquationes, quarum maximæ exponentes inter duo quadrata proxima continentur, explicari posse per curvas, quæ sint gradus denominati a radice majoris quadrati, id intelligendum est cum hac limitatione, ut saltem una ex prædictis curvis sit semper ad solutionem necessaria; cæterum alia curva in quibusdam casibus particularibus esse potest uno gradu depressior. Superest inquirendum, quænam sint illæ æquationes intermedie, quæ huiusmodi solutionem admittunt. Regula generalis hæc est, quæ potius exemplis, quam verbis declarari potest.

Sumo duo quadrata proxima V. G. 9., & 16. Horum radices 3., & 4. invicem multiplicentur, & productum sit 12. Numerus 12. denotat omnes æquationes a nona ad duodecimam dignitatem solvi posse per duas curvas, quarum prima sit tertii gradus, secunda quarti. Itaque inter quæcumque quadrata, quorum radices unitate differant, collocetur numerus productus ex multiplicatione dictarum radicum, & eodem semper servato operandi modo, nova series orietur, ut sequitur.

1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 40, 49, 56, 64, 72, 81, & cæ.

Hoc habet peculiare hæc series, ut numerus quicumque medius inter duo quadrata proxima, non solum generetur ex radicibus dictorum quadratorum invicem multiplicatis, sed etiam ideam numerus proveniat, si quadrato minori suum latus addatur. E. G. numero quadrato 16. adde suam radicem 4., producitur numerus 20, qui in supraposita progressionis medius est inter quadratum 16, & proxime majus 25.

Secunda series jam condenda est, quæ primæ ex altera parte respondeat. Sub singulis quadratis superioris progressionis, ut supra etiam factum est, colloco eorum radices, quas eo modo scribo, quo fractiones in Arithmetica scribi solent. E. G. numero quadrato 16 subjacet suum latus designatum sequenti formula $\frac{4}{4}$. Deinde sub numeris non quadratis

primæ seriei pono fractionem compositam ex duabus radicibus quadratorum proximorum, ex quarum multiplicatione admonui præfatos numeros oriri. Numero E. G. 30. respondet fractio $\frac{5}{6}$. Sic igitur stabit utraque series.

1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 64, 72, 81, & c.

$\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{5}, \frac{5}{6}, \frac{6}{6}, \frac{6}{7}, \frac{7}{7}, \frac{7}{8}, \frac{8}{8}, \frac{8}{9}, \frac{9}{9}$ & c.

Utus harum progressionum talis est. Numeri primæ seriei omnium æquationum gradus possibiles eminenter continent; at fractiones in secunda serie dispositæ determinant gradum duarum curvarum, quarum ope præfatæ æquationes explicari debent. Primus numerus in prima serie est unitas, cui subijcitur fractio ex unitatibus composita, hinc colligo æquationes simplices, in quibus ignota quantitas latus non excedit, facile resolvi per lineas primi gradus, nempe rectas. Secundus numerus primæ seriei est binarius, cui in altera serie respondet fractio $\frac{1}{2}$, quod

indicat, æquationes omnes quadraticas solutionem admittere per duas lineas, quarum prima sit primi, secunda secundi gradus, circulus enim cum recta conjunctus omnibus his æquationibus satisfacit. Circuli peripheriam mediam pono inter lineas primi, & secundi gradus, nam si consideretur ejus genesis simplicissima in plano, profecto inter lineas primi gradus locum habet; at vero ad secundum gradum spectat, si ad examen revocetur æquatio localis hujus curvæ constitutiva, quæ ab hyperbolæ æquilatæ æquatione non differt, nisi per variam signorum positionem: unde mirum non est, circulum quandoque ad secundum gradum ascendere eo in casu, quo cum aliqua ex sectionibus conicis copulatur ad problemata solida explicanda, quod admonuisse operæ pretium duxi, ut omnis de medio tollatur æquivocatio.

Tertius numerus primæ progressionis est quatuor, & quartus sex, quibus in secunda junguntur fractiones $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, ex quo inferitur æquatio-

nes tertiæ, & quartæ potestatis solvendas esse per duas curvas secundi gradus, quintæ vero, & sextæ per alias duas curvas, alteram secundi gradus, alteram tertiæ. Accipiat in superiori serie ad libitum numerus quicumque E. G. 42. Huic subjacet fractio $\frac{6}{7}$; omnes igitur æquationes a

trigesimo sexto gradu, usque ad quadragesimum secundum construuntur per intersectionem curvarum sexti, & septimi gradus. Exempla non multiplico, nam ex dictis intelligitur modus operationis in aliis casibus.

Inde emanat pulcherrimi problematis resolutio, videlicet. Data quacunque æquatione, reperire curvas simplicissimas propositæ æquationis constructioni inservientes. Huic problemati per sequentem regulam generalem fit satis. Consideretur exponens dignitatis altioris, quæ in æquatione continetur. Si exponens reperiatur inter numeros primæ seriei, tum fractio correspondens sumpta in secunda serie determinat gradum duarum curvarum, per quarum combinationem simplicissime æquatio explicatur. At si dictus exponens non inveniatur inter numeros superioris progressionis, accipiat in serie numerus proxime major, & eodem modo fractio progressionis secundæ designat, ad quos gradus curvæ ascendere debeant, ut per illas simplicissime construatur æquatio. Sit loco exempli

pli proposita æquatio sequens $x^{11} + a^2 x^9 = a^{11} b$. Exponens maximæ potestatis in hoc casu est numerus 34, quem constat in prima serie non reperiri. Sumatur itaque numerus proxime major, hoc est 36, cui convenit fractio $\frac{6}{6}$, ex quo colligo ad dictam æquationem explicandam curvas

sexti gradus, seu cubico-cubicas sufficere.

Hujus methodi demonstrationem innuere non erit abs re, ut quæ supra tradita sunt, confirmentur, & illustrentur. Theorema est omnium Analystarum calculis, & demonstrationibus comprobatum, quæcumque æquationem tot habere radices partim veras, aut reals, partim falsas, aut imaginarias, quot continet dimensiones maxima potestas ignota in æquatione contenta. Hinc si æquatio ad vigesimum quintum gradum E.G. assurgat, viginti quinque radices determinandæ sunt, quæ omnes si veræ sint, ut in aliquibus casibus accidit, omnes propositæ æquationi satisfaciunt. Ad hoc ut ergo æquationes construantur, duas curvas eligere oportet, quæ in totidem punctis se intersecent, aut saltem se interficere possint, quot radices habet, vel dimensiones æquatio, nam sicuti in unica æquatione plures radices comprehenduntur, ita illas invenire debemus unica constructione.

Jam ex altera parte certum est, & universaliter ex methodo Leibnitiana deducitur, curvam curvæ tot in punctis occurrere posse, sive secundo, sive tangendo, quot continet unitates numerus ille, qui oritur ex multiplicatione exponentium dictarum curvarum. E.G. duæ curvæ tertii gradus, quæcumque sortiantur positionem, sibi occurrere nequeunt in pluribus punctis, quam novem, qui numerus innotescit, si gradus primæ curvæ ducatur in gradum secundæ. Ut res clarius percipiatur, sit æquatio simplex, seu unius dimensionis; hæc unicam habet radicem, quæ facile determinatur per duarum rectarum intersectionem; recta enim rectam non nisi in puncto secat. Æquationes vero quadraticæ vel duarum dimensionum geminam sortiuntur radicem, adeoque explicantur per intersectionem duorum circularum, vel circuli cum linea recta, quæ fit in duobus punctis, & duplex æquationis latus designat. Rursus conic sectiones, cum in pluribus punctis, quam quatuor occurrere non possint, necessario adhibentur ad construendas æquationes tertii, aut quarti gradus. Quod si æquatio ad quintam, aut sextam dimensionem ascendat, tunc assumendæ sunt curvæ, altera secundæ, altera tertii gradus, quæ juxta varias positiones in unico, duobus, tribus, quatuor, quinque, & sex punctis ad summum se interficere possunt, & sic omnes æquationis radices, si conditio problematis postulet, exhibere.

Uterius, cum duarum curvarum tertii gradus intersectio in novem punctis, & duarum quarti gradus in sexdecim punctis, & non ultra fieri possit, satis patet, ad quas æquationes explicandas hujusmodi linearum combinatio sic idonea. Tandem E. G. curva septimi gradus comparatur cum curva octavi, si invicem multiplicentur dictarum curvarum exponentes, prodit numerus 96, ex quo infero has curvas inutiles esse

ad

ad construendas æquationes, quæ quinquagesimum sextum gradum superant; omnes enim illarum radices determinare non possunt, cum hæ lineæ occurrere sibi non possint in pluribus punctis, quam quinquaginta sex, adeoque in hoc casu ad lineas magis compositas recurrere debemus; & insuper his uti non oportere, in explicatione æquationum, quæ quadragesimum nonum gradum non excedunt; nam istarum determinationem assequi possumus per lineas simpliciores, nempe per duas curvas septimi gradus.

Hanc regulam quoque obtinere in omnibus casibus ex hoc fit manifestum, nam alioquin problema cujuscumque generis reduci posset ad genera depressiora, & sic solidum per lineas planas, & plusquam solidum per solidas construere liceret, quod omnino impossibile est.

Hucusque demonstrata cum his, quæ superius tradita sunt, apertissime congruere manifestum puto, ex quo apparet mirabilis veritatum mathematicarum nexus, & dependentia.

SCHEDIASMA XII.

*De modo construendi non ineleganter Problemata
plusquam solida.*

Communis Mathematicorum sententia est, Antiquorum analysim, magnum quondam Geometriæ arcanum, nunc inter artes inutiles reponendam, postquam nova methodus innotuit, cujus inventor Vieta, promotor Cartesius. Nihil profecto excogitari potuit commodius, quam Algebræ speciosæ ad res Geometricas applicatio, satis enim se sua commendat universalitate, hujusque præsidio certa ratione obtinere datum est, quod Veteres methodo quidem duce, sed comite plerumque, aut industria, aut fortuna, assequuti sunt.

Interim si veritati locus esse potest, confidenter pronuncio, nostrum resolvendi modum vitio non carere, & magna adhuc obscuritate laborare, adeo ut nova methodus in his sæpius deficiat, in quibus antiqua excellit, & si quis utramque conjungere posset, & ex duplici unicam efficere, is omne tulisse punctum mihi videretur. Aliud est Problema solvere quocumque modo, aliud elegantissima ratione id ipsum procurare, & ea perspicuitate, & nitore, qui Geometram deceat, hoc est brevissima analysi adhibita, & synthesi non operosa, quod in Veteribus admi-

(*) Una figura relativa a questo Schediasma delineata sopra una lettera scritta nell'anno 1705 serve di fondamento alla congettura, che il nostro Autore in quel tempo lo componesse. In certe aggiunte posteriori si legge: vel aliter juxta ea quæ tradidit nuper in Opere posthumo Marchio Hospitalius. Usel in Parigi l'opera postuma del Marchese dell' Ospitale, cioè a dire il Trattato delle sezioni Coniche, l'anno 1707.

admiror, in Neothericis desidero. Non solum inventum Vietzum minus concinnam suppeditat Problematum constructionem, ut ab illustri Leibnitio observatum est, sed etiam ex modo, quo procedit, necessario derivatur perplexa resolutio, & difficilis compositio.

In primis totius novæ analysis progressum turbant quantitates ad infar fractionum expressæ, magnitudines irrationales, ascensus ad dimensiones plusquam solidas, quibus incommodis, cum vetus resolvendi ratio non subiaceret, hanc vere Geometricam dixerim, nostram potius Arithmeticæ, quam Geometrix legibus conformem.

2. Quando ad æqualitatem ventum est, quot expurgationes, & terminorum transpositiones, quot specierum metamorphoses institui debent, ut ad simplicissimam formam revocetur æquatio? Facta reductione Geometrica effectio aptatur potius inventæ æquationi, quam Problemati proposito, & cum in quolibet genere Problemata sint infinita, æquationum vero numerus determinatus, constructio minus naturalis evadit; semper enim eodem modo solvitur Questio E. G. omnia Problemata solida explicantur per intersectionem parabolæ cum circulo juxta Cartesium, vel circuli cum ellipsi juxta Slusum, aut per duas hyperbolas Heuratii, vel per duas parabolæ Bakeri, & tamen in casu particulari quandoque Problematis conditio postulat, ut diversa utamur linearum solidarum combinatione; ex hac enim elegantissima profuit solutio, quam ab aliorum methodo sperare non licet. Veteres, teste Pappo Alexandrino, magnam collegerunt suppellectilem locorum tum planorum, tum solidorum, quos resolutos vocabant, & quos satis apposite adhibebant ad enodandas questiones, varietate locorum respondente varietati Problematum. Hinc cum resolutivus progressus duceret ad locos jam resolutos, vel saltem viam sterneret ad venanda nova loca constructioni inservientia, mirum non est hoc artificio obtineri solutionem magis naturalem, & cujusvis Problematis genio accommodatam.

3. Postquam ad mentem Recentiorum Problema constructum est, vix dimidium operis consecimus; superest enim ut vestigia analysis relegendo, eruamus Geometricam demonstrationem. At dum tentamus Algebraicæ resolutioni aptare compositionem verè Geometricam, in tot difficultates incidimus, ut melius plerumque sit novam cudere demonstrationem, quam prosequi insinuatam ab analysi. In Antiquorum methodo istæ perplexitates non occurrunt; sponte si quidem, ut ita loquar, analysis sequitur synthetis, & nihil tam obvium est, quam componendo demonstrare, quod resolvendo inventum est. Hos omnes defectus de medio tollere haud permittit ingenii tenuitas. Tantum specimen aliquod methodi exhibeo, ut Analysis fortasse occasionem præbeam melioris edendi. Interim tria præstare conabor.

1. Calculi tædium minuendum est, & liberanda resolutio a quantitatibus asymmetria, & magnitudinibus plusquam solidis.

2. Constructio ex ipsa analysi petenda est, & curvæ locales determinandæ, ex quarum intersectione, quantum fieri potest, minus composita habetur solutio.

3. Ita algebram cum Geometria conciliare oportet, ut ab analysi ad synthese[m] facilis evadat regressus.

Totum vero artificium in eo consistit, ut in resolutione pluribus quantitativis ignotis utamur juxta Problematis conditionem, & gradum.

Ignotæ porro quantitates non ad arbitrium, sed quando res postulat, sumendæ sunt, neque illarum numerus frustra multiplicandus; hoc enim confusionem pareret: sed sequentem potius adhibeamus cautionem.

Quando in analysi propositi Problematis eo ventum est, ut ulterius progredi non liceat, quin ignota quantitas assumpta, rem tractando juxta Quæstionis circumstantias, ad superiores gradus sive puros, sive affectos necessario ascendat, neque aut divisione, aut radicis extractione ad simpliciorum reduci possit, tum species mutandæ sunt, & in resolutionem nova quantitas ignota introducenda, qua industria toties uti debemus, quoties in eundem casum incidimus. E. G. si ex problematis conditione quantitas ignota $\frac{ax+xx}{b}$ ducenda esset in x , productum $\frac{ax^2+xx^2}{b}$

ad tertiam potestatem pertineret; loco igitur ipsius $\frac{ax+xx}{b}$ ponatur se-

cunda incognita y , & productum evadat xy . Rursus sit quantitas ex ignotis composita $\frac{xy}{a}$, quæ ducenda sit in $b-xx$: tunc in producto $\frac{bxy-xx^2y}{a}$

continetur solidum xy compositum ex quadrato magnitudinis ignotæ x , & latere alterius ignotæ y . Ad vitandum igitur ascensum loco $\frac{xy}{a}$

substituto tertiam incognitam z , & productum erit $bz-xxz$.

In his operationibus dignitates altiorum graduum eminenter continentur; attamen species intra planorum limites semper subsistunt, quod quam magni sit usus, infra patebit exemplis.

Licet aliquando in resolutione ad cubos, & solida ascendere, sinempe in quæstione proposita, cuborum, & solidorum præcipue ignotorum aperta fiat mentio; Geometria enim a solidorum comparatione non abhorret. Cavendum interea est, ne ad dignitates cubo altiores perveniamus, & si regia via progrediendum sit, licebit solida, vel per rationum compositionem, vel alio quocumque modo resolvere. Exemplis potius methodus illustranda sit. Sit igitur propositum

P R O B L E M A I.

Eptagonum circulo inscribere.

*Quod ad aliud reducitur vestigiis Euclidis insisterendo, videlicet
Triangulum isosceles construere, cujus uterque angulus
ad basim sit triplus reliqui.*

Sit jam factum, illudque sit triangulum ACB (Fig. 24.) Dividatur
angulus ad B in tres partes æquales, & tres anguli ABE, EBD,
DBC sint tum inter se, tum angulo C æquales, & linea AC, vel CB,
quæ ad arbitrium sumi potest, vocetur a .

Hoc Problema sic methodo vulgari resolvi potest.

Ignota CE esto x , adeoque AE erit $a - x$, & ob similitudinem tri-
angulorum CAB, ABE, ut CA ad AB, ita AB ad AE, & ob id rectan-
gulum CBE erit æquale quadrato AB; sed rectangulum CAE est $aa - ax$;
ergo & quadratum AB, sive BE erit $= aa - ax$, & AB, vel BE $=$
 $\sqrt{aa - ax}$.

Rursus ob similitudinem triangulorum ECB, EBD.

EC quadratum:: EB quadratum:: DB quadratum

$$x^2 : aa :: aa - ax : \frac{a^2}{x^2} - \frac{a^2}{x}.$$

Ob eandem rationem

$$EC : EB :: EB : ED$$

$$x : \sqrt{aa - ax} :: \sqrt{aa - ax} : \frac{aa}{x} - a,$$

& DC $= x + a - \frac{aa}{x}$, si nempe ex CE $= x$ subducatur ED $= \frac{aa}{x} - a$

sed DC, & DB sunt æquales ob æquales angulos DCB, DBC; ergo
perventum est ad æquationem $\sqrt{\frac{a^2}{xx} - \frac{a^2}{x}} = x + a - \frac{aa}{x}$,

& sumptis utriusque membri æquationis quadratis,

$$\frac{a^2}{xx} - \frac{a^2}{x} = x^2 + 2ax - a^2 - 2\frac{a^2}{x} + \frac{a^2}{xx},$$

& expurgata æquatione,

$$x^2 + 2ax - a^2 = a^2.$$

Me:

Methodi vulgaris ope tali pacto obtinetur æquatio: sed cum Analyſta reſolutionis veſtigia repetit, & demonſtrationem aggreditur, in magnas incidit perplexitates, ob quantitates ſolidas, & irrationales, quæ in reſolutione continentur, ita ut ſi illam aſſequi liceat, fortunæ, aut induſtriæ potius, quam arti id tribuendum ſit.

Noſtra methodo ſic rem abſolvimus.

Sint ea omnia, quæ ſuperius. AB igitur, vel BE erat $\sqrt{aa-ax}$; ſed ex antecedentis analyſis progreſſu patet, quod iisdem ſignis retentis, ad ſuperiores gradus ſit aſcenſus; ergo per regulam traditam ſecunda quantitas ignota in ſubſidium vocanda eſt. Sit $\sqrt{a^2-ax}=y$. Ob ſimilitudinem triangulorum ECB, EBD ſequens oritur analogia.

$$CE : CB :: EB : BD$$

$$x : a :: y : \frac{ay}{x}$$

Sed DC eſt æqualis ipſi BD ob angulos æquales DCB, DBC, & DC erat ex ſuperiori reſolutione $= x + a - \frac{aa}{x}$; ergo datur æquatio

$$x + a - \frac{aa}{x} = \frac{ay}{x}, \text{ ſive } xx + ax = aa + ay.$$

Ut locus Geometricus huic ultimæ æquationi reſpondens inveniat, ſic procedendum eſt. Quoniam $xx + ax = aa + ay$, erit $xx + ax = ax$,

ſi $a + y$ ponatur $= z$: addito utrimque $\frac{1}{4}aa$, erit $xx + ax + \frac{1}{4}aa$

$$= az + \frac{1}{4}aa, \text{ \& hinc inde extracta radice, } x + \frac{1}{2}a = \sqrt{az + \frac{1}{4}a^2}.$$

Sit $x + \frac{1}{2}a = q$, & erit $q^2 = az + \frac{1}{4}a^2$. Eſto inſuper $\frac{1}{2}a + z = p$; ergo $q^2 = ap$, qui locus eſt ad parabolam.

Rurſus altera æquatio erat $\sqrt{aa-ax}=y$, hoc eſt $aa-ax=yy$.

Statuatur $a-x=r$; igitur $ar=y^2$, qui locus eſt ad alteram parabolam, & ſic per duarum parabolarum interſectionem Quæſtio ſoluta eſt.

Tentemus modo quæſtioni ſatiſfacere aliorum placitis inſiſtendo. Repetamus itaque ſuperius inventam æquationem $x^3 + 2ax^2 - a^2x = a^3$, quæ ſi conſtruenda ſit more Cartheſiano liberanda prius erit ab affectu ſub quadrato, deinde per circulum, & parabolam habebitur intentum. Verum huiusmodi æquationis expurgatio, & reductio ad cubum tantum affectum ſub latere torius analyſis, & ſyntheſis progreſſum turbat, & ſolvendi problematis hypotheſim confundit.

R 2

Mc-

Methodus, quæ locis utitur juxta mentem Fermatii, talis est. Supponatur comparationis homogeneum prædictæ æquationis, scilicet a^2y , æquari solido axy , & cum hac quantitate assumpta comparetur utrumque æquationis membrum, eritque prima æquatio $a^2 = axy$, hoc est $a^2 = xy$, qui locus est ad hyperbolam intra asymptotos. Altera æquatio erit $x^2 + 2ax^2 - a^2x = axy$, & omnibus per x divisis, $x^2 + 2ax - a^2 = ay$, qui locus est ad parabolam. Per intersectionem igitur hyperbolæ, & parabolæ problemati fit satis.

Vel aliter juxta ea, quæ tradidit nuper in opere posthumo Marchio Hospitalius. In supradicta æquatione $x^2 + 2ax^2 - a^2x = axy$ ponatur loco quadrati x^2 divisus per cognitam quantitatem a secunda ignota y , ita ut consurgat æquatio ad parabolam $\frac{x^2}{a} = y$, deinde loco plani x^2

in æquatione proposita substituatur suus valor ay , & sic stabit æquatio $axy + 2ay^2 - a^2x = a^2y$, & omnibus terminis ad a applicatis, $yx + 2ay - ax = a^2$. qui locus ad hyperbolam pertinet. Quæstio igitur solvitur per combinationem parabolæ, & hyperbolæ.

Non dissimili ratione alia loca solida venari possumus, & eo artificio deducere, ut acceptis ad libitum duabus conic sectionibus, vel circulo, & quacumque conic sectione, per harum intersectionem problema enodare valeamus.

Interim methodum tam Fermatii, quam Hospitalis Cartesiana præfero, eo quia neutra ullam adhibet expurgationem, aut specierum transmutationem, ut constructionem perficiat, utraque tamen vitio non caret; nam opportune quidem determinat valorem magnitudinis incognitæ x ; sed dum æquationem analyticam in duos locos Geometricos resolvit, & assumit secundam ignotam y , hæc quantitas, ut ita loquar, extranea est, neque convenit præmissæ præparationi. Valor ipsius y relatus ad primam incognitam x , secundum Fermatium est $\frac{ax}{x} = y$, secundum Hospitalium

est $xs = y$. Nullam autem in fig. 24. præparationis invenio lineam, quæ hujusmodi valoribus respondeat, adeoque quantitas y , quæ non minus ac prima ignota x ex constructione innotescit (semper enim vel sola, vel juncta magnitudinibus datis, & aliquando etiam ignotis componit alterutram ex coordinatis curvarum localium) in demonstratione vix locum habere potest, cum nullum habeat in præparatione. Hinc compositio extraneis quantitibus implicatur, atque ardua, & expertis artis redditur, ut propria experientia didici, qui defectus in methodum nostram non cadit, nam secunda ignota y optime præparationi congruit; valet

enim idem ac $\sqrt{a^2 - ax}$, & per consequens designat quantitatem AB; vel EB. Hæc autem lineæ non solum in præparatione, sed etiam in demonstratione considerandæ sunt, ut ex ipso compositionis progressu manifestum est.

Si libeat in constructione, & demonstratione, ad Specimen artis ostendendum, præmissæ nostræ analysis vestigia sequi, ita Problemata Geometricæ constructur, & demonstrantur.

Sumatur (Fig. 25.) infinita FX , cui ad angulos rectos insistit FH æqualis lateri quæsitæ trianguli, & vertice F , axe FX , parametro FH describatur parabola FKV . Latus rectum FH bisariam dividatur in puncto G , & agatur indefinita GT ipsi FX parallela, deinde a linea FX abscindatur FL æqualis quartæ parti parametri FH ; & insuper LN æqualis dictæ parametro. Erigatur perpendicularis NR , secans rectam GT in puncto P , & posita PR æquali lateri recto FH , vertice R , axe RV , parametro RP , vel FH describatur altera parabola RV primam secans in puncto U , & ducantur normales VS , VT . PS est $= x$, $SV = PT = NX = y$.

Dico primo rectangulum BRS esse æquale quadrato SV , vel PT , quod ex descriptione parabolæ RV manifestum est; supponitur enim RP æqualis lateri recto dictæ parabolæ.

Dico secundo rectangulum RPS una cum quadrato PS esse æquale quadrato RP , & rectangulo RPT . Ex natura parabolæ rectangulum HFX est æquale quadrato XV , sed rectangulum HFX est æquale duobus rectangulis HFL , & HF in LX , quorum primum potest quartam partem quadrati FH ; assumpta est enim in constructione FL æqualis quartæ parti i suis FH ; igitur quadratum UX est æquale rectangulo AF in LX , & insuper quartæ parti quadrati FH , seu quadrato FG , vel XT . Quadratum autem VX æquatur quadratis XT , TV , & duplo rectangulo XTV , quod dunlum rectangulum æquale est rectangulo sub RP in TV ; facta est enim RP æqualis FH , & per consequens dupla ipsius XT ; ergo si ab utraque parte auferas quadratum XT , rectangulum sub FH in LX erit æquale rectangulo sub RP in TV , & quadrato TV , seu rectangulo RPS , & quadrato SP .

Porrò cum rectangulum sub FH in LX sit æquale duobus rectangulis sub FH in LN , hoc est quadrato FH , vel RP , & rectangulo sub FH in NX , hoc est rectangulo RPT , erit rectangulum RPS una cum quadrato PS æquale quadrato PR , & rectangulo RPT . Q. E. D.

Ponatur jam AC æqualis PR (Fig. 24., & 25.) & CE æqualis SP , adeoque AE erit æqualis SR . Super data AE construatur triangulum isosceles ABE , cujus utrumque latus sit æquale datæ PT , & jungatur BC . Ex supra demonstratis erit rectangulum CAE æquale quadrato AB , vel EB , & rectangulum ACE plus quadrato EC æquale quadrato CA plus rectangulo CAB . Dico jam triangulum ACB esse quæsitum. CE ita dividatur in puncto D , ut rectangulum CED sit æquale quadrato EB , & ducatur DB .

Quoniam rectangulum CAE est æquale quadrato AB , erit ut AC ad AB , ita AB ad AE ; ergo triangula ACB , ABE habentia circa communem angulum A latera proportionalia, erunt similia. Isosceles est igitur triangulum ACB , & angulus ABE æqualis angulo C .

Iterum, quoniam rectangulum CED factum est æquale quadrato EB , erit, ut CE ad EB , ita EB ad ED , adeoque triangula ECB , EBD .

EBD habentia circa communem angulum E latera proportionalia erunt similia; angulus igitur EBD est æqualis angulo C.

Tandem quoniam rectangulum ACE, & quadratum EC sunt æqualia quadrato CA, & rectangulo CAB, si hinc inde auferatur rectangulum ACE, erit quadratum EC æquale differentie quadrati CA, & rectanguli ACE, hoc est rectangulo CAE, & insuper rectangulo CAB; sed rectangulum CAE est æquale quadrato AB, vel EB, hoc est rectangulo CED; ergo quadratum EC æquatur rectangulis CED, CAB, & ab utraque parte dempto rectangulo CED, erit differentia quadrati EC, & rectanguli CED, scilicet rectangulum ECD æquale rectangulo CAB, vel CBE.

Jam ob superius demonstratam similitudinem triangulorum EBD, ECB, erit, ut EB ad BD, ita EC ad CB; ergo rectangulum CBE erit æquale rectangulo sub EC in BD: sed rectangulo CBE erit etiam æquale rectangulum ECD; igitur rectangula ECD, & EC in BD sunt æqualia, & ob eandem altitudinem EC, DC & DB sunt æquales, & per consequens angulus DBC æqualis angulo C. Tres itaque anguli ABE, EBD, DBC sunt tum inter se, tum angulo C æquales, & ob id angulus ABC triplus anguli C, quod erat faciendum.

S C H O L I U M I

Præmissum problema construximus per duas parabolas, sed facilius expediri poterat per parabolam, & hyperbolam. Prima namque æquatio localis erat $a^2 - ax = y^2$ ad parabolam. Altera æquatio item ad eandem curvam erat $ax + xx = a^2 + ay$, vel $x^2 - ay = a^2 - ax$. Loco membri $aa - ax$ pono suum valorem y^2 , qui a prima æquatione locali determinatur; ergo $xx - ay = y^2$, hoc est $ay + yy = xx$, qui locus est ad hyperbolam, quam æquilateram vocant. Combinatio itaque parabolæ, & hyperbolæ quæstioni satisfacit. Interim gemina parabola potius usus sum, licet difficilior, & magis prolixa evaserit compositio, quia parabolam simpliciore, & minus compositam curva hyperbolica sum arbitratus, si non genere & gradu saltem æquatione locali. Huic observationi nec scrupulosius adherere, nec illam omnino spernere debet Analysta. Eligat igitur curvas quantum fieri potest æquationis simplicioris, dummodo id permittat, ut in casu nostro natura problematis.

Omittere non possum elegantem solutionem per hyperbolam intra asymptotos, & circulum, quæ ita se habet. Transformetur species sequenti modo. Sit ignota $y = datæ b$, hoc enim arbitrarium est, & nota a ponatur æqualis incognitæ q , & $a - x = z$. Prima æquatio localis, facta specierum metamorphosi, novam hanc induit formam $xq = b^2$, quæ æquatio spectat ad hyperbolam intra asymptotos. Secunda æquatio localis $ax + xx = aa + ay$ transmutata ad normam assumptæ hypothesis talis est $3qz + bq - qq = xz$, qui locus quidem est ad alteram hyperbolam: sed si vice $3qz$ collocares suum valorem $3b^2$ cognitum ex æquatione $xq = bb$, hyperbola transit in circulum, & oritur æqua-

tiō

tio localis ad circulum $3bb + bq - qq = 2^*$. Simili ratione, mutata positione specierum, alios locos omnino diversos indagare possumus, unde colligitur nostræ methodi fecunditas.

S C H O L I U M II.

Consueverunt Analytæ duplicem, aut triplicem quantitatem ignotam assumere in resolutione problematum indeterminatorum, sive localium, hoc est duas incognitas si locus est ad lineam, tres si pertinet ad superficiem, cum optimè noverint huiusmodi problemata per unius ignotæ positionem solvi non posse. Cæterum plurium ignotarum usus non adeo communis est; nam licet aliqui in analysi multas ignotas in subsidium quandoque vocaverint ad calculi rædium minuendum, tamen illarum valoribus substitutis, omnes tandem reducunt ad unicam incognitam, & sic resolutionem claudunt per consuetam æquationis inventionem, cujus constructionem perficiunt more vulgari, quod omnium Analystarum exemplis ostendi potest.

Neque aliter rem expedire, aut possunt, aut debent, cum enim hucusque nemo docuerit, qua occasione, & quibus in circumstantis secunda, & ulteriores quantitates ignotæ sumendæ sint, sequitur delectum ignotarum hucusque fuisse artis expertem, & omnino arbitrarium. Quod si quis duas ignotas accipiat ad libitum, & his utatur tamquam duabus coordinatis geminæ curvæ localis inservientis solutioni quæstionis, fieri potest, ut fortuito incidat in duo loca, quæ simplicissima sint, neque assurgant ad altiorum gradum, quam postulet conditio problematis, sed plerumque quæstio solvetur ex improprio genere, solida nempe per curvas plusquam solidas, & linearia cujuslibet classis per curvas convenientes quæstionibus sublimiorum graduum.

In Fig. 24. vocata data AC a , eligantur duæ ignotæ ad libitum AB, & ED, quarum prima sit x , secunda y . Ex supra demonstratis.

$$AC : AB :: AB : AE$$

$$a : x :: x : \frac{xx}{a}$$

adeoque CE erit $= a - \frac{xx}{a}$ sed proportionales sunt

$$CE : EB :: EB : ED$$

$$\frac{a-xx}{a} : x :: x : y$$

ergo prima datur æquatio localis $xx = ay - \frac{x^2y}{a}$ ad curvam tertiæ gradus.

Rursus

EC

$$EC : CB :: EB : BD$$

$$\frac{a-xx}{a} : a :: x : \frac{a^2x}{aa-xx}$$

sed $BD = DC$, & $DC = a - \frac{xx}{a} - y$; ergo oritur altera æquatio lo-

$$\frac{aax}{aa-xx} = a - \frac{xx}{a} - y, \text{ videlicet } a^2x = a^3 - 2aax + x^2 - a^2y +$$

axx , quæ æquatio simplicissima est ad curvam quarti gradus. Peccaret Analyſta contra leges Geometricæ ſimplicitatis, ſi problema hac ratione conſtrueret, & in eundem ſcopulum incideret, ſi pro coordinatis curvarum localium eligeret duas ignotas EB , BD , & hac hypothefi adhibita tentaret ſolutionem problematis. Noſtra methodus has difficultates de medio tollit; quando enim in reſolutione ventum eſt ad quantitatem $\frac{xx}{a}$, vel ad aliam $a - \frac{xx}{a}$ ulterius progredi non licet, niſi aſcen-

dendo ad magnitudines ſolidas. Canon itaque generalis ſubit, ut ſci- eundæ ignotæ detur locus, adeoque recta AE , vel ſaltem EC erit $= y$. In hac ſuppoſitione omnia legitimè procedunt, & habetur ſolutio vere Geometrica per duplicem curvam ſecundi gradus, Hæc dicta ſint, ut Analyſtæ innotefcat uſus, & neceſſitas noſtri Canonis generalis; ex hoc enim totius methodi vis, & artifiſcium dependet.

P R O B L E M A II.

*Datis baſe, & perpendicularo, dataque ratione aggregati ex uno latere;
& perpendicularo ad aggregatum ex altero latere & perpendicularo,
reperire triangulum.*

HOc Problema conſulto elegi, utpote jamdudum reſolutum a Renal- dino in ſuo Geometra promoto pag. 52. operoſa præparatione, analyſi, expurgatione, & conſtructione. Noſtra autem methodo ſic pro- blemati ſatiſfacio, nulla adhibita præparatione.

Sit jam factum: & quæſitum triangulum eſto ABC (Fig. 26.) in quo datur baſis $AC = a$, normalis $BD = b$, & ratio $AB + BD$, ad $BC + BD$ data eſt ut r ad s .

Aggregatum ex $AB + BD$ eſto x ; ergo $r : s :: x : \frac{sx}{r}$, quæ ultima quantitas eſt æqualis ſummæ ipſarum BD , & BC ; adeoque $BC = \frac{sx}{r} - b$,
c-

cujusque quadratum $= \frac{s^2 x^2}{r^2} - \frac{2bsx}{r} + b^2$, ex quo si auferas quadratum

$BD = b^2$, erit quadratum $DC = \frac{s^2 x^2}{r^2} - \frac{2bsx}{r}$, & $DC =$ radici hujus

quadrati. Hic nostra analysis sistit; nam si progrediendo supponamus AD esse $= a - \sqrt{\frac{s^2 x^2}{r^2} - \frac{2bsx}{r}}$, & hujus quadratum efformandum sit, ut

additum quadrato DB fiat horum aggregatum æquale quadrato AB , implicatissima redditur æquatio, in qua continentur quantitates irrationales. Igitur $\sqrt{\frac{s^2 x^2}{r^2} - \frac{2bsx}{r}}$ sit $= \gamma$, & $AD = a - \gamma$, quæ facilitatis gratia

non necessitatis vocetur x ; ergo $x^2 + b^2 = x^2 - 2bx + b^2$, seu $x^2 - 2bx = x^2$, qui locus est ad hyperbolam. Altera æquatio erat $\frac{s^2 x^2}{r^2} - \frac{2bsx}{r}$,

qui locus est ad alteram hyperbolam, & per duarum hyperbolarum intersectionem solutum est Problema propositum.

P R O B L E M A III.

Data differentia segmentorum basis, & alterutro angulorum ad basim, datoque rectangulo sub lateribus, reperire triangulum.

SIt jam factum, & questum triangulum sit ABC , in quo datur differentia segmentorum basis AE , angulus BAC , & rectangulum sub lateribus $AB, BC = c^2$. A puncto E ad latus AB intelligatur ducta perpendicularis EF .

In triangulo rectangulo AFE , quoniam AE data est, & datur angulus ad A , datum erit magnitudine dictum triangulum; ergo utraque AF, FE data est. Sit $AF = a$ $EF = b$, & ignota $FB = x$. Quadratum igitur EB , vel BC , erit æquale duobus quadratis FB , & FE . Quod si EB ponatur æqualis secundæ incognitæ γ , ventum erit ad æquationem $b^2 + x^2 = \gamma^2$, qui locus est ad hyperbolam æquilateram. Rectangulum porro ABC , vel ABE erat æquale plano c^2 , & cum AF sit $= a$, $FB = x$, & $BE = \gamma$, erit idem rectangulum $ABE = ay + xy$; Ergo altera oritur æquatio localis $ay + xy = c^2$ ad hyperbolam intra asymptotos. Per intersectionem itaque duarum hyperbolarum Problema solutum est.

Hoc problema, aliaque similia in Astronomicis locum habent, si tamen verum est, quod Cassinus suspicatur, planetas motu suo non describere Ellipsim Apollonianam, sed omnino diversam, in cuius nempe peripheria sumpto da libitum puncto, & ductis ad utrumque polum lineis rectis, harum summa non est ubique eadem, ut in Ellipsi vulgari, sed potius semper constans est rectangulum sub dictis lineis comprehensum.

Deceveram methodum ad solida tantum Problemata hucusque applicatam ad linearia etiam extendere, sed jam nimis in longum dissertatio excurrit. Itaque otio tuo Illustrissime Vir dintius abutendum non est. Quod si tu, alique in Geometrico pulvere exercitati has nugas putent esse aliquid, non dubitabo methodum ipsam usque ad umbelicum perducere.

APPENDIX.

UT datæ fidei satisfiat, methodus, quam superiori dissertatione adumbravi, amplianda est, & quæstionibus magis compositis applicanda, qua data occasione, non solum ostendam, quomodo se gerere debeat Analysta in casibus difficilioribus, sed etiam non inutiles fortasse meditationes adjungam circa naturam, & constitutionem Problematum plusquam solidorum, & locorum linearium. Verum quia nuda præcepta vix intelligi possunt, non erit abs re præceptis exempla conjungere, sumpto initio ab his quæstionibus, quæ ad quintum, aut sextum gradum ascendunt, & primum genus Problematum linearium constituent. Sic igitur propositum.

P R O B L E M A I.

*Data prima, & summa secunda, & sexta in serie sex quantitatum
continue proportionalium, singulas distinguere.*

PRima quantitas nota ex hypothesi vocetur a , aggregatum ex secunda & sexta sit b , secunda vero, quæ ignota est, ponatur $= x$, adeoque sexta erit $= b - x$. Adhibita methodo ordinaria, sic stabit analysis

$$a : x :: \frac{x^2}{a} : \frac{x^3}{a^2} :: \frac{x^4}{a^3} : \frac{x^5}{a^4} = b - x.$$

Nostri methodo, quando perventum est ad magnitudinem $\frac{xx}{a}$ ulte-

rius progredi datum non est, nisi ad quantitatem tertiæ gradus ascendamus,

mus, videlicet ad $\frac{x^2}{a^2}$: loco igitur $\frac{x^2}{a}$ pono secundam incognitam y ,

eruntque proportionales

$$a : x :: y : \frac{y^2}{x}$$

Hic iterum subsistere necesse est, nam si procedat resolutio, in eundem scopulum incidimus. Sit ergo $\frac{y^2}{x} = z$. Fiat ut secunda x ad tertiam

y , ita quarta z ad quintam $\frac{yz}{x}$. Rursus ut tertia y ad quartam z , ita

quinta $\frac{yz}{x}$ ad sextam, nempe $\frac{x^2}{x}$; sed sexta erat etiam $= b - x$; ergo

darur æquatio $z^2 = b - x$, vel $z^2 = bx - x^2$. Ecce ex analysi constru-

tionem.

Quoniam prima æquatio erat $\frac{xx}{a} = y$, qui locus est ad parabola-

lam, sumatur indefinita AH (Fig. 27.), & vertice A, diametro AH, parametro $= a$ descripta intelligatur parabola Apolloniana ACE, & ducta ad AH normali AB, omnes abscissæ AB vocentur x , & omnes applicatæ BC in trilineo parabolico vocentur y . Jam quia altera æquatio erat $\frac{y}{x} = z$, hoc est $y = xz$, seu æquatione in analogisum conversa, $x;$

$y :: y : z$, fiat semper ut AB ad BC, ita BC ad BD, & per punctum D, aliaque simili ratione inventa, transeat curva ADE, in qua ordinatum applicatæ semper erunt $= z$. Ultima vero æquatio $bx - x^2 = z^2$ dat circuli peripheriam ADF descriptam super diametro AF $= b$, quæ curvam ADE secabit in puncto D, & ducta perpendiculari BDC, AB erit secunda, BC tertia, & BD quarta ex quæsitis proportionalibus. Q. E. F.

Scholium primum.

Si loco aggregati ex secunda, & sexta quantitatē, data fuisset ipsarum differentia, in geminam incidissemus æquationem $z^2 - x^2 = bx$, & $x^3 - z^3 = bx$. Prima oritur, quando crescit proportio, secunda quando decrescit, utrique autem satisfact hyperbola æquilatera. Interim non est animus prosequi varios Problematum casus, & determinationes, vel curvarum proprietates; hæc enim extra nostrum sunt institutum.

S 2

Ali-

Aliqua potius tradenda sunt de constitutione locorum linearium, quorum descriptio Mathematicorum semper vexavit ingenia. Contemnenda non est Antiquorum methodus, qui curvarum plusquam solidarum constructionem aggressi sunt per varios linearum rectarum motus certis legibus temperatos, cujus rei illustre exemplum habemus in conchoide Nicomedis: licet autem curvæ simpliciores hac ratione eleganter delineari possint; tamen in magis compositis, & ad altiores gradus pertinentibus ineluctabiles difficultates occurrunt ob multiplicem rectarum combinationem, & nimiam motuum compositionem.

Clarissimus de la Hire locorum linearium generis repetit a sectionibus corporum solidorum; licuti enim ex cono, originem circulo debentis, varia sectione omnia loca solida comparantur, ita supposita descriptione circulerum tertiæ, quartæ & aliarum dimensionum in infinitum, & super his altiorum graduum conoidibus constitutis, loci lineares solidis respondentes derivantur, videlicet infinitæ parabolæ, Ellipses, & hyperbolæ. Interim si nostro instituto aptetur Clariss. Viri hypotheseis, in duobus potissimum deficit. Primo non servantur Geometriæ canones, qui jubent, ut a simplicioribus ad magis composita gradum faciamus: qua ratione autem circulus E. G. quinti gradus sit simplicior parabola, aut hyperbola ejusdem ordinis prorsus non video. Neque respondent, idem absurdum sequi, dum loca solida ex eoni sectione derivantur; nam circulus, qui cono basis est, quamvis habeat æquationem sui constitutivam ad secundum gradum spectantem, & ejusdem generis cum æquationibus localibus sectionum conicarum, tamen ob illius simplicissimam generis in plano, inter locos planos, potius quam solidos jure merito collocatur. Secundo loco certum est, & ab Analysis demonstratum, in sectionibus conicis omnia loca solida contineri, ita ut nulla possit inveniri æquatio tertiæ, aut quartæ dimensionis, quæ per hujusmodi curvarum combinationem non explicetur: At conois gradus superioris quomodocumque secta non exhibet omnes curvas locales ad eundem gradum spectantes; multæ siquidem assignari possunt ab his omnino diversæ, quas doctissimus de la Hire consideravit. E. G. curvæ tertii ordinis, aut gradus in universum numerantur septuaginta duæ, ut patet ex celeberrimi Newtoni opusculo de speciebus, & magnitudine figurarum curvilinearum.

Dominus de Tschirnhausen in libro, qui inscribitur Medicina mentis, curvarum plusquam solidarum descriptionem tentavit per focos, vel umbilicos, qua methodo nihil potuit ingeniosius excogitari; sed optandum esset, ut illam Illustri Auctor universalem redderet, & omnibus curvis aptaret, nam observante Joanne Bernoullio, sæpe in simplicioribus hæret aqua, & nondum con lat, qua ratione per focos delineari possit parabole, quam cubicam secundam vocant, & cujus æquatio localis est $ax^2 = y^2$.

Omitto dictarum curvarum constructionem, quæ sit per motum evolutorium Hughenii, vel per tractorium Leibnitii, vel per reptorium Bernoullii, hi enim motus solum in aliquibus casibus magis compendiosam.

sam solutionem Analystæ subministrant. Interim ad methodum generalem properandum est.

Ego semper regia via incedendum putavi, hoc præmissio axiomate, videlicet curvarum magis compositarum genesis, & constructionem petendam esse a curvis simplicioribus, & depressioris gradus, quarum descriptionem, & originem aliunde notam suppono; quemadmodum enim ex planis loca solida in plano satis apposite derivantur, ita ex solidis deducuntur loci lineares primæ classis, & ex istis lineares secundæ, eodem in infinitum servato operandi modo.

Hanc procedendi rationem numeris omnibus absolutam pronuncio. Primo adeo universalis est, ut nullus dari possit locus plusquam solidus, cujuscumque sit generis, & quacumque labore terminorum affectione, qui tali pacto non determinetur, & construatur. Secundo, loco fundamenti hoc unum postulo, ut concedatur sectiones conicas in plano delineari posse. Hoc posito gradatim progredior, & a facilioribus incipiendo, viam sterno ad difficiliora. Si describenda sit E. G. curva localis ad quintum genus pertinens, id obtineri non potest, nisi præmissa constructione quorundam locorum linearium, qui quintum, & secundum genus, quod est solidorum, interjacent.

Quære quis posset, qua arte obtinere liceat horum linearium descriptionem. Hoc nostra Analysis ignotum esse non finit. Methodus, quæ pluribus quantitatibus ignotis utitur, hoc habet peculiare, ut non solum designet curvam localem inservientem solutioni Problematis propositi, sed etiam illius constructionem opportune doceat, ut ex allato exemplo, & clarius ex sequentibus patet.

Sic curva ADE est parabola, quam cubicam primam vocant Geometræ, hanc vestigiis methodi insistendo per simplicem analogiam ex parabola Apolloniana deduximus, unde hujusmodi curvæ descriptio non ex suppositione, sed ex vi resolutionis inventa est.

Scholium secundum.

Accidit aliquando ultimam æquationem determinantem Problematis solutionem, & quæ in superiori exemplo erat $bx - x^2 = 2^3$, non solum duas quantitates incognitas, sed tres, vel etiam plures continere, quod tamen nullum negotium facessere debet Analystæ, ut constabit ex sequenti Problemate, cujus resolutionem simpliciorum exhibere potuissem, sed malui potius proposito, quam Problemati inservire.

P R O B L E M A II.

Datum arcum in quinque æquales partes dividere :

Si jam factum, & compleatur semicirculus AHG (Fig. 28.), & arcus divisus in quinque partes æquales sit AH. Ducantur lineæ BD, CD, CE, CF, CG, CH, & recta CE ita producatur ad punctum S, ut CD, DI sint inter se æquales. Similiter linea CF producatur in K, ut CE sit ipsi EK æqualis. Eadem ratione CF ponatur æqualis LF, & CG æqualis GM.

Ex præparatione primo patet triângula BCD, DCI, ECK, FCL, GCM esse similia; omnia enim sunt isoscelia ex constructione, & anguli BCD, DCE, & cæter. sunt inter se æquales, ob æquales arcus AD, DE, & cæter.

Patet secundo rectam EI esse æqualem rectæ AC, & FK æqualem DC, quod dicendum est de lineis LG, EC, & MH, FC. Comparentur invicem duo triângula ACD, DIE, in quibus duo latera CD, DA sunt æqualia duobus lateribus ID, DE ex constructione, & insuper angulus ad I æqualis est angulo ACD; ergo dicta triângula sunt similia, & æqualia, igitur latus IE erit æquale lateri AC. Hæc demonstratio cæteris triângulis applicetur.

His præhabitis, sic analysim instituo. Esto $AC = 2a$, adeoque $BC = a$. Sit HC data $= b$, at vero incognita CD ponatur $= x$

Quoniam similia sunt triângula BCD, DCI erit

$$BC : CD :: CD : CI$$

$$a : x :: x : \frac{xx}{a}.$$

Ad vitandum ascensum ad dimensiones solidas, statuatur $CI = \frac{xx}{a}$

$= y$, & cum IE sit $= AC$, hoc est $= 2a$, erit $EC = y - 2a$.

Ob similitudinem triângulorum BCD, ECK, erit

$$BC : CD :: EC : CK.$$

$$a : x :: y - 2a : \frac{xy}{a} - 2x.$$

Sed FK est $= CD$, nempe $= x$; ergo FC erit $= \frac{xy}{a} - 3x$:

Rursus cum similia sint triângula BCD, FCL, erit

BC

$$BC : CD :: FC : CL$$

$$a : x :: \frac{xy}{a} - 3x : \frac{xy}{a} - \frac{3x^2}{a}$$

Putasset minus peritus Analysta quantitatem $\frac{x^2y}{aa} - \frac{3x^2}{a}$ inter soli-

das reponendam, adeoque nova incognita in resolutionem introducta, totius analysis seriem turbasset: sed profecto deciperetur; nam si loco x^2 ponatur suus valor y , prædicta quantitas hanc induit formam $\frac{y^2}{a}$ —

$3y$, & a planorum limitibus non egreditur, quod admonuisse sufficiat.

Sed LG est = EC, hoc est = $y - 2a$; ergo GC erit = $\frac{y^2}{a} - 4y + 2a$.

Hic tertia quantitate incognita in subsidium vocata, ne ad altiores gradus perveniamus, fiat magnitudo $y^2 = 5az$, & per consequens $\frac{y^2}{a} =$

$$4y + 2a \text{ erit} = 5z - 4y + 2a.$$

Tandem quoniam similia sunt triangula BCD, GCM,

$$BC : CD :: GC : CM$$

$$a : x :: 5z - 4y + 2a : \frac{5xz - 4xy}{a} + 2z.$$

Sed MH est = FC scilicet = $\frac{xy}{a} - 3x$; igitur HC erit = $\frac{5xz}{a} +$

$\frac{5xy}{a} + 5x$: sed eadem HC ex hypothesi est = b ; ergo datur æquatio

$\frac{5xz - 5xy}{a} + 5x = b$, & reducta æquatione, assumptaque data c æquali

quintæ parti ipsius b ,

$$ax - ac = xy - xz.$$

In hac æquatione tres ignotæ continentur, hoc tamen non obstante ut desideratam constructionem assequamur, prædicta æquatio convertatur in sequentem analogiam $x : a :: x - c : y - z$.

Quoniam prima æquatio, in qua secunda ignota assumpta est, erat $x^2 = ay$, locus huic æquationi respondens erit ad parabolam. Vertice igitur A (Fig. 29.), & latere recto $= a$ intelligatur descripta parabola vulgaris ABC, & omnes abscissæ in trilineo parabolico, veluti AF, AG, vocentur x , omnes ordinatæ, puta FB, GC, vocentur y . Æquatio autem secunda erat $5ax = y^2$. Vertice A, diametro AL, & parametro $= 5a$ describatur altera parabola AHI, & ex puncto B utrumque accepto in prima parabola agatur linea BH parallela rectæ AG secans secundam parabolam in puncto H, & demissa normali HL, erit semper $HL = BF = y$, & sagitta LA = tertiæ incognitæ z .

Denique ex ultima æquatione deducta est sequens analogia $x : a :: x - c : y - z$. Sit $y - z = q$, & per consequens $y = z + q$. Ex recta AF abscindatur AD $= c$, hoc est $= b$, & ducta concipiatur AK faciens

cum AL angulum semirectum. Fiat semper, ut AF $= x$ ad constantem a , ita DF $= x - c$ ad KM, quæ erit $= q$: sed LK est $= LA = z$, ergo LM erit $= q + z$, videlicet $= y$. His factis, puncto F insitit perpendicularis FN $= LM = y$, & per punctum N, alisque simili modo inventa, transeat curva NCO occurrens parabolæ ABC in puncto C, & demissa normali CG, dico AG esse $=$ quæsitæ x , & sic Problema per locum solidum, & curvam tertii gradus solutum est.

S C H O L I U M.

Quod si quis postularet æquationem localem exprimentem naturam curvæ NCO relatæ ad axem AG, ita procedat. Reassumatur supra exposita proportio $x : a :: x - c : y - z$: loco z pono suum valorem $\frac{y^2}{5a}$; igitur $x : a :: x - c : y - \frac{y^2}{5a}$, & proportionem in aequalitatem

$$\text{mutata, } xy - \frac{xy^2}{5a} = ax - ac, \text{ \& reduc'ta æquatione, } 5axy - xy^2 = 5a^2x$$

$= 5axc$, quam curvam ad tertium gradum pertinere manifestum est.

P R O B L E M A III.

Triangulum isosceles construere, cujus uterque angulus ad basim sit quintuplus anguli ad verticem.

Hujus Problematis resolutio parum differt ab illa, qua in superiori dissertatione usi sumus, dum Eptagonum circulo inscriberemus; hoc exemplum tamen omittendum non erat, ut cognosceret Analysta, quæ ratione debeat a simplicioribus ad magis composita gradum facere.

Sic

Sit igitur jam factum, & quæstum triangulum sit ABC (Fig. 30.) Alteruter angulorum ad basim, puta angulus ABC intelligatur divisus in quinque partes æquales, ductis lineis rectis DB, EB, FB, GB. Ponatur nota CB, vel CA = a , assumantur autem duæ ignotæ quantitates, nempe CE = p , & EB = q .

Quoniam similia sunt triangula ECB, EBF, habent enim angulum ad punctum E communem, & angulos EBF, ECB æquales ex constructione, erit

$$\begin{aligned} \text{LC} : \text{CB} &:: \text{EB} : \text{BF} \\ p &: a :: q : \frac{aq}{p} \end{aligned}$$

Ob eandem rationem

$$\begin{aligned} \text{EC} : \text{EB} &:: \text{DB} : \text{EF} \\ p &: q :: q : \frac{q^2}{p} \end{aligned}$$

$$\text{adeoque FC} = p - \frac{q^2}{p}.$$

Manifestum est, quod iisdem speciebus retentis, ulterius progredi non licet, nisi ascendendo ad gradus superiores. Ex methodo itaque generali novæ incognitæ in resolutione sunt introducendæ. Sit ergo BF = $\frac{aq}{p} = m$, & FC = $p - \frac{q^2}{p} = n$.

Ob similitudinem triangulorum FCB, FBG habentium angulum ad F communem, & angulos FBG, FCB æquales per constructionem, erit

$$\begin{aligned} \text{FC} : \text{CB} &:: \text{BF} : \text{BG} \\ n &: a :: m : \frac{am}{n} \end{aligned}$$

Et ob eandem rationem

$$\begin{aligned} \text{FC} : \text{FB} &:: \text{FB} : \text{FG} \\ n &: m :: m : \frac{m^2}{n} \end{aligned}$$

$$\text{adeoque GC} = n - \frac{mm}{n}.$$

Sed GC est æqualis GB ob angulos æquales GBC, GCB, ergo ventum est ad æquationem $n - \frac{mm}{n} = mn$, vel $an + m^2 = n^2$, qui lo-

cus est ad hyperbolam.

Opere Ricc. Tom. III.

T

Ad

Ad tollendam confusionem præstat huic primæ parti analysis suam constructionem aptare. Quoniam ex superiore æquatione erat $am + m^2 = n^2$, sumpta infinita AK (Fig. 30, 31.) cui ad angulos rectos inlittæ linea KI, & vocatis abscissa HK m , & ordinatim applicata KI n , intelligatur descripta hyperbola æquilatera HI præmissæ æquationi locali respondens. Superest, ut ex datis indeterminatis m , & n investigemus relationem inter p , & q magnitudines ignotas in principio resolutionis assumptas, & hoc pacto describamus curvam localem, cujus omnes sagittæ sint $= p$, & ordinatæ $= q$.

Ex resolutionis progressu erat $BF = m = \frac{aq}{p}$; ergo $\frac{mp}{a} = q$: sed

EF erat $= \frac{q^2}{p}$; ergo loco q^2 posito ipsius valore $\frac{m^2 p^2}{aa}$, erit EF $=$

$\frac{m^2 p}{aa}$: sed CF est $= n$, & CE $= p$; igitur datur æquatio $n + \frac{m^2 p}{a^2} = p$.

vel $aan = aap - m^2 p$, & æquatione in analogisimum conversa,

$$a^2 - m^2 : a^2 :: n : p.$$

Fiat ut quadratum constantis a minus quadrato variabilis HK ad quadratum ejusdem constantis, ita HI ad HM. Et rursus quoniam erat $\frac{aq}{p} = m$, adeoque $a : p :: m : q$, fiat ut nota a ad HK, ita HM

ad MN, & per punctum N, aliaque puncta simili ratione determinata transeat curva HN, cujus coordinatæ sint HM, MN, videlicet p , & q , atque hoc pacto descripta est prima ex curvis localibus necessaria ad perficiendam Problematis constructionem.

Transseamus modo ad secundam resolutionis partem, & ad vitandas quantitates solidas, novis ignotis detur locus, sitque DB, vel AB $= x$, & DC $= y$. Ob similitudinem triangulorum CAB, ABD

$$CA : AB :: AB : AD$$

$$a : x :: x : \frac{xx}{a},$$

atque adeo CD erit $= a - \frac{xx}{a}$; sed eadem CD ex hypothese est $= y$;

ergo perventum est ad æquationem $a - \frac{xx}{a} = y$, qui locus est ad para-

bolam. Abscindatur HP $= a$, & vertice P, diametro PH, & parametrum $= a$ describatur parabola PRT, sumptoque ad libitum in axe puncto Q, & ductis QR, RS, erit QR, vel SH $=$ indeterminatæ x , SR vero, vel HQ $= y$ alteri indeterminatæ.

De:

Deinde existentibus similibus triangulis DCB, DBE.

$$DC : CB :: DB : BE$$

$$y : a :: x : \frac{ax}{y}$$

sed eadem BE est $= q$ ex his, quæ assumpsimus in primo membro resolutionis; ergo data est æquatio $\frac{ax}{y} = q$, & per consequens analogia

$y : a :: x : q$. Fiat semper ut HQ $= y$ ad HP $= a$, ita SH $= x$ ad quartam HO $= q$.

Ob eandem rationem

$$CD : DB :: DB : DE$$

$$y : a :: x : \frac{ax}{y}$$

& ideo CE erit $= y - \frac{ax}{y} = p$ ex prima analysis parte, & æquatione

in analogismum mutata, $y : x :: x : y - p$. Ponatur $y - p = z$; ergo $y - z = p$. Fiat semper ut HQ $= y$ ad HS $= x$, ita eadem HS ad quartam HZ $= z$, & ob id HQ existente y , erit QZ $= y - z = p$. Puncto O insitit normalis ON æqualis QZ, & per punctum N aliaque similiter inventa transeat curva YNX, cujus coordinatæ HO, ON erunt, p & q . Dico hanc curvam esse localem secundam, quæ primam secundo in puncto N Problema determinabit, eritque HO æqualis quæsitæ EB, & ON æqualis EC. Q. E. F.

SCHOLIUM PRIMUM.

Si questio proposita methodo vulgari tractanda sit, ex suppositione, quod linea AC sit $= a$, & AB $= x$, adhibita opportuna specierum substitutione, nisi me calculus decipit, sequens occurret æquatio

$$a - bx^2 + cx^4 - dx^6 + ex^8 - fx^{10} + gx^{12} - bx^{14} + x^{16} = x - ix^3 + jx^5 - lx^7 + x^9.$$

Hujus æquationis constructionem non ita facile inveniet Cartesius Analysta. Quod si tota res absolvenda sit per locos juxta Neothericorum placita, propositam æquationem resolvere in duas æquationes locales quarti gradus, hoc opus, hic labor est. Interim nostra methodus hoc ipsum nullo prorsus labore assequitur, unde ex hoc capite patet, quantum ex dictis Geometricæ Analysis compendium accesserit.

S C H E D I A S M A XIII.

Da analogia inter aequationes analyticas, & potestates logarithmicas.

Mathematicus non infima nota super sequens Problema proposuit invenire numerum y , qui elevatus ad dignitatem quomodocumque affectam a potestatibus sui logarithmi x , & constantibus, faciat productum aequale datae magnitudini.

HAc quaestione mihi communicata, dum illius solutionem tentarem, incidi in speculationem omnino novam, & fortasse non injucundam, qua scilicet deregitur mirabilis profecto armonia, & correspondentia inter potestates logarithmicas, & aequationes analyticas cujuscumque gradus. Veritatem istam Mathematicam, ut pote fecundam, & ad majora viam aperientem, perire non patior, adeoque tuo committendam judicio decrevi Vir Illustriss. & Eruditiss. ut qualiscumque sit meditatio mea tuo probetur, vel improbetur suffragio.

L E M M A P R I M U M.

Sit quicumque numerus y cujus logarithmus x ducatur in quantitatem b , & fiat productum bx , quod consideretur tanquam magnitudo logarithmica: dico numerum huic quantitati logarithmicæ nempe bx , respondentem esse = dignitati y^b . Demonstratio hujus lemmatis pendet ex conceptu multiplicationis & ex genesi logarithmorum. Multiplicare enim x per quantitatem b , nihil aliud est, quam toties sumere magnitudinem x , quoties b continet unitatem. Atqui iterata additio in serie logarithmorum postulat iteratam multiplicationem in progressionem numerorum; igitur numerus y toties in se ipsum multiplicari debet, quoties sumitur ipsius logarithmus x , vel quot sunt unitates in b , & per consequens elevari ad dignitatem, cujus exponens sit b . Q. E. D.

L E M M A S E C U N D U M.

Logarithmus x ascendat ad potestatem quamcumque m , numerus correspondens dignitati logarithmicæ x^m posito quod y sit numerus logarith. x , quod & in sequentibus semper intelligendum, erit $= yx^{m-1}$. Potestas x^m hanc novam inducat formam $x^{m-1}x$, & sit $x^{m-1} = bx$. Per lemma autem superius numerus respondens log. bx est $= y^b$, ergo, si loco quantitatis b ponas suum valorem x^{m-1} , erit yx^{m-1} numerus log. x^m Q. E. D.

LEM:

LEMMA TERTIUM.

Dignitas quæcumque x^m ducatur in quantitatem c , & fiat productum cx^m , quod habeatur pro magnitudine logarithmica: dico numerum huic quantitati respondentem esse yx^{m-1} . Potestas x^m in c est $cx^{m-1}x$, & factò termino $cx^{m-1}=b$ erit dignitas $cx^m=bx$: sed logarith. bx numerus est y^b ; ergo si loco b ponas suum valorem cx^{m-1} , numerus dignitatis logarithmicæ cx^m erit yx^{m-1} . Q. E. D.

SCHOLIUM.

Propositiones conversæ horum Lemmatum non minus veræ sunt. Si proponatur E. G. dignitas logarithmica yx^{m-1} , patet logarithmum huius dignitatis esse cx^m . De cæteris idem esto iudicium.

Ut autem ostendam relationem, & correspondentiam inter dignitates logarith., & æquationes analyticas, sequentia Problemata præpono.

PROBLEMA PRIMUM.

Propositum sit invenire numerum y , qui elevatus ad dignitatem sui logarithmi x faciat productum y^x æquale datæ quantitati b .

Quoniam $y^x=b$; ergo istorum numerorum logarithmi erunt inter se æquales: sed numeri dati b datur logarithmus c , & potestatis y^x logarithmus est xx ex converso secundi Lemmatis; igitur datur æquatio $xx=c$, & assumpta quantitate a loco unitatis, $xx=ac$, adeoque $a:x::x:c$; igitur x est media proportionalis inter a , & c . Q. E. I.

Aliter.

Sit primus numerus in serie numerorum habens unitatem pro logarithmo $=a$ & numerus quæsitus y ponatur $=z^a$: evidens est, quod numeri z^a logarithmus erit $=x$. Quoniam vero numerus z^a elevari debet ad potestatem sui logarithmi, hoc est ad potestatem x , erit facta operatione $=z^{ax}$: sed numeri z^{ax} logarithmus est $=xx$; qui æqualis supponitur c logarithmico numeri b : ergo datur æquatio $xx=c$. Q. E. I.

PROBLEMA SECUNDUM.

Propositum sit elevare numerum y ad quamcumque potestatem sui logarithmi x , puta ad potestatem x^{m-1} , & facere productum $y^{x^{m-1}}$ æquale datæ quantitati b .

Quoniam $y^{x^{m-1}}=b$; ergo eorum logarithmi erunt æquales: sed dignitatis $y^{x^{m-1}}$ logarithmus est $=x^m$, & numeri b dati datus est logarithmus c , ergo ventum est ad æquationem $x^m=c$, & assumpta magnitudine a loco

eo unitatis, $x^m = a^{m-1}c$, & conversa æquatione in analogismum, $a^{m-1} : x^{m-1} :: x : c$. E. Q. I.

Si m ponatur $= 3$, erit $a^1 : x^2 :: x : c$, & per consequens $x^3 = a^2c$, adeque x est prima ex duabus mediis proportionalibus inter unitatem a , & datam quantitatem c . Sit iterum $m = 7$; ergo $a^6 : x^6 :: x : c$ & ob id $x^7 = a^6c$; x igitur est prima ex sex mediis proportionalibus inter a , & c .

Aliter.

Primus numerus in serie numerorum, cui convenit unitas pro logarithmo, sit $= z$, & numerus quæsitus esto z^m , cujus logarithmus $= m$. Ascendat quantitas z^m ad quamcumque potestatem sui logarithmi, E. G. ad potestatem m^2 , & fiat dignitas z^{m^2} , vel quod idem est $z^{m \cdot m}$; logarithmus hujus dignitatis erit $= m^2$ ergo dabitur æquatio $m^2 = c$, & sumpta unitate a evecta ad potestatem n , $m^2 = a^nc$, quæ æquatio est ad tot medias proportionales, quot unitates continet exponens n , & semper magnitudo m erit p^a . in istis mediis proportionalibus.

PROBLEMA TERTIUM.

Propositum sit elevare numerum y ad quamcumque dignitatem, cujus exponens componatur ex pluribus nominibus, & in qua indices potestatum sint quæcumque potestates sui logarithmi x per quasumque quantitates datas quomodocumque multiplicatæ, & oporteat facere hoc productum æquale magnitudini b .

Sit ex præscripto quæstionis E. G. numerus y elevatus ad potestatem $x^{m-1} + x^{n-1} + x^{p-1} + x^{q-1} = b$, & æquatio hanc novam induat formam.

$$y^{x^{m-1}} \cdot y^{x^{n-1}} \cdot y^{x^{p-1}} \cdot y^{x^{q-1}} = b.$$

Assumptis igitur per præmissa lemmata harum quantitatum logarithmis, & signis multiplicationis mutatis in signa additionis (evidens namque est multiplicationi in serie numerorum respondere additionem in serie logarithmorum) altera occurrit æquatio

$$x^m + x^n + x^p + x^q = \log. b = c.$$

Facta autem denominatione in numeris quantitatum generalium m, n, p, q & posito $m = 7, n = 5, p = 3, q = 1$, dabitur æquatio analytica ascendens ad septimum gradum $x^7 + x^5 + x^3 + x = c$. Q. E. I.

Sit altera dignitas $y^{x^{m-1}} + y^{x^{n-1}} + y^{x^{p-1}} + y^{x^{q-1}} = b$ & facta operatione, ut prius, & positis $m = 15, n = 7, p = 5, q = 3$, erit,

$$x^{15} + x^7 + x^5 + x^3 = c.$$

Aliter

Aliter:

Sit x primus numerus in serie numerorum, cujus logarithmus est unitas, & x^n aquet quæsitum numerum y . Elevanda sit x^n ad potestatem $x^n + dx^n$, habebitur $x^n \cdot x^{n+1} \cdot dx^n = x^{n+1} + dx^{n+1}$, cujus numeri logarithmus $x^{n+1} + dx^{n+1} = c$, & positus $m=3$, $n=2$, erit.

$$x^3 + dx^3 = c:$$

Hinc patet correspondentia inter omnes possibiles æquationes analyticas, & dignitates logarithmicas, quod hujus demonstrationis scopus erat.

SCHEDIASMA XIV.

Theoria proportionum per exponentes.

1°. Comparatis inter se duabus magnitudinibus ratione aliqua se invicem respicientibus (rationem autem habere dicuntur ex magnitudines, quæ multiplicatæ se mutuo superare possunt) illud in primis manifestum est, quod prima A erit vel totum, vel pars respectu secundæ B ; & cum relationes inter duas quantitates infinitæ esse possint, unica tantum locum invenit inter magnitudines determinatas A , B , estque modus ille peculiaris, quo fit, ut prima tot vicibus, & non pluribus, aut paucioribus contineat secundam, aut saltem partem aliquam sive finitam, sive infinitesimam secundæ.

2°. Sic numerus 8. bis continet numerum 4, & quatuor vicibus tertiam partem numeri 6, aut octies sextam partem ejusdem numeri 6. Hinc sequitur, quod semper datur aliqua quantitas hujusmodi relationem, sive melius continentiam exprimens, quæ a Geometris vocatur exponent rationis.

3°. Comparentur magnitudines A , & B , & sit m ea quantitas, quæ exponat continentiam ipsius A respectu B : liquet, quod cum quantitas mB eodem modo, ac antecedens A contineat consequens B , idem est scribere A , ac mB , ideoque ratio inter A , & B per exponentem rationis, hoc est per duos terminos mB , & B optime repræsentatur.

4°. Quod si invertatur ratio, & quærat exponentis rationis B : A , vel B : mB (est enim $mB=A$) divide utrumque terminum per m : igitur $B=\frac{A}{m}$, & collocando in ratione B : A , loco B valorem æqualem

$\frac{A}{m}$, exprimetur ratio per magnitudines $\frac{A}{m}$: A , & tunc quantitas $\frac{1}{m}$

erit exponentis rationis B : A .

Exem-

Exemplo rem declaro. Pono $A=8$, $B=4$. In ratione A ad B exponens $\frac{1}{m} = 2$, quia A bis continet B: at in ratione B ad A est exponens $\frac{1}{m} = \frac{1}{2}$, quia B est dimidium ipsius A.

5°. His præhabitis, rationes æquales, ex quibus oritur proportio; sunt earum, quarum exponentes sunt æquales. Sint quatuor magnitudines $A : B :: C : D$ proportionales, hoc est eodem modo A contineat B, ac C continet D: si numerus, vel quantitas m exponit continentiam ipsius A relata ad B; idem numerus, vel quantitas m designabit pariter continentiam ipsius C relata ad D; nam si secus esset, non existentibus hinc inde continentis æqualibus, eadem non esset proportio. Hinc si ex primo primam rationem $A : B$ per terminos æquivalentes $mB : B$, debet quoque exprimere secundam $C : D$ per terminos æquivalentes $mD : D$, eritque $mB : B :: mD : D$.

6°. Sint modo quatuor magnitudines A, B, C, D: exponens rationis inter primas A, B sit m , & inter secundas C, D sit n , offeranturque more nostro sic $mB : B$, $nD : D$.

Ex dictis si $m=n$, dictæ magnitudines erunt proportionales: sed si m sit maior quam n , tunc A magis continet B, quam C contineat D, & in hoc casu dicatur major proportio A ad B, quam C ad D. Si vero quantitas m sit minor quam n , tunc A minus continet B, quam C contineat D; & in isto casu dicatur minor proportio A ad B, quam C ad D.

Ex his principiis fluunt omnes argumentandi modi, quos adhibent Geometræ, & Euclides longo circuitu demonstravit.

7°. In eadem ratione, in qua sunt magnitudines A, B erant eorum æquemultiples nA , nB , vel partes similes $\frac{A}{n}$, $\frac{B}{n}$.

Exponatur ratio A : B per suum exponentem, scribaturque $mB : B$. Jam quoniam $A = mB$, substituendo valorem ipsius A in magnitudinibus nA , $\frac{A}{n}$, erit $nA = m \cdot nB$, & $\frac{A}{n} = \frac{mB}{n}$. Hinc cum rationes $mB : B ::$

$nB : nB$; $\frac{mB}{n} : \frac{B}{n}$ habeant idem exponens m , ita erit

mB , vel $A : B :: m \cdot nB$, vel $nA : nB :: \frac{mB}{n}$ vel $\frac{A}{n} : \frac{B}{n}$. Q: E. D.

Euclides statuit quatuor terminos A : B :: C : D, tunc esse in eadem ratione, quoties auctis eadem multiplicatione antecedentibus, hoc est prima, & tertia quantitate, auctis etiam alia quacumque multiplicatione consequentibus, hoc est secunda, & quarta, semper evenit, ut si multiplex primæ est majus multiplice secundæ, multiplex tertiæ sit etiam majus multiplice quartæ, & si est æquale, aliud sit etiam æquale, & si est minus, sit etiam minus.

8°. Hanc magnitudinum proportionalium affectionem inter Theoremata, non inter axiomata colloco, & sic demonstro. Sint quatuor quantitates proportionales $A : B :: C : D$, vel (n^o 3°.) $m B : B :: mD : D$. Multiplicentur termini antecedentes per quamcumque magnitudinem p , & consequentes per aliam quamcumque q , & sint $pmB : qB :: pmD : qD$. Sit modo pm major quam q ; ergo tam pmB erit major ipsa qB , quam pmD ipsa qD ; nam cum multiplicatio non sit nisi repetita additio, existente A majore quam B , etiam $2A$ major erit quam $2B$, $3A$ quam $3B$, & sic deinceps; igitur etiam factum pA factum pB majus erit.

Sit secundo loco $pm = q$; ergo $pmB = qB$, & $pmD = qD$, æquales enim quantitates multiplicatæ per æquales gignunt producta æqualia.

Sit denique pm minor quam q ; ergo pmB minor quam qB , & pmD minor quam qD , quæ omnia erant demonstranda.

9°. Rursus sint quatuor magnitudines A, B, C, D , & sit exponents rationis $A : B$ quantitas m , & quantitas n sit exponents alterius rationis $C : D$, ponaturque m major, quam n . Sumantur æque multiplices more Euclideo $pmB, qB ; pnD, qD$. Fieri potest, ut ita determinentur magnitudines multiplicantes p , & q , ut sit $pm = q$, & $pn = qD$. In hac hypothese cum sit m major quam n , erit etiam pm major quam pn ; sed $pn = q$; ergo pm major quam q , & pmB major quam qB .

Ex dictis autem constat, quod $A : B$ majorem habet rationem quam $C : D$, cum exponents m rationis $A : B$ supponatur majus exponente n alterius rationis $C : D$; contingere itaque potest, quod sumptis æquemultiplicibus, ut præscribit Euclides, multiplex primæ sit majus multiplice secundæ, & multiplex tertiæ non sit majus multiplice quartæ, sed vel æquale, vel minus, & hoc in casu erit major ratio primæ ad secundam, quam tertiæ ad quartam. Quod si oppositum evenit, minor erit ratio primæ ad secundam, quam tertiæ ad quartam.

10°. Est etiam alia insignis proprietas quantitatum proportionalium, quod factum sub extremis æquale sit facto sub mediis. Sint quatuor magnitudines A, B, C, D , sitque ut $A : B$ ita $C : D$; dico productum ex extremis A in D æquale esse producto sub mediis B in C . Utrobique est eadem ratio; ergo & idem exponents m ; ergo $mB : B :: mD : D$; factum autem tam ex extremis quam ex mediis est mBD ; igitur manifesta est æqualitas.

11°. Dico insuper, quod si duo producta sint æqualia, puta $A.D = B.C$, erit $A : B :: C : D$. Si vera assertio non est, habeat $\neg$. G°. $A : B$ minorem rationem quam $C : D$; ergo datur magnitudo aliqua major ipsa A , quæ ad B habet eandem rationem, quam $C : D$, & hæc magnitudo ponatur $A + N$.

Jam cum ex suppositione sint proportionales $A + N : B :: C : D$; ergo ($n. 10.$) factum sub extremis æquatur facto sub mediis, hoc est $AD + ND = BC$; sed ex hypothese $AD = BC$, ergo $AD + ND = AD$, vel totum parti, quod est absurdum.

12°. Ajo postremo, quod si factum AD sit majus facto BC , erit major ratio $A : B$, quam $C : D$. Quoniam productum AD majus est produ-

cto

Est BC, huic addo aliud productum NC, ut fiat æqualitas $AD = B + N \cdot C$; igitur (n. 11.) $A : B + N :: C : D$; sed A magis continet B , quam $B + N$; ergo major est ratio $A : B$, quam $A : B + N$; sed $A : B + N :: C : D$; ergo major est ratio $A : B$ quam $C : D$.

Et si sit major ratio $A : B$, quam $C : D$, factum AD majus erit factu BC ; & contra si sit minor ratio $A : B$, quam $C : D$, factum AD minus erit factu BC .

Demonstro nunc omnes argumentandi modos a Geometris adhiberi solitos.

Conversa ratio.

13°. Esto $A : B :: C : D$; dico $B : A :: D : C$

Sit m exponents tam rationis $A : B$ quam $C : D$; ergo (n. 4.) $\frac{1}{m}$ erit exponens tam rationis $B : A$, quam $D : C$; igitur æquali existente utrobique exponente, $B : A :: D : C$.

14°. Sit major ratio $A : B$, quam $C : D$; dico quod ratio conversa $B : A$ minor erit, quam $D : C$. Exponents rationis $A : B$ sit m , & rationis $C : D$ sit n ; erit $\frac{1}{m}$ major quam $\frac{1}{n}$, minor quam $\frac{1}{n}$; sed $\frac{1}{m}$ est

exponens rationis $B : A$, & $\frac{1}{n}$ rationis alterius $D : C$, ergo minor est ratio $B : A$, quam $D : C$.

Aliter.

Sit $A : B :: C : D$; erit factum $EC =$ factu AD ; ergo $B : A :: D : C$.

Similiter demonstratur numerus 14. Quoniam major ratio $A : B$, quam $C : D$; ergo factum EC minus quam AD ; ergo minor ratio $B : A$, quam $D : C$ per num. 12.

Alternata seu permutata ratio.

15°. Esto $A : B :: C : D$; erit alternando, vel permutando $A : C :: B : D$; nam cum sit $mB : B :: mD : D$, erit $mB : mD :: B : D$, consule numerum septimum.

16°. Hinc si sit major ratio $A : B$, quam $C : D$, exponents m rationis $A : B$ majus erit exponente n rationis $C : D$; ergo mB magis continet nD , quam B continet D ; ergo permutando major erit ratio $mB : nD$, vel $A : C$, quam $B : D$.

Aliter.

Quoniam est $A : B :: C : D$, ergo $AD = BC = CB$, ergo $A : C :: B : D$.
 Si sit major ratio $A : B$, quam $C : D$; ergo AD major quam CB ;
 ergo major ratio $A : C$, quam $B : D$. (n. 12.)

Compositio rationis.

17°. Sit $A : B :: C : D$; dico componendo ita esse $A + B : B :: C + D : D$.
 Loco A scribe mB , & loco C scribe mD ; ergo

$$\frac{mB + B}{m + 1} : B :: \frac{mD + D}{m + 1} : D, \text{ vel}$$

& cum utrobique sit idem exponens $m + 1$, utrobique erit eadem ratio:
 Sit major ratio $A : B$ quam $C : D$; dico componendo $A + B : B$ majorem habere rationem quam $C + D : D$.

Demonstratio facilis est. In prima ratione exponens est $m + 1$, in secunda $n + 1$, & cum m sit major quam n , etiam $m + 1$ major erit quam $n + 1$; ergo &c.

Aliter.

Si $A : B$ est in eadem ratione cum $C : D$, factum sub extremis æquale erit factum sub mediis; ergo $AD = BC$, & addito hinc inde BD erit $AD + BD = BC + BD$, vel $A + B : D :: B : C + D$; ideoque $A + B : B :: C + D : D$.

Divisio rationis.

18°. Sit $A : B :: C : D$, erit dividendo $A - B : B :: C - D : D$. Exponens utrobique est $m - 1$; ergo &c.

Si major sit ratio $A : B$, quam $C : D$, dividendo erit major ratio $A - B : B$, quam $C - D : D$. Exponens primæ rationis est $m - 1$, secundæ $n - 1$. Porro si m major quam n , etiam $m - 1$ major erit quam $n - 1$.

Aliter.

Quoniam $AD = BC$; ergo $AD - BD = BC - BD$; ergo $A - B : B :: C - D : D$, quæ divisio est rationis.

Quod si AD major est ipsa BC , etiam $AD - BD$ major erit $BC - BD$; ergo major erit ratio $A - B : B$, quam $C - D : D$. Q. E. D.

266

Conversio rationis.

19°. Si sit $A : B :: C : D$, erit per conversionem rationis $A + B : A :: C + D : C$.

Quoniam $A : B :: C : D$, ergo convertendo $B : A :: D : C$, & componendo $B + A : A :: D + C : C$.

20°. Si $A : B$ majorem rationem habuerit, quam $C : D$, per conversionem rationis erit minor ratio $A + B : A$ quam $C + D : C$. Demonstratio est eadem.

Demonstrari quoque potest conversio rationis per exponentes; in analogia enim $A + B : A :: C + D : C$ exponens utrobique est $\frac{m+1}{m}$.

Factum pariter sub extremis est $AC + BC$, & factum sub mediis est $AC + AD$; sed $BC = AD$; ergo $AC + BC = AC + AD$; id est $A + B : C = A : C + D$; ergo ex æqualitate oritur analogia prædicta.

Sequitur, quod si sit $A : B :: C : D$, erit quoque $A - B : A :: C - D : C$, vel $B - A : A :: D - C : C$.

21°. Si fuerit ut tota ad totam, ita ablata ad ablatam, reliqua ad reliquam erit, ut tota ad totam, hoc est sit $A : B :: A - P : B - Q$, erit pariter $A : B :: P : Q$. Demonstratio ex antecedentibus facile deducitur.

Ordinata ratio.

22°. Si fuerit ut $A : B$, ita $P : Q$, & ut $B : C$, ita $Q : R$, erit ex æquo ordinate $A : C :: P : R$.

Disponantur tres magnitudines A, B, C , & alix tres P, Q, R . Sit exponens rationum $A : B :: P : Q$ quantitas m , & sit quantitas n exponens rationum $B : C :: Q : R$; ergo $A = mB$, $P = mQ$, $B = nC$, $Q = nR$; sic ergo stabunt magnitudines $A = mB$, $B = nC$, $C : P = mQ$, $Q = nR$; R , & extremæ ex utraque parte $mB : C :: mQ : R$. Loco B colloca suum valorem nC , & loco Q colloca suum valorem nR ; ergo $mnC : C :: mnR : R$; sed utrobique est idem exponens mn , ergo ultimæ quatuor quantitates sunt proportionales. Sed $mnC = A$, & $mnR = P$; ergo sunt etiam proportionales $A : C :: P : R$. $Q : E : D$.

23°. Si sit major ratio $A : B$, quam $P : Q$, & rursus major ratio $B : C$ quam $Q : R$, erit major ratio $A : C$, quam $P : R$. Quoniam major ratio $A : B$, quam $P : Q$, erit permutando major ratio $A : P$ quam $B : Q$; & quia est major ratio $B : C$, quam $Q : R$, erit etiam permutando major ratio $B : Q$, quam $C : R$; ergo multo major ratio est $A : P$, quam $C : R$; igitur permutando erit major ratio $A : C$, quam $P : R$.

Aliter.

Quoniam proportionales sunt $A : B :: P : Q$, ergo $AQ = PB$. Iterum quoniam proportionales sunt $B : C :: Q : R$, ergo $BR = CQ$, & multiplicando utrumque membrum ultimæ æqualitatis per P , $PLR = PCQ$; sed $PB = AQ$, ergo $AQR = PCQ$, & dividendo per Q , $AR = CP$, ergo $A : C :: P : R$. $Q : E :: D :$.

Perturbata proportio.

24°. Si sint tres magnitudines, & aliæ totidem in eadem ratione perturbata, etiam extremæ proportionales erunt.
 $A, B, C : P, Q, R, S$. Sint tres magnitudines A, B, C , & aliæ totidem P, Q, R in eadem ratione perturbata, hæc est sit $A : B :: Q : R$, & $B : C :: P : Q$; dico $A : C :: P : R$.
 Addatur quantitas S , ita ut sit $B : C :: R : S$ & quoniam $A : B :: Q : R$, & $B : C :: R : S$, erit ex æquo ordinate (num. 23.) $A : C :: Q : S$. Sed $B : C :: P : Q$; $R : S$ ergo permutando, $P : R :: Q : S$; sed $A : C :: Q : S$; igitur $A : C :: P : R$.

Per exponentia proportionis sic.

$A, B, C : P, Q, R$, vel

$mB, B = nC, C : nQ, Q = mR, R$.

Loco B substitue valorem nC , & loco Q valorem mR ; ergo $mnC = A : C :: mR = P : R$; & cum utrobique inveniatur exponents m , patet veritas propositionis.

Aliter.

$A : B :: Q : R$, ergo $AR = BQ$. Rursus quoniam $B : C :: P : Q$, ergo $BQ = CP$; igitur $AR = CP$, ideoque $A : C :: P : R$.

Sit major ratio $A : B$, quam $Q : R$, & major ratio $B : C$, quam $P : Q$; erit major ratio $A : C$, quam $P : R$. AR maior est quam BQ , & BQ major quam CP ; ergo AR multo maior quam CP ; quare patet propositio.

25°. Sit $A : B :: C : D$, sitque $E : B :: F : D$; dico $A + E : B :: C + F : D$.
 Prima analogia convertitur in æqualitatem $AD = BC$, secunda in eam æqualitatem $ED = BF$; ergo $AD + ED = BC + CF$; ergo transeundo ab æqualitate ad alteram analogiam, $A + E :: C + F : D$.

Hæc est propositio 24 Euclidis, sed ex hypotesi nonnullæ aliæ illationes deducuntur.

Quoniam $AD = BC$; ergo $\frac{AD}{C} = B$; & quoniam $ED = BF$, ergo

ED

$FD=3$, ergo $\frac{AD}{F}=\frac{ED}{F}$, vel dividendo per D , $\frac{A}{C}=\frac{E}{F}$; ergo $A:C::E:F$.

Rursum quoniam $AD=BC$, & $ED=BF$, erit $AD-ED=BC-BF$; ergo $A-E::B::C-F::D$.

26°. Sint quatuor magnitudines proportionales $A:B::C:D$, & sit maxima inagnitudo alterutrum antecedens puta C ; dico consequens B esse minimam magnitudinem. Et primo cum sit $C:D::A:B$, & C sit major quam D , erit A major quam B .

Secundo quoniam $C:D::A:B$, erit permutando $C:A::D:B$: sed C major quam A ; ergo D major quam B , ergo B erit omnium minima.

Deinde sit maxima quantitas alterutrum consequens, puta D , antecedens A erit minima: nam convertendo, $D:C::B:A$; ergo patet secunda pars propositionis.

Tandem ajo, quod aggregatum ex maxima, & minima majus est aggregato reliquarum.

Sint proportionales $A+B:C+D::A:C$, sitque $A+B$ maxima, erit C minima. Summa ex maxima, & minima est $A+B+C$. Summa reliquarum est $A+C+D$.

Quoniam $A+B:C+D::A:C$; ergo permutando $A+B:A::C+D:C$, & dividendo, $B:A::D:C$, & permutando, $B:D::A:C$: sed C utpote minima, est minor quam A ; ergo D minor quam B ; igitur $A+B+C$ major quam $A+D+C$. Q. E. D.

De rationum compositione.

Nihil utilius in tota Geometria, quam rationum compositio, & divisio; vix enim demonstratio aliqua majoris momenti absque earum subsidio eleganter perficitur.

27°. Sint magnitudines A, C , inter quas interponatur media quæcumque ad libitum B , & ordine collocentur A, B, C . Quæritur. quomodo ratio primæ A , & tertiæ C exprimi queat per rationes primæ A ad secundam B , & secundæ B ad tertiam C .

Exponens rationis $A:B$ sit m , & rationis $B:C$ sit n , & scribatur $mB, B=nC, C$. Loco B in primo termino substitue valorem nC , & habebimus $mnC=A, nC=B, C$; igitur ratio $A:C$, vel $mnC:C$ constituitur ex exponentibus rationum $A:B$, & $B:C$ in se invicem multiplicatis.

Ratio itaque primæ ad tertiam dicatur composita ex rationibus primæ ad secundam, & secundæ ad tertiam, quia si harum exponentia invicem multiplicentur, componunt exponens rationis primæ ad tertiam.

28°. Datis quocumque quantitativibus sequenti ordine dispositis A, B, C, D, E , &c., ratio primæ ad ultimam componitur ex rationibus omnium mediarum, hoc est sint exponentia rationum $A:B=m, B:C=n, C:D=p, D:E=q$, exponens rationis $A:E$ erit $mnpq$.

Quo-

SCHEDIASMA XV. (*)

*De Organica Curvarum Tractoria, atque Logarithmica Constructione
a Viro Celeberrimo Joanne Poleno inventa.*

JACOBUS RICCATUS JOANNI POLENO.

S. P. D.

Quæ duo a Te excogitata, atque inventa Instrumenta sunt, ut curvas binas, Logarithmicam, & Tractoriam, hodiernæ Geometriæ apprime necessarias, quæque numero censentur Transcendentium Curvarum, mechanice describeres expendi diligenter; mirificeque sum isdem delectatus. Ac quod nostro hoc genere rectissimo æstimantem facere oportet, ut traducat ad periculum, semel ipse iterumque transuli. Re admiratione haud levi, sic inveni: eas lineas inde oriri, & mihi existere, quas utpote natura sua, ac indole obscuras & difficiles, mente dumtaxat, & cogitatione antea perceperam; ita porro clare ac distincto eas describi, ut ne notæ quidem vulgo Coni Sectiones certius in plano, ac luculentius delineari ratione ulla mihi posse videantur. Sed ex rebus omnibus puram simplicemque rationem demiratus sum, qua rem ipsam struis ex proprietatibus earundem Curvarum, quarum altera Tangentem, Subtangentem altera constantem jugiter habet. Ceterum hæc ipsa simplicitas, quæ tantopere adamatur, cum prima existere, & apparere deberet, latens tamen est, detegiturque extrema: quo fit, ut ego putem, in quocumque artificio difficillimum esse videre, ac cernere, quam facile ad exitum proposita res perducatur. Namque post Neperum id insisterunt Mathematici, ut plurimum opera ac studii Logarithmicæ tribuerent, & aliquanto post de Tractoria cogitarunt. Earum proprietates illustrare, atque ad quadraturas, rectificationes, mensuras corporum solidorum, horumque superficiesum usque penetrarunt. At nemo unus adhuc inventus est, qui de organica constructione Curvæ utriusque cogitaverit, aut tanquam Problema aliquod proposuerit. Tu tamen rem investigasti, nobisque eodem tempore felicissime adaperuisti.

Renutus Cartesius, Vir de Mathematicis Scientiis optime meritus, nullam aliam ob causam curvas Transcendentes repulit a Geometria, nisi quod ea ratione illi non occurrerent, qua exprimere Curvarum naturam consuevit analyticis nimirum æquationibus, quas quantitates duæ

Opera Riccati Tomo III.

X

in-

(*) Dopo la lettera del Signor Marchese Poleni al Sig. Jacopo Ermanno stampata in Padova l'anno 1729., che tratta dell' Organica Constructione della Tractoria, e della Logarithmica, leggesi la presente del nostro Aut. &c.

indeterminatæ ingrederentur. Sed hoc haud recte factum ab Renato, qui sic æxistimavit, tam longe porrigi Geometriæ fines, quam itæ methodi regio proferretur.

Mihi præ cæteris Nevvtoni, Viri incomparabilis, sententia probatur. Sic enim ille æxistimabat, ut in Geometria Elementari, seu bina Postulata, assumerebatur ductus rectæ lineæ de puncto ad punctum, atque descriptio circuli ad quodlibet intervallum, ita in sublimiori id contingere, ut Curvarum Constructiones totidem sint Postulata; quæ deinde ad indolem Problematum pertineant; quorum solutio a Mechanica, non a Geometria sit expectanda. Munus est Geometriæ investigare, & expandere Curvarum naturam; ideam illarum exprimere distinctam; idque palam facere, qua ratione progignantur; denique ex earum origine commonstrare, eas non contradicentium numero, sed ejusmodi rerum, quæ fieri possunt, contineri. Ac quamdiu proprietatibus illarum utitur, ut propositis quæstionibus difficilioribus satisfaciat, res versatur ipsa in contemplatione sola: cum vero hinc ad usum operamque rem traducit, Mechanica sæpissime opus est, & iis instrumentis, quæ ad manum pertinent. Porro Mechanica motu opportune uti solet, quem tamen Ars temperet, ac moderetur. Ad Artem vero spectat, adjuncta omnia versare in singulas partes, & expendere vel defectus ipsos materiæ, a qua omnino abstrahit Geometria. Qui trahens pondus aliquod, obligatum fune, arbitrareretur, ea ratione, se describere Tractorium, aut Catenariam, binis clavis funem suspendens, aut Elasticam chalybys flectens laminam; curvarum istiusmodi ob oculos haberet rudem quamdam imaginem: materies enim ad eas curvas perfecte referendas nequaquam est accommodata. Et multa quidem præterea hujusmodi addere possem exempla.

Qui curvarum focis, funiculisque adhibitis, curvas describunt, accuratius rem tractant; dum tamen ne foci multiplicentur, & funiculi, namque si hi friccionibus sint pluribus obnoxii, inæqualiter extenduntur: resque minus procederet, cum infiniti foci essent; & cum funiculum adaptari oporteret alicui curvæ, ut in Evolutis Hugeni. Neque hoc prodest, silarum loco substituere catenulas, cum, curvæ loco, tunc polygonus conformetur.

Mea est igitur sententia, ex omnibus constructionibus mechanicis illas plurimi faciendas, quæ consiciuntur per instrumenta solidis, firmisque regulis formata, in quibus nullus esse locus potest incommodis, quæ commemoravi. Neque quicquam aliud, ut res undique perfecta sit, requiritur, nisi ut organi constructio accurata, ac simplex sit. Ex veteribus autem Nicomedes nobis ejusmodi exemplum reliquit, & quidem præclarum, in Conchoidis constructione, & ex novissimis nonnulla habemus pro aliquibus curvis ex numero analyticarum.

Ad Te autem unum ea jure pertinebit laus, quod curvas Transcendentes (ut ita dicam) indole asperas quodammodo mansuefeceris, deque contemplatione ad operam, ex Geometria ad Mechanicam transuleris. Instrumentis a Te nuper inventis, nihil aut ad rem aptius, aut simplicius potest excogitari.

Quod

Quod ad usum attinet, quis ignorat, Transcendentes quæstiones partem magnam ad Hyperbolæ quadraturam referri, aut ad Logarithmicæ descriptionem? Sint Problemata, aut localia, aut determinata; hoc est sive adhibenda sit integra Curva, aut ejus pars aliqua; vel secari ipsa debeat ab aliqua nota alia curva, ut signari possint quæsitæ puncta: cum Geometra arbitrabatur, se tandem industriæ, & investigationis suæ finem attigisse, sic inveniebat etiamnum circum initia se quodammodo versari. Itaque necesse illi erat approximationum methodis uti; ac vel Series, vel Logarithmorum tabulas adhibere: hacque ratione, Geometriæ cancellis veluti egressus, in fines Arithmeticæ pertransire.

Geometra deinceps usum Logarithmicæ, ac Tractoriæ perinde retinere facile poterit, ac si una usus esset aliqua Coni Sectione, atque, ferme dixi, circulo ipso. Caterum, ut opus tantopere utile omnino perficiatur, sine Tu, ut hoc Ego iniciam, ut tibi ponas etiam ante oculos Curvas, quibus arcuum circularium rectificationes continentur; quemadmodum Cyclois, Linea item sinuum, aut alia quæpiam analogæ, tentando hoc maxime, ut organice describantur. Ita enim fiet, ut Mechanica, & Geometria novo, neque minore, invento adaugeantur. Præstare hæc posse melius Te neminem puto, qui in istiusmodi rebus non contemplandis modo, sed etiam persequendis excelsis. Vale.

Castrofranco X. Kal. Apr. CIOCCXXVIII.

SCHEDIASMA XVI. (*)

Scientia Dynamica Elementa.

CAPUT PRIMUM.

*De legibus virium sollicitantium. **

DE materiæ attributo primario disputent inter se Physici, & Mathematici. Mathematici est eas corporum proprietates contemplari, quæ ex Phænomenis manifestæ sunt.

Quantitas materiæ cujusque corporis, quam massam deinceps vocabimus, est complexus omnium particularum corpus componentium.

Volumen cujusque corporis est spatium a materia corporis occupatum simul cum interpositis poris.

Ex collatione massæ cum volumine resultat corporis densitas, quæ est ratio, quam materiæ quantitas in quolibet corpore habet ad corpus

X 2

* Questo Schediasma era compinto nel 1722., trovandosi nominato in una lettera 10. Marzo 1722. del Conte Giovanni Rizzetti all' Autore.

poris volumen. Ut si corpus in massam poris earentem intelligatur co-
liquatum, eadem massa erit sub minori volumine, & sub majori
densitate.

Raritas est corporum qualitas densitati reciproca consistens in ra-
tione voluminis ad massam, seu materię quantitatem.

Ex hisce definitionibus fluunt sequentia confectaria. Dicantur cor-
pora inter se comparata C, c, eorum massę M, m, volumina V, v,
densitates D, d, raritates R, r.

1. Quantitates materię, seu massę M, m sunt in ratione composita
densitatum D, d, & voluminum V, v; hoc est $M : m :: DU : dv$.
Nam $D = \frac{M}{V}$, & $d = \frac{m}{v}$: ergo $D : d :: M : m$, vel $M : m :: DV : dv$

2. Habebimus ergo $Mdv = mDV$, & mutata æquatione in analo-
giam, $V : v :: Md : mD :: \frac{M}{D} : \frac{m}{d}$, hoc est volumina erunt in ratione

composita directā massarum, & inversa densitatum.

3. Sed densitates sunt reciproce ut raritates, ergo volumina se ha-
bent in ratione composita ex directā massarum, & directā raritatum,
scilicet $V : v :: MR : mr$.

4. $M : m :: \frac{V}{R} : \frac{v}{r}$, seu massę erunt inter se directę ut volumina

& reciproce ut raritates. Reliqua omitto, quę facile ex formula de-
duci possunt.

Motus corporis est translatio ejusdem corporis de loco in locum,
seu successiva applicatio corporis diversis partibus spatii immobilis.

In motu consideratur vis generans, & consideratur vis genita. Pri-
ma vocatur vis mortua, secunda vis viva, vel hæc simpliciter vis, &
illa sollicitatio.

Vis mortua ea est, quę sensibilem effectum non producit, & ex
qua ullus motus actualis non resultat nisi aliquandiu in corpore con-
tinuata, & replicata fuerit. Talis vis foret unicus tantum gravitatis
impulsus, nullis aliis ei succedentibus. Etenim nisi post infinitos denum
gravitatis ictus indefinenter replicatos motus sensibilis gravi non acquiritur.

Ut hæc doctrina clarius intelligatur, considero corpus grave cadens
ex quiete, quod tempore finito acquirit determinatum motum, seu gra-
dum celeritatis. Cum gravitas constanter agat, & mobile transeat per
omnes velocitatis gradus, necesse est, ut primus impulsus gravitatis gra-
dum infinitesimū velocitatis producat, ex quo sequitur, quod si gra-
vitas per ictus repetitos non ageret, non ederet sensibilem effectum.

Vis viva cum motu jam acquisito conjuncta est, & est aggrega-
tum actionum omnium virium mortuarum, quę successive operantur.
Impetus enim corpori communicatus licet minimus, conservatur in cor-
pore, & infiniti impetus simul additi vim vivam constituunt.

Sicut

Sicut ex vi mortua generatur, ut dictum est, vis viva, ita ex viva generatur vis mortua. Fingo pilam data celeritate motam impingere in chordam tensam, & elasticam; manifestum est pilam insciscendo chordam totum suum motum amittere, & rursus chorda sese restitueret, amissum motum pilæ communicari.

Velocitas, quæ consideratur in corpore moto, semper ad tempus refertur, dicimusque corpus illud velocius, quod minori tempore idem spatium pertransit. Hinc si velocitas esset uniformis, se haberet semper directe ut spatium, & inverse ut tempus. Frequentissime tamen velocitas est variabilis, hoc est vel crescens, vel decrescens, & tunc ad uniformem reducenda est. Dico igitur velocitatem percurrere uniformiter spatium infinitesimum.

Sit velocitas variabilis, qua percurratur spatium minimum ds : in principio hujus spatii velocitas erit u , & in fine ejusdem spatii erit $u \pm du$; supponitur enim crescere, vel decrescere: atqui $u \pm du = u$; ergo dictum spatium ds in hac hypothese percurritur velocitate variabili quidem, sed quæ pro uniformi assumi potest.

Quantitas motus mensuratur a massa ducta in velocitatem. Hinc si quantitas motus vocetur q , habebimus $q = mu$.

Axiomata.

Corpus non impeditum perseverat in statu suo, hoc est si quiescit, semper quiescit, nisi ab altero corpore impellatur, & si movetur, semper movebitur eadem velocitate, nisi in alia corpora impingat, quibus communicet motum.

Motus de se fit semper per lineam rectam; nulla enim est ratio, ut corpus sursum, vel deorsum, vel ad dextram, vel ad sinistram deflectat, nisi aliqua vi a recto itinere abducatur.

Corpus moveatur semper per directionem, qua moveri incipit; est enim indifferens ad quamcumque directionem, & per consequens ad aliquam determinari debet a vi impellente.

Actio est semper æqualis, & contraria reactioni. Corpus tantum agit, quantum patitur. In hac lege fundatur vis passiva corporum, quæ venit nomine inertie. Hæc vis in corporibus quiescentibus se satis prodat. Etenim corpus quodcumque A in aliud quiescens B impactum, aliquid de sua vi, & motu amittit. Ex quo patet corpus quiescens B habere aliquam vim passivam superandam a corpore incurrente A: alioquin impellens A post occursum nihil de suo motu amississet. Cum corpus quiescens B, si resistendi facultate careret, alterius motus nullum remoram afferret.

Hæc lex semper præ oculis habenda est, nam hac neglecta peccamus contra sequens axioma. Vis igitur quocumque modo agit, agendo aliqui d amittit de propriis viribus.

Causa est semper proportionalis effectui, neque edere potest effectum se ipsa majorem.

Sol-

Sollicitatio, seu vis mortua, quæ agit per tempus, vel spatium infinitesimum, licet sit variabilis, constanter agit. Confer quæ dicta sunt de velocitate.

De sollicitationibus verticalibus.

THEOREMA PRIMUM.

Si quæcumque vis mortua, vel sollicitatrix dato tempore constanter agat, erit proportionalis quantitati motus, quæ dato tempore generatur. Nam vi manente constante, quo major est massa movenda, eo minor velocitas, & e contra. Insuper positis massa, & tempore constantibus majori vi major velocitas respondet. Demum positis constantibus, tempore, & velocitate, quo major est massa movenda, eo magis requiritur vis motrix. Si hæc secus fuerint, effectus non essent proportionales suis causis, vel sollicitatio per totum tempus non ageret uniformiter, quorum primum absurdum est, secundum vero contra hypothefim.

Hinc sit vis $= f$, tempus $= dt$; per tempus enim infinitesimum quæcumque vis variabilis constanter agit. Sit pariter massa $= m$ & fluxio velocitatis dato tempore dt acquisita $= du$: habebimus semper $fdt = mdu$, ex qua formula omnia Theoremata ad hanc rem pertinentia deduci possunt.

THEOREMA SECUNDUM.

Si corpus velocitate determinata infinitesimo tempore percurrat spatium infinitesimum, semper erit velocitas $u = \frac{ds}{dt}$. Cum enim spatium

minimum ds percurratur, ut dictum est, velocitate uniformi, eo major erit velocitas, quo dictum spatium percurritur minori tempore, & e contra. Igitur velocitas quæcumque variabilis sese habet directe ut fluxio spatii, inverse ut fluxio temporis.

Ex assignata formula collige, spatium servare proportionem compositam velocitatis, & temporis, & tempus se habere directe ut spatium, inverse ut velocitatem.

THEOREMA TERTIUM.

Momentum velocitatis est semper ut vis ducta in elementum spatii directe, & ut massa reciproce. Momentum velocitatis nihil aliud est quam velocitas multiplicata in suum elementum, exprimiturque per factum udu . Erit igitur $\frac{fds}{m} = udu$. Nam cum sit per Theorema primum

fdt

$\frac{fds}{m} = du$, & per secundum $dt = \frac{ds}{u}$, ergo substituendo, $\frac{fds}{m} = du$, vel

$$\frac{fds}{m} = udu. \text{ Q. E. D.}$$

Hæc formula sæcundissima est; multæ siquidem consequentivæ deduci possunt. Unam tantum, quæ frequentissime uiuenerit, non omitam. Quoniam $\frac{fds}{m} = udu$; ergo integrando, neglecta constante, quæ in multis ca-

sibus peculiaribus negligenda non est,

$$\int \frac{fds}{m} = \frac{u^2}{2} \text{ vel } \sqrt{2 \int \frac{fds}{m}} = u: \text{ sed } u = \frac{ds}{dt}; \text{ ergo}$$

$$dt = \frac{ds}{\sqrt{2 \int \frac{fds}{m}}} \text{ \& integrando rursus, } t = \int \frac{ds}{\sqrt{2 \int \frac{fds}{m}}}.$$

S C H O L I O N.

Quæ beneficio specierum inventa sunt, figuris geometricis aptare oportet. Grave A (Fig. 32.) ex puncto quietis A descendat versus centrum B, & in quocumque puncto descensus, puta C, sollicitetur a vi centrali CG, & sit curva FGH scala virium centralium. Vocetur f variabilis GC, & s spatium decurtum AC. Velocitas CD acquisita in puncto C ponatur $= u$, fluxio spatii $Cc = ds$, & fluxio velocitatis $dt = du$. Per Theorema autem tertium invenimus $fds = udu$. (hic cum non varietur massa corporis, quantitas m constans pro unitate assumi potest). Factum fds nihil aliud est quam GC. Cc rectangulum, quod est elementum areæ FACG. Sed $Sfds = \frac{u^2}{2}$; igitur quadratum CD est

semper æquale duplæ areæ CAFG. Hinc si dictæ duplæ areæ facias semper æquale quadratum rectæ CD, & per punctum D, alique similiter inventa transcat curva ADI, hæc est scala velocitatum.

Rursus quoniam $\frac{ds}{u} = dt$, si fiat $\frac{a}{u} = p$ habebimus $pds = dt$: sed

$a = up$; ergo facto rectangulo DCM = constanti a , vel unitati, erit CM = p , & curva MCP erit reciproca curvæ velocitatum. Est autem rectangulum MC. Cc = $pds = dt$. Iterum integrando, $Spds = t$, hoc est area QACM æqualis tempori. Posita demum curva AKN, quæ sit quadratrix curvæ MOP, ita ut ordinata CK sit semper æqualis areæ QACM, curva AKN erit scala temporum, quæ omnia erant invenienda.

EXEM-

EXEMPLUM PRIMUM.

In hypothefi gravitatis constantis curva virium FGH mutatur in lineam rectam ipsi AB parallelam. Integrando itaque formulam, refultat $2fs = uu$, locus ad parabolam ADI, quæ est scala velocitatum.

Iam existente $a = p$, erit $\frac{a}{u} = \frac{pp}{uu}$: sed $u^2 = 2fs$, ergo $a = 2fspp$

ad hyperbolam secundi gradus MOP. Hujus autem hyperbolæ quadratrix AKN, scilicet scala temporum, sic invenitur. Quoniam $\frac{ds}{u} = dt$,

$$\& u = \sqrt{2fs}; \text{ ergo } \frac{ds}{\sqrt{2fs}} = dt, \text{ vel } \frac{fds}{\sqrt{2fs}} = fdt, \& \text{ integrando, } \sqrt{2fs}$$

$$= fs, \text{ vel } \frac{2s}{f} = tt. \text{ Erit igitur curva AKN parabola, \& per conse-}$$

quens tempora erunt inter se, ut velocitates, & tam tempora, quam velocitates in ratione dimidiata spatiorum e quiete decurforum. In nostro casu facilius inveniri potest scala temporum; est enim $fdt = du$, & integrando, $fs = u$; sed $u = \sqrt{2fs}$, ergo &c.

Ex dictis collige tempus, quo spatium quodlibet AC cadendo conficitur, esse ut duplum spatium AC applicatum ad celeritatem CD hoc tempore acquisitam. Nam eum sit $t = \frac{u}{f}$, erit pariter $\frac{t}{fu} = \frac{u^2}{f u^2}$; atque

$$\frac{u^2}{f} = 2fs; \text{ ergo } t = \frac{2s}{u}$$

Addo vim centricam esse semper ut subnormalem in scala velocitatum; est enim $f = \frac{u du}{ds}$ dictæ subnormali.

SCHOLIUM PRIMUM.

Vocentur duorum mobilium massæ M, m; vires, seu gravitatés, seu pondera P, p; spatia cadendo descripta S, s; & tempora descensuum T, t. Ex dictis non omitendo considerationem massarum, erit $PT^2 = 2MS$, & $pt^2 = 2ms$; adeoque si spatia ab ambobus mobilibus diversis temporibus confecta, sunt in duplicata ratione temporum, ut experimenta nos docent, corporum pondera massis erunt proportionalia. Nam $TT : tt :: S : s$, erit $TTs = ttS$, adeoque $PTT = 2MS$ fiet $ttPS = 2MS$, vel $Pts = 2Ms$, hoc est $= \frac{2Ms}{P}$, & omnibus ductis in

P,

$p, pit = \frac{2pMs}{p}$: sed $pit = 2ms$; ergo subrogando, $2ms = \frac{2pMs}{p}$, vel
 $mp = Mp$, scilicet $P: p:: M: m$: hoc est pondera massis proportionalia.

SCHOLIUM SECUNDUM.

Quod si motus a quiete non incipiat, tunc in integrationibus addenda est constans, quod sequenti exemplo declaro. Grave B projiciatur in altum a B versus A. In hoc casu quoniam crescentibus spatiis decursis Bc, BC, BA; velocitas minuitur, cum impetus impressus in puncto B a repetitis ictibus gravitatis paulatim destruat: illud sequitur, quod sumpta tamquam positiva fluxione spatii, fluxio velocitatis negativa est. Habemus igitur in hac specie $fds = udu$, & integrando, $fs = -\frac{u^2}{2} + bb$. Ut determinetur valor constantis bb , observandum, quod

spatio existente $= 0$ in puncto B, velocitas initialis in dicto puncto B est equalis constanti, puta $a = BI$. Deleto igitur in equatione termino fs , remanet $2bb = uu$: sed in nostra hypothese $uu = aa$; ergo $2bb = aa$, & integralis vera sit $fs = -\frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{2}$. Similiter crescente tem-

pore, velocitas minuitur, ideoque habebimus alteram formulam $fds = -du$, & integrando, $fs = -u + b$: sed u existente $= 0$, $u = a$; ergo constans addenda $= a$, & summatoria vera est $fs = -u + a$. Cetera perficiuntur per regulas supra traditas.

EXEMPLUM SECUNDUM.

Sint vires centripetæ, ut distantie a centro, hoc est grave in quocunque puncto D (Fig. 33.) sollicitetur versus centrum B a gravitate variabili, quæ sit semper ut distantia DB: scala virium erit triangulum ABC. Ponatur AB $= a$, spatium percursum AD $= s$, spatium percurrendum DB $= vi$ centrali $= x$. In formula generali $fds = udx$ loco f pone x , & loco ds pone $-dx$; quia crescente cum spatio AD velocitate, spatium DB decrescit. Habebimus igitur $-xdx = udu$, & integrando addita debita constans, $\frac{a^2}{2} - \frac{x^2}{2} = \frac{u^2}{2}$, vel $a^2 - x^2 = u^2$,

qui locus est ad circuli quadrantem AFG, a quo representatur scala velocitatum.

Quoad tempus, $\sqrt{aa-xx} = u$: sed $ds = -\frac{dx}{u} = dt$; ergo $\frac{-dx}{\sqrt{aa-xx}}$

$= dt$. Integratio primi membri, ut notum est, respondet arcui AF; er-
Opere Ricc. T.III. Y go

S C H O L I U M.

Exempla sumpsimus ad Physicam accomodata. Gravitatis constantis hypothesis Galilæana est, & est veluti radix cæterarum omnium: nam præterquamquod hæc lex obtinet in gravibus cadentibus quam proxime ob magnam centri distantiam, certum quoque est vim quancunque variabilem continuo applicatam per spatium infinitesimum agere uniformiter, & constantem esse.

Secunda lex, quæ ponit vires in ratione distantie a centro, a Fermatio primum excogitata, & quam demonstratione munire conatus est non sine principii petitione, deinde a Viviano & a Morellio usurpata, censetur locum habere posse a clarissimo Nevvtono in iis gravibus, quæ occupant spatium a centro telluris usque ad superficiem.

Tertia denique lex obtinet in sistemate Planetario, cum Planetæ, & cometæ hac lege gravitatis ferantur in solem, sicuti etiam planetæ secundarii in primarios.

Consideratis his legibus, addo aliqua de aliis, quæ contradictionem involvunt. Putavit Cærenus celeritates acquisitas in eadem proportionem esse, ac spatia confecta, quo in casu erit $u = s^2$ atqui $u = \frac{ds}{dt}$

ergo $\frac{ds}{dt} = s$, sive $dt = \frac{ds}{s}$ unde $t = \int \frac{ds}{s}$. Jam existente $s = 0$, & lo-

garithmo ipsius $s = \infty$, scilicet infinito, erit $t = \infty$ hoc est infinitum tempus requiritur ad percurrendum initio spatium nullum, adeoque grave ibi perpetuo quiescet. Simili ratiocinio aliæ leges ad examen revocari possunt.

T H E O R E M A Q U A R T U M.

Curva AFD (Fig. 15.) sit scala velocitatum relate ad tempora, hoc est expriment abscissæ AG, AC tempora descensum cujuscumque mobilis & ordinatæ GF, CD velocitates in fine dictorum temporum acquisitas. Idem mobile celeritate variabili, tempore AC percurrat spatium AB, & in puncto B adeptum sit velocitatem CD: dico quod si toto tempore AC grave delatum fuisset velocitate constante CD, percurrisset spatium AM, quod ad spatium AB esset in eadem ratione, ac rectangulum AC. CD ad aream curvilineam AFDC.

Quoniam $ds = udt$; ergo integrando $s = \int udt$, vocato autem spatio AM = S, est $S = \int ut$ supposita velocitate constanti; ergo $S :: t :: ut$: $Sudt$, hoc est ut spatium AB ad spatium AM, ita area AFDC ad rectangulum ACD.

COROLLARIUM.

Sit curva AHI scala temporum relate ad spatia decursa. Tangat recta HL curvam prædictam in quocumque puncto H, erit spatium AK, quod percurritur motu accelerato, & subtangens LK erit spatium, quod grave percurrisset in toto tempore KH, si delatum fuisset ex constante celeritate, quam obtinet in puncto K. Nam per Theorema præmissum $Sudt : ut :: AK = s : KL$; ergo cum sit $Sudt = s$ erit $kL = ut$: sed $u = \frac{ds}{dt}$; ergo $KL = \frac{tds}{dt}$; ergo subtangens curvæ AKI. Q.E.D.

SCHOLIUM PRIMUM.

In hypothefi Galilæana gravitatis constantis curva AHI erit parabola Apolloniana, ideoque subtangens KL duplex abscissæ AK, & spatium confectum celeritate terminali duplum ejus, quod per motum acceleratum conficitur.

In altera hypothefi virium servantium proportionem distantiarum a centro spatia decursa in allatis circumstantiis ut sinus versus AD (Fig. 33.) ad quartam proportionalem post radium, sinum rectum, & arcum AF. In tertia hypothefi (Fig. 34.) ubi scala temporum erat cyclois, prædicta spatia se habebunt ut ordinata in circulo generatore ad ordinatam in cycloide.

SCHOLIUM SECUNDUM.

Hæc satis superque essent ad præsentis materiæ illustrationem, nisi quandoque inter se essent comparandæ vires continue applicatæ, quarum scala nobis ignota est. Ne igitur aqua hæreat, aliquot Theoremata nobis subiicienda sunt.

THEOREMA QUINTUM.

Si scalæ virium centralium sint curvæ similes, & pondera sint massis proportionalia, mobile abscissarum partes similes eodem tempore percurrit.

Ponantur duæ figuræ similes ABC, *abc* (Fig. 36.), & duo mobilia descendant per lineas verticales AB, *ab*; conficiant spatia AB, *ab* temporibus æqualibus. Fiat $AB : ab :: AD : ad$, ita differentia DF ad alteram *df*, & cum velocitates mobilium in punctis D, *d*, sint in ratione dimidiata arearum ADEC, *adec*, & aræ ob figuras similes sint ut quadrata AD, *ad*; igitur velocitates in D, *d* erunt, ut abscissæ, seu ut fluxiones DF, *df*: sed tempora, quibus percurruntur spatia minima DF, *df* sunt ut prædicta spatia divisa per velocitates, seu $T : t :: \frac{DF}{df} : \frac{df}{df}$, quæ

quæ ratio est æqualitas; ergo eodem tempore percurrantur spatia DF, df, & quia tot DF continentur in AB, quot df in ab, spatia AB, ab, vel analogæ quæcumque AD, ad eodem tempore conficiuntur. Q.E.D.

COROLLARIUM.

Si omnes curvæ similes ita disponantur, ut earum origo sit in B, & una ex dictis figuris sit DBH; recta conjungens puncta B, & C transibit per punctum H, & alia similiter determinata. Hinc pars DBH, & cæteræ omnes trianguli ABC erunt similes toti. Triangulum itaque est figura isocrona, hoc est temporibus æqualibus percurruntur abscissæ AB, EB, FB, & præstat per unicam lineam continuam id, quod reliquæ omnes figuræ similes per curvas diversas.

THEOREMA SEXTUM.

Sint duæ curvæ ad eundem axem, & analogæ ad ordinatas, hoc est in curvis BFC, BGD (Fig. 37.) rescissa abscissa AE utcumque, ordinata EF sit ubique ad alteram EG in ratione constante AC:AD. Movetur corpus, cujus massa = m per AB sollicitatum a scala virium ACB, & rursus alterum corpus cujus Massa = M a scala virium ADB. Sint AE = s, EA = as, EF = f, EG = F. Quoniam per notas formulas habemus $f ds = m u du$, $F ds = M V dV$; ergo integrando, $S f ds = \frac{m u^2}{2}$, &

$S F ds = \frac{M V^2}{2}$. Sed areæ ACFE ADGE sunt inter se ut $f : F$; ergo

$$\frac{2f}{m} : \frac{2F}{M} :: u u : V V, \text{ vel } \frac{\sqrt{f}}{\sqrt{m}} : \frac{\sqrt{F}}{\sqrt{M}} :: u : V. \text{ Omitte corollaria, quæ nullo}$$

labore deducuntur ex formula.

Cum autem sit $u = \frac{ds}{dt}$, & $V = \frac{dS}{DT}$, erit $ds : DT :: s : T :: \frac{1}{u} : \frac{1}{V}$

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{f}} : \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{F}} :: \frac{1}{u} : \frac{1}{V}$$

SCHOLIUM.

Hinc solvi potest problema, quod Geometris Italis proposuit Cl. Nicolaus Bernoullius. Quæritur quænam sit curva BGC (Fig. 38.) in qua tempus, quo percurruntur AB, EB, sit ut dignitas virium AC, EG. Circa axem AB describantur ex origine B infinitæ curvæ similes ad libitum, quarum duæ sint BHC, BIF, ductaque recta BC, hæc tran-

transibit per punctum F. Corpus igitur sollicitatum a scalis curvarum similium, eodem tempore per Theorema quintum percutret lineas AB, EB. Producatur EF in G, quærasque ordinata EG ita ut descripta curva BLG ipsi BIF analoga, si mobile acceleretur a viribus, quarum scala sit curva BLG, tempus, quo percurrit totam AB, sit ut data dignitas applicatæ EG.

Per Theorema sextum in curvis analogis $t : T :: \frac{1}{\sqrt{f}} : \frac{1}{\sqrt{F}}$, ex-

istentibus massis constantibus in nostra hypothese; sed tempus t constans, & tempus $T = F^a$; & EF = f ad EB = s in ratione constante, hoc est $f = bs$; ergo $t : F^a :: \frac{1}{\sqrt{bs}} : \frac{1}{\sqrt{F}}$, vel $\frac{t}{\sqrt{F}} = \frac{F^a}{\sqrt{bs}}$, ex quo fit

$$bs = \frac{F^{2n+1}}{t^2}.$$

Si ergo per punctum G, & alia infinita similiter determinata ducatur curva BGC, hæc erit ex familia parabolarum, vel hyperbolarum; ajo curvam BGC esse quæsitam. Nam descripta curva BKF simili ipsi BGC, ex proprietatibus dictarum curvarum erit curva BKF analoga portioni BGM, ut demonstrari facile potest; ergo &c.

THEOREMA SEPTIMUM.

Sint duæ Figuræ ABC, abc (Fig. 39.) analogæ ad abscissas, hoc est sumptis abscissis AD, ad in data proportionem constante, ordinariæ DE, de sint æquales, & reassumpta hypothese superioris Theorematis, erit Sfds : SFDS :: mu^a : MV^a ; sed in nostro casu atque Sfds : SFDS, vel ADE, ade sunt inter se ut s : S, hoc est ut AD : ad, igitur $\frac{\sqrt{s}}{\sqrt{m}} : \frac{\sqrt{S}}{\sqrt{M}} :: u : V$, & cum velocitates sint in temporum ratione reciproca, & directæ spatorum, sive $ds : dS$, erit $\frac{ds}{\sqrt{s}} : \frac{dS}{\sqrt{S}} :: dt : dT$,

& per consequens $\sqrt{ms} : \sqrt{MS} :: t : T$ Q. E. D.

Hujus, & antecedentis Theorematis usus patet, & inservit, dum comparandæ sunt vires, quarum lex nobis ignota est. Observandum etiam doctrinam supra explicatam locum habere non solum in gravibus cadentibus, sed in viribus quibuscumque applicatis, ut sunt pressiones, vires elasticæ, & ceteræ omnes, quæ debent applicari, ut effectum sensibilem producant.

CA.

CAPUT SECUNDUM.

De principio fundamentalis Mechanices.

THEOREMA PRIMUM.

SI sollicitationes quæcumque æquali tempore agentes producant quantitates motus in data ratione, etiam sollicitationes in data ratione erunt. Id patet ex formulis $Sfdt = mu$, $SFdt = MV$; nam cum tempus utrobique ponatur æquale, erit $Sfdt : SFdt :: f : F :: mu : MV$. Si $mu = MV$; igitur $F = f$. Neque quidquam facit utrum sollicitationes sint constantes, vel variables, nam in secundo casu erunt æquales arcus curvarum ipsas repræsentantes, quæ sollicitationum scalæ vocantur.

THEOREMA SECUNDUM.

Ex extremitatibus libræ horizontalis AB (Fig. 40.) cujus jugum sit in puncto C, pendeant duo pondera D, & E, quorum directiones sint parallelæ tendentes ad centrum infinite distans. Sit D. AC = E. BC, hoc est pondera se habeant reciproce, ut distantia a fulcro : dico pondera prædicta manere in æquilibrio.

Ponderi E superadde pondus infinitesimum p, & descendat brachium libræ CB per spatium infinitesimum Bb, ascendente altero brachio CA per spatium infinitesimum Aa. In hac hypotesi habebimus motum inassignabilem, quia destruetur æquilibrium, & cum tempora descensus per Bb, & ascensus per Aa sint æqualia, sollicitationes erunt inter se ut quantitates motus, hoc est ut massa E ducta in velocitatem, qua percurritur fluxio Bb ad massam D ducta in velocitatem, qua percurritur fluxio Aa : sed ex una parte pondera sunt ut massæ, & velocitates ut arcus nascentes Bb, Aa, hoc est ut distantia CB, CA, & producta D. AC, & E. CB sunt æqualia; ergo & sollicitationes erunt æquales. Neutra igitur alteram prævalebit, & libra perseverabit in æquilibrio.

S C H O L I U M.

Allatæ principii demonstrationem deduxit Archimedes ex centro gravitatis, ponderibus hinc inde dispositis, assumendo, quod pondera æqualia eodem modo gravitent, ac si conjuncta essent in centro gravitatis. Verum in hoc discursu adest petitio principii; centrum enim gravitatis illud est, quod corpus dividit in partes æqualium momentorum.

At Galilæus, & qui hunc sequuti sunt, fingunt per impossibile grave E describere arcum inassignabilem Bb, & grave D per arcum similem Aa ascendere; postquam autem demonstrarunt quantitates motus esse æquales, rem ad absurdum deducunt, supponendo vires vivas esse ut quantitates motus, hoc est æquales. Hoc autem, ut supra demonstravimus, falsum est.

Quan-

Quantitates motus non sunt ut vires vivæ, sed ut vires mortuæ, seu sollicitationes, & manifestum est æquilibrium fieri non a viribus vivis, quæ numquam cum æquilibrio stare possunt, sed cum mortuis, a quarum æqualitate dependet æquilibrium.

Hoc adeo verum est, ut pars gravitatis, quæ impenditur in generatione vis vivæ, nullo modo gravitet, ac premat, alioquin causa non responderet effectui, cum eadem sollicitatio ad duplicem effectum in solidum extenderetur. Placet autem veritatem hanc rigorosa demonstratione evincere. Sit

THEOREMA TERTIUM.

Sit libra AB (Fig. 41.), cujus jugum C. Ex puncto A pondeat grave D, & ex puncto E altera libra FH, cujus jugum E cum ponderibus appendis G, & I. Sint omnia in æquilibrio, hoc est pondera G, I sint æquilibrata circa punctum suspensionis E; & tota libra FH cum suis ponderibus æquipondium cum gravi D constituat in libra AB. Removeatur grave I, & suspendatur puncto K, ita ut in lance FH tollatur æquilibrium, descendente pondere I, vel LM, & ascendente pondere G: dico quod turbatur æquilibrium alterius lance AB, & quod onus D necessario descendit.

Cum pondera G, I in punctis FH, stent æquilibrata, eundem conatum efficiunt respectu gravis D, ac si utrumque penderet ex jugo E. Supponimus enim virgas librarum esse lineas geometricas nullo modo ponderantes. Jam cum grave I translatum in M L suspenditur ex puncto K tollitur, ut dictum est, æquilibrium, quod ut restituitur, fiat ut distantia KE ad distantiam EF; ita pondus G ad pondus L; & cum pondus M sit illud, quod æquilibrium destruit, sustineatur a potentia P. His positis, G & L ita sunt disposita respectu ponderis D, ac si conjuncta penderent ex puncto E. Sed ad constituendum æquilibrium cum pondere D, suspendi debent ex ipso tria pondera G, L, M; ergo duo G, L minora sunt; quam quæ necessaria sint ad æquilibrium faciendum cum onere D; ergo pondus D præponderabit, & descendet.

COROLLARIUM.

Remota potentia P, quæ impedit descensum gravis ML, & est æqualis, & contraria gravi M, est ab hac petenda vis sollicitationis ad descensum. Grave igitur M dum actu descendit, nullo modo gravitat.

COROLLARIUM II.

Hinc vera est clarissimi Leibnitii doctrina pluvium descendente per aerem nullo modo gravitare in Barometrum, quamquam ad explicanda Barometri Phenomena non sufficiat. Quantitas enim aquæ, quæ actu descendit, comparari non potest cum ascensu Mercurii, ut in eodem computum manifestum sit.

THEO-

THEOREMA QUARTUM:

Corpus per duas diversiones impulsu percurrit diametrum parallelogrammi, cujus latera vires repræsentant.

Corpus quodcumque A (Fig. 41.) impulsu a data vi agente per directionem AB versus B percurrat dato tempore velocitate AB spatium AB, deinde impulsu ab altera secundum directionem AC pertranseat eodem tempore spatium AC velocitate AC: sunt enim spatia eodem tempore percursa, ut velocitates constantes, quibus percurruntur. Perficiatur Parallelogrammum AD, & eodem tempore, hoc est eodem instante, corpus A impellatur a præfatis viribus duabus: dico tempore æquali percurrere diagonalem AD.

Finge corpus A transferri a linea AB, quæ sibi ipsi sit semper parallela velocitate AC, & motu proprio velocitate AB incedere per dictam lineam. Quo tempore linea AB acquisivit positionem *ab*, corpus A per ipsam incedens, dimenso jam spatio AB, reperietur in E puncto Diagonalis AD, & cum id verificetur de omnibus aliis punctis, revera corpus semper fuit in dicta diametro, atque illam determinato tempore debuisset percurrere. Q. E. D.

COROLLARIUM PRIMUM:

Quod si angulus ABD (Fig. 43.) sit rectus, & parallelogrammum transeat in rectangulum, tunc gemine vires corpori A impressæ, prima juxta directionem AC, altera juxta directionem AB, prima horizontalis, & altera verticalis, cum nullo modo contrariæ sint, nulla datur reactio opposita actioni, & cum corpus A ab utraque impellatur eodem tempore, utraque perseverare debet in dicto corpore, cum fertur per diametrum AD. Vis igitur corporis A lati per AD æqualis est viribus simul sumptis duorum corporum æqualium, quorum primum eodem tempore incederet per AB, secundum per AC.

Sit horum corporum massa = m , vis primi per AD = F, vis secundi per AB = f , vis per AC = ff ; ergo $mf + mff = mF$, vel $f + ff = F$.

Hujusmodi autem vires non possunt esse æquales, si exprimantur per quantitates motus, hoc est in casu nostro per velocitates, massis existentibus æqualibus. Nam cum velocitates per spatia exprimantur æqualibus temporibus decursa, hoc est per rectas AD, AB, AC, evidens est summam rectarum AB + AC non æquari diagonali AD.

Hujusmodi æqualitas obtineri non potest, nisi prædictæ vires vivæ exprimantur per velocitatum quadrata, tunc enim $f + ff = F$; nam $u^2 + VV^2 = V^2$.

Cujuscumque igitur corporis vis viva proportionalis est massæ ductæ in quadratum velocitatis, quod est principium Dynamicum Leibnizii.

tianum, de quo in sequentibus redibit sermo. Quæ cum ita sint, manifestus redditur error Galilæi in demonstratione Theorematis fundamentalis. Confer Scholium ad Theorema secundum.

COROLLARIUM II.

Quod si angulus ABD (Fig. 42.) sit acutus, ex puncto A demitte normalem AF. Cum vis per AB æqualis sit viribus per AF, BF, mobile A percurrendo rectam AB idem præstat, ac si dum incedit per AF velocitate AF, linea AF moveatur super FB velocitate FB: sed mobile A fertur etiam versus C celeritate AC, cui contraria est velocitas FB ab F versus B; ergo deductis deducendis, revera corpus A non fertur versus partes DC, nisi velocitate FD, & versus lineam FD, nisi velocitate AF. Percurrit autem diagonalem AD, cujus quadratum duobus quadratis AF, FD æquale est. Igitur ex hoc dicta in antecedente corollario confirmantur.

COROLLARIUM III.

In hoc casu, ut vidimus, velocitates in parte se elidunt, ac destruant. At si angulus ABD esset obtusus, tunc essent conspirantes, & se mutuo adjuvarent, ut demonstrari facile potest. Quod autem demittitur a contrariis, a conspirantibus restituitur: unde sequitur vim corporis moti velocitate AD, plus vim corporis moti velocitate BC æqualem esse viribus quatuor corporum, quorum duo moveantur celeritate AB, & duo velocitate AC. Verum enim est, & Geometris notum duo quadrata diagonalium AD, BC æqualia esse quattuor quadratis laterum parallelogrammi.

SCHOLIUM.

A viribus vivis transeamus ad mortuas. Si mobile sollicitetur a duabus sollicitationibus AC, AB juxta directiones a prædictis lineis determinatas, idem omnino præstabit, ac si sollicitetur ab unica sollicitatione AD agente per directionem AD, non quia ejusmodi sollicitationes sint æquales, neque tempore infinitesimo æqualem producant motus quantitatem, sed quia quocumque impulsu, licet minimo, sollicitationes laterales æqualem vim vivam corpori imprimunt, ac diagonalis, quod facile eruitur, si velocitates genitæ tempore inassignabili eandem proportionem servant, ac sollicitationes ipsæ, hoc est linearum AC, AB, AD. Nam etiam in hoc casu vis infinitesima nascentis erit, ut quadratum velocitatum minimarum nascentium, & per consequens locum habent corollaria supra explicata.

CAPUT TERTIUM.

De centro gravitatis.

CENTRUM gravitatis illud est, ex quo si intelligatur grave suspendi a filo aliquo, nullo modo movetur, sed quiescit. Linea igitur suspensionis est veluti jugum in libra, circa quod partes corporis sunt in æquilibrio, & hinc inde exercent momenta æqualia. Sit corpus quodcumque ABC (Fig. 44.), cujus centrum gravitatis D, & linea verticalis suspensionis transiens per dictum centrum sit EDF; pars corporis AGH ex uno latere lineæ AF erit in æquilibrio cum parte corporis BGHC ex altero latere ejusdem lineæ verticalis.

Hinc centrum gravitatis semper affectat locum infimum; congruere enim debet cum linea verticali suspensionis: aliter cum partes non sint æquilibratæ, quæ majus momentum exercet, attollet contrariam, & descendet usquequo centrum gravitatis ad infimum locum perveniat.

Cum vero grave quodcumque constituitur in statu manente, ut loqui amant Mechanici, hoc est quiescit, signum est centrum gravitatis ad locum infimum descendisse, quod tamen intelligendum dum fieri potest; nam aliquando descendere requirit ob indifferentiam.

Putabat Borellius, quod si sphaera AC (Fig. 45.) cujus superior medietas esset plumbea, inferior lignea, descendendo per lineam verticalem GH volvi circa centrum E Figuræ, ut centrum gravitatis F, quod in emisphaerio superiori locatum esset, ad locum infimum tendere posset. At cum nulla sit ratio, quæ determinet punctum F, ut potius inclinetur versus A, quam versus C, aut quancumque aliam plagam, mathematice loquendo, dum pila descendit versus centrum gravium, nullo modo centrum gravitatis deferet locum superiorem.

Sed hujusmodi meditationes sunt altioris indaginis, transeamus ad faciliora.

THEOREMA.

Sint data quæcumque corpora, seu melius puncta gravia A, B, C, D, (Fig. 46.), quæ referantur ad planum quodcumque *ad*, & sit omnium centrum gravitatis E. A dictis punctis gravibus, & ab eorum centro gravitatis ducantur in dictum planum normales *aA*, *bB*, *cC*, *dD*, *eE*: dico, quod si ponatur $A + B + C + D = M$, erit $A. Aa + B. Bb + C. Cc + D. Dd = M. Ee$. Per punctum E, hoc est centrum gravitatis, ducatur planum *za zd* plano *ad* parallelum. Cum in recta *za zd* sit centrum gravitatis E, hoc est axis æquilibrii respectu ponderum A, B, C, D; ergo per principium fundamentale Mechanices $A. Aza + C. Czc - B. Bzb - D. Dz d = 0$. Similiter cum recta *Ee* transiens per gravitatis centrum E sit alter axis æquilibrii, $A. ae +$

Z z

B. be

B. $be - C. ce - D. de = 0$. Iterum quia $Aa = a_1a - A_1a = Ee - A_2a$; $Bb = Ee + B_2b$; $Cc = Ee - C_2c$; $Dd = Ee + D_2d$, erit $A. Aa + B. Bb + C. Cc + D. Dd = A. Ee - A. A_2a + B. Ee + B. B_2b + C. Ee - C. C_2c + D. Ee + D. D_2d$. Atqui $- A. A_2a + B. B_2b - C. C_2c + D. D_2d = 0$; igitur subductis hisce terminis, remanet $A. Aa + B. Bb + C. Cc + D. Dd = A. Ee + B. Ee + C. Ee + D. Ee = A + B + C + D. Ee = M. Ee$ ex hypotefi: Q. E. D.

COROLLARIUM I.

Si aliqua puncta gravia, vel corpora sita essent infra planum ad , & aliquot supra dictum planum; tunc si distantie inferiores spectantur tamquam positivæ, superiores afficientur signo negativo. Cæterum signis mutatis, Theorema verum est.

COROLLARIUM II.

Si omnia corpora A, B, C, D sunt æqualia, omnes eorum distantie a linea ad , erunt multipulum distantie centri gravitatis E ab eadem linea secundum ponderum numerum, & in casu primi corollarii computandi sunt excessus ob signa partim affirmativa, partim negativa.

SCHOLIUM I.

Facile demonstrari potest, quod si directiones gravium tendant ad centrum infinite distans, & sint parallelæ, unicum datur in unoquoque corpore centrum gravitatis. Duorum ponderum A, B (Fig. 47.), ut brevitati consulam, sit centrum gravitatis E: non solum verificatur propositio superior respectu plani ab , sed etiam alterius quomodocumque inclinati CF; sunt enim, similia triangula CAG, DEH, FBI: ex quo fit, quod signato centro gravitatis in corpore, ad quodcumque planum, vel lineam suspensionis referatur, si directiones punctorum gravium sint parallelæ, partes hinc inde a plano suspensionis sunt æqualium momentorum.

SCHOLIUM II.

Hinc demonstratur regula Guldini a Pappo indicata; nempe figuram solidam ex rotatione cujuslibet figuræ planæ circa rectam positionem datam oriundam æquati producto ex figura genitrice in viam centri gravitatis. Pono ordinatam $CE = y$ (Fig. 48.) fluxionem $Ce = dx$, distantiam $GF = a$, figuram genitricem $ABD = f$, solidum ab illa ge-

ni-

nitum in rotatione circa AD $= s$, ejus elementum $= ds$. Quibus positis, per nostram propositionem erit $af =$ summæ omnium momentorum partium, seu punctorum gravium componentium figuram f . Elementi areæ, hoc est rectanguli $Ee = ydx$ centrum gravitatis distat a re-
cta AD per dimidium EC, hoc est $\frac{y}{2}$; ergo ejus momentum $= \frac{y^2 dx}{2}$;

ergo $af = \int \frac{y^2 dx}{2}$, & ductis omnibus in p notam circumferentiæ, pas

$= \int \frac{py^2 dx}{2}$: sed pa est periphæria radii GF, & py circumferentia radii

CE, & $\frac{py^2}{2}$ circulus ex radio CE; ergo $\frac{py^2 dx}{2} =$ cylindro inscripto iq

solido rotundo; ergo $\int \frac{py^2 dx}{2} = s$; ergo tandem $pas = s$. Q. E. D.

Ob similem rationem si punctum F sit centrum gravitatis non spatii ABD, sed curvæ AB, superficies genita ex rotatione curvæ AB circa axem motus AD æqualis est rectangulo ex curva AB in viam rotationis puncti F. Notandum tamen hanc regulam Guldini locum invenire in corporibus uniformiter, non autem disformiter gravibus.

S C H O L I U M III

Hinc ortum habent formulæ, quarum ope centra gravitatis inve-
niuntur. Si F sit centrum areæ ABD, habebimus distantiam GF, hoc

est $a = \frac{\int y^2 dx}{\int y dx}$. Distantia porro FH $= b = \frac{\int \frac{1}{2} x^2 dy}{\int x dy}$, & cum utro-

bique area ABD $= \int y dx = \int x dy$, posito quod DC sit $= x$, erit GF: FH, ut solidum ex figura ABD circa axem AD ad solidum ex eadem figura circa DB. Similiter si sit F centrum gravitatis curvæ AB, erit

FG $= a = \frac{\int y ds}{s}$: est autem curva AE $= s$, ejus elementum $Ee = ds$;

Centra gravitatis conoidum, eorumque superficierum inveniuntur deteg-
minando centra gravitatis spatiorum analogorum.

Regula Guldini obtinet etiam in motibus, ubi centra, vel axes rotationis mutantur; semper enim vel solidum, vel superficies genita æqualia sunt figuris, vel curvis ductis in viam rotationis. Id explico, adducto Theoremate Leibnitiano.

Sit curva quæcumque ACB (Fig. 49.), ejus centrum gravitatis G. Evolvatur curva more Hugheniano per suas tangentes, ac generet figuram AMD, centrumque gravitatis curvæ in actu evolutionis incedat per curvam GFg. Sint duæ tangentes MN, *mn* proximæ. Centra gravitatis harum tangentium sint puncta media E, *e*. Centrum gravitatis curvæ BN + rectæ NM sit F; curvæ autem Bn + rectæ *nm* sit f; rectæ EF, *ef* concurrant in puncto H.

Demonstrat Varignonius, quod MN. E *e* = MN + NB. Ff = ACNB. Ffi ergo per calculum summatorum area ABD = rectangulo ex ACB. GFg.

Consule de centro gravitatis Varignonium laudatum in actis Academicæ regiz Parisiensis anni 1714.

CAPUT QUARTUM.

De Pendulis.

THEOREMA I.

GRAVE quodcumque descendat prius per lineam verticalem AB (Fig. 50.), deinde per planum inclinatum AC, & sit linea quæcumque horizonti parallela EF: Dico primo in punctis E, F velocitates esse æquales. Linea verticalis FD exprimat vim absolutam gravitatis, ejusque directionem ad centrum infinite distans, & sit DI normalis ad rectam AC; manifestum est vim FD resolvi in vires ID, FI, quarum prima cum sit plano inclinato perpendicularis, tota insumitur in ejusdem plani compressionem, altera vero FI juxta directionem plani ea est, quæ grave ad motum sollicitat per dictum planum declive. Sunt autem vires acceleratrices FD, FI semper constantes, & uniformiter urgentes mobile, incipientes a puncto quietis A; ergo velocitatum quadrata utrobique se habebunt, ut factum ex vi sollicitante in spatium decursum, hoc est $V^2 : u^2 :: FD. AE : FI. AF$: sed ob similitudinem triangulorum AEF, FID, FD : FI :: AF : AE, vel FD. AE = FI. AF; ergo $VV = uu$, vel $u = V$. Q. E. D.

Quoad tempus: cum velocitates per elementa Ee, FH sint æquales, ex formula $dt = ndt$ evincitur, tempus, quo percurritur fluxio Ee, vel Ef,

Ff, ad tempus, quo percurritur fluxio *FH*, esse ut *Ff*: *FH* :: *EA*: *AF*, in qua ratione constat pariter esse tempora integra, quibus percurruntur spatia *AE*, *AF*; *AB*, *AC*. Q. E. D.

COROLLARIUM.

Ex puncto *E* duc ad rectam *AC* normalem *EK*: illud sequitur; quod spatia *AE*, *AK* æqualibus temporibus percurrantur. Cum enim tempus per *AE* ad tempus per *AF* sit, ut *AE* ad *AF*, tempus vero per *AF* ad tempus per *AK* in ratione dimidiata *FA*: *KA*, hoc est in ratione simplici *FA*: *AE*; ergo tempus per *AE* ad tempus per *AK*, ut *AE*: *AE*, hoc est in ratione æqualitatis.

COROLLARIUM II.

Ob angulum rectum ad punctum *K* idem punctum erit in circumferentia semicirculi, cujus diameter *AE*, unde ducta a puncto *A* quacunque chorda pertingente ad peripheriam, tempora per diametrum *AE*, & per dictam chordam sunt semper æqualia, quod invenit Galileus.

THEOREMA II.

Feratur mobile *A* (Fig. 51.) per duo plana inclinata *AB*, *BC*: dico mobile non inchoare motum descensus in primo puncto *B* secundi plani ea velocitate, quam acquisiverat in puncto ultimo *B* primi plani post descensum acceleratum per integram *AB*. Velocitas acquisita in puncto *B* ex casu per *AB* exprimatur per eandem *AB*, & producta *CB* ad partes *E* cadat ex puncto *A* ad *CE* normalis *AE*. Velocitas *AB* resolvitur in duas velocitates *AE*, *EB*, quarum prima, cum sit plano *EBC* perpendicularis, tota infumitur in compressionem dicti plani, & a plani reactione destruitur; altera vero *EB* juxta directionem plani *BC*, cum a nulla vi contraria destruat, tota perseverat. Mobile igitur incipit moveri in plano *BC* non celeritate *AB*, sed solum celeritate *EB*, determinata ut supra. Q. E. D.

COROLLARIUM.

Ex puncto *E* duc ad *AB* normalem *EF*: mobile ea velocitate inchoat motum in plano inferiore *BC*, ac si descendisset ex puncto quietis *F*, non ex puncto quietis *A*, & eandem velocitatem haberet in puncto *B*, quam habet, & postulat casus per *FB*, non autem per integram *AB*. Reliqua velocitas, quæ mobili erat acquisita, amittitur, dum planum subiectum comprimit, & percutit. Hinc protracta *AB* in *H* usque ad horizontalem *DC*, si mobile motum suum continuasset per planum *ABH* in puncto *H*, eandem velocitatem acquisivisset, ac si cecidisset per verticalem *AD*. Et percurrendo successive per duo plana inclinata *AB*,

AB, BC, in puncto C majorem celeritatem non adipiscitur, quam si descendisset per verticalem FG. Velocitas autem per FG ad velocitatem per AD se habet in ratione dimidiata ipsius FG ad AD. Hæc omnia satis manifesta sunt. Cum enim EB sit media proportionalis inter AB, & BF, si velocitas terminalis acquisita in descensu per AB exprimitur per eandem AB, velocitas terminalis acquisita in descensu per FB exprimitur per EB: sed per eandem EB exprimitur velocitas, qua mobile incipit moveri in plano inferiore BC; ergo &c.

COROLLARIUM II.

Si angulus ABC rectus esset, & secundum planum BC normaliter plano AB insisteret, tunc tota velocitas periret, & insumeretur in percussione. Id intelligo, existente corpore non elastico; nam si elasticum esset reflexionem pateretur. Similiter in positione planorum ABC, dum corpus elasticum transit ab uno in aliud planum, aliquam reflexionem patitur, & saltum efficit. Moveretur itaque in aere per parabolam, & rursus secundam percussione efficit, mox per alterum saltum tertiam percussione, & sic deinceps, usquequo totus motus reflexionis amittatur, & mobile incedat tangendo planum declive. Hæc circumstantia tamen non facit, quod in puncto C non acquirat velocitatem supra determinatam.

COROLLARIUM III.

Si angulus EBA esset infinite acutus, & angulus ABC a duobus rectis quam minime distans, superest inquirendum, quid inde sequatur. Erit in hoc casu tam EA, quam EF infinitesima primi gradus ob finitas EB, BA; ergo FA infinitesima secundi gradus. Nam BF: FE:: FE: FA. Sublimitates igitur descensus non differunt, nisi per secundam differentiam.

COROLLARIUM IV.

Hinc si essent infinita plana se mutuo succedentia, ita ut anguli inclinationis ab invicem differrent per angulos infinitesimos, quod contingit in curvis, in quibus sunt minimi anguli contactuum, in transitu ab uno plano in aliud minuitur sublimitas descensus per secundam fluxionem, quæ infinites repetita primam fluxionem æquat. Perveniunt igitur duo gravia æqualia ad eandem horizontalem BC (Fig. 52.), & unum descendat per verticalem AB, alterum per curvam AC, velocitates in punctis B, & C erunt æquales. Nam grave descendens per curvam, eandem acquirit velocitatem, ac si cecidisset ex sublimitate DB: sublimitas autem DB differt a sublimitate AB per infinitas infinitesimas secundi gradus, quæ simul junctæ, & in unam summam collectæ constituunt AD infinitesimam primi gradus. Velocitates ergo utrobique se habebunt, vocando AB x , ut $\sqrt{x} : \sqrt{x-4x}$, hoc est æquales, quod erat demonstrandum.

THEO-

THEOREMA III.

Descendat grave in hypothefi gravitatis constantis per curvam quaecumque BCD (Fig. 53.), & gravitas absoluta mobilis exponatur per constantem CG. Ducta tangente C c F, ex puncto G demittatur ad dictam tangentem normalis GF. Quoniam vis CG resolvitur in vires CF, FG, quarum secunda nihil facit ad motum, cum fit normalis ad curvam, & tota infumitur, vel in gravitando curvam, vel in distensionem fili AC in pendulis; illud sequitur, quod vis CF sit illa, a qua mobile per curvam acceleratur, & quam deinceps vocabimus vim tangentialem: sed $CG : CF :: Cc :: co$; ergo vocando vim $CF = f$, $CG = a$, Cc elementum curvæ $= ds$, co elementum abscissæ $= dx$, habebimus $f = \frac{adx}{ds}$.

COROLLARIUM I.

Si curva BCD sit quadrans circuli, & exponatur vis constans CG per radium AC, erit ordinata EC $=$ vi tangentiali FC. Unde circulus ipse est relate ad se ipsum scala virium tangentialium accelerantium.

COROLLARIUM II.

Porro velocitas in quacumque curva est semper in ratione dimidiata sublimitatis AE.

COROLLARIUM III.

Cum sit $f = \frac{adx}{ds}$, vel $ds = \frac{adx}{f}$ & sit $ds = udt$, habebimus $dt = \frac{adx}{fu}$, & integrando, $t = \int \frac{adx}{fu}$; utraque autem f , & u data est per x , ut docuimus.

THEOREMA IV.

In duobus pendulis oscillantibus in vacuo AB, AD, (Fig. 55.) & arcus similes describentibus sint vires absolutæ f , F, in qua ratione cum sint tangentiales, ut ob similitudinem triangulorum manifestum fit, perinde est utrum usurpentur tangentiales, vel absolutæ, dum motus pendulorum circularium inter se comparantur. Sint massæ corporum m
A a M, &

M, & longitudines pendulorum AB, a , AD, A: quæro quænam relatio intercedat inter velocitates, & tempora oscillationum. Pono arcus minimos $Gg = dt$, $Hh = dS$.

Quoniam si vires sollicitantes pendula, ducantur in elementa spætorum dimensorum, producta æqualia sunt factò ex momentis velocitatibus in massam, igitur $fds = mdu$; $FDS = MVDV$; ergo $fds : FDS ::$

$mdu : MVDV$, & integrando, $\int fds : \int FDS :: mu^2 : MV^2$: sed $Gg = ds : Hh = dS :: AG = a : AH = A$; igitur $fa : FA :: mu^2 : MV^2$; vel $fa : FA :: u^2 : V^2$.

Jam cum sit $u = \frac{ds}{dt}$, & $V = \frac{dS}{dT}$, facta horum valorum substitutione, ponendo etiam loco ds , dS proportionales a , A ; $\frac{fa}{m} : \frac{FA}{M} ::$

$\frac{a^2}{dt^2} : \frac{A^2}{dT^2}$: unde fit $\frac{am}{f} : \frac{AM}{F} :: dt^2 : dT^2$, vel $\frac{\sqrt{am}}{\sqrt{f}} : \frac{\sqrt{AM}}{\sqrt{F}} :: dt :$

$dT :: t : T$; nam cum sint in assignata ratione tempora infinitesima, quibus percurruntur spatia minima Gg , Hh , in eadem ratione erunt tempora integra, quibus conficiuntur arcus similes quicumque BG , DH , BC , DE . Quod erat inveniendum.

C O R O L L A R I A.

1°. Tempora oscillationum pendulorum diversorum sunt ex formula assignata in composita ratione ex subduplicata massarum, & longitudinum pendulorum directe, & subduplicata itidem, sed inversa ponderum.

2°. Si longitudines pendulorum sint æquales, hoc est $a = A$, erit

$$\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{f}} : \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{F}} :: t : T.$$

3°. Si $t = T$; ergo $\frac{am}{f} = \frac{AM}{F}$ vel $a : A :: \frac{f}{m} : \frac{F}{M}$, hoc est pen-

dula sunt isocrona, quando pondera divisa per massas sunt in eadem ratione, ac longitudine.

4°. Quod si massæ sint æquales, isocronismus servatur, dum vires sunt inter se, ut longitudines pendulorum, & si æquales vires, in eadem hypothesi longitudines debent esse in massarum ratione inversa.

5°. Si

5°. Si sollicitationes; quibus pendula agitantur; id est vires, & pondera sint proportionalia longitudinibus pendulorum, tempora erunt in ratione dimidiata massarum; tunc enim $\sqrt{m} : \sqrt{M} :: t : T$.

6°. Cum autem sint numeri oscillationum in ratione inversa temporum, hoc est $t : T :: \frac{1}{n} : \frac{1}{N}$ hinc alia corollaria deduci possunt; tot

enim sunt, ex quibus tot Theoremata confici possunt, quot sunt combinationes specierum $a, A; f, F, m, M; t, T; n, N$, a quibus repræsentantur longitudines, massæ, pondera, tempora, & numeri oscillationum.

SCHOLIUM I.

Attendendum potius est ad phænomena, quæ in pendulis communibus observantur. Si pendula sint æqualis longitudinis semper erunt isocrona, licet ipsis appendantur non solum æqualia pondera, sed inæqualia, nec tantum ex eadem materia confecta, sed etiam ex diversa, ut si glans unius penduli sit aurea, & alterius lignea, vel plumbea. In huiusmodi pendulis machinæ Boyleanæ inclusis, ubi minima est aeris extenuati resistentia, oscillationes sunt perfectæ isocronæ, si fiant per arcus æquales; adeo ut in mille vibrationibus vix notari possit dimidiæ oscillationis differentia. In aere libero resistentia mediæ aliquid operatur, & turbat isocronismum. Notandum tamen, quod pendula demitti debent ex æqualibus altitudinibus; nam per arcus inæquales in circulo descensus non sunt æque diuturni. His positis, in nostra for-

mula $\frac{\sqrt{am}}{\sqrt{f}} : \frac{\sqrt{AM}}{\sqrt{F}} :: t : T$ habebimus $t = T$, & $a = A$; ergo

$\frac{m}{f} = \frac{M}{F}$, hoc est $f : F :: m : M$. Erunt igitur vires, seu pondera massarum

sint proportionalia, quod alibi ex descensu verticali gravium demonstratum est, & nunc confirmatur ex oscillationibus pendulorum.

Quæ cum ita sint, erit in formula generali ad pendula communia applicata $\frac{m}{f} = \frac{M}{F}$; ergo $\sqrt{a} : \sqrt{A} :: t : T$, hoc est tempora in ra-

tione dimidiata longitudinum, quod comprobatur experientia; si enim comparentur inter se duo pendula, quorum secundum sit primi quadruplum in longitudine, tempora oscillationum erunt in ratione dupla.

Hoc fundamentale principium innumeras Physicorum hypothesen evertit. Mirari non defino confidentiam, qua Philosophi minimis particulis corpora præsertim fluida componentibus peculiare figuras assignant. Sic atomi aquæ cylindricæ sunt, vel sphericæ, at illæ, ex quibus argentum vivum componitur, sunt minimæ sphaeroides ellipticæ. Sal marinum constat ex cubis, & reliqua sælia figuras sortita sunt determinatas, & regulares. Verum si huiusmodi hypothesi conferatur cum his, quæ demonstrata sunt, statim falsitatis arguetur. Si aqua constaret ex sphaeris, cum cubus ad sphaeram inscriptam sit quam proxime in ratione binarii ad unitatem, sequeretur nullum corpus in natura dari, cuius gravitas specifica esset plus quam dupla gravitatis aquæ in specie, quod est contra experientiam. Sed de his dicta sint satis.

P R O B L E M A.

Invenire pendulum isochronum in hypothesi gravitatis constantis.

Quæstio huc redit, ut determinetur curva, per quam pendulum oscillando quascunque vibrationes, sive magnas, sive parvas eodem tempore perficiat.

Sit jam factum, & curva quæsitæ sit BCD. (Fig. 53., & 54.). Gravitas mobilis in quocunque puncto C, cum sit constans, & tendat ad centrum infinite distans, exprimitur per constantem GC axi AD parallelam: vis tangentialis, qua mobile urgetur uniformiter per elementum Cc curvæ, erit CF, quæ determinatur, ut jam dictum est, ducta tangente CF, & demissa ex puncto G normali GF.

His positis curva BCD extendatur in rectam verticalem b_2Cd , & sit $BC = b_2C$, & $2C_2c = Cc$. Ponatur ordinata $2C_2F = CF$, hoc est vi tangentiali curvæ in puncto C, & per punctum $2F$, aliaque similiter determinata transeat curva d_2F_2G , quæ sit scala virium sollicitantium mobile per rectam bd . In primis manifestum est pendulum descendere per curvam BCD, vel per quancunque ejus portionem CD eodem prorsus tempore, quo mobile percurrit rectam bd , vel ejus partem $2Cd = CD$.

Cum enim tam spatiosa Cc, $2C_2c$, quam vires acceleratrices CF, $2C_2F$ sint utrobique æquales, manifestum est tempora minima per Cc, $2C_2c$ esse æqualia, quod cum verificetur in singulis elementis arcus CD, & abscissæ $2Cd$, evidens quoque est tempora integra per CD, $2Cd$ esse æqualia. Idem demonstrabimus de descensu penduli per arcum quemcumque KD, & mobilis per rectam æqualem kd . Interim Problematis conditio postulat, ut tempora descensus per arcus BD, CD, KD, vel per

per verticales bd , $2Cd$, kd &c. sint æqualia; ergo per ea, quæ sunt alibi demonstrata, hæc conditio impleri non potest, nisi scala virium sollicitantium mobile per verticalem bd sit triangulum, & curva $d2F2G$ transeat in lineam rectam, tunc enim tempora descensuum per bd , $2Cd$, kd sunt æqualia; ergo $2Cd: 2C2F:: DC: CF$ in ratione constante.

Sit itaque arcus $DC = s$, ejus elementum $Cc = ds$, vis substantialis $FC = bs$, utpote quæ debeat esse ad arcum in ratione constante, gravitas absoluta $CG = a$, elementum abscissæ De , hoc est $Ee = dx$. Ob similitudinem triangulorum GCF , $Cc e$, erit $GC = a: CF = bs :: Cc = ds: Ce = dx$; ergo $\frac{adx}{b} = ds$, quæ est æquatio

differentialis ad Cycloidem.

COROLLARIUM:

Si ponatur CG constans = duplo diametro circuli genitoris Cycloidis, hoc est gravitas absoluta exprimitur per duplum ejusdem diametri, vis tangentialis CF erit ubique arcui cycloidico CD æqualis.

CAPUT QUINTUM.

De Trajectoriis descriptis a viribus centralibus in vacuo.

Ardum tractionem aggredimur, quam tamen ad aliquas faciliores formulas adducere tentabimus, nonnullis præmissis Theorematis.

THEOREMA I.

Sint duo gravia æqualia, quorum primum descendat versus B (Fig. 56.) per lineam rectam AB sollicitatum a viribus centralibus, quarum scala sit curva CG ; alterum feratur per trajectoriam AF hac lege, ut ex centro B ductis quibuscumque arcibus circularibus EF , ef secantibus trajectoriam in punctis F, f , mobile in puncto F , vel f sollicitetur versus centrum B vi EG , vel eg : dico utrumque grave, tam illud descendens per rectam AE , quam illud, quod fertur per curvam AF , in punctis analogis $E, F; e, f$ habere velocitates æquales.

Incipiant moveri dicta mobilia in punctis E, F velocitate impressa æquali, & mobile, quod fertur per lineam rectam, sollicitetur per minimum spatium Ee a vi centripeta EG : aliud vero describens arcum infinitesimum Ff a vi tangentiali FI ; nam posita $FK = EG$, si ex puncto K ad tangentem FI demittas normalem KI , vis centralis FK resolvitur in vires IK, FI , quarum prima utpote perpendicularis ad curvam trahit grave a tangente versus curvam, altera juxta directionem tangentis illud accelerat.

Jam

Jam ob triacula similia, $KF:FI::Ff:FH$, vel Ee ; ergo $KF:FH=EG:Ee=FI:Ff$. sed $GE.Ee$ = momento velocitatis in e , & $IF.FE$ = momento velocitatis in f ; ergo dicta momenta, hoc est velocitates in e, f sunt æquales. Et quoniam id semper verificatur, sumptis in recta AB , & curva AFK duobus aliis elementis analogis, sequitur in quibuscumque punctis analogis velocitates esse æquales. Quod E. D.

COROLLARIUM.

Ex Theoremate præmissio prima deducitur formula. Cum enim in motu rectilineo sit semper — $fds = vdu$, & velocitas etiam in motu curvilineo sit eadem, atque insuper sit $Ee = FH$, habebimus pariter vim centram ductam in elementum ordinatæ FH æqualem momento velocitatis mobilis in quocumque puncto F curvæ; ergo $2aa = 2Sfd$ = u^2 , ponendo $FH = ds$.

THEOREMA II.

Describat grave, cujus vis centripeta tendat ad centrum B (Fig. 57. quamcumque trajectoriam AFK : dico tempus per arcum curvæ AF esse semper proportionale spatio ABF . Postquam mobile pervenit ad punctum F curvæ, habet velocitatem acquisitam, per quam tempore infinitesimo percurrat uniformiter curvæ arcum Ff : si dictum mobile a nulla vi centrali afficeretur, motum suum continuaret per tangentem Ff productam, & secundo instanti primo æquali percurreret spatium $fI = Ff$: sed vis centripeta urget grave per directionem Ii , quæ cum centro ipso concurrat, versus quod grave impellit, & ob angulum infinitesimum FBI est etiam parallela rectæ BF ; ergo mobile per legem virium centripetarum fertur per elementum curvæ fi , & in fine secundi instantis reperitur in puncto i .

Jam rectæ infinitesimæ æquales Ff, fI exponunt duo momenta æqualia, & cum sint etiam æqualia duo triacula FBf, FBI , & triangulum fBI sit æquale triangulo fBi , quod semper verificatur, veritas Theorematis manifesta est.

COROLLARIA.

I. Hinc profluit altera formula; si enim elementum temporis, quo percurritur arcus infinitesimus Ff , vocetur dt , sit autem $Bf = s$, & arcus minimus $fH = dz$, habebimus $sdx = dt$.

II. Est autem tempus ut elementum Ff directe, & velocitas inverse, ponendo $Ff = dvv$; $dt = \frac{dvv}{u}$; ergo $sdx = \frac{dvv}{u}$, quæ est tertia

formula.

III Sit

III. Sit FL normalis ad curvam, ad quam ex centro B demittatur perpendicularis BL: habebimus ob similitudinem triangulorum FfH, FBL (si statuatur FL = p) BF = s : FL = p : Ff = dvv : fH = dx; ergo $sdz = pdvv$, & in formula corollarii secundi $sdz = \frac{dvv}{u}$,

collocando loco sdz suum valorem $pdvv$, erit $pdvv = \frac{dvv}{u}$, hoc est

$p = \frac{1}{u}$. Est igitur semper normalis FL reciproce ut velocitas, quæ

est quarta formula.

IV. Sit radius osculator MF, & centrum osculi M, a quo ad ordinatam FB demittatur normalis MN, erit FN subosculatrix, seu co-radius, sitque FN = q; per ea, quæ dicta sunt in problemate inverso radiorum osculatorum, $\frac{ds}{q} = \frac{dp}{p}$: sed $ds = -\frac{udu}{f}$, & $\frac{dp}{p} = -\frac{du}{u}$

ab æquatione $p = \frac{1}{u}$; ergo factis substitutionibus, $\frac{udu}{fq} = \frac{du}{u}$, seu u^2

= fq. Velocitas igitur semper est media proportionalis inter vim centralem, & co-radius, quæ est quinta formula.

V. Quoniam $u^2 = fq$, vel $\frac{ds}{q} = \frac{fds}{u^2}$, & $\frac{ds}{q} = \frac{dp}{p}$; ergo $\frac{u^2 dp}{p} = fds$: sed $u^2 = \frac{1}{pp}$; ergo $\frac{dp}{p^3} = fds$, quæ est sexta formula. Hæc etiam

formula deduci potest ex prima $fds = udu$; nam cum sit $u = \frac{1}{p}$ & du

= $-\frac{dp}{pp}$, erit $-udu = \frac{dp}{p^3} = fds$.

S C H O L I U M.

Ex prædictis formulis nullo negotio deducere possumus æquationem trajectory expressam per secundas differentias. Sed præstabit formulam ipsam differentio-differentialem ex aliis principiis deducere. Sit trajectory KCH (Fig. 38.), centrum virium A, & sit mobile in puncto C. Sumatur arcus infinitesimus CF, sitque CE tangens curvam, quæ tangens ab ordinata AF producta secetur in E. Centro A intervallo AC describatur arcus minimus CB, & centro C intervallo CF alter arcus minimus FD, deinde sint rectæ CG, FG normales ad curvam in punctis C, F, quæ concurrant in puncto G, & sit GC, vel FG radius osculator. Hæc

Hac præparatione facta manifestum est interceptam EF esse spatium, quod mobile percurrit sollicitatum a vi centrali, eo tempore nempe dt , quo percurreret tangentem CE, ex quo fit, quod revera percurrat arcum CF. Jam velocitas, qua percurritur linea EF est fdt , hoc est ut vis ducta in tempus, & est etiam ut EF directe, & ut tempus inverse; ergo $fdt = \frac{EF}{dt}$; vel $f = \frac{EF}{dt^2}$; sed GC, r : CF, dvv :

$$:: CF, dvv: DF = \frac{dvv^2}{r}, \text{ \& rursus } BG, dz: CF, dvv:: DF, \frac{dvv^2}{r} :$$

$$FE = \frac{dvv^2}{rdz} \text{ igitur substituendo, } f = \frac{dvv^2}{rdzdt^2}. \text{ Verum cum tempora sint}$$

in ratione arearum, habebimus $dt = \frac{sdz}{v}$, posita nempe AC = s ; ergo $f = \frac{dvv^2}{rs^2dz^2}$. Interea quia valor radii osculatoris, sumptis pro constan-

tibus CB= dz , vel CF= dvv , vel BF= ds , est respective $\frac{sdvv^2}{dvv^2dz - sdzdds}$;

vel $\frac{sdzdvv}{dz^2 - sdds}$, vel tandem $\frac{sdvv^2}{dzdvv^2 + sdsdz}$; hinc factis operationibus,

& opportunis substitutionibus, erit $f = \frac{dvv^2 - sdds}{s^2dz^2}$, vel $f =$

$\frac{dvv^2dz^2 - sdvv^2dds}{s^2dz^4}$, vel $f = \frac{dzdvv^2 + sdsdz}{s^2dz^3}$. Jactis his fundamentis;

placet aliquot necessaria Problemata addere.

PROBLEMA I.

Determinare leges virium centralium in circulo.

Circa clavum fixum in puncto A (Fig. 59.) rotatur grave aliquod alligatum filo AB, & describat circumferentiam BCD motu æquabili. Vocetur ut moris est vis centrifuga, seu conatus, quem mobile exercet, ut recedat a peripheria circuli per tangentem, vocetur inquam f , cui semper æqualis est, & contraria vis, qua retinetur in dicta circumferentia. Hac scilicet grave tentat extendere cordam, quam suppono infinite rigidam. Voco u velocitatem actualem mobilis per circumferentiam, & sit radius AB = r , circumferentia = cr , tempus unius integri circuitus sit t . Ergo habebimus $\frac{cr}{t} = u$, & hæc est prima formula.

u

Deinde sumamus alteram formulam ex corollario quarto, hoc est $fq = u^2$, sed cum in circulo tam radius osculator, quam subosculator coincident cum semidiametro AB, erit $fr = u^2$.

De-

Denique idem grave, ut acquirat velocitatem u , quam habet dum agitur per circumferentiam BCD, debeat descendendo verticaliter ex puncto quietis H percurrere lineam verticalem HI, & in puncto I moveatur prædicta velocitate u . Vocetur altitudo HI, a , gravitas communis, g ; ideoque $2ga = u^2$.

Ex inventarum formularum combinatione sequitur primum $fr = u^2 = 2ga$, & ponendo $r = 2a$, erit $f = g$, hoc est si mobile revolvatur ea velocitate, quam acquisivisset cadendo dimidii radii ex altitudine, conatus centrifugus gravitati æqualis est: & generaliter conatus centrifugus est ad gravitatem, ut dupla HI ad radium AB.

2°. Cum sit $fr = u^2$, & $u = \frac{cr}{t}$, vel simpliciter $\frac{c}{t}$ ponendo $c =$

circumferentiæ radii AB; ergo $fr = \frac{c^2}{t^2}$, vel $\frac{c^2}{fr} = t^2$, hoc est $\frac{c}{\sqrt{f}\sqrt{r}}$

$= t$, & ponendo r loco unitatis, erit tempus ut arcus directæ, vel integra circumferentia, & inverse ut radix conatus centrifugi. Reliquæ habentur ex formulis.

SCHOLIUM.

Comparemus conatus centrifugos mobilium, qui circulos diversos describunt, & lineæ minusculæ designent in uno circulo, quod in alio majusculæ. Sit igitur $fr = u^2$, $FR = V^2$, $\frac{c}{t} = u$, $\frac{C}{T} = V$, $\frac{c}{\sqrt{f}\sqrt{r}}$

$$= t, \quad \frac{C}{\sqrt{F}\sqrt{R}} = T:$$

I. Sint velocitates æquales; ergo $fr = FR$; & conatus centrifugi in ratione inverse radiorum, seu distantiarum a centro, hoc est $f: F:: R: r$; deinde ob $\frac{c}{t} = \frac{C}{T}$, $c: C:: t: T$; sed $c: C:: r: R$; ergo tempora

ut distantiarum, hoc est in ratione virium inversa:

II. Sint velocitates in quacunque ratione distantiarum, hoc est $u = r^m$, $V = R^m$: habebimus $fr: FR:: r^{2m}: R^{2m}$, vel $f: F:: r^{2m-1}: R^{2m-1}$. Si igitur velocitates sint ut distantiarum, & sit $m = 1$, vires erunt ut eadem distantiarum. Et si velocitates sint in ratione inversa dimidiata distantiarum, hoc est $m = -\frac{1}{2}$, vires erunt inter se in ratione reci-

proca duplicata distantiarum; habebimus enim $f: F:: r^{-1}: R^{-1}$. In
Opere Ricc. Tom. III. B b hac

hac hypothesi tempora erunt in ratione sesquuplicata distantiarum; & in hoc consistit celebre Theorema Repleri pro motibus cælestibus. Nam cum $c : t :: C : T$, vel $u : R :: s : T$, hoc est $rr : RR :: s^2 : T^2$, &

$$\frac{u}{u} : \frac{R}{R} :: \frac{s}{s} : \frac{T}{T}$$

$$u^2 = fr, V^2 = FR; \text{ ergo } \frac{r}{f} : R :: s^2 : T^2; \text{ sed } f = \frac{1}{rr}, \text{ \& } F = \frac{1}{RR}$$

igitur $r^3 : R^3 :: s^2 : T^2$.

III. Si tempora periodica sint æqualia, conatus centrifugi erunt ut distantiz. Reliqua prætereo, quæ ex formulis facile deducuntur.

PROBLEMA II.

Invenire vim centralem cujuscumque mobilis datam trajectoriam in vacuo describentis.

VEL æquatio differentialis curvæ data est relate ad focum, hoc est ad centrum virium, vel solum data est relate ad axem.

In primo casu res est facilis, siue utamur formula secundas differentias involvente, siue adhibeamus formulas continentes tantum primas differentias. Exemplum dabimus in utraque hypothesi.

EXEMPLUM I.

Sit Logarithmica spiralis, cujus æquatio sit $adx = bds$, hoc est sit CB: BF (Fig. 58.) in ratione constante: erit semper triangulum minimum specie datum, & $CF = dw = cds = bdx$. Jam sumpta pro constanti dx , habebimus $bdds = 0$. In formula igitur $f = \frac{dw^2 - sdds}{s^3 dx^2}$

deleatur terminus $-sdds = 0$, & loco dw^2 collocetur valor $b bdx^2$: habebimus valorem $f = \frac{bh}{s^3}$, hoc est vires reciproce ut cubi distan-

tiarum.

EXEMPLUM II.

Sit Spiralis hyperbolica ad focum, cujus subtangens sit semper constans, & $= a$. Habebimus ergo $a : s :: dx : ds$, vel $\frac{ads}{s} = dz$. Suman-

tur iterum differentiz, sumpta ds pro constante, & habebimus $\frac{ads}{s^2} = dz$

$\equiv ddx$. Jam cum fit $\frac{ads}{s} = dx$; vel $\frac{a^2 ds^2}{s^2} = dx^2$, habebimus $\frac{a^2 ds^2}{s^2} +$

$ds^2 = dx^2 + ds^2 = d^2w$. Sumamus formulam huic casui convenientem $f = \frac{dx d^2w + s ds ddx}{s^2 dx^2}$, & substitue valores inventos loco dx , d^2w ,

ddx , & dx^2 , & sic fiet formula $f s^2 dx^2 = dx d^2w + s ds ddx$: habebimus $f a^2 ds^2 = \frac{a^2 ds^2}{s^2} + \frac{ads^2}{s} - \frac{ads^2}{s}$, & elisis elidendis, & facta divisione per

ds^2 , erit $f = \frac{1}{s^2}$, hoc est vires in ratione reciproca triplicata distantia:

rum, ut etiam in curva logarithmica spirali. Facilius fortasse præstari potuisset, adhibita sexta formula $f ds = \frac{dp}{p^2}$, in qua p (Fig. 57.) significat

portionem normalis resectam versus partes superiores a perpendiculari BL.

Sit rursus spiralis hyperbolica, cujus subtangens a , five unitas, & retentis iisdem denominationibus, sit BO perpendicularis ad ordinatam BF, & per consequens subnormalis curvæ, eritque $BO = \frac{s ds}{dz}$: sed in no-

stra hypothesi $\frac{ds}{s} = dz$; ergo $BO = \frac{s^2}{a}$, & quadratum OF $= s^2 + \frac{s^4}{a^2}$:

sed OF:FB::FB:BL; ergo FL $= p = \frac{s^2}{\sqrt{aa + ss}}$, & differentiando,

$dp = \frac{ds}{aa + ss \cdot \sqrt{aa + ss}}$, & dividendo utrobique per quantitates æquales

$p^2 = \frac{s^2}{aa + ss \cdot \sqrt{aa + ss}}$, erit $\frac{dp}{p^2} = f ds = \frac{ds}{s^2}$, ergo f ut cubus distantia

reciproce.

Altera hypothesi est, quando curva refertur ad suum axem, ejusque localis æquatio data est per abscissas, & ordinatas more Cartesiano. Hic casus pariter in duos casus dividitur; vel enim vis centripeta dirigatur ad datum punctum tamquam centrum virium, vel ad punctum infinite distans, ita ut directiones vis centripetæ fiant secundum ordinatas parallelas.

B b' 2

Si

Si vis centralis tendat ad focum datum; tunc æquatio curvæ ad axem convertenda est in æquationem differentialem ad focum, & res per methodum supra expolitam tractanda venit.

EXEMPLUM I.

Describat mobile circuli peripheriam, & vis centralis tendat ad punctum datum in eadem circumferentia: quæritur lex vis centripetæ. In hoc casu erit in ratione reciproca quintuplicata distantia.

EXEMPLUM II.

Moveatur Planeta per perimetrum alicujus sectionis conicæ ellipsis scilicet, vel parabolæ, vel hyperbolæ, & vis tendat ad centrum sectionis, erit in tali casu ut distantia. Hæc problemata solvuntur per regulas supra traditas.

Transitum faciamus ad hypothesim, in qua vis dirigitur ad centrum infinite distans & recenseamus nostras tres formulas exhibitas in Scholio Theorematis secundi, nempe $f = \frac{dw^2 - sdds}{s^3 dx^2}$, in qua est constans

$$dx; f = \frac{dw^2 dx^2 - sdw^2 dds}{s^3 dx^4}, \text{ in qua est constans } dw; f = \frac{dx dw^2 + sds ddx}{s^3 dx^3},$$

in qua est constans ds .

Ut has formulas aptemus nostræ hypothesi, notandum primo, quod termini dw^2 in prima, $dw^2 dx^2$ in secunda, $dx dw^2$ in tertia, utpote cum aliis incomparabiles, evanescent; est enim $s = \infty$.

Notandum secundo, quod quantitas s sit constans; cum enim sit infinita, variabilis esse nequit, & differentia finitæ duarum quantitatum infinitarum æqualitatem non destruunt.

Hinc formulæ prædictæ transeunt in tres sequentes, assumendo pro constantibus eodem ordine dx , dw , ds , $f = -\frac{dds}{dx^2}$, $f = -\frac{dw^2 dds}{dx^3}$,

$$f = \frac{ds ddx}{dx^3}.$$

EXEMPLUM I.

Sit quæcumque parabola vel hyperbola ABC (Fig. 60.); ejus abscissa AD = x , ordinata BD = s . Moveatur corpus in curva ABC, & detineatur in dicta curva a viribus centralibus, quarum directiones sint juxta ordinatas BD. Sit æquatio catholica $x^m = s$, & differentiantio, $m x^{m-1} dx = ds$, & rursus differentiendo, sumpta constante dx , $m(m-1) x^{m-2} dx^2 = dds$. Quoniam facta est constans dx , sumatur prima for-

formula $f = -\frac{dds}{dz^2}$, & substituendo loco $-dds$ valorem inventum, ha-

bebimus $f = \frac{m-mm}{m} \cdot z^{m-2}$: sed $z^m = s$, ergo $z^{m-2} = \frac{s \cdot m-2}{m}$; igitur

$$f = \frac{m-mm}{m} \cdot \frac{s \cdot m-2}{m}.$$

COROLLARIUM I.

Si $m = 2$, & tunc $f = -2$, scilicet constans, & negativa: hoc significat, quod descripta parabola AEF relata ad tangentem AG, per hanc fertur mobile gravitate constante existente, ut jam demonstravit Galilæus: verum vis centralis negativa est, quia non tendit ad partes superiores versus D, sed ad inferiores versus E.

COROLLARIUM II.

Sit $m = 1$, in quo casu ABC esset linea recta, & tunc vis centripeta $f = 0$.

COROLLARIUM III.

Sit $m = \frac{1}{2}$, in quo casu curva ABC est parabola relata non ad

tangentem, sed ad axem AG, & vis centralis erit reciproce, ut cubus ordinatæ BD. Omitto alias deductiones, quæ patent ex formula.

EXEMPLUM II.

Sit parabola ADEC (Fig. 61.), in qua sit $AB = z$, $BD = s$, & æquatio curvæ $az - zz = bc$. Sumptis differentiis, erit $adz - 2zdz = bds$, & rursus differentiando, sumpta ds pro constante, ut locum inveniat tertia formula $f = \frac{dsddz}{dz^3}$, erit $addz - 2zddz - 2dz^2 = 0$; ergo

$$ddz = \frac{2dz^2}{a-zz}. \text{ Facta substitutione, erit } f = \frac{ads}{adz - 2zdz} : \text{ sed } ds = \frac{a-2z}{b} dz;$$

ergo rursus substituendo, $f = \frac{2}{b}$. Curva igitur parabolica est trajec-

toria, quam gravia nostra describunt; nam & gravitas in motibus pro-

projectorum pro constanti usurpari potest, & directiones, quæ non nisi in centrum terræ convergunt, pro parallelis haberi possunt.

S C H O L I U M.

Problema addo, quod hanc materiam exhaurit. Grave A (Fig. 62.) emittatur oblique cum data velocitate, & describendo parabolam ABC, debeat pervenire ad datum punctum C: quæro per quam directionem, puta AD, grave impelli debeat. Sit linea verticalis FAI, sumaturque AF talis, ut grave decidens ex puncto quietis F percurrendo rectam FA, acquirat in A eam velocitatem, cum qua grave proiicitur. Super AF describatur segmentum circuli AHGF capiens angulum æqualem angulo CAI, & abscindatur AE quarta pars sagittæ AC, ducaturque altera verticalis EHG. Hæc vel cadit extra segmentum circuli, vel illud tangit, vel secat. In primo casu velocitas impressa non est sufficiens, ut projectum attingat scopum C. In secundo casu unica tantum datur inclinatio, quæ præstet effectum. In tertio datur gemina inclinatio, hoc est AHD, AGD: utralibet electa projectum attingit scopum C. Demonstrationem inveniendam relinquo.

S C H E D I A S M A XVII. (*)

In pleno tempora, quibus arcus trajectoriæ describuntur, non possunt esse arcus a radio vectore factis proportionalia.

Suspiciari quis posset Canonem Nevvtoni, quod nempe tempora, quibus arcus trajectoriæ describuntur, sint semper arcus a radio vectore factis proportionalia, locum etiam invenire in pleno, dum Planeta fertur per medium resistens; nam resistentiæ fortasse ita temperari queunt, ut mobile eundem arcum majori quidem tempore percurrat, sed tamen arearum ratione servata. Hoc autem impossibile esse sic demonstro.

Circa focum A (Fig. 63.) describat mobile in pleno trajectoriam BCE in quacumque virium centralium, & resistentiarum suppositione, sintque tempora per arcus BC, BE, ut arcæ correspondentes BAC, BAE. Cum curva BCE data sit specie, & positione, repetatur in bæ, & determinetur vis centralis directæ ad focum a, per quam eadem cur-

va

(*) Spianò la strada alla dimostrazione del presente Teorema la bella scoperta fatta dall'Autore l'anno 1723., che un Planeta può descrivere nel vano la stessa curva, mentre da infinite scale analoghe all'ordinate di forze centrali sia stimolato. Al detto tempo adunque dee riferirsi questo Schediasma.

va percurratur in vacuo, ejusque scala sit curva NLH. Jam demonstratum est, quod sumptis pro scalis virium centripetarum infinitis curvis analogis ad ordinatas NLH, *nlh* &c., semper eadem curva *bce* describitur, variantibus temporibus & velocitatibus. Eligatur ea scala virium puta *nlb*, ut velocitates in punctis C, *c*, utriusque curvæ æquidistantibus a verticibus B, *b* sint æquales, & existentibus æqualibus non solum velocitatibus ex constructione, sed insuper etiam arcubus minimis CD, *cd*, & elementis arcarum CAD, *cad*, tempora quoque per arcus CD, *cd*, erunt æqualia. Sumantur alii duo arcus ad libitum æquales EF, *ef*, & cum sit ex hypothesis tempus per CD ad tempus per EF; ut area CAD ad aream EAF, & sit in vacuo ut tempus per *cd* ad tempus per *ef*, ita area *cad* ad aream *eaf*, tempora per EF, & *ef* erunt æqualia; ergo & velocitates per dictos arcus erunt æquales: sed velocitas utrobique est media proportionalis inter vim centralem, & subosculatricem punctorum E, *e*, quæ subosculatrices sunt æquales; igitur in dictis punctis erunt æquales vires centripetæ. Si itaque curva *bce* describitur in vacuo, existente *f* vi centripeta, per eandem vim non potest altera curva BCE describi in medio resistente, quia resistentiæ nullo modo agerent. Repugnat igitur, ut salva lege Nevvtoniana, quælibet trajectoria describi possit in pleno Q. E. D.

SCHEDIASMA XVIII.

Del Sistema Ticonico.

PEr rispondere al quistito fattomi, se siasi mai dimostrato falso il Sistema di Ticone, io non mi fermerò in andar bilanciando i motivi finora addotti, sopra i quali sono già usciti in pubblico i giudizj de' Dotti: ma piuttosto proporrò una mia osservazione ad altri non venuta in mente, ch'io sappia, e lascerò a chi legge la cura di decidere di che peso ella si possa essere.

I Difensori de' due celebri sistemi di Ticone, e di Copernico (mentre degli altri già screditati non occorre farne menzione) convengono in ciò, che i cinque Planeti, cioè Mercurio, Venere, Marte, Giove, e Saturno anno per centro delle loro rivoluzioni il Sole, intorno cui fanno i loro giri in tali tempi periodici, che giusta la regola del Keplero sono in ragione sesquiquadrata delle distanze. Da questa legge ne nascono dimostra-

tiva-

- (*) Questo Schediasma è stato dall'Autore composto a richiesta del P. D. Giovanni Bernardo Pisenti C. R. S., il quale ne lo pregò con una lettera de' 25. Aprile 1734. Il C. I. gli rispose così li 12. Maggio dell'anno medesimo.
 „ Per quello riguarda il dubbio da lei proposto, le trasmetto una mia
 „ Dissertazione lavorata i giorni passati, e per cui ho dovuto ritardare
 „ la risposta.

tivamente altre tre, vale a dire, che l'Orbite de' predetti Pianeti son tante curve ellittiche, trovandosi il Sole in un umbilico d'esse a tutte comune; che la forza centrale d'ogni Pianeta in qualunque punto della sua ellisse sta in proporzione reciproca duplicata della lontananza dal foco; e che i tempi parziali serbano la ragione delle aje descritte dal moto de' raggi direttori: i quali canoni tutti e quattro si verificano nelle rivoluzioni dei Satelliti rispetto ai Pianeti principali, come altresì delle Comete relativamente al Sole.

Non c'è discordia fra gli Astronomi d'ambo i partiti nello stabilire il moto della Luna intorno la Terra; restando tuttavia in quistione, s'ella debba annoverarsi fra i Pianeti primarij, ovvero fra' secondarij.

Tutta adunque la gran controversia a ciò si riduce, se la nostra terra abbia a collocarsi fra i Pianeti, onde faccia i suoi viaggi intorno al Sole colle regole già stabilite, e si ravvisi nel nostro Vortice una perfetta unità di Sistema: ovvero se costituita essa immobile, serva di centro ai giri di alcuni corpi celesti, e specialmente del Sole, che colle sue rivoluzioni l'abbraccia, tirandosi dietro il corteggio di tutti i Satelliti, tanto principali, quanto secondarij.

Ognuno comprende agevolmente, che l'ultima ipotesi ci viene suggerita dalle apparenze, e che in qualunque luogo noi fossimo stati prodotti, la persuasione di stare in quiete ci farebbe cangiar sistema; non essendoci maggior ragione, per cui s'abbia ad attribuire il riposo piuttosto alla Terra, che a Venere, o a Giove, e per cui gli Abitanti di quel'globo, se per avventura ci fossero, esser dovessero immuni da un tal pregiudizio. All'incontro la costruzione Copernicana non soffre alterazione di sorta alcuna dalla mutazione del sito, in cui l'Uomo si ritrova, e di qualsivoglia Patria egli si finga Cittadino; purchè il Sole pongasi nel centro dei moti, nè si diversifica il sistema, nè si variano in conto alcuno le leggi della Natura.

Facciamoci ad investigare più da presso le conseguenze, che derivano dalla posizione comune. Intorno la Terra immota gira da vicino la Luna opaca di sua natura, e ad una assai più grande distanza il Sole risplendente di luce propria, e circondato da cinque globi, che da lui prendono il lume, tre de' quali camminano da se soli, e due dalle loro lunule accompagnati. Per ultimo ad una incomprendibile lontananza si rivolge attorno la Terra lo stuolo innumerabile delle Stelle fisse, che sono tanti Soli. E qui si noti, che il moto annuale del Sole è lo stesso, che alla Terra attribuir si dovrebbe collocata nel suo sito fra Pianeti, per salvare la regola del Keplero.

Nel sistema di Ticone il moto fisico del Sole si fa per una spirale* delineata intorno ad una specie di frusto conoidale, e per ben concepirlo è d'uopo poner mente all'obblività, ed alla eccentricità dell'Eclittica; ma perchè i due moti diurno, ed annuo sogliono distinguersi, e separarsi; osservo per quello appartiene al primo, che facendosi le rivoluzioni diurne prossimamente in tanti cerchi paralleli all'equatore, i quali sebbene anno e diametri, e centri diversi, non ostante ciò vengo-

no

no percorsi in ispazj di tempo poco presso eguali di ore ventiquattro; bisogna dire seguitando le dimostrazioni Nevvtoniane, che le forze centrali, le quali trattengono il Sole nelle periferie di questi archi, e rimirano centri differenti, attesi i tempi periodici eguali, sieno proporzionali a' raggi dei medesimi circoli.

E se il Sole col giro annuale descrive un' ellissi intorno al globo terrestre, il quale è collocato non già nel centro, ma in uno dei fuochi dell' Orbita, conforme le osservazioni Astronomiche c' insegnano, egli è evidente per le cose dimostrate dal citato Inglese, che costituito il Sole in varie distanze dalla Terra, le forze centrali, che lo sforzano a non abbandonare l' orbe ellittico, riguardano sempre il centro terreno, e decrescono in ragione inversa duplicata delle distanze. Sembrami una stravaganza, che allontanandosi il Sole da noi per descrivere i cerchi maggiori, che regolano il moto diurno, la forza centrale s' aumenti a misura che dee viaggiare per circonferenze più grandi; ed all' opposto, che relativamente al moto annuo la forza centripeta si accresca, ogni qual volta le distanze si minorano.

Non cesso frattanto di maravigliarmi, che non sia ad alcuno caduto in pensiero di misurare l' energia della forza centrale, per cui nel Sistema Ticonico il Sole viene obbligato nel corso d' un anno a percorrere la sua ellissi, la quale per la grandezza, e per la proporzione degli assi resta dagli Astronomi delineata, senza scostarsi gran fatto dal vero. Per farmi strada alla soluzione di questo nuovo Problema, premettasi ciò, che abbiamo dal lodato Sig. Nevvton, cioè che viene affetta dalla medesima gravità la Luna, che circondando il globo terracqueo si mantiene nella sua orbita, ed un corpo qualunque de' nostri, che per l' aere verticalmente discende. Veggasene l' ingegnossissimo computo, e la illazione, che se ne deduce, che quanto più i corpi, ne quali la stessa gravità risiede, si discostano dal centro; tanto più vassi rallentando lo sforzo, che gli stimola alla discesa, e ciò in proporzione reciproca de' quadrati delle distanze.

A buon conto si fa, che questa legge si stende dalla Terra sino alla Luna, e posto giusta il Cassini, che l' intervallo medio fra questo Pianeta, e noi sia di semidiametri terrestri $57 \frac{1}{2}$, e che per il numero

2

1000000. preso ad arbitrio si esprima la forza della gravità, che si ravvisa nei nostri corpi; se faremo come il quadrato di $57 \frac{1}{2}$ alla unità,

2

che ci espone il raggio della periferia massima della Terra, così 1000000: al quarto numero = 302. $\frac{242}{529}$, con esso dinoteremo il valore di quel,

529

la forza, che conserva la Luna nella sua Orbita.

Che se supporremo propagarsi la legge menzionata fino alle regioni del Sole, la distanza media del quale dalla nostra Terra è di semidiametri terrestri 22000., secondo il citato Cassini, ed istituiremo la seguente analogia, come il quadrato di 22000. all'unità, così 1000000. ad. $\frac{1}{484}$; avremo la misura della forza centrale del Sole nell'ipotesi as-

484

sunta. Seguendo a cavare dagli stessi dati le conseguenze, giacchè per la regola del Keplero i quadrati de' tempi periodici sono come i cubi delle distanze, troveremo, che il Sole dovrebbe compiere il giro della sua ellissi in mesi lunari di giorni 27, ed ore otto l'uno n°. 7484. Ma il detto Pianeta, che cammina con assai maggior celerità, non impiega nella sua rivoluzione, salvo che giorni n°. 365, e sei ore; dunque la sua forza centrale supera di lunga mano quella, che corrisponde al canone premesso.

Per rinviarla farebbe di mestieri dimostrare un Teorema, che per ora mi si conceda di supporlo vero, ed è, che quando un corpo qualunque ora più lento, ed ora più celere descrive una data orbita in due tempi differenti, le forze centrali sono reciprocamente come i quadrati dei tempi periodici, nei quali le due rivoluzioni si compiono. Ed atteso che 7484. mesi lunari contengono giorni. 204562 $\frac{2}{3}$ se faremo

3:

come il quadrato di 365 $\frac{1}{4}$ all'altro di 204562 $\frac{2}{3}$, così $\frac{1}{484}$, forza

4:

3:

484.

centrale del Sole, che risponde alla ragione reciproca duplicata delle distanze, ad un quarto numero prossimamente = 648, ci darà questo la forza centrale del Sole stesso tal quale la ricerca il Sistema Ticonico adattato alle osservazioni. In questo mentre quella, che nella Luna risiede, e s'è già determinata, s'esprime col numero 302 $\frac{242}{529}$; dunque

529.

nonostante la grandissima lontananza del Sole dalla Terra, che messa a confronto con quella della Luna, si trova essere come 220001.57 $\frac{1}{2}$::

2

383: 1, la forza, che spinge il Sole verso il centro terrestre, è più che doppia dell'altra, che fa girare la Luna nella sua ellisse.

Passiamo ad investigare come si diffonda all'intorno del nostro centro la forza, qualunque ella sia, che si chiama gravità; per opera della quale la Luna, il Sole, e le fisse sono obbligate nell'ipotesi di Ticone ad abbracciare la mole terracquea colle loro rivoluzioni.

Primieramente per il computo Newtoniano, in cui si paragona la gravità di un corpo terreno con quella del globo lunare, abbiamo, che questa forza si sminuisce in ragione inversa de' quadrati delle distanze. Situata adunque la terra in A (Fig. 64.), e la luna in B, la porzione

GH

GH della iperbola quadratica ci rappresenterà la scala delle predette forze decrescenti.

In secondo luogo sia AD la massima distanza del Sole dalla Terra, ed AC la minima, onde CD sia la doppia eccentricità di semidiametri terrestri 748: egli è manifesto, che viaggiando annualmente il Sole per la sua ellisse, ed essendo posta la Terra in uno de' fochi, almeno per tutto il tratto DC dovrà essere regolato il moto da una forza centrale, che colla legge già nota si minori al ricrescere delle distanze. Fingasi perciò, che la curva LK sia una parte della iperboloide, che serve di scala alle forze, per cui viene temperato il corso ellittico del Sole, e se ne deduca, che essendo l'ordinata CL, come di sopra s'è provato, più che doppia di BH, l'arco KL non ha punto che fare colla curva GH, e che queste due linee quantunque dello stesso genere, sono fra loro differenti per il valore delle costanti, ch'entrano nelle loro locali equazioni.

Finalmente essendo che la forza centrale va crescendo, come abbiamo veduto nel passare dalle regioni Lunari alle Solari, e che si fatto transito non si fa per via di salto, ma per gradi impercettibili; bisognerà, che la curva GH estendendosi si ripieghi in senso contrario, avanzandosi col ramo HL, in maniera che le sue applicate in progresso si aumentino sino all'ordinata CL, indi torni ad inflettersi per un terzo ramo iperbolico Lk, di cui si è fatta parola.

Ciò, che fin ora si è detto, basterebbe per far comprendere la stravaganza del Sistema, in cui la scala delle forze centripete, la quale è formata dal raccozzamento di vari pezzi di curve, non procede con legge certa, e determinata. Ma se rivolgeremo la nostra considerazione a' moti delle stelle fisse, ci si presenteranno nuovi, e maggiori assurdi.

Messo per ora da parte il loro moto diurno, per cui si girano in cerchi paralleli all' Equatore, nel centro de' quali non si trova quello dell' Universo, o sia della Terra, e con forze tali, che serbano la ragione delle distanze; facciamci piuttosto a riflettere sovra un altro moto, per cui tutte le fisse compiono le loro rivoluzioni da Occidente in Oriente attorno la Terra stabile in anni numero 25920, il qual periodo si chiama anno grande, o Platonico, e la qual apparenza spiegasi da Copernicani col mezzo della precessione degli Equinozj. E se gli Astri predetti non sono tutti inchiodati, come in una volta nella superficie concava d'una sfera, giusta la credenza degli Antichi, ma sono disposti in differenti distanze dal centro comune del Mondo, siccome ce lo persuadono il buon senso, e parecchi fenomeni; bisogna necessariamente dire, che le loro forze centrali serbino la proporzione delle lontananze; stantchè nel compiere i loro giri c'impiegano tempi periodici eguali.

Investighiamo presentemente a quale intervallo abbia a collocarsi tal una d'esse Stelle, onde debba terminare il suo periodo nell' assegnato numero d'anni, salvo il canone del Keplero. E perchè se ne può fare un doppio paragone, cioè col corso mestruo della Luna, e coll'annuale del Sole, nel primo caso, la Stella si discosterebbe da noi per 283590

semidiametri terrestri, vale a dire non arriverebbe ad esser lontana tredici volte, quanto è lontano il Sole; nel secondo caso la distanza notabilmente s'accrescerebbe; sino ad essere 876 volte più grande di quella, che dal Cassini al Sole viene attribuita.

Ognun sa, che non abbiamo alle mani fin ora dati sufficienti per misurare la lontananza delle Stelle fisse: a me basta però per dedurre legittimamente le mie conseguenze, che sia maggiore delle due ipoteticamente determinate. E quanto alla prima, che supera di poco quella di Saturno, non se ne debbe fare alcun conto: per la seconda poi, la quale ha più del ragionevole, posto il diametro apparente del Sole di mezzo grado, una Stella, per modo di esempio Sirio, liberata con un ottimo Telescopio dal capillizio si vedrebbe sotto un diametro apparente

di minuti secondi $2\frac{4}{25}$ nella supposizione, che la mole di Sirio fosse pressò poco uguale a quella del Sole. E pure egli è certo, che l'angolo, sotto cui si osserva, non eccede venti minuti terzi, cosicchè la minima lontananza, che a Sirio possa attribuirsi, è per sei volte almanco maggiore di quella da noi fissata di 876. semidiametri dell'orbita annua del Sole.

Ma se non altro per dar regola ai calcoli prendiamo la misura trovata dall'Ughenio per via delle ragioni Diottriche, che fa il diametro apparente di Sirio di quattro minuti terzi, e lo discosta dal nostro occhio 27664 volte più del Sole: avvertendo però, che coll'accrescerla, o col diminuirla anche fuori del limite assegnato, non si toglie nè punto, nè poco la forza all'induzioni, che sono per fare.

Fingo dunque, che alla stessa distanza di Sirio ci sia un gran corpo, il quale finisca il suo periodo a confronto di quello del Sole in tanto tempo, quanto appunto ne richiede la regola del Keplero. In tale ipotesi essendo i cubi delle distanze come i quadrati de' tempi periodici; avremo (esprimendo per l'unità la distanza del Sole dalla Terra, ed il suo tempo annuale) avremo dico il tempo periodico di Sirio d'anni 4601214, ed in oltre la sua forza centrale, che paragonata con quella del Sole = 648 decrebbe in ragione inversa de' quadrati delle distanze, espressa per la frazione $\frac{648}{765296896}$. Ma di fatto la menzionata Stella

termina assai più presto il suo corso in anni 15920, dunque la sua vera, e reale forza centripeta è incomparabilmente più grande di quello si consaccia alla legge del Nevuton, da cui dipende la Kepleriana: ed istituito il computo in ordine del Teorema di sopra ricordato, che le forze centrali, per cui si descrive la stessa orbita da corpi differenti, o dallo stesso con diverse velocità, sono reciprocamente come i quadrati

de' tempi periodici, la troveremo prossimamente = $\frac{1}{17}$ di gran lunga minore di quella, che risiede nel Sole già stabilita = 648.

Sarà

Sarà perciò necessario, che la scala delle forze centrali, in passando dalle regioni Solari a quelle della Stella fissa a noi più vicina situata in E ci venga rappresentata dalla curva KM, che sempre più si va accostando all'asse ACE, onde la forza centrale si esprima per l'ordinata EM minore assai di CL: avvertendo però, che la suddetta curva KM non è la continuazione dell'iperboloide LK, e molto meno dell'altra GH, le quali prorogate passerebbono fra i due punti E, ed M.

Ma perchè la scala delle tante volte mentovate forze centripete dee stendersi per l'immenso spazio di tutte le Stelle fisse, ognuna delle quali fa la sua rivoluzione intorno la terra nel tempo prefisso d'anni 25920, per salvare questa uguaglianza fra i tempi periodici, farà di mestieri, che la nostra scala proceda non più per pezzi di linee curve; ma bensì per la retta MO, la quale inferiormente prolungata vada a congiungerli col punto A, centro della Terra, e dell'Universo.

La sola ispezione della figura, che ci mette sotto gli occhi le irregolarità, di cui abbiamo a lungo favellato, ci fa comprendere, quanto sia composto, disordinato, ed irragionevole quel sistema, che obbliga la Natura ad operare in una sì stravagante maniera.

SCHEDIASMA XIX.

Riflessioni sopra un principio usato del Bradley per ispiegare l'alterazione delle stelle fisse.

Discenda il mobile D (Fig. 6^a.) per la verticale DB, e giunga a colpire il piano sottoposto AC, che cammina con moto equabile per la direzione ABC: si dimanda secondo qual linea, e sotto qual angolo si farà la percossa.

Per soddisfare al quisito, io premetto un notissimo principio. La Natura non opera mai per via di salto, vale a dire, che se il mobile rispetto ad una qualsivoglia direzione si trova privo di moto, non acquisterà mai un grado determinato di velocità giusta la direzione medesima, se prima non si passa per tutti i gradi di mezzo; perchè se si facesse in un momento il transito dalla velocità nulla ad una data, e finita, non ci vorrebbe meno d'una forza accelerante infinita.

Ap-

Ha data occasione allo Schediasma XIX. un Problema proposto da un Geometra Napoletano, e che il Padre D. Giovanni Crivelli C. R. S. con lettera de 31. Marzo 1734. comunicò al nostro Autore; acciocchè dicesse la sua sentenza, e gli permettesse di mandarla a Napoli. A fine di esaminare il principio usato dal Sig. Bradley per ispiegare l'alterazione delle stelle fisse, si cercava secondo qual linea una palla cadente a piombo percoteva un piano orizzontale, che con direzione parimente orizzontale cammina con moto equabile.

Applicando al caso nostro l'assioma, egli è certo, che sinattantochè la palla D cade per la perpendicolare DB, in essa non si ravvisa alcuna impressione orizzontale; quando non si volesse, che il moto del piano comunicato all'aere facesse deviare la sfera menzionata dalla linea del piombo: la qual particolarità non si vede espressa nella proposta, e ad altro non servirebbe, che a rendere la questione più complicata.

Perciò se noi supponiamo, che la percossa si faccia in un istante, io penso, che il globo D, nell'atto di toccare per un solo momento il piano, non possa guadagnare, salvo che un grado infinitesimo di velocità orizzontale. E se tanto la palla, quanto il piano fossero perfettamente elastici; non ho dubbio, che la riflessione non si avesse a dirriggere per la stessa linea BD già trascorsa nella discesa.

Ma se, per dir così, il colpo istantaneo muore nel piano, onde sia escluso il moto riflesso, dopo seguita la percossa secondo la linea verticale DB, il grave appoggiato al piano acquisterà a gradi la velocità orizzontale; ma ciò si farà a norma dei canoni della comunicazione del moto fra i corpi molli. Sia M la massa del piano AC, V la sua velocità, ed m la massa della palla D; ogni qual volta la palla stessa camminerà con tutta quella celerità, che le può essere partecipata, avremo la velocità comune della palla, e del piano uguale alla quantità $\frac{MV}{M+m}$.

$$\frac{MV}{M+m}$$

E se così è, cangiando ipotesi, e posto, che la percossa non sia momentanea, ed il corpo D consumi qualche piccolo spazio di tempo, a premere il piano, perdendo successivamente, e a gradi tutta la velocità acquistata nella caduta; mi sembra manifesto, che durante l'avvicinarsi del colpo, o per dir meglio de' colpi replicati l'un dopo l'altro, alla palla si comunichi nel tempo stesso una qualche parte di quella velocità, con cui il piano attualmente cammina. E se nel caso dell'urto momentaneo questa velocità è inassegnabile; ne segue dipender essa dal tempo, in cui la percossa si compie, il quale quanto sarà più breve, tanto minor velocità orizzontale nella palla D verrà impressa. La durata del tempo da molte circostanze resta alterata, cioè dalla grandezza, dalla materia, e dalla figura del corpo D, e molto più dalla sua velocità, ed in oltre dalla materia, dall'asprezza, e dalla velocità del piano, e da parecchi altri accidenti, che si potrebbero aggiungere.

A questo passo si noti, che nel fermarsi, che fa la palla sul piano; sinattantochè la percossa si compia, relativamente al punto mobile B del piano medesimo resterà essa alquanto indietro; perchè non può al primo tocco acquistare l'intera velocità orizzontale. Ma rispetto al punto immobile, che si considera fisso nella verticale DB, la palla in virtù del moto orizzontale guadagnato appoco appoco, nel mentre che va perdendo il verticale, s'avvanzerà dal punto B verso C giusta la direzione del piano.

In-

Interverrà pertanto, che il primo urto si eserciti a piombo contro il punto mobile B, e che in progresso la palla s'appoggi, e prema diversi punti del piano compresi fra i due limiti B, E, supposto che pervenuta la palla al contatto in E, tutto il moto per la direzione verticale sia estinto, e finita conseguentemente l'azione della percossa. Ognuno vede, che nelle impressioni di mezzo fra B, ed E si complicano i due moti verticale, ed orizzontale, e che si va sempre variando la proporzione, atteso che in vicinanza del punto B il moto a piombo supera di lunga mano l'orizzontale; laddove ne' punti prossimi al punto E succede tutto all'opposto. Diviso perciò il tempo finito della percossa in minimi elementi, e considerato il colpo come una serie d'impressioni istantanee, e successive contro tutti i punti della retta BE, egli è certo, che ogni impressione in particolare si fa sotto una diversa direzione, e in ordine a ciò sarebbe mestieri determinare la media direzione: ma stante, le confusioni, che si fanno tanto nella palla, quanto nel piano sottoposto, e le cose notate di sopra, io giudico la quistione insolubile.

Non è però affatto inutile la speculazione, e serve, s'io non mi inganno, a metter in chiaro la bella scoperta dell'Inglese Bradley in proposito dell'aberrazione delle stelle fisse. Non cerco per ora, se la dimostrazione dell'Autore sia concludente; affermo bensì, che corrispondendo sì esattamente la sua ipotesi alle osservazioni, non bisogna così di leggeri abbandonarla.

Ecco come per me la cosa si spiega. Mentre s'ammetta, che la luce si propaga in tempo, ne nasce per necessaria conseguenza, che si fa in tempo anche la nostra visione. L'occhio adunque stabile BC (Fig. 66) rimiri la stella fissa A, e la luce, che produce in noi la visione, dopo aver penetrati gli umori dell'occhio faccia impressione in una fibrilla BC del nostro sensorio, e la ripieghi nella curva elastica BEC: in questo caso la visione si farà per la retta EA, che passa per il vertice E della curva, ed è l'asse, che taglia per metà, e perpendicolarmente tutte le ordinate della curva medesima parallelo alla BC.

Ma se nel tempo medesimo, in cui s'inflexe la fibra BC, accadrà, che l'occhio si muova giusta la direzione CB, per le cose dette i raggi luminosi, che non acquisteranno in un momento il moto giusta la direzione dell'occhio, resteranno addietro, ed in vece di piegare la fibrella nella curva BEC, la infletteranno nella curva alquanto obliqua BFC segnata a punti, il di cui vertice sarà in F. Per avere la media direzione di tutti gli impulsi, basterà seguendo i documenti del Signor Gio. Bernoulli, a due punti estremi B, C tirare le due toccanti BG, GC, e diviso l'angolo BGC per metà colla retta GH, determinerà essa il raggio visuale, che formerà l'angolo picciolissimo HGI colla linea GI parallela ad EA. Non si vedrà adunque l'oggetto luminoso per la GI, o per la EA, le quali linee per la loro minima distanza fisicamente coincidono, ma piuttosto per la GH, la quale prorogata alla distanza terminata, per cui sono da noi lontane le stelle fisse, cagionerà quella pic-

108
picciolissima diversità d'aspetto, o sia aberrazione, che da noi si offer-
va, e di quest'angolo d'aberrazione se non altro dai Fenomeni se ne avrà
la misura. Sopra questo punto assai delicato sarebbe necessario prender
per mano le osservazioni fin ora fatte, ed istituire calcoli assai laboriosi,
eh' io lascio di buona voglia agli Astronomi, bastandomi d'aver arri-
schiato una conghiettura.

SCHEDIASMA XX. (*)

*Determinare la lunghezza d'un pendolo semplice isocrono
ad un dato composto.*

Sia il pendolo composto ACB (Fig. 67.) con due pesi C, B attaccati
alla verga rigida, e non pesante AB, il quale movendosi dalla ori-
zontale AK pervenga nel sito ACB, e sia disposto a continuare il suo
viaggio nel tempo minimo dt per gli archi infinitesimi, e simili $Bb =$
 dS , e $Cc = ds$. Le due verticali BD, CE espongano le masse M, m
delle due ghiande B, C animate dalla lor naturale gravità, e condotte
le rette Bd, Ce. che tocchino gli archi Bb, Cc nei punti B, C, dalle
estremità D, E si lascino cadere sopra le menzionate tangenti le due
perpendicolari Dd, Ee.

Ognun sa, che le intercette Bd, Ce esprimono le forze tangenziali,
da cui i gravi B, C vengono stimolati alla discesa per gli archi Bb,
Cc: non ostante ciò è cosa per se stessa manifesta, che per esse non ponno
esponersi le totali azioni esercitate dalle ghiande B, C nell'atto di pre-
correre gli spazj Bb, Cc. La ragione si è, perchè essendo le forze morte
tangenziali Bd, Ce in ragione siccome le masse M, m, o sia come BD:
CE, in qualunque sito della verga AB si collocassero i pesi B, C, le
inriere forze agenti, e conseguentemente gli effetti generati farebbono
proporzionali alle masse; lo che è un assurdo, che ci condurrebbe a
stravagantissime conclusioni.

Nè giova ricorrere al tempo, di cui sogliono in simili incontri va-
lersi i Cartesiani; attesochè nel nostro pendolo composto descrivendosi
in pari tempo gli archi Bb, Cc, la durata dell'azione ajuta egualmente
le due forze morte $Bd = Me$, e $Cc = m$.

Bisogna per tanto farsi ad esaminare da quali elementi le predette
masse, ovvero le sollecitazioni per le toccanti restino avvalorate. Per
venirne a capo io la discorro così. Se i due gravi B, C cadessero libe-
ramente, senz'essere impediti, e deviati dalla verga girante intorno il
centro A, discenderebbono dai punti I, G della orizzontale AH per le
li-

(*) avendo il C. J. difesa questa soluzione l'anno 1735, la spedì al Padre
D. Ramiro Rampinelli Monaco Olivetano, conforme s'impara da una
lettera 20. Settembre 1735. dallo stesso dottissimo Padre diretta al Co.
Giordano Figlio dell'Autore.

linee del piombo, ed in tempi eguali precorrerebbono eguali spazi. Di più se i predetti mobili B, C oscillassero in figura di pendoli semplici, impiegherebbono tempi minimi disuguali, in passando per gli archi simili Bb, Cc, e la ghianda C v'impiegherebbe tempo minore della ghianda B. Nel dato tempo $= dt$ descriva il pendolo AC l'arco Ca, ed il pendolo AB l'arco Bg: e perchè quando i corpi C, B essendo congiunti costituiscono un pendolo composto, le masse C, B nel tempo medesimo passano per gli archi simili Cc, Bb, ne segue, che messa a confronto la prima colla seconda ipotesi, il mobile C resta indietro per l'archetto ca, ed all'opposito il mobile B avanza strada per l'archetto gb.

Quindi la forza per la roccante cioè Cc non può estendersi ad accompagnare il mobile, salvo che per tutto l'arco Cc, nè più oltre si disfonde, e per la stessa ragione la forza morta Bd sollecita costantemente la massa B per tutto l'arco Bb. Dunque le forze tangenziali Bd, Cc provenienti dalla gravità tante volte ripetono l'impressioni ne' predetti corpi B, C, quanti sono gli elementi eguali contenuti negli archi ineguali Bb, Cc, ed il numero degli impulsi risponde alle lunghezze degli spazi trascorsi.

In ordine a ciò le masse M, m, le quali essendo alle forze tangenziali proporzionate si possono in luogo loro sostituire, anno a moltiplicarsi per le flussioni DS, DS degli archi corrispondenti, onde si determini la precisa misura d'amendue l'azioni equivalenti una ad MDS, l'altra ad mds. Ma (chiamate U, u le velocità acquistate dalle masse M, m in B, C, e DU, du i loro elementi) la somma dell'azioni dev'essere proporzionale alla somma de' prodotti delle masse ne' momenti delle rispettive velocità, cioè, MUDU, mudu; dunque perverremo all'equazione

(1.^a) $MDS + mds = MUDU + mudu$: ma $DS = UDT$, e $ds = udt$; dunque sostituendo, (2.^a) $MUDT + mdu = MUDU + mudu$.

E perchè come i due raggi $AB = R$: $AC = r$: $U : u$: $DU : du$, troveremo $\frac{VU}{R} = u$, ed $\frac{VDU}{R} = du$, i quali valori surrogati nella superiore

espressione ci danno la (3.^a) $MUDT + \frac{mvUdt}{R} = UDU + \frac{Mv^2UDU}{R^2}$.

Abbiasi ora $AF = x$ lunghezza del pendolo semplice isocrono al nostro composto, in cui la forza tangenziale accelerante s'esponga per la massa T, e tanto l'una, quanto l'altra per l'unità. Segnisi colla specie $\mathcal{W}$ la velocità acquistata dalla ghianda F nel percorrere l'arco HF; e per la Teorica de pendoli semplici, il tempo dt consumato nel passare per l'arco inassegnabile Ff sarà come l'incremento $d\mathcal{W}$ della velocità, cioè $dt = d\mathcal{W}$: ma per la seguente analogia $AB = R$: $AF = x$: $DV : d\mathcal{W}$ si ha $\frac{xDV}{R} = d\mathcal{W} = dt$, e sostituendo in cambio di dt il suo valore $\frac{xDV}{R}$,

l'espressione (3^a) si trasformerà nella

$$(4^a) \frac{MXVDV}{R} + \frac{mr xVDV}{R^2} = MVDV + \frac{mr^2VDV}{R^2},$$

la quale espurgata ci somministra $MRX + mr x = MR^2 + mr^2$, e finalmente la (5^a) $x = \frac{MR^2 + mr^2}{MR + mr}$, lo che &c.

$$\frac{MR + mr}{MR + mr}$$

S C O L I O I.

Prefa di bel nuovo per mano la seconda delle nostre formole, vale a dire $MVDT + mndt = MVDV + mudu$; egli è manifesto, che essendo le velocità V, u proporzionali alle distanze R, r , posso collocare in vece delle due prime le due ultime quantità, onde sia

$$MRDT + mrdt = MRDV + mrdu.$$

Quindi si viene in cognizione per qual motivo il Sig. Ermanno sia stato stretto ad avvalorare per una parte colle distanze R, r le masse M, m già moltiplicate nel tempo comune dt ; e per l'altra abbia dovuto altresì avvalorare le quantità infinitesime del moto acquistato MDV, mdu , per le distanze analoghe, R, r .

S'io debbo però dire sinceramente il mio parere, giudico, che siasi proceduto alla soluzione quantunque vera per un genere improprio, e che si sieno assunti principi tali, che abbiano bisogno d'essere appoggiati ad altri più chiari, e più semplici.

La perplessità nasce, secondo me, da ciò, che il citato Autore ha fatto entrare nella sua analisi le differenze della quantità del moto MDV, mdu , le quali nella nostra ricerca naturalmente non anno luogo, in iscambio delle altre due $MVDV, mudu$, che sono le flussioni delle forze vive misurate alla maniera del Leibnizio. Ed in fatti chi non vede, che per iscanfare il paralogismo è stato in necessità di moltiplicar le prime per le distanze R, r , riducendole a $MRDV, mrdu$, senza che se ne capisca a prima vista lo perchè: laddove senz'altri raggiri potea valersi più naturalmente delle seconde.

In oltre i prodotti MDT, mdt , si applicano altresì per R, r , e si fanno diventare $MRDT, mrdt$, applicando al caso la forza, o il momento delle masse M, m , avvalorate dal vètte: ma $MRDT$ eguale a MDS , e $mrdt$, a mds , e gli spazj DS, ds moltiplicati nelle forze tangenziali M, m ci danno la vera misura delle azioni generate dal diffondersi, che fanno le impressioni acceleranti Bd, Ce rispettivamente per gli archi simili Bb, Cc ; dunque senza tante tergiversazioni avea a farsi uso della nostra formula segnata (1^a), e poi passar oltre, e dar compimento alla soluzione.

La nostra quinta equazione $x = \frac{MR^2 + mr^2}{MR + mr}$ si guida ad una con-

clusione, della quale, siccome d'un principio, s'è già servito il Signor Giovanni Bernoulli, ed è, che supposti due pendoli semplici AB, AC discesi per gli archi simili IB, GC, la somma delle forze vive da essi acquistate ne' punti B, C si trova eguale all'aggregato delle forze vive guadagnate dalle predette ghiande, mentre discendono in figura di pendolo composto per gli archi medesimi IB, GC.

Non succede però così, quando si confrontano insieme le quantità del moto. E per dilucidare la materia, i due pendoli semplici AI, AG separatamente discendano per gli archi simili IB, GC; è cosa chiara, che dalle replicate impressioni della gravità agente contro le masse B, C per gli spazi IB, GC un certo, e determinato effetto verrà prodotto. Ma stante che la gravità non ha il discernimento di distinguere, se i gravi B, C formino un pendolo composto, o due semplici; nell'uno, e nell'altro caso avremo due effetti pari, siccome generati da pari cause agenti necessariamente.

Ciò posto, gli effetti prodotti, o saranno le quantità del moto comunicate nella doppia ipotesi assunta alle due ghiande B, C, ovvero le forze vive misurate alla Leibniziana. Già sappiamo, che l'uguaglianza sta ferma nella seconda supposizione: veggiamo cosa nella prima succeda.

Nel pendolo semplice AB la velocità acquistata in B può esprimersi per $\sqrt{AB}$; dunque la quantità del moto ad esso partecipata sarà $= B \cdot \sqrt{AB}$; e per la stessa ragione la quantità del moto guadagnata dal pendolo semplice AC in C si esporrà per $C \cdot \sqrt{AC}$; laonde si avrà la somma delle predette due quantità di moto $= B \cdot \sqrt{AB} + C \cdot \sqrt{AC}$. Nel pendolo poi composto chiamata U la velocità della palla B in B, sarà $= \frac{V \cdot AC}{AB}$ quella della sfera C in C, e conseguentemente le due

quantità del moto saranno BV, e $\frac{CV \cdot AC}{AB}$, e il loro aggregato

$$BV + \frac{CV \cdot AC}{AB}.$$

Se dunque gli effetti nascenti dalla gravità nella nostra doppia ipotesi si misurano dalle due somme della quantità del moto come sopra generate, ambe esse somme deono essere fra loro eguali, cioè

D d 2

B.

$$B \cdot \sqrt{AB} + C \cdot \sqrt{AC} = BV + \frac{CV \cdot AC}{AB}, \text{ e ridotta l'equazione,}$$

$$\frac{B \cdot AB \cdot \sqrt{AB} + C \cdot AB \cdot \sqrt{AC}}{B \cdot AB + C \cdot AC} =$$

Per rinvenire poscia in tale falsa supposizione il pendolo semplice AF isocrono al composto ACB, pongasi la lunghezza della verga $AF = x$, la velocità della ghianda F nel punto F $= \sqrt{x}$, e giacchè per avere l'isocronismo, le velocità nei siti analoghi debbono essere proporzionali ai raggi, vale a dire $\sqrt{x} : V :: x : AB$; dunque $\frac{AB}{\sqrt{x}} = V$.

Scoperti in tal guisa i due differenti valori di V, nascerà l'equazione:

$$B \cdot \frac{AB \cdot \sqrt{AB} + C \cdot AB \cdot \sqrt{AC}}{B \cdot AB + C \cdot AC} = \frac{AB}{\sqrt{x}}, \text{ ovvero}$$

$$\frac{B \cdot AB + C \cdot AC}{B \cdot \sqrt{AB} + C \cdot \sqrt{AC}} = \sqrt{x}$$

Questa formola ci porta ad un manifesto assurdo, e per dimostrarlo, prendo a considerare un pendolo composto, in cui il punto di sospensione sia di mezzo fra i due pesi C, B. Se in tal supposto prendesi per negativa la distanza AC, la nostra espressione passa nella seguente

$$\frac{B \cdot AB + C \cdot -AC}{B \cdot \sqrt{AB} + C \cdot \sqrt{-AC}} = \sqrt{x}$$

in cui nel denominatore della frazione ci si presenta la quantità immaginaria $\sqrt{-AC}$, e perciò la grandezza x , o sia la lunghezza del pendolo semplice isocrono è impossibile a determinarsi, nè si trova scritta sul libro della Natura.

Chi per iscanfare l'inconveniente volesse porre negativa la massa C in cambio della distanza AC, ne incontrerebbe un altro, il quale si deduce dalla formola

$$\frac{B \cdot AB - C \cdot +AC}{B \cdot \sqrt{AB} - C \cdot \sqrt{+AC}} = \sqrt{x}.$$

Facciassi $B \cdot AB - C \cdot +AC = 0$, onde le masse B, C sieno in ragione inverfa delle distanze AB, AC, nel qual caso i pesi starebbono in equilibrio, ed il pendolo isocrono AF sarebbe infinitamente piccolo, cioè a dire

dire il centro di gravità della sua ghianda s'unirebbe con quello di sospensione. Quanto dunque fosse minore la differenza fra i due prodotti B. AB, C. AC, tanto più celeri si troverebbero le oscillazioni del pendolo composto, il che è falsissimo. E da ciò si scuopre, che posta l'uguaglianza fra i suddetti prodotti, la lunghezza del pendolo isocrono semplice AF è infinita, come si ricava dalla nostra formola.

$$x = \frac{MR^2 + mr^2}{MR - mr} = \frac{MR^2 + mr^2}{0}.$$

S C O L I O III.

Non si vuole lasciar d'avvertire, che la Natura in regolando i moti dei pendoli composti, e semplici nelle circostanze di sopra notate mantiene ferma l'uguaglianza fra le forze vive Leibniziane, e non già fra le quantità del moto. Quantunque queste due leggi spesso s'uniscano, sono però differenti, nè sono talmente connesse, che una non possa star senza l'altra. Molte fiato dalla Natura vengono nelle sue operazioni insieme congiunte; ma qualora ripugna, che amendue nel tempo medesimo si verifichino, ha sempre luogo la prima, e resta esclusa la seconda; siccome nel caso nostro interviene. E da ciò si raccoglie, qual sia la legge fondamentale, e principale della Natura, e quale l'accessoria, e secondaria. Potrei addurne parecchi esempj, che ci fanno toccar con mano, quanto sia ragionevole la sentenza di Leibnizio, che colle sue forze vive, e non colle quantità del moto misura le azioni, e le reazioni.

S C H E D I A S M A XXI.

Delle comunicazioni del moto, che si fanno per via di attrazione.

Que' Valentuomini, che difendono la più vecchia, e la più comune opinione intorno la misura delle forze vive, in veggendo, che se nell'urto dei corpi molli concedono egliino impiegarsi nelle ammaccature una qualche benchè picciola parte della forza primitiva; la cosa è fatta, ed il tutto in vigore delle mie deduzioni cospira (a) a favore della sentenza Leibniziana; volteranno i loro sforzi a mettere in dubbio il principio, che serve di base alle mie dimostrazioni. Debbo però eccettuare l'in-

Fu scritto dal C. Jacopo nel 1733., come si ricava da lettera del Padre D. Ramiro Rampinelli al Co. Giordano Riccati de' 21. Luglio 1733. Uscì alle stampe tradotto in latino dal Padre Vincenzo Riccati l'anno 1747. nella terza parte del Tomo secondo dei Comentarj dell' Accademia di Bologna.

(a) Veggasi il Cap. XIX. del lib. II. de' Principj, e de' metodi della Fisica.

l'incomparabile Sig. Cav. Nevvton, il quale ha conosciuto almen di passaggio questa verità, e ce ne ha lasciata ne' suoi libri una pubblica testimonianza, che non può più cancellarsi: e quantunque non gli sia venuto in mente di pensare alle illazioni, che cavar se ne possono; perchè gli uomini anche di vista acutissima sopra ogni obbietto non gittano à loro sguardi, ciò non ostante mi persuado, che avendo egli amMESSA una volta la massima, non isdegnerebbe, se fosse in vita, attesa la sua ingenuità, d'ammettere per belle, e per buone le conseguenze.

In tanto almeno in grazia de' suoi discepoli, m'ingegnerò di dimostrare la mia proposizione fondamentale con un altro giro di cose: e perchè nel tempo medesimo mi si apre la strada di considerare una diversa maniera di comunicare il moto, e di farlo passare da un corpo all'altro per via non già di spinta, ma di attrazione; farò vedere con che leggi si regoli questo transito, e come la Natura sia in tutte le sue operazioni uniforme; mettendo in chiaro colla medesima occasione, che fra le infinite ipotesi, che noi possiamo immaginarci intorno la giusta misura delle forze vive, trattane quella del Leibnizio, tutte le altre ci conducono ad assurdi, e contraddizioni.

Prima d'ogn' altra cosa io dimando, se supposta una corda elastica, o una molla nel suo naturale stato, per istenderla, ed allungarla, abbiassi ad impiegar forza. Di questa mia interrogazione alcuni faranno le meraviglie, e ciò interverrà, perchè non distingueranno a prima vista a quale scopo essa sia indiritta. Se rispondono affermativamente, ho io nelle mani quanto mi basta, per condurre a fine la mia dimostrazione: ma in caso di negativa, ch'io non lo credo, bramerei, che facessero meco le seguenti riflessioni.

Penda dal chiodo immobile A (Fig. 68,) l'elastro AB, alla di cui estremità B s'attacchi il peso C, discenderà questo con moto accelerato per esempio fino al punto C, indi per vigore dell'impeto impresso, seguirà esso a discendere, ma con moto ritardato, discendendo la molla fino ad un certo termine, come sarebbe il punto D, in cui si ridurrà alla quiete. Prevalendo allora la forza elastica, la discesa si volterà in ascensione, ed il grave C monterà da D fino in C con moto accelerato, e poi con ritardato fino in B. Così reciprocando a guisa d'un pendolo, continuerà a calare abbasso, e risalire in alto infinite volte, se la verga AB sarà fornita d'una perfetta virtù elastica, e se il giuoco si farà nello spazio vano. Ma non verificandosi queste due circostanze, come in fatto non si verificano, dopo varie oscillazioni si fermerà il peso immobile nel sito C, e l'elastro patirà la distensione BC.

Ora se la resistenza dell'elastro non facesse ostacolo all'azione della gravità, dovrebbe il peso discendere con quella stessa legge di accelerazione, come piomberebbe nell'aere, mentre staccato dalla verga venisse messo in libertà; perchè dunque percorrendo lo spazio BC non si affretta quanto dovrebbe; perchè va tardando il suo moto per l'intervallo CD; perchè giunto in D si trova in istato di riposo; e perchè finalmente mutata direzione, in vece di seguir il suo cammino verso

il

il centro, è obbligato a ritornar in dietro per la linea DB? Non è egli evidente, che tuttocìò procede in parte dalla reazione, ed in parte dall'azione dell'elastro?

Per vederne il modo, si rifletta, che la molla AB ridotta alla sua natural dimensione ha una minima ripugnanza per soffrire uno stiramento infinitesimo: ma quanto più si v'è stendendo, altrettanto resiste ad una ultetior distensione, sinattantochè non potendosi la verga prolungar all'infinito, giunta che sia ad un certo termine di lunghezza, finalmente si spezza. La curva dunque, che colle sue ordinate esprime le tenacità crescenti dell'elastro, avrà l'origine nel punto B, e si anderà sempre più discostando dall'asse BE, come sarà per cagion d'esempio la curva BHK, di cui non importa per ora d'investigar la natura, bastando che la minima resistenza risponda al punto B, e la massima al punto E, posto, che si spezzi la verga, quando alla lunghezza AE sia pervenuta.

In questo mentre la costante BG ci rappresenti il peso del Globo C, e tirata la verticale GI, tagli questa nel punto F la scala delle resistenze; egli è manifesto, che nel punto B il grave esercita tutta la sua azione, perchè in quel sito la resistenza della molla è minima, ma arrivato, che sia al punto M, la gravità non mette più in opera la sua intiera, ed innata forza LM, dovendosi da questa sottrarre il contrasforzo dell'Elastro esposto dall'applicata NM; laonde l'impulso, che sollecita il grave all'ingiù, ci viene rappresentato dall'intercetta LN, e l'aggregato di tutte le successive impressioni non si misura già dal rettangolo GFCB, come interverrebbe, se la palla C discendesse liberamente, ma bensì dal trilineo GFNB. Quindi fatta l'area FHI inferiore al punto F uguale alla superiore GFNB, e condotta l'ordinata HD, segnerà essa il punto D, in cui il peso C, dopo essere disceso per la verticale BD, si ridurrà alla quiete.

Descrivasi ora la parabola Apolloniana Bcd, colle ordinate della quale si esporgano le velocità Cc, Dd, che avrebbe acquistate il grave non impedito nello scorrere rispettivamente gli spazi BC, BD: e giacchè lo stesso grave pendente dall'elastro, giunto che sia al punto C in vece di camminare colla velocità intiera Cc, cammina con una assai minore CO: ne ciò certamente nasce dall'azione della gravità, la quale in ogni punto della discesa non cessa di sollecitarlo con tutta la sua energia; dunque dobbiam dire, che una porzione della forza totale della gravità, la quale alla celerità CO avrebbe aggiunta la OC, siasi impiegata contro l'elastro, vincendo la sua tenacità, e stirandolo da B fino in C. Similmente pervenuto il peso al punto D, si trova egli costituito in quiete, in tempo che liberamente piombando avrebbe guadagnata la velocità Dd; dunque tutta quella forza, ch'è necessaria per imprimere al mobile la suddetta velocità, qualunque ella siasi, si è spesa nello stendere la molla per tutto il tratto BD.

Osservisi in oltre, che l'Elastro nell'atto di rimettersi strascina all'insù il peso C, e lo sforza a rimontare dal luogo D fino in B: ma
per

per farlo ascendere contro l'inclinazione della sua gravità innata; ap- punto tanta forza ci vuole, quanta ne avrebbe acquistata in discenden- do liberamente da B sino in D; dunque tutte le successive impressioni comunicate dalla gravità costante al mobile C nella discesa, in vigore della reazione si sono trasfuse nell'elastro, il quale recuperando la sua natural dimensione, tira in alto il peso con un aggregato pari di forze, non ostante i replicati impulsi, con cui tenta la gravità di spingerlo abbasso.

Queste poche cose, che dette si sono fra le molte, che dir si po- trebbono, basteranno per farci intendere, che non può un elastro qua- lunque, le cui fibre sieno per se medesime in riposo, stendersi, nè ran- nicchiarsi, senza che vi si adoperi una forza estrinseca. Ciò premesso mi metto sotto gli occhi la seguente

IPOTESI.

Alla palla A (Fig. 69.) sia attaccato l'elastro rigido C, ed ambo camminino per uno spazio infinitamente raro colla velocità comune V. Nel tempo, che sono in moto, e scorrono una linea retta orizzontale per non fermarsi mai, all'altra estremità della molla s'intenda congiun- ta la sfera B priva affatto di moto, e per maggiore facilità si suppon- ga, che tanto i due globi, quanto l'elastro sieno senza gravità, e che la massa di questo abbia alle masse dell'una, e dell'altra palla una mi- nima inassegnabile proporzione; non essendovi ripugnanza, che una mol- la di una massa quanto si voglia picciola sia dotata d'una finita tenaci- tà: si dimanda con che leggi si regolerà nella nostra ipotesi la comu- nicazione del moto.

PROPOSIZIONE I.

TEOREMA.

Dico prima d'ogni altra cosa, che nell'atto, in cui si partecipa il moto alla palla B, l'elastro C si allungherà; conciossiachè se la molla non patisce alterazione di sorta alcuna, ne seguirebbe, che la massa B nel primo istante della sua unione all'elastro dovrebbe di salto acqui- stare tutta la velocità della sfera A. E se ciò intervenisse, avrebbersi un effetto, che supererebbe di lunga mano l'energia della propria ca- gione; attesochè la forza prodotta alla primitiva, stante le velocità pa- ri, sarebbe in proporzione, come le masse $A + B : A$. Mentre poi si volesse, che la palla B ricevesse a gradi il moto, che ad essa per mez- zo della molla si partecipa, allora si avrebbe l'azione, senza la corri- spondente reazione: ma tutte queste conseguenze sono ripugnanti a ve- rità incontrastabili; dunque nella nostra costituzione di cose l'elastro necessariamente si stenderà; lo che ec.

CO.

COROLLARIO.

E perchè non si può tener ferma l'analogia, che passa tra la cagione, e l'effetto, se acquistando il corpo B una qualche velocità, il corpo A non ne perde una parte di quella, che in esso risiede; siccome il primo la va acquistando a gradi, il secondo altresì a gradi la va perdendo: ma la comunicazione del moto non si fa se non per via dell'elastro C; dunque anche questo si anderà estendendo appoco appoco, nè cesserà d'allungarsi, finattantochè ambi i corpi A, B, e la molla stessa non camminino con pari velocità.

PROPOSIZIONE II.

TEOREMA.

Per istendere l'elastro oltre i limiti della sua natural dimensio-
ne, deesi nel caso nostro consumare una porzione della forza pri-
mitiva.

Supponiamo, che il corpo A, il quale certamente ne spende una parte a tirarsi dietro il corpo B, sia pervenuto a quel segno, in cui amendue essi corpi procedono con eguale celerità. E perchè il moto comune punto nè poco influisce nell'azione particolare sarà lo stesso, che la molla sia di mezzo a due palle, ch'assieme con essa si muovono di pari passo colla velocità comune per esempio V, come se stesse di mezzo alle predette due sfere costituite in riposo. Ciò dipende dalla dottrina dei moti traslati, e di fatto se si collocheranno i due globi in una pavicella, che proceda in senso contrario coll'assegnata celerità V, coloro, che stanno fermi sul lido, vedranno la molla nell'atto del restringersi agire contro le due masse poste in quiete, l'una, e l'altra delle quali si verranno incontro con direzione opposta. L'elastro dunque, nel ridursi alla sua prima positura, vince l'inerzia di due corpi, che si ponno considerare in quiete, ed imprime loro velocità tali, che sono dell'ordine delle finite: ma ciò non può farsi senza forza, e questa forza la molla non può riceverla altronde, salvo che dalla sfera A; dunque una parte della forza primitiva è passata nell'elastro, il quale viene determinato ad operare nel rannicchiarsi a misura della forza, che nello stenderlo è stata impiegata.

COROLLARIO.

Se ambe le palle assieme colla molla si muovono, la forza primitiva si divide in tre parti, una se ne conserva nella sfera A, l'altra si comunica alla B, e la terza si partecipa all'elastro. Quando poi tutti e tre essi corpi procedono con celerità eguale, in tal caso essendo la molla

Opera Ricc. T. III.

E c

sog.

mente elasticj: ma di ciò non occorre favellare, essendosene in altra occasione detto abbastanza. (a)

Le verità per noi semplicemente enunciata anno a stabilirsi colle dimostrazioni, onde si tolga di mezzo ogni dubbiosità, e si dia luogo ad alcune importanti riflessioni.

PROPOSIZIONE III.

TEOREMA.

La palla A giusta la nostra ipotesi debba tirarsi dietro il corpo B, e fingasi, che la comunicazione del moto si faccia in un vascello, il quale cammini colla velocità stessa U impressa da principio nella sfera A, ma con direzione contraria. Coloro che sono portati dalla nave, veggono ritardarsi appoco appoco il moto del globo A, ed accelerarsi quello del globo B, sinattantoché in entrambi si ravvisi una velocità pari, ch'io chiamerò u . Tutto all'opposto gli spettatori fermi sul lido osservano sul principio la sfera A in quiete, a cui viene partecipato il moto dalla sfera B procedente colla velocità V del vascello, e ciò fino a tanto che amendue camminino con velocità eguale, che si esponga per la specie v . Ma i primi, terminata l'azione, anno sotto gli occhi la velocità u propria delle due palle, ed i secondi la relativa $V-u$, cioè a dire la differenza, che passa tra la predetta celerità, e quella della nave; dunque $V-u=u$, o sia $V=u+v$.

E da ciò s'inferisce (conciosiachè posso io servirmi dell' antecedente discorso, quando stando ferma la palla A viene essa strascicata dalla palla B, che si suppone camminare da principio colla solita velocità V) s'inferisce dico, che considerata l'azione nella sfera A, la quale si tiri dietro la sfera B, o tutto al rovescio, facendo, che il corpo B imprima il moto nel corpo A, ogni qual volta nell'uno, e nell'altro caso ambo esse masse procederanno con celerità pari, per cagion d'esempio nel primo caso colla velocità u , e nel secondo colla velocità v , l'aggregato di queste due celerità sarà sempre uguale alla primitiva, e costante U , cioè $u+v=V$, lo che io m'era proposto di dimostrare.

COROLLARIO I.

Le prenotate velocità u, v anno fra loro un qualche rapporto dipendente dall' analogia, che corre fra le masse A, B. Di fatto, se stando fermo il corpo A, e la celerità V , il corpo B si va scemando fino a diventare infinitesimo, la velocità u valse accostando alla primitiva,

E e z a cui

(a) Accennasi dall'Autore il seguente Schediasma XXII., in cui tratta dei limiti, da quali restano determinate le leggi della comunicazione del moto in qualunque ipotesi.

a cui si fa finalmente uguale, nel qual incontro l'altra velocità v diventa nulla. Ognuno vede, che mentre la sfera A ha da tirarsi dietro una massa minima, non perde, salvo che una parte inassegnabile del suo moto: siccome parimente se la palla B dee strascinare un corpo infinitamente maggiore di se, non può ad esso comunicare, fuorchè una celerità infinitamente pigra. Così se il globo B va all'infinito crescendo, si minora sempre più la velocità u , aumentandosi l'altra v , fino a divenire uguale all'assunta V . Che se poi i corpi A, B fossero di pari massa, sarebbe $u = v$, ed amendue precisamente uguali alla metà della velocità primitiva.

COROLLARIO II.

Risponde altresì ad una qualche relazione fra le masse A, B la forza, che si spende nel dilatare la molla C, particolarmente quando ambo le masse giungono ad acquistare una velocità pari. Posto che il corpo A sia finito, ed il corpo B infinitesimo, egli è evidente, che l'elastro patisce uno stiramento inassegnabile, e che conseguentemente vi si applica una forza minima: al contrario se B fosse infinito, tutto lo sforzo del globo A si consuma in distendere la molla, e perciò nei casi di mezzo, quando cioè le due sfere si riguardano con una finita proporzione, l'energia della palla A dividesi in due, e parte s'adopra nella comunicazione del moto, e parte nello stirare l'elastro: con questa avvertenza però, che quanto è maggiore la grandezza del corpo B rispetto a quella del corpo A, altrettanto una maggior porzione di forza contro l'elastro si spende, la quale vaffi sempre diminuendo, quanto più, stando costante la massa A, viene ad impicciolirsi la massa B.

S C O L I O.

Fa a mio proposito, che si mettano a confronto le due maniere, per cui si comunica il moto, cioè quella per via d'attrazione con l'altra, nella quale vi si impiega l'impulso, e la percoffa. Abbianfi (Fig. 70.) due altre palle $a = A$, e $b = B$, e facciasi, che la sfera a mosia colla velocità V , urti nella b quiescente, e dopo la collisione, essendo ambedue perfettamente molli, ed inerti, camminino unite colla celerità comune x : indi la palla b , in cui risegga la medesima velocità V , si volti a percuotere la sfera quieta a , e dopo il colpo procedano ambe di conserva colla velocità y .

Dico, che la somma delle due predette velocità $x + y$ è uguale alla velocità primitiva V . Per i canoni della comunicazione del moto fra i corpi molli comunemente ricevuti, e da me dimostrati (a) si trova

$$x = \frac{aV}{a+b}, \text{ ed } y = \frac{bV}{a+b}; \text{ dunque } x + y = \frac{a+b}{a+b} \cdot V = V. \text{ Da ciò se}$$

ne

(a) Lib. 11. Cap. XVIII. de' Principj, è de' metodi della Fisica;

ne ricava, che essendosi per noi provato essere $u + v = V$, avremo ancora $x + y = u + v$.

Dico di più, che ammessa per vera la sentenza dei Cartesiani, che le forze vive si misurino dalla quantità del moto, e che conservandosi nella collisione de' corpi inerti la stessa quantità di moto tanto prima, quanto dopo la percossa, onde niuna parte della forza viva passi in morta, e nella contusione si spenda; non può mai verificarsi la suddetta equazione $x + y = u + v$.

La ragione si è, perchè se dopo d'aver la palla A (Fig. 69. e 70.) comunicato per quanto può il moto alla palla B, si conservasse in esse palle tutta la forza primitiva senz'alcuna diminuzione, una parte non se ne potrebbe impiegare nel distendere l'elastro; altrimenti l'energia dell'effetto supererebbe di gran lunga quella della propria cagione: ma già si è detto, che una porzione di forza viene assorbita dalla reazione della molla; dunque la restante espressa secondo i Cartesiani per

$A + B. u$ è minore della primitiva AV , a cui essendo uguale la forza $a + b. x$, che richiede nei due corpi a, b , dopo la percossa; ne segue, che essendosi poste uguali le masse $A, a; B, b$, la velocità x sarà maggiore di u .

Col medesimo progresso si proverà, che la celerità y è più grande di V ; dunque il binomio $x + y$ eccederà l'altro $u + v$, il che è un manifesto assurdo, e contrario alla conclusione per noi di sopra dimostrativamente dedotta.

Nè si può credere, che una più grande porzione della forza primitiva si spenda nella contusione, messa al paragone di quella, che s'impiega a distendere la molla; conciossiachè si manterrebbe minor quantità di forza viva nelle due palle a, b dopo l'urto, ed all'incontro una maggiore quantità nelle altre due A, B , tirato che fosse l'elastro a norma della nostra supposizione. In ordine a ciò la velocità u supererebbe la velocità x , come altresì farebbe v maggiore di y , e conseguentemente il binomio $x + y$ minore dell'altro $u + v$, il che ripugna alla nostra dimostrazione.

Bisogna per tanto dire, che una medesima porzione di forza viva si spenda ugualmente nello stirare l'elastro, e nel formare la contusione, e che in qualunque maniera passi l'azione da un corpo all'altro o per via di spinta, o per via d'attrazione, non alterandosi in conto alcuno la quantità primitiva del moto, da essa non abbia a prendersi la giusta misura della forza viva, da cui non solamente il moto superfluo riconosce l'origine, ma di più ciò, che nelle ammaccature, o nelle distensioni degli elastri si consuma.

Le cose dette senz'altra perquisizione ci fanno comprendere con qual legge si regoli la prima comunicazione di moto, che si fa per via d'attrazione, stante che essendo per una parte $x = u$, ed $y = v$, e per l'al-

tra

tra $x = \frac{aV}{a+b}$, ed $y = \frac{bV}{a+b}$, avremo le celerità u , v espresse per le mas-

se, e per la velocità primitiva, e potremo tirare tutte quelle illazioni, che per intiero compimento della materia opportune si giudicassero, quand' anche ambo le masse da principio si supponessero mosse con velocità diverse, o conspiranti, o contrarie. In tanto procuriamo di camminare per un'altra strada, e sia

PROPOSIZIONE IV.

PROBLEMA.

Determinare quanta forza si consumi nella distensione dell' elastro, e come abbia a misurarsi la forza primitiva della palla A.

Pongasi per procedere generalmente la forza viva della palla A (Fig. 69.) avanti qualunque azione in ragion composta della massa A, e di qualsivoglia dignità U^n della velocità: e perchè già s'è insinuato, che la forza, la quale si conserva nelle due sfere A, B, compita che sia la comunicazione del moto, a quella, che si trasfonde nell' elastro, serba una relazione, che dipende in qualche modo dall' analogia fra le masse A, B; facciasi, che la distribuzione delle predette forze seguiti la proporzione, che passa fra le due potestà indeterminate A^r : B^r .

Inerendo alla nostra ipotesi, la forza viva, che resta nelle due palle dopo l'azione, s'esprime per le masse $A + B$ moltiplicate nella velocità u alzata all' esponente n , cioè per $A + B \cdot u^n$: ma come A^r : B^r :: $A + B \cdot u^n$: $\frac{A + B \cdot B^r u^n}{A^r}$; dunque l'ultimo termine dell' analogia ci di-

nota la forza impiegata a prolungare l' elastro, e sommate queste due forze, che unite insieme pareggiano la primitiva, attesa l'egualità fra gli effetti prodotti, e la cagione producente, ci si presenterà l'equazione $A + B \cdot u^n + \frac{A + B \cdot B^r u^n}{A^r} = AV^n$, o sia $\frac{A^r + B^r}{A^r} \cdot u^n = \frac{A^r + B^r}{A + B} V^n$, ed

abbassando i membri coll' estrazione della radice, il cui indice è n ,

$$\frac{A^{\frac{r+n}{n}} + B^{\frac{r+n}{n}}}{A + B} V = u.$$

Similmente dopo l'azione della palla B, che mossa da principio colla celerità V si tira dietro la palla A, la forza, che rifiede nelle due sfere,

re, si ritrova $= \overline{A+B} \cdot V^2$; ma come $B^2 : A^2 :: \overline{A+B} \cdot V^2 : \overline{A+B} \cdot A'V^2$;

e questo ultimo termine dinota la forza impiegata contro l'elastro; dunque uguagliando l'aggregato delle predette due forze alla primitiva BV^2 , e riducendo il calcolo siccome di sopra s'è fatto avremo

$$\frac{B^2}{A+B} \cdot V^2 = V^2. \text{ Ma per il nostro Teorema } n+v=U$$

dunque $\frac{A^2}{A+B} \cdot V^2 + \frac{B^2}{A+B} \cdot V^2 = V^2$, e finalmente

$$\frac{A^2}{A+B} + \frac{B^2}{A+B} = A+B. \text{ A' + B' = A + B. A' + B' = A + B.}$$

Fa di mestieri dunque, per iscoprire ciò, di che andiamo in traccia determinare talmente i due esponenti n , t , che qualunque siasi la proporzione, con cui si riguardano le masse A , B , che può in infiniti modi ad arbitrio variarsi, si verifichi sempre la nostra ultima equazione. Ciò però non si conseguirà mai, se non si fisserà l'esponente $t=1$, e l'altro esponente $n=2$; dunque la forza primitiva è come la massa A moltiplicata nel quadrato V^2 della velocità, e si distribuisce in maniera, che la forza, la quale dopo la comunicazione del moto si mantiene nelle due sfere A , B , a quella, che si spende nell'agire contro l'elastro nella stessa proporzione delle masse, cioè a dire come A , B : le quali tutte cose doveano determinarsi.

COROLLARIO I.

Sieno le forze vive proporzionali alle quantità del moto siccome vogliono i Cartesiani, onde abbiasi l'esponente $n=1$, e la formula generale si riduca alla particolare $A^{1+1} + A'^{1+1} = A+B: A'+B'$, ovvero $A^{2+1} + B'^{2+1} = A^{1+1} + A'B + AB' + B'^{2+1}$. Comunque si determini il valore dell'indice t , nascerà sempre l'assurdo, che il tutto sia eguale alla parte, ovvero che una delle due masse A , B abbia a prendersi per negativa, riducendosi la premessa equazione alla seguente $A^{1+1} = -B'^{1+1}$: laonde per picciola, che si finga quella porzione di forza, che si spende nello stiramento della molla, sarà sempre un fenomeno, che ci mette sotto gli occhi la ripugnanza della comune opinione.

CO-

COROLLARIO II.

Diversificata la supposizione, ci si affaccieranno gli stessi inconvenienti, o pure bisognerà determinare quel preciso valore della massa B per rapporto alla massa A, che alla nostra equazione soddisfaccia, ed allora potrà la Natura operare in un solo caso, e negli altri innumerevoli dovrà pensare a mutar legge, ovvero a permettere una sorta di comunicazione di moto assurda, ed impossibile.

COROLLARIO III.

Non così interviene, mentre sia $t=1$, ed $n=2$; perchè in qualsivoglia determinazione delle masse sta salda l'egualità fra i due mem-

bri dell'equazione, essendo $A+B=A^2+2AB+B^2$.

COROLLARIO IV.

Se poi si prendessero uguali le masse A, B allora l'equazione si fa

più semplice, e si riduce alla seguente $2A^{\frac{t+1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} A^{\frac{1}{2}}$, o pure $2^{\frac{1}{2}} = 4$. ed in questo incontro si vede essere l'esponente r necessariamente uguale al binario; dunque se posta $B=A$, la forza della palla A ci viene esposta per il prodotto AV^2 , non ammette essa alterazione in qualsivoglia altro caso; perchè la forza viva d'un corpo in moto in nessuna maniera dipende dal corpo B, a cui per mero accidente se ne debbe una qualche parte comunicare.

COROLLARIO V.

Presa di bel nuovo per mano la formula generale

$A^{\frac{t+1}{2}} + B^{\frac{t+1}{2}} = A+B$, $A'+B'$, si ridurrà essa più particolare; in facendo, $n=2$, giusta la determinazione del precedente corollario.

Quindi $A'^{2^{\frac{1}{2}}} + 2A^{\frac{1}{2}}B^{\frac{1}{2}} + B'^{2^{\frac{1}{2}}} = A'^2 + AB' + BA' + B'^2$;

e conseguentemente $2A^{\frac{1}{2}}B^{\frac{1}{2}} = AB' + BA'$, e dividendo tutti i

termini per il prodotto AB; $2A^{\frac{1}{2}}B^{\frac{1}{2}} = B'^{\frac{1}{2}} + A'^{\frac{1}{2}}$, o sia $A'^{\frac{1}{2}}$

$A^{t-1} - 2A \frac{t-1}{A} B \frac{t-1}{A} + B^{t-1} = 0$, ed estrarra la radice quadrata ;

$A \frac{t-1}{A} - B \frac{t-1}{A} = 0$. Quest' ultime equazioni si riducono al caso particolare di $A=B$, la qual egualità permettendoci di poter assumere come unità ognuna delle due masse A, B , nulla rileva, che alla quantità t si dia qualunque valore. Intanto ci è un'altra strada di salvare l'uguaglianza nelle formule antecedenti, ponendo l'indice t uguale all'unità, senza limitare la proporzione fra le due masse A, B .

S C O L I O.

Per tutto ciò, che fin ora si è spiegato, chiaramente apparisce, che surrogata qualunque altra legge, col mezzo della quale si pensi di misurare la forza viva d'un corpo in moto, trattane la sola Leibniziana, ci si fanno incontro parecchie contraddizioni. In fatti io stabilisco due principj incontrastabili, a' quali il mio discorso s'appoggia, cioè primieramente, che debba ammettersi la Teorica de' moti traslati, ed in secondo luogo, che una qualche porzione della forza primitiva si spenda nello stirare l'elastro: e da queste verità cavate per via di dimostrazione alcune necessarie conclusioni, chiaramente comprendo, che qualsivoglia canone, che mi piaccia d'assumere intorno le forze vive, distrugge o l'una, o l'altra, o amendue insieme le massime mentovate, le quali vano perfettamente d'accordo colla sola legge scoperta dall'incomparabile Leibnizio. Ogn'altra ipotesi dunque è impossibile, ne può essere messa in opera dalla Natura, senza che ci si facciano innanzi gli inconvenienti, che si dia un effetto fisico, cui non risponda la propria causa, ovvero che il moto comune a molti corpi confonda, e perturbi il particolare.

PROPOSIZIONE V.

TEOREMA.

Ogni qual volta le due sfere A, B , sono ridotte a camminare con pari celerità, allora l'elastro C soffre il maggiore stiramento, a cui possa essere soggetto nelle circostanze, in cui si ritrova: e perchè abbiamo osservato, che allora sta in mezzo a due corpi, i quali con esso lui procedono con egual moto, cessata totalmente l'azione del globo A , e la reazione del globo B , comincia ad operare la molla, accorciandosi appoco appoco, sinattantoche ritorna al suo stato naturale, ed in tal guisa viene ad accelerare il moto della sfera B , e a ritardare quello della sfera A ; dico, che in tali circostanze la comunicazione del moto fassi secondo le regole dei corpi perfettamente elastici.

La palla $a \equiv A$ (Fig. 69. e 70.) urti nella palla $b \equiv B$, e siano le due masse A, b dotate d'una squisita virtù di molla, onde dopo la percossa intieramente si restituiscano. Già si è dimostrato, che tanta forza precisamente s'impiega nell'ammaccatura, quanta nello stiramento dell'elastro, e che tanto le due sfere a, b , quanto l'altre due A, B almeno per un momento procedono di conserva con una velocità data $\frac{AV}{A+B}$;

le seconde quando l'elastro patisce la massima distensione, e le prime quando l'ammaccatura è intieramente compiuta. Le predette dunque due forze uguali nel rimettersi agiscono collo stesso vigore ogn'una di esse contro masse uguali, mosse colla medesima direzione, e con uguale velocità; perciò stando tutte le cose pari, non ci è ragione, per cui non abbiano ad essere uguali gli effetti, e conseguentemente terminata l'operazione delle mentovate due forze, le velocità delle due palle A, a , com'è altresì delle due B, b saranno eguali: ma dopo la percossa, e la restituzione della contusione, i globi a, b camminano colle regole della comunicazione del moto, che si osservano negli urti de corpi perfettamente elastici; dunque colla stessa legge procedono anche le masse A, B , dappoichè l'elastro s'è ridotto alla sua prima, e natural dimensione.

COROLLARIO I.

In tale circostanza tutta la forza primitiva AV^2 risiede nelle due sfere; conciossiachè niuna forza s'impiega contro la molla, mentre questa non è stirata, nè compressa.

COROLLARIO II.

Di fatto la velocità della palla B si fa essere $= \frac{2AV}{A+B}$, e quella della

palla $A = \frac{A-B}{A+B} V$, ed alzando queste due quantità ai loro quadrati,

i quali si moltiplicheranno rispettivamente per le masse B, A , avremo le forze vive delle due palle, cioè quella della sfera $B = \frac{4BA^2V^2}{A+B^2}$,

e l'altra della palla $A = \frac{A^3-2A^2B+AB^3}{A+B^2} U^2$. Congiunte in una som-

ma le suddette due forze, saranno precisamente uguali alla primitiva AV^2 .

SCO.

S C O L I O II.

Io non mi prenderò la briga di dedurre tutte quelle conseguenze, che discendono dalle nostre proposizioni fondamentali, o considerando il passaggio del moto da un corpo all'altro, e la distribuzione delle forze; ovvero come dalla legge principale nasca la secondaria, per cui si conserva sempre la stessa quantità relativa del moto, ed il centro di gravità delle due palle non cangia nè velocità, nè direzione. Lascierò pure da parte i casi più composti, cioè a dire se si supponesse, che alla sfera B, nell'atto di congiungersi con l'elastro, fosse impresso un moto a parte a quello della sfera A o cospirante, o contrario. Di tutti questi accidenti ho con altra occasione favellato abbastanza, nè debbo io abusarmi della pazienza di chi legge, mettendogli innanzi più fiate la cosa medesima, quantunque sotto un aspetto diverso.

S C O L I O II.

Avvertirò per ultimo, che la comunicazione del moto regolata sulle leggi dei corpi elastici non dura più d'un istante, e la ragione consiste in ciò, che o la sfera B cammina con maggiore velocità della sfera A, quand' ambo procedono colla medesima direzione; ovvero, come può frequentemente succedere in caso, che A sia minore di B, si vengono esse incontro con moto contrario. Comunque vada la faccenda, egli è necessario, che l'elastro patisca una compressione, compiuta la quale, acquistando le sfere una pari celerità, ci metteranno sotto gli occhi un'altra specie di comunicazione di moto, che si fa per via d'impulso, e seguita le leggi dei corpi molli.

Ma trovandosi la molla rannicchiata da una forza esterna, dee di bel nuovo dilatarsi, e recuperare la sua naturale lunghezza; dunque ritarderà essa il moto della palla B, ed accrescerà quello della palla A: terminata la qual operazione, la prima si ridurrà alla quiete, e la seconda acquisterà la velocità primitiva V.

Così torneremo da capo, dappoichè alle due sfere sarà stato partecipato il moto in tutte le maniere, e circostanze possibili. La dimostrazione degli ultimi due fenomeni si cava per via di corollario dalle premesse Propositioni.

SCHEDIASMA XXII. (*)

Dei limiti, da' quali restano determinate le leggi della comunicazione del moto in qualunque ipotesi.

Prendo a considerare uno dei casi più semplici, quando cioè il corpo R, che cammina con una data velocità $= V$, incontra per viaggio il corpo S costituito in quiete, e ad esso comunica il moto in qualunque supposizione, o sieno ambo perfettamente molli, o perfettamente elastici, o di natura media fra le due estreme. Gli altri casi più composti, vale a dire mentre il corpo S si muove con una determinata celerità o cospirante, o contraria a quella del mobile R, si riducono facilmente al già proposto col mezzo della teoria de' moti traslati.

Urtando dunque il corpo R nel corpo S, compito l'effetto della contusione, prima che l'elastro si spieghi, procederanno essi almeno per un istante colla velocità comune $\frac{RV}{R+S}$, giusta i canoni della comuni-

cazione del moto fra i corpi inerti, e la loro forza viva in tale stato computata alla Leibniziana, moltiplicando della predetta velocità il semiquadrato $\frac{R^2 V^2}{2 \cdot R+S}$ per la somma delle masse $R+S$, sarà $= \frac{R^2 V^2}{2 \cdot R+S}$;

ma la forza viva del corpo R prima della percossa era nella stessa ipotesi $= \frac{RV^2}{2}$; dunque sottratta quella da questa, avremo la forza morta,

$$\text{che si spende nella contusione} = \frac{RV^2}{2} - \frac{R^2 V^2}{2 \cdot R+S} = \frac{RSV^2}{2 \cdot R+S}.$$

Ora

(*) Da una lettera scritta nel mese di Luglio dell'anno 1731, e diretta al Fratello Co. Giordano siamo istruiti, che il Padre Vincenzo Riccati aveva ricevuta una Dissertazione del C.J., che promette di tradurre in latino. Li 4. Settembre dell'anno seguente manda il Padre Vincenzo al Co. Giordano la traduzione della soprad detta Dissertazione, ed indi a' 17. dello stesso mese rende ragione della versione della parola elastro, dicendo per altro, che starebbe bene modificata conforme il suggerimento del C.J. Questa circostanza ci manifesta, che la mentovata Dissertazione era il presente Schediasma XXII. trovandosi nell'esemplare di pugno del Padre Vincenzo la stabilita correzione, e si rende noto altresì, che nell'anno 1737. era compiuto lo Schediasma, di cui parliamo.

Ora questa forza morta si è quella, che torna ad esser forza viva, quando i corpi si rimettono in virtù del loro elaterio. E perchè la forza morta può restituirsi o in tutto, o in parte, secondo che i corpi sono dotati o d'una perfetta, o d'una imperfetta elasticità; facciamo, che l'intera $\equiv RSV^2$, a quella, che dalla molla viene restituita, sia in ra-

$$\frac{2 \cdot R + S}{nRSV^2}$$

gione come 1: n, onde la forza restituita s'esprima generalmente per $\frac{nRSV^2}{2 \cdot R + S}$.

$$2 \cdot R + S$$

A questo passo si noti, che la specie n è circonscritta da' suoi limiti, cioè per una parte dal nulla, e per l'altra dall'unità, oltre i quali non può trascorrere. Nel primo caso, quando $n=0$, i corpi sono perfettamente molli; nel secondo, mentre sia $n=1$, sono perfettamente elastici: nei casi di mezzo la forza dell'elastro è imperfetta, ed a questo genere si riducono tutti i corpi da noi conosciuti, che per un verso non si dimostrano affatto inerti, rendendo nella mutua percossa un suono muto, indicio di qualche elasticità, e per l'altro lo stesso suono, che s'ode, ci fa comprendere, che almeno una parte di quella forza, da cui venivano animati i corpi avanti la collisione, si spende a mettere in tremoto le minime particelle, delle quali sono composti laonde, trattane forse la luce, non c'è materia dotata d'una isquisita elasticità.

In altra occasione ho dimostrato essere proprietà d'un elastro posto in mezzo a due corpi costituiti in quiete di ripartire ad essi la sua forza in proporzione reciproca delle masse. Perciò se la forza d'un elastro pareggi la grandezza $\frac{nRSV^2}{2 \cdot R + S}$, facendo $R+S:R::\frac{nRSV^2}{2 \cdot R + S}:\frac{nR^2SV^2}{2 \cdot R + S}$,

l'ultimo termine dell'analogia ci rappresenterà la parte di forza, che dalla molla viene comunicata al corpo S; e facendo

$$R+S:S::\frac{nRSV^2}{2 \cdot R + S}:\frac{nR^2SV^2}{2 \cdot R + S}, \text{ l'ultimo termine ci dinoterà quella}$$

porzione di forza, che dall'elastro viene comunicata al corpo R.

Agevolmente si determinano le velocità, che a' suddetti corpi quieti R, S vengono partecipate per l'espansione dell'elastro. Dividasi per la massa S la forza viva $\frac{nR^2SV^2}{2 \cdot R + S}$ comunicata, come si è detto di sopra

$$\frac{nR^2SV^2}{2 \cdot R + S}$$

al corpo S, e ci si presenterà il semiquadrato della velocità cercata $\equiv$

$$= \frac{n R^2 V^2}{2 \cdot R+S}; \text{ dunque la velocità impressa dall' elastro al corpo}$$

$$S = \frac{RV\sqrt{n}}{R+S}; \text{ similmente la velocità partecipata al corpo R si troverà}$$

$$= \frac{SV\sqrt{n}}{R+S}. \text{ Ma per la teorica del moto traslato, agli stessi corpi nella}$$

dilatazione d'un elastro le stesse velocità si comunicano, o'seno quieti; o si muovano insieme con qualunque celerità; dunque le velocità ritrovate son quelle stesse, che nella nostra ipotesi ricevono dall' elastro i corpi R, S, l'una delle quali è contraria, l'altra cospirante alla comune velocità primitiva $= \frac{RV}{R+S}$. Perciò l'intera velocità del corpo

$$S = \frac{RV}{R+S} + \frac{RV\sqrt{n}}{R+S} = \frac{1+\sqrt{n}}{R+S} \cdot RV = u, \text{ e quella del corpo}$$

$$R = \frac{RV}{R+S} - \frac{SV\sqrt{n}}{R+S} = \frac{R-S\sqrt{n}}{R+S} \cdot V = W; \text{ le quali due equa-}$$

zioni, posta n indeterminata, sono a due parabole Apolloniane.

COROLLARI

Andrò raccogliendo alquante conseguenze, che nascono immediatamente dall' Analisi.

I. Le velocità, le quali dalla forza elastica, che si restituisce, vengono impressa con direzione contraria nelli due corpi R, S, cioè a dire

$$\frac{\sqrt{n} \cdot SV}{R+S}; \frac{\sqrt{n} \cdot RV}{R+S} \text{ si scoprono essere come } S : R \text{ in proporzione reci-}$$

proca delle masse.

II. Perciò moltiplicando la velocità partecipata dall' elastro al corpo

$$R = \frac{\sqrt{n} \cdot SV}{R+S} \text{ per la massa R, e l'altra comunicata al corpo S}$$

$$= \frac{\sqrt{n} \cdot RV}{R+S} \text{ per la massa S, avremo per una parte, e per l'altra quan-}$$

tità

tà di moto uguali, ma con opposta direzione. E questa è una proprietà comune a tutti gli elastri collocati in mezzo a due corpi, che può facilmente dimostrarsi per altra strada.

III. La somma delle quantità del moto generata dall'elastro, e fra due corpi egualmente distribuita $= \frac{2\sqrt{n} \cdot RSV}{R+S}$, paragonata colla quan-

tità del moto RV, che risiedeva nel corpo R prima della percossa, ci dà la proporzione come $2\sqrt{n} \cdot S : R+S$. La prima dunque può essere maggiore, minore, ed eguale inessa a confronto della seconda, conforme si va variando la ragione fra le masse R, S, ed il valore della spezie n relativamente all'unità.

IV. Egli è certo, che se urtando la massa R colla velocità V nella massa S quieta, si farà la comunicazione del moto secondo le note regole dei corpi molli, ambo essi corpi R, S procederanno colla celerità comune $\frac{RV}{R+S}$. Moltiplicando pertanto la velocità del corpo R per la sua

massa R, e quella del corpo S per la sua massa S, avremo le due quantità di moto $\frac{R \cdot V}{R+S}$, $\frac{RSV}{R+S}$, che unite in una somma ci daranno la

quantità di moto RV, quella stessa, da cui veniva animato il corpo R avanti la percossa.

V. Ora se dalla quantità del moto del corpo R $= \frac{R \cdot V}{R+S}$, con cui

camminerebbe esso corpo dopo la collisione, se fosse affatto inerte, sottrarremo la prodotta dell'elastro in senso contrario $= \frac{\sqrt{n} RSV}{R+S}$, ed

alla quantità del moto del corpo S nella circostanza come sopra $= \frac{RSV}{R+S}$ aggiungeremo la generata dalla molla con direzione cospirante

parimenti $= \frac{\sqrt{n} RSV}{R+S}$, scopriremo, che sieno i mobili o inerti, o do-

tati di perfetta, o imperfetta elasticità, tanto prima, quanto dopo l'urto si mantiene la stessa quantità di moto, avuto però riguardo ai moti o cospiranti, o contrari.

VI. Quindi non resterà mai alterata nè la velocità, nè la direzione del centro di gravità dei due corpi R, S; e come camminava avanti il congresso, così continuerà a muoversi dopo la collisione.

VII.

VII. La velocità relativa delli due corpi R, S , restituito che sia l'elastro, s'esprime generalmente per la quantità $U\sqrt{n}$, e sarà alla velocità relativa de' predetti corpi prima dell'urto come $\sqrt{n}:1$, la quale analogia si cambia in egualità, posto che i corpi sieno perfettamente elastici.

VIII. Finalmente computata la forza viva del corpo R avanti la percossa giusta la sentenza del Leibnizio, moltiplicando la massa R nel semiquadrato $\frac{V^2}{2}$ della velocità, questa forza sarà all'aggregato delle

forze vive, che risiedono nei corpi R, S compiuta la comunicazione del moto, come $R+S: R+nS$, e conseguentemente a quella porzione di forza, che dai corpi imperfettamente elastici resta per così dire asorbita, e non agisce nell'atto della restituzione, come $R+S: S-nS$.

Se dunque saranno i corpi affatto inerti, fatta $n=0$, la forza primitiva sarà alla viva, che resta, come la somma delle masse $R+S$ alla massa R del corpo in moto, ed alla morta, che si perde nella confusione, come la somma delle masse $R+S$ alla massa S del corpo in quiete, ed in conseguenza avremo in ragione di $R:S$ la forza viva, che nei corpi dopo l'urto si conserva, alla morta, che senza restituirsì nella mutua ammaccatura si spende.

Se poi si supporranno essi corpi perfettamente elastici, allora essendo $n=1$, la forza viva prima del urto si mantiene la stessa anche dopo l'urto, dividendosi fra corpi con quelle leggi, che dal calcolo risultano.

Nei corpi dotati d'imperfetta elasticità, la formula c'insegna come cammina la faccenda.

S C O L I O

I Corollari, che si sono dedotti, e che concordano colle Proposizioni già dagli altri Geometri dimostrate intorno la comunicazione del moto ne' due casi più semplici di corpi o perfettamente molli, o perfettamente elastici, mi porgono motivo di render la ragione, da cui sono stato persuaso a servirmi nell'analisi della ipotesi Leibniziana, supponendo, che le forze vive d'un corpo in moto abbiano a misurarsi dalla massa moltiplicata nel semiquadrato della velocità, e non dalla quantità del moto, come pretendono i Cartesiani, ed i Nevvtoniani.

Il Corollario quinto c'insegna, che urtando il corpo R nel corpo S , si mantiene costante tanto prima, quanto dopo l'urto la medesima quantità di moto, o sieno i corpi totalmente inerti, o dotati di perfetta, o imperfetta elasticità. Su questo principio suole comunemente fondarsi una delle principali ragioni, per cui si professò, che la forza viva dalla quan-

tità

tà del moto non si distingua: e pure s'io non m'inganno, penso, che da ciò debba tirarsi una conseguenza direttamente contraria.

Egli è certo, che nelle percosse vicendevoli di tutti que' corpi, che abbiamo alle mani, quantunque sieno de più risentiti, e de più disposti a prontamente rimettersi, non si conserva intera dopo l'urto quella quantità di forza viva, da cui erano animati prima della collisione. In prova di questa verità basta leggere le accuratissime osservazioni fatte col mezzo dei Pendoli dal Cav. Nevvton, e le più recenti registrate in una Dissertazione del Sig. Giovanni Rizzetti stampata nel primo Tomo degli atti dell'Accademia di Bologna.

E perchè nelle citate sperienze sono state computate diligentemente le resistenze, e particolarmente quella, che nasce dal contrasto dell'Aria; si persuadeva il Matematico Inglese, che la diminuzione della forza, la quale nelle palle di vetro da lui adoperate era prossimamente la decimasesta parte della forza primitiva, nascesse da qualche picciola contusione, per cui nell'atto della percossa restassero esse sfere intaccate, e viziate in maniera, che per quanto fossero pronte a restituirsì, non giungessero però mai a ricuperare esattamente la loro primiera figura.

A buon conto secondo l'opinione del citato Autore, ogni qual volta dopo l'urto rimane la contusione, abbiamo ad inferire, che ci è perdita di forza: ma nel congresso dei corpi molli si rende manifesta al senso l'ammaccatura; dunque se la stessa quantità di moto si conserva, o la forza è una cosa diversa dalla quantità del moto, o nulla di forza si perde nella contusione. Guardinsi dunque i Nevvtoniani, che nell'opporli al Gravefande, che prima d'ogni altro di quella forza, che nelle ammaccature si consuma, e passa da viva in morta, ha fatto parola, non gettino a terra le massime del loro Maestro, e non impugnino una verità evidente da lui conosciuta, e insegnata per difendere una ipotesi, che mal s'accorda con i fenomeni.

In molti incontri la cosa succede almeno in parte come il Signor Nevvton va divisando, specialmente in quella sorta di materie, che fra le molli, e le dure stanno di mezzo, e che ci fanno sentire un suono ottuso. Frattanto spesse fiate accade, che parecchi corpi possono chiamarsi in un senso perfettamente elastici, come per cagion d'esempio le sfere di vetro, di bronzo, d'avorio, in quanto cioè compiuta la compressione nascente dalla percossa, anno in se tal virtù di rimettersi, e di ricuperare la loro figura, che in esse non si discerne nè pur vestigio di qualsivisia minima contusione. Sopra questo punto merita d'esser letto ciò, che dopo il Mariotte ha dottamente scritto il Sig. Rizzetti nella citata Dissertazione.

Non ostante ciò se rifletteremo, che tutta la forza primitiva non s'impiega nella comunicazione del moto, ma che una parte se ne trattiene, per così dire, dai corpi stessi, le minime particelle dei quali vengono agitate, e sconvolte da un moto intestino di tremito, e di palpitazione, per cui si genera il suono, che sempre mai durerebbe, se non venisse estinto dalla resistenza del mezzo; conchiuderemo, che in

qualunque caso la forza, dalla quale viene generato il moto prodotti dalla riflessione, è sempre minore di quella, che risiedeva nel corpo stessi, e da cui nasceva il moto locale prima della percossa.

E se così è (perchè s'altrimenti fosse, la forza viva, che si conserva nel moto riflesso, aggiunta l'altra, che si spende, o nel tremito, o nella contusione, o in ambo i suddetti elementi, supererebbe la forza primitiva, che sola l'uno, e l'altro effetto produce, e si porrebbe un'eccezione al generalissimo assioma, che l'energia dell'effetto non può mai eccedere quella della propria cagione) mi sembra evidente, che se nella percossa una qualche parte della forza viva s'impiega sempre in produrre il tremito, e frequentemente anche la contusione, e che ciò non ostante tanto prima, quanto dopo l'urto la stessa quantità di moto locale sussiste in tutti i corpi o affatto inerti, o perfettamente, o imperfettamente elastici; non abbia punto che fare la forza viva colla quantità del moto, e che queste sieno due proprietà diverse, che senza incorrere in un manifesto paralogismo non possono mai prendersi per una cosa medesima.

C O S T R U Z I O N E.

La velocità U , con cui cammina il corpo R (Fig. 71., 72., 73.) prima d'urtare nel corpo S , ci venga rappresentata dalla retta CD , alla quale tirata la perpendicolare CA , questa ci esponga tutta la forza, che s'impiega nella compressione, e che intiera si restituisce dai corpi perfettamente elastici, con che le ascisse crescenti Cw , CM , che principiano dal nulla, e vanno a terminare nella massima CA , esprimessero le forze, con cui si sviluppano gli elastri imperfetti in tutti i casi possibili. Compiuto il rettangolo $CABD$, la base AB si divida in due parti AI , IB , che sieno in ragione reciproca delle masse R , S , e dai vertici C , D intorno gli assi CA , DB si descrivano le due semi parabole come nello schema, che ambe passino per lo punto I . Quindi prorogata CD in H , si cacciansi tanto DH , quanto CG uguali all'ordinata BI , e condotte le normali HL , GK , si avrà ciò, che basta per la costruzione, e per le necessarie determinazioni.

C O R O L L A R J.

I. L'ordinata BI appartenente alla curva BPI nel punto, dove le due parabole si tagliano, dinota la velocità, con cui urtando il corpo R colla celerità AB nel corpo S quieto, ambo camminerebbono uniti dopo la percossa, mentre fossero perfettamente molli. All'incontro l'applicata AI dell'altra parabola CNI esprime la velocità, colla quale nella medesima ipotesi procederebbero di conserva i mobili S , R , quando il corpo S colla suddetta velocità AB urtasse nel corpo R costituito in riposo.

II.

II. La supposizione dell'antecedente Corollario ci somministra uno dei limiti, che per un verso circoscrivono le operazioni della Natura. L'idea d'un corpo affatto inerte è un lavoro del nostro intelletto, al quale poco costa il fingere, che tutta la forza impiegata nella contusione passi in forza morta, di modo che se ne restituisca una porzione, o nulla, o infinitamente picciola. In fatto si trovano alcune materie pigre, e cedenti, come per esempio la creta molle, che a tale immaginaria proprietà così da vicino si accostano, che fra i canoni, i quali da essa se ne deducono, e le più delicate sperienze non si ravvisa differenza, che col senso possa distinguersi. Nel caso nostro si vuole, che sia $n=0$, conseguentemente le due ascisse ne due punti H, G, saranno nulle, e le ordinate, che partono dai predetti punti anderanno a terminare nei vertici D, C delle parabole, camminando dopo l'urto ambo i corpi congiunti colla celerità comune HD, ovvero GC.

III. Il limite opposto ha luogo, qualunque volta i due corpi R, S sono perfettamente elastici, e per tali intendo io non già quelli, che nell'atto di rimettersi, esattamente la loro prima figura riacquistano; ma solamente gli altri, se pur si danno in Natura, che non ritengono in se alcuna quantunque minima parte di forza impiegata nel comprimerli, e nel far loro cangiar figura. Per le osservazioni del lodato Sig. Rizzetti prossimamente si verifica la posizione in certi corpi sferici, piccioli, pronti, che rendono un acutissimo suono, e che conseguentemente un brevissimo tempo in restituirsi consumano. L'ipotesi richiede, che sia l'ascissa $CA=n$: e giacchè le velocità si misurano dalle applicate LI, KI, che vanno a terminare nella intersecazione delle parabole; la prima spiegato intieramente l'elastro, converrà al corpo S, e la seconda al corpo R.

IV. E qui cadono in acconcio alquante considerazioni. Qualora le due masse R, S, fornita la collisione, in figura di masse inerti camminano di conserva, la retta IB, ovvero BL dinota la loro comune velocità: perciò si fa manifesto, che aggiunto al corpo S il moto prodotto dalla forza cospirante dell'elastro, si raddoppia la sua velocità. All'incontro l'azione della molla comunica alla sfera R la celerità AI, la quale, come già si è avvertito, non è diversa da quella, con cui congiuntamente procederebbero i corpi molli R, S, quando Surtaffe in R colla velocità AB. Ed essendo la celerità AI contraria di direzione alla KA, o sia BI acquistata già dalla palla R prima dello sviluppamento dell'elastro, ne siegue, che compiuta l'operazione, camminerà essa colla velocità IK, differenza, che passa fra le celerità assegnate.

V. Quindi si scorge, che siccome nel doppio urto successivo dei corpi inerti, mentre cioè R percuote S, si muovono ambo colla velocità IB, e mentre S percuote R, procedono ambo colla velocità AI, le quali velocità unite insieme sono eguali alla primitiva AB; così parimente nella doppia azione, che nasce dall'evoluzione della molla, si generano le predette velocità in senso contrario, aggiungendosi la prima al corpo S, e levandosi la seconda al corpo R: dal che si rende manifesto, quanto

tenace delle proprie leggi sia la Natura, e quanto uniforme nelle sue operazioni.

VI. Dalli mentovati due limiti restano abbracciati tutti gli altri casi. In fatti se la forza impiegata nella contusione, e nella costringimento delle parti non si restituisce intieramente, facciasi come la forza intera a quella, che si rimette, così $AC:MC$, e tirata la retta MQ , dinoteranno le applicate UP , MN quelle velocità, che dalla sola azione dell'elastro imperfetto vengono comunicate a due corpi S , R , ed aggiunta al primo, e sottratta dall'altro la comune velocità UQ , o sia MO , farà QP la velocità totale del corpo S , ed ON quella del corpo R , compiuta che sia la restituzione.

VII. Quanto i corpi sono dotati di maggior forza di molla, tanto più s'augmenta la celerità del corpo S , e si scema quella del corpo R ; di modo che questa ultima in parecchie circostanze può diventar nulla, ed anche negativa. Se il corpo R è maggiore del corpo S , succede ciò, che la figura adattata a questo caso ci dimostra (Fig. 71.), e di qualunque genere i suddetti corpi esser si possano conserveranno dopo la percossa la direzione del corpo R , ed ambo acquisteranno quelle velocità, che negli incontri particolari restano dalla costruzione determinate.

VIII. Ma se le masse R , S (Fig. 72.) fossero uguali, ed in conseguenza uguali i segmenti AI , IB , la perpendicolare GK verrebbe a cadere nel punto I , intersezione delle due parabole; laonde riducendosi a nulla la retta KI , ci dà a dividere, che nell'ipotesi d'una perfetta elasticità il corpo R , compiuta la restituzione, si ferma immobile, e che il corpo S riceve in se tutta la velocità AB . Se poi i mobile saranno imperfettamente elastici, fatta la forza, che si spende nella contusione, a quella, che si restituisce, come $AC:MC$, e tirata la retta MQ , il corpo R procederà colla velocità OM , ed il corpo S colla celerità QP verso dove era diretto il moto del corpo R prima dell'urto. Ma perchè nel presente caso le due applicate ON , OP sono eguali, accadrà, che la somma delle due velocità $QP+PO$ sia sempre uguale alla celerità primitiva IL , o sia AB .

XIX. Per ultimo se la massa, che si muove, è minore dell'altra, che stando quieta aspetta d'essere cacciata di luogo, la Fig. 73. ci manifesta con quali canoni si regoli la comunicazione dei moti. Se ambe esse masse fossero affatto inerti, procederebbono per la direzione RS colla comune velocità IB . Se poi fossero dotate di perfetta elasticità, la palla S giusta l'assegnata direzione camminerebbe colla velocità LI , e la palla R tornerebbe indietro colla velocità IK . Nelle costituzioni di mezzo, secondo la varia proporzione fra la forza impiegata nella contusione, e quella, che dall'elastro imperfetto si rimette, può accadere, che muovendosi sempre il corpo S verso la medesima parte, l'altro R o seguiti i suoi vestigi, o si fermi, o volti cammino. Si ferma, qualora la velocità generata dall'espansione dell'elastro è precisamente uguale a quella, con cui progrediva in figura di corpo molle, ed il punto n , in cui la

ret-

retta GK taglia la parabola, ed a cui conviene l'ordinata $mn = AK$, determina la proporzione tra AC, MC. Procede per la direzione del corpo S, quando la forza restituita è minore di mC : e muta viaggio in senso contrario, mentre sia maggiore di mC la forza, colla quale la molla si spiega, essendo obbligata in tal incontro a retrocedere colla velocità per esempio ON.

S C O L I O.

Per dimostrare maggiormente quanto la Natura sia conforme, e costante nelle sue operazioni, io dico, che non solamente il centro di gravità continua il suo solito viaggio, compiuto che sia la comunicazione del moto, ma di più nell'atto stesso senz'alcuna interruzione, in cui il moto va passando per gradi, e successivamente da un corpo all'altro, e ciò generalmente, e senz'alcuna eccezione in tutte le varie supposizioni, che da noi sin ora sono state considerate.

Prima di proceder oltre si noti, che quantunque paja al senso ridursi con tal prestezza a termine l'operazione, che non si possa discernere il principio dal fine; contuttociò sempre vi s'impiega un tempo determinato, ora più lungo, ed ora più breve secondo la varia natura, e costituzione dei corpi, lo che ci viene chiaramente indicato dal suono più acuto, e più grave, che si ode nell'atto della percossa.

Aggiungasi, che dovendo far passaggio il corpo S (Fig. 71.) dallo stato di quiete ad un grado determinato di celerità, e conseguentemente scemarsi, ed alterarsi quella del corpo R, che talvolta, come abbiamo veduto, è obbligato a cangiar direzione; ne siegue, che non operando mai la Natura per via di salto, anderanno a poco a poco crescendo, e decrescendo le predette velocità, fino a giungere in passando per tutti i gradi di mezzo a que' limiti, che già si sono assegnati. Ma con che regola procedano principiamo ad investigarlo dal caso, in cui gli elastri dopo sofferta la compressione si vanno di passo in passo sviluppando.

Sia dunque la forza impiegata nella confusione a quella, che si restituisce, come AC: MC, onde sieno ON, QP le velocità dei due corpi R, S, terminata che sia l'evoluzione dell'elastro. Suppongasì, che la molla cominci ad impiegare una parte minima della sua azione contro le masse R S, espressa per l'abscissa Cm, e ci sia concesso d'impedire con qualche ordigno l'ulteriore restituzione; egli è manifesto, che in questo caso procederà la cosa, come se la forza consumata nell'ammaccatura, a quella, che si rimette, fosse in proporzione di AC: mC : ma per ciò, che di sopra si è provato, in tale circostanza non resta punto alterato il moto del centro di gravità; dunque nè meno sarà soggetto a qualsivisa alterazione in quel momento di tempo, in cui il mobile R cammina colla velocità on ; ed il mobile S colla celerità qp . Facciasi, che la molla agisca con un secondo elemento di forza, e replicato il discorso, si raccolga, che quantunque le suddette velocità a misura, che si va spiegando l'elastro, o ricscano, o si diminiscano, non ostan-

te

re ciò mantengono fra loro una così giusta relazione, e sono in maniera temperate, che il centro di gravità seguita sempre il suo viaggio in qualunque ipotesi colla stessa direzione, e colla stessa velocità.

Deducasi dalle cose dette per via di corollario, che le parabole nello schema delineate servono di scala per determinare le velocità variabili dei corpi R, S nell'atto, che la molla si va sviluppando. Compiuta la contusione, le due masse camminano per un istante in qualità di corpi molli colla comune celerità GC, ovvero HD, ma in progresso si aumenta il moto della palla S, e si sminuisce quello della palla R, fin tanto che la prima acquista la velocità QP, e la seconda si riduca colla velocità OU, nel quale stato si suppone, che l'elastro consumata tutta la forza, cessi d'esercitar la sua azione. In questo mentre avendo il corpo R a passare dalla velocità GC alla ON per tutti i gradi intermedi, ci sarà un momento di tempo, nel quale dovrà procedere colla velocità YS, ed in questo medesimo istante il corpo S camminerà colla celerità corrispondente ZT, regolandosi le rispettive velocità sulla comune abscissa CR, e sulle ordinate terminate alle due curve paraboliche.

La mentovata legge di Natura, siccome generale, trova altresì luogo nell'atto stesso, che percuotendosi un corpo con l'altro, si genera la mutua contusione. La Massa R nell'esercitar la sua azione contro la massa S colluita in quiete perde la sua velocità a gradi, ed a gradi parimente la palla S acquista la velocità ad essa dovuta, fin tanto che finita l'operazione, ambe procedono con pari passo in figura di corpi molli. Frattanto in qualunque stato si mantiene sempre costante la medesima quantità di moto; perchè colle stesse leggi la forza viva passa in morta, e la morta in viva, ed in ogni elemento di spazio l'elastro si spiega con una forza eguale, o almeno proporzionale a quella, con cui è stato compresso; cioè a dire uguale, mentre i corpi sieno perfettamente elastici, e proporzionale, quando sono dotati d'una imperfetta elasticità.

Colla retta AB (Fig. 74.) espongono la velocità della palla R, e condotta al punto B la perpendicolare BC, faccio AB:BC in ragione inversa di R:S. Taglio per metà colla linea BD l'angolo retto ABC, e dal punto D d'intersecazione lascio cadere la normale DE = EB. Egli è certo, che se le sfere R, S saranno affatto molli, ed inerti, terminata che sia la comunicazione del moto, ambe cammineranno colla comune celerità ED, o sia EB: ma nel tempo, in cui dura l'azione, se per cagion d'esempio la massa R avrà perduta la velocità AF, la massa S avrà acquistata la velocità FG, e così successivamente, fin tanto che la celerità DE acquistata dal corpo S, e la EB rimasta nel corpo R sieno eguali, cessando allora l'azione, e la forza della percossa, quando il primo con pari velocità si sottragge alle impressioni del secondo.

SCHEDIASMA XXIII. (*)

Verè & germana virium elasticarum leges ex phænomenis demonstrata.

ARduum opus aggrediuntur hi, qui quæstionem aliquam enodandam sibi proponunt, in qua cum nihil datum sit, quod ad investigationem perducat, quot data invenire oportet, totidem nova, & difficilia problemata solvenda occurrunt. Et quamquam ea, quæ pro notis usurpamus, non ex fictis philosophorum hypothésibus, sed ex ipsa natura, & ab experimentis petenda sunt; sæpissime accidit, ut quæ priora videntur, & rem fere attingunt, ea nos a proposito longissime removeant. Hoc periculo meo didici; cum enim in leges virium elasticarum inquirerem, putabam me voti compotem fieri debere, si spirarum, laminarum, funium sese restituentium suppellectile comparata, majori qua poteram accurate experimenta instituissem. Verum incassum recidit labor, & rei difficultas qualemcumque industriam meam frustrata est; nullus enim canon observationibus ex omni parte respondens sanciri potuit; quod an materia defectui, & circumstantiarum varietati, an experimentorum subtilitati tribuam, nescio: parumque absuit, quin in doctissimi Jacobi Bernoullii sententiam descenderem, unumquodque scilicet corpus pro varia suarum partium textura, peculiarem, & ab aliis corporibus diversam elasticitatis legem obtinere.

Cum autem de re mea non conquiescerem, venit in mentem ab acustica auxilium petere. Notissimæ sunt fidium musicarum armonicæ proprietates, sed nondum compertum est, ex quo canone virium elasticarum dependeant, argumentumque hoc nullis clarissimorum mathematicorum paralogismis inclaruit. Nam si elasticitatis legem aliquam inter simpliciores tamquam datam assumimus, quod hucusque factum est; tunc id quod querendum erat, supponitur, & hypothesis detorquenda est, me-

(*) Sino dall'anno 1720. il Conte Jacopo incominciò a lavorare intorno il presente Schediasma, come si raccoglie da una lettera scritta nel mese di Settembre al celebre Sig. Antonio Vallisnieri. Impariamo da due lettere del Sig. Niccolò Bernoulli all' Autore in data de' 24. Novembre, e de' 9. Dicembre 1721., ch'egli avea divisato di spedire una lettera al Sig. Giovanni Bernoulli Padre del Sig. Niccolò, una copia della quale si conserva fra i suoi manoscritti. Contiene questa un estratto dello Schediasma XXIII. Avendo l' Accademia di Bologna richiesta al Conte Jacopo una qualche Dissertazione, mandò egli la presente al Sig. Eustachio Manfredi, il quale con lettera de' 12. Ottobre 1723. ne accusa la ricevuta. Finalmente essa comparve al pubblico l' anno 1731. nel Tomo primo dei comentarj della mentovata Accademia.

ut omnibus phænomenis satisfaciatur. Quod si inter infinitas unam; aut alteram attentando eligimus, quæ melius propositum præstet; etiamsi, quod difficile est, veram fortuito assequamur, talem aggressionem geometra indignam existimo: Ex quibusdam igitur datis conditionibus, quas circumstantiæ subministrant, vires elasticæ sollicitantes, licet omnino ignotæ, inter se comparandæ fuerunt, ut deinde cum notis phænomenis collatione facta, unica, & germana lex, qua natura utitur in huiusmodi motibus temperandis, tandem prodiret; quod an feliciter, & ex voto cesserit, clarissimorum Academiæ Bononiensis sociorum iudicio relinquo.

sed altius contemplatio petenda est; & aliquot lemmata præmittenda.

LEMMA PRIMUM.

Sint duæ figuræ similes ACB , acb (Fig. 75.), & duo corpora B ; b , quorum massæ M , m ex punctis quietis B , b secundum directiones BA , ba moveantur, & sollicitentur a viribus acceleratricibus expositis per ordinatas curvarum AEC , aec : dico quod tempora, quibus lineæ BA , ba , vel earum partes similes percurruntur, erunt in ratione dimidiata massarum.

Fiat $BA : ba :: BD : bd$, & in eadem proportionem sumantur fluxiones BF , df , ducanturque ordinatæ DE , de .

Quoniam velocitates, quibus percurruntur elementa DF , df , per ea, quæ ab aliis demonstrata sunt, se habent in ratione dimidiata arearum $BDEC$, $bdec$ directe, & in ratione pariter dimidiata massarum reciproce; huiusmodi autem velocitates sunt etiam directe ut spatia conficienda DF , df , & inverse ut tempora T , t , quibus hæc spatia conficiuntur, atque insuper proportio dimidiata arearum $BDEC$, $bdec$, ob earum similitudinem est eadem, quæ fluxionis DF ad fluxionem df ; igitur $\frac{DF}{T} : \frac{df}{t} :$

$\frac{DF}{\sqrt{M}} : \frac{df}{\sqrt{m}}$, hoc est $T : t :: \sqrt{M} : \sqrt{m}$; quod cum verificetur de temporibus per quasque alias fluxiones similes, & similiter positas; sequitur tempora integra, quibus percurruntur lineæ BA , ba , vel earum portiones quælibet similes, esse in ratione massarum subduplicata $Q.E.D.$

COROLLARIUM.

Hinc si massæ ponantur æquales, tempora quoque erunt æqualia: & si massæ sint ut spatia percurrenda BA , ba , tempora erunt in dictorum

spatiorum proportionem dimidiata Quod si $M : m :: \overline{BA} : \overline{ba}$ hoc est

et massæ se habeant, ut quæcumque spatiorum dignitates, tempora se habebunt ut $\overline{BA}^{\frac{3}{2}} : \overline{ba}^{\frac{3}{2}}$.

S C O L I O N.

Ex origine A (Fig. 76) circa communem axem AB describantur infinitæ figuræ similes AED, AGF, ACB &c.: linea recta, quæ connectit puncta A, C, transibit per infinita puncta E, G &c.: sunt enim tam in figuris similibus, quam in triangulo ABC, AB: BC:: AF: FG:: AB DE &c.: recta igitur AC est communis locus, in quem desinunt puncta extrema, & analogæ omnium similium figurarum. Cum autem curva AHC ad libitum sumpta sit, nullaque tam ex analyticis, quam ex mechanicis a demonstrata proprietate excludatur; manifestum est inter ipsas locum etiam rectæ lineæ AEC concedendum. Si itaque triangulo ABC, & lineæ AF, vel AG pars lineæ majoris AC. In hoc solo casu, reliquis omnibus exclusis, unica linea, hoc est recta AEC idem officium præstat, ac infinitæ curvæ similes. Porro ex præmissis lemmate, massis existentibus æqualibus, spatia BA, FA, DA &c. æquali tempore percurreuntur. Solum igitur triangulum pro scala virium sollicitantium habendum est, in qua motus a quiete incipientes in quocumque puncto axis, & desinentes in punctum A sint isochroni.

LEMMA SECUNDUM.

Iisdem positis, ut in antecedenti lemmate, hoc solum immutato; quod loco duarum curvarum similium, accipiantur duæ curvæ AEC, *acc*, (Fig. 77.) analogæ ad ordinatas; in quibus scilicet sumptis abscissis æqualibus AD, *ad*, applicatæ DE, *de* sint semper in constante ratione: dico tempora, quibus a mobilibus B, *b* conficiuntur spatia æqualia BA, *ba*, vel BD, *bd*, se habere in ratione directæ subduplicata massarum, & inversæ pariter subduplicata virium sollicitantium.

Velocitates, quibus percurreuntur spatia infinitesima æqualia DF, *df*, ex una parte sunt in ratione reciproca temporum, ex altera ut radices arearum BDEC, *bdec* divisæ per radices massarum: sed areæ sunt inter se ut ordinatæ, seu vires accelerantes BC, *bc*; ergo tempora per DF, *df* sunt directæ ut radices massarum, & inversæ ut radices virium. Quod autem demonstratum est de fluxionibus DF, *df*, de quibuscumque aliis sub iisdem conditionibus verificatur; igitur eadem temporum proportio locum habet, etiamsi conficiantur spatia finita BA, *ba*, vel BD, *bd*. Q. E. D.

COROLLARIA.

Massis existentibus æqualibus, tempora se habebunt in ratione inversa dimidiata virium, & si massæ sint ut vires, tempora utrobique erunt æqualia.

LEMMA TERTIUM.

Sint modo curvæ AEC, *acc* (Fig. 78.) ad abscissas analogæ, hoc est diviso utroque axe BA, *ba* proportionaliter in punctis D, *d*, ordinata DE alteri *de* sit semper æqualis: dico tempora per BA, *ba*, vel BD, *bd* esse in ratione composita ex dimidiata spatiorum BA, *ba*, & dimidiata massarum.

Velocitates per elementa proportionalia DF, *df* sunt ut ipsa elementa directè, & tempora, quibus percurruntur, inverse: & cum hujusmodi velocitates sint pariter in ratione subduplicata directè arearum BDEC, *bdec*, & inversa subduplicata massarum; areæ autem servant proportionem fluxionum DF, *df*, hoc est spatiorum BA, *ba*; igitur vocatis T, *t* temporibus per DF, *df*, habebimus $\frac{BA}{T} : \frac{ba}{t} :: \frac{\sqrt{BA}}{\sqrt{M}} : \frac{\sqrt{ba}}{\sqrt{m}}$,

quæ analogia alteram suppeditat T: *t* :: $\sqrt{BA} \cdot \sqrt{M} : \sqrt{ba} \cdot \sqrt{m}$. E. existentibus porro temporibus per quascumque fluxiones proportionales, & proportionaliter rectas in ratione constante, eadem proportio manebit, dum corpora B, *b* feruntur per spatia finita proportionalia BD, *bd*, BA, *ba*. Q. E. D.

COROLLARIA.

Si massæ sunt æquales, tempora se habebunt in ratione dimidiata spatiorum; & si massæ sint ut spatia percurrenda, tempora quoque erunt ut ipsa spatia. Quod si massæ sint reciproce ut spatia, tempora utrobique erunt æqualia.

S C H O L I U M.

Dum vires sollicitantes quomodocumque per ordinatas alicujus curvæ exponuntur, qua ratione tractandæ sint, geometram latere non potest, postquam apud illustres mathematicos canones generales passim demonstratos inveniet; at cum vires omnino ignotæ inter se comparandæ veniunt, tunc tria lemmata, quæ consulo præmissa sunt, latissime patent, & eximium præstant usum. Id pluribus in medium allatis exemplis evincere pos-

possem; sed instituti nostri ratio postulat; ut non nisi de lege distractionum in corporibus elasticis ad potentias distrahentes relata disseramus.

CANON PRIMUS

Ab experientia desumptus.

Fides sonoras ex eadem materia confectas aliquot præditas esse proprietatibus phisicos, & muscos longa experientia docuit. In primis certum est itus, & reditus ejusdem chordæ sub constante distractione ad instar oscillantis penduli eodem sere tempore perfici. Isochronismo locus esse nequit, ut in primo lemmate demonstratum est, nisi curva, seu scala tensionum sit linea recta, hoc est arithmetice crescentibus potentiis distrahentibus eadem prorsus ratione augeantur, quod experientia non satisfacit. Quo longior chorda est, cæteris paribus, magis ab ista lege discedit, & inter maximas, & minimas ejusdem chordæ vibrationes, hoc est inter sonos his respondententes integri comatis differentiam audiri sæpius expertus sum, & post alios testatur doctissimus Jesuita de Chales. Cum autem fides jam distractæ viribus minimis licet inæqualibus pulsantur, tunc vibrationes fieri æque-diuturnas ita demonstrat.

Funis AB a pondere DC patiatu distentionem BC (Fig. 79.). Addatur pondus minimum IG, cui conveniat ulterior distractio CE, manifestum est chordam ab hoc onere superadjecto liberatam sese restituere per spatium EC. Rursus appendatur pondus majus, sed infinitesimum KH, quod efficiat distentionem CF, atque eo remoto, restitutio fiat per majus spatium FG; in utroque casu scala virium funem restituentium exponitur a minimis trilineis DGI, DHK, quorum ordinate representant cum potentias distrahentes, tum chordæ tenacitates distractioni resistentes. Sed cum pars curvæ DK sit infinitesima, cum sua tangente confunditur, & ideo trilinea DHK, DGI triangulum rectilineum constituunt; igitur per scholium lemmatis primi utraque restitutio, quæ sit seorsim per spatia FC, EC, est isochrona. Q. E. D.

COROLLARIUM.

Hoc verum est in rigore geometrico, dum chorda jam distenta a viribus aequalibus, vel ad æqualitatem proxime accedentibus, vel tandem a viribus infinitesimis quamcumque rationem obtinentibus rursus sollicitatur. In cæteris casibus differentia exigua est, & plerumque sub sensum non cadit; cum virium restituentium scala paululum a triangulo aberret.

H h 2

CA:

C A N O N S E C U N D U S

Ab experientia desumptus.

Sumptis duobus nervis sola longitudine inæqualibus, qui ab eodem pondere distrahantur, & pulsantur ictibus æqualibus, tempora oscillationum sunt inter se, ut nervorum longitudines. Ex hoc canone nihil ad rem nostram colligi potest; locum enim invenit in quacumque hypothesi distractionum, quod sic ostendo.

Chordis AB breviori, & ab longiori (Fig. 79. aptetur idem pondus P, quod hinc inde producat distentiones BF, bf. Intelligantur descriptæ curvæ tensionum, quæcumque tandem sint BDK, bdk, quarum abscissæ designent distractiones, applicatæ vero potentias distrahentes. Hujusmodi curvæ semper erunt analogæ relatæ ad abscissas; ponderibus enim æqualibus respondent distensiones, chordarum longitudinibus proportionales, ut ex lemmate subiiciendo constabit. Sublato hinc inde pondere P, dum utraque chorda regreditur per spatia FB, fb eandem proportionem servantia, ac chordarum longitudines, sollicitatur a viribus, quarum scalæ sunt curvæ BDK, bdk. Porro cum massæ sint in nostra hypothesi ut spatia percurrenda FB, fb, vel ut chordarum longitudines AB, ab, tempora quoque restitutionum ex corollario lemmatis tertii se habebunt in eadem ratione. Q. E. D.

L E M M A Q U A R T U M.

Pendeant chordæ prædictæ AB, ab, duobis clavis A, a, & tendantur a ponderibus æqualibus: dico distentiones BF, bf esse inter se, ut chordarum longitudines.

Hæc propositio jam demonstrata fuit a summis Viris Galilæo, Borello, & Jacopo Bernoullio, sed alteram placet addere demonstrationem his, quæ dicenda sunt, magis accommodatam.

Sumatur ex chorda AB pars minima AL, cui in puncto L applicetur datum pondus P, quod distrahendo fibram AL, producat distentionem LM. Pariter ex altera chorda accipiat pars al = AL, & eodem aptato pondere in l, fiat distentio lm = LM. Punctum m figatur clavo, ut fibra am se contrahere non possit. Sumpta iterum ex eadem chorda portione mn = AL, agat rursus pondus P in fibram mn, & oriatur secunda distentio no = LM, punctumque o ut prius altero clavo firmetur. Sic repetita operatione ex ultima fibra, quam statuamus esse op, libere pendeat idem grave P, & sit pq = LM postrema distractio.

Cum duæ fibræ distractæ am, mo tentent ad consuetam longitudinem sese reducere, & alligatæ sint duobus clavis a, & o, manifestum est, quod clavus intermedius m trahitur sursum, & deorsum a viribus

bus æqualibus inter se æquilibrium constituentibus. Similiter duæ fibræ *mo*, *oq* sunt in æquilibrio respectu clavi *o*, prima namque eandem vim exercet in clavos *m*, *o*, ac secunda in clavum *o*, & onus suspensum ex puncto *q*, contrariis tamen directionibus; igitur remotis clavis intermediis *m*, & *o*, non destruitur æquilibrium, sed omnibus in eodem statu manentibus, grave *P* non ascendet, neque descendet; ex quo fit, quod tot erunt distentiones æquales, quot fibræ, & quod distractio totius chordæ *ab*, quæ æquivaleret omnibus suarum partium distractionibus, ad distractionem unius fibræ *AL*, vel omnium fibrarum componentium chordam *AB* se habebit, ut longitudo ad longitudinem. *Q. E. D.*

COROLLARIUM I.

Ad procurandas distentiones funium *AB*, *ab* requiruntur vires obtinentes proportionem longitudinum; vidimus enim pro numero fibrarum in utraque chorda multiplicandam fuisse actionem constantem ponderis *P* singulis partibus infinitesimis applicatam. Quod si potentia quomodocumque in funes agant, puta si pondera æqualia suspensa ex punctis *B*, *b* motu accelerato descendunt chordas secum traherent, & distenderent, tandemque post varias reciprocationes in punctis *F*, *f* consisterent; evidens puto vires in distractiones insumptas in eadem ratione esse; cum causæ sint semper effectis productis proportionales, & æqualibus effectis æquales causæ respondere debeant.

COROLLARIUM II.

At distractione jam facta, ad impediendam restitutionem utriusque chordæ sufficiunt pondera æqualia, etiamsi chordæ sint longitudinis inæqualis. Hoc fortasse mirum alicui videbitur, sed phænomeni explicatio augebit admirationem. Dico igitur, quod grave applicatum chordæ in puncto infimo *q* sustinetur, & æquilibratur solummodo a dimidia vi ultimæ fibræ *oq*. Restitutis clavis in locis *o*, & *m*, patet fibræ minimam *op* tendi a consueto pondere *P*, atque eodem tempore, dum nititur se se contrahere, non solum sustinere onus *P*, sed æquali vi deorsum urgere clavum *o*. Similiter fibra superior *mn* passa distractionem *no* pari vi sursum trahit clavum *o*, & deorsum clavum *m*, & sic successive; ergo dum singulæ fibræ virtutem contractionis directione opposita exercent, actio unius elidit actionem alterius, & pondus *P* non est in æquilibrio nisi cum dimidia resistentia inferioris fibræ *oq*. Dummodo fibræ sint in utraque chorda ejusdem tenacitatis, & resistentiæ, nihil facit ad hunc effectum explicandum longitudo chordæ, quamvis in infinitum excreset.

COROLLARIUM III.

Colligo ex dictis, vim gravitatis ponderis finiti P quiescentis esse infinitesimam, sustinetur squidem a dimidia vi minima fibræ aq , quæ cum sit totius chordæ ab pars inassignabilis, necesse est ut agat inassignabili ratione. Equilibrium igitur a natura non instituitur, præterquam inter vires evanescentes, seu inter elementa, & fluxiones virium; supponamus enim vires in statu manente, & cum loco cujuscumque vis mortuæ pondus substitui possit, absque eo quod tollatur æquilibrium, vires autem ponderum quiescentium sint minimæ, liquet inter vires mortuas tantummodo æquipondium subsistere. Hinc ni fallor corrigendi veniunt nostrates Galilæus, & Borellus, qui animadvertentes vim percussionis ad vim gravitatis habere rationem quacumque data majorem, cum supposuissent vim gravitatis finitam esse, alteram percussionis infinitam fecere. Sed potius vis percussionis inter finitas collocanda erat, & vis gravitatis cum omnibus aliis viribus mortuis, quæ scilicet a motu non roborantur, ut vires elasticæ, pressiones, &c. inter infinitesimas erant recensendæ.

S C H O L I O N.

Fortasse ex proprietatibus chordarum elasticarum peri potest demonstratio principii fundamentalis Dynamices, quod scilicet vires vivæ corporum sint inter se, ut facta ex massis in velocitatum quadrata, non autem ut quantitates motus; quam legem tota fere Mathematica Republica reclamante, nulla licet demonstratione munitam, faciendam tamen putavit incomparabilis Leibnitius.

T H E O R E M A

Vires ejusdem corporis sub diversis velocitatibus, non sunt ut velocitates.

Chordis AB , ab in punctis B , b aptentur pondera æqualia FK , fk : Descendat utrumque ad puncta F , f usquequo chordarum resistentiæ sint dictis ponderibus æquales, quod evenit, quando, descriptis curvis BDK , bdk , tenacitatum ultimæ ordinatæ KF , kf cum inter se, tum ponderibus sunt æquales, & abscissæ FB , fb se habent ut longitudines AB , ab .

Jam fingamus tam pondus BX , quam bx sollicitatum a naturali gravitate, & nullo modo impeditum a reactione chordarum descendere per spatia BF , bf : velocitates in punctis F , f erunt in ratione dimidiata spatiorum confectorum, aut rectangulorum XF , xf . Rursus descendant dicta pondera chordis appensa; vires acceleratrices in punctis analogis C , c erunt æquales, utpote quæ determinantur a vi constante ponderum ZC , zc , subductis viribus æqualibus resistentiarum utriusque chordæ DC , dc . Scalæ itaque virium sollicitantium pondera descendencia erunt curvæ BDK , bdk relatæ ad axes KX , kx , & velocitates in punctis F , f ut radii.

diſces quadratæ arearum BDKX, *bdkx*; ſed huiusmodi areæ ſunt ut abſciſſæ KX, *kx*; igitur velocitates in punctis F, *f* ſe habebunt in ratione dimidiata diſtarum abſciſſarum.

His poſitis, animadvertendum eſt, gravitatem BX, vel *bx* comitantem utrumque pondus per ſpatia BF, *bf* paſſim agere extendendo chordas AB, *ab*, partim accelerando gravia deſcendentia uſque ad terminos F, *f*; ſed huiusmodi vis gravitatis continue applicata, & non impedita gignere poſſet velocitates in ratione dimidiata ſpatiorum hinc inde decurſorum, atque impedita a tenacitate chordarum de ſacſo velocitates utrinque producit in eadem proportionem; igitur ſi fieri poteſt, quod vires vivæ ſint ut velocitates, deducendo velocitates, ſeu vires genitas a velocitatibus, ſeu viribus, quæ generari potuiſſent a ponderibus non impeditis, ſequitur, quod reliqua pars virium, quæ ex utraque parte inſumitur in chordarum diſtentionem, ſit pariter in ratione dimidiata linearum BF, *bf*, vel longitudinum AB, *ab*, quod eſt abſurdum, & contra corollarium primum noſtri lemmatis; nam cum diſtentiones ſint, ut vires tendentes, vis, quæ efficit diſtentionem BF, ad vim efficientem alteram diſtentionem *bf* ſe habet ut BF ad *bf*; non vero ut $\sqrt{BF}$ ad $\sqrt{bf}$. Q. E. D.

COROLLARIUM I.

In idem abſurdum incidimus ponendo vires vivas reſpondere cui-cumque functioni celeritatum, unica tantum excepta, quod nempe vires ſint in ratione velocitatum duplicata. Juxta hanc hypotheſim gravitas non impedita agendo per ſpatia BF, *bf* producit vires vivas in ratione eorundem ſpatiorum, ac inſuper impedita a reſiſtentia chordarum efficit vires diſtis ſpatiis proportionales, & facta ſubtractione, ea vis, quæ erogatur in diſtentionem chordarum, ſervat pariter rationem diſtentionum, quod verum eſſe ſupra comprobatum eſt.

COROLLARIUM II.

Vires tendentes chordas, & inducentes diſtentiones BF, *bf* metiri debemus per areas BDKF, *bdkf*, quæ in eadem proportionem inveniantur cum longitudinibus chordarum; ordinatæ ſiquidem curvarum BDK, *bdk* exprimunt reſiſtentias creſcentes chordarum, ad quas vincendas in ſingulis punctis C, *c* adhibetur pars aliqua conſtantis gravitatis, quæ per eaſdem applicatas CD, *cd* exponitur. Quod ſi chorda *ab* in plures partes dividatur, & ſingulæ extendantur ab eodem pondere P, ſumma omnium virium partes ditrahentium eſt præciſe æqualis vi, quæ in chorda *ab* efficit diſtractionem *bf*; ſicuti hæc diſtractio æqualis eſt omnium partium diſtractionibus. Mirabuntur fortalle hi, qui contrariam ſententiam tuentur, & vires vivas corporum ex quantitate motus, hoc eſt ex ſacſo maſſæ in velocitatem metiuntur, me in allata demonſtratione nullam inire

rationem temporis; quod profecto elementum in huiusmodi disquisitionibus absque paralogismo omitti non debuit. Verum, nisi pessime fallor, certo certius est in ea re, de qua sermo est, temporis rationem nullo modo subducendam esse; cum enim funis elasticus brevior per violentam distractionem transit in longiorem, non mutatur ejus resistentia, seu longo, seu brevissimo tempore ad æqualem distentionem perveniat. Ad æqualem porro resistentiam vincendam eadem vis adhibetur, dum manu, vel lento motu, vel velociori funis ducitur:

CANON TERTIUS

Ab experientia desumptus.

Altera proprietates fidium nostrarum in hoc consistit. Si geminæ chordæ æquales ab inæqualibus ponderibus distrahantur, & ex his sumantur portiones æquales, quæ pari vi pulsantur, soni erunt inter se in subduplicata ratione ponderum tendentium, & tempora oscillationum in sonorum proportionem reciproca. Superest inquirendum, quid ad rem, de qua sermo est, ex hoc canone deduci possit.

Ex funibus æqualibus AB, ab (Fig. 80.) suspendantur duo gravia inæqualia, quorum minus C efficiat distentionem minorem BC, majus vero c majorem bc. Fiat *cg* æqualis inægræ CA, & punctum *g* clavo firmetur, ita ut pars superior *ag* ulterius tendi non possit; deinde punctis C, c aptentur duo alia pondera æqualia magnitudinis infinitesimæ, quibus convenient minimæ distentiones CD, cc. Sublatis hisce ponderibus a punctis extremis D, & c, tempora restitutionum per fluxiones DC, cc sunt in ratione composita tam dimidiata earundem fluxionum, quam massarum CA, cg. Id patet ex lemmate tertio; nam portiones nascentes curvarum, sive arcuum, quæ hinc inde sunt scalæ tenacitatum a triangulis non differunt, quorum bases æquales sunt ob æqualia pondera infinitesima superaddita; altitudines autem plerumque inæquales ob diversam funium inæqualiter tensorum resistentiam. Jam cum massa *gc*, ad massam *ac*, vel AC, sit ut recta *gc*, vel AC, ad rectam *ac*, si massa utriusque funis per unitatem exponatur, massa portionis *gc* exprimi poterit per magnitudinem $\frac{AC}{ac}$, igitur tempora restitutionum per DC, cc

se habebunt ut $\sqrt{DC} : \frac{\sqrt{cc} \cdot \sqrt{AC}}{\sqrt{ac}}$. Sed hæc tempora experientia do-

cent sunt etiam in ratione reciproca subduplicata ponderum inæqualium

C, c; ergo $\sqrt{DC} : \frac{\sqrt{cc} \cdot \sqrt{AC}}{\sqrt{ac}} :: \frac{1}{\sqrt{C}} : \frac{1}{\sqrt{c}}$, quæ analogia debi-

tis

tis operationibus institutis transit in sequentem $\frac{AC}{C} : \frac{ac}{c} :: DC : ec$, quod²⁴⁹
erat inveniendum.

COROLLARIUM.

Removeatur clavus g , & tunc onus infinitesimum, quod agendo in solam portionem cg producebat distentionem ce , sollicitando integram chordam ca , efficit distentionem cd , eritque $ce, cd :: cg = CA : ca$, ideoque $\frac{CA}{ca} \cdot cd = ce$, quo valore substituto in superiori analogismo

$$\frac{AC}{C} : \frac{ac}{c} :: DC : ec, \text{ alter oritur } \frac{AC}{C} : \frac{ac}{c} :: DC : dc.$$

SCHOLIUM.

Reponet fortasse aliquis, me in allata demonstratione computum non inire ponderum C, c , prima vice suspensorum, quorum massæ in restitutionibus per fluxiones DC, ec movendæ sunt: at hæc pondera considerata non veniunt in casu nostro; sunt enim in æquilibrio cum renacitibus chordarum, a quibus sustinentur, & eorum actio a retro actione eliditur. Ut hoc evincam, rem ad absurdum deduco. Chordis sola longitudine inæqualibus AB, ab (Fig. 79.) aptentur duo pondera finita æqualia CD, cd efficientia distentiones BC, bc ; subinde alia duo infinitesima æqualia HK, hk , quibus convenient ulteriores distentiones CF, cf . His remotis, quadrata temporum restitutionum per FC, fc se habebunt ob vires sollicitantes æquales, ut spatia percurfa FC, fc ducta in massas movendas, seu juxta hypothesim assumptam in massas chordarum, additis hinc inde ponderibus æqualibus DC, dc ; igitur $\overline{T}^a : \overline{t}^a$

$FC. \overline{AB} + DC : fc. \overline{ab} + dc$: est autem $FC : fc :: AB : ab$; ergo vocato

P pondere DC , vel dc , $\overline{T}^a : \overline{t}^a :: \overline{AB} + AB. P : \overline{ab} + ab. P$.

Interim cum pondus P ad pondera chordarum possit esse in ratione quacunque data, sequitur tempora restitutionum per FC, fc vergere ad æqualitatem, quod est absurdum; sunt enim semper inter se ut chordarum longitudines.

CANON QUARTUS.

Ab experientia desumptus.

Remanet postrema proprietas chordarum sola diametro differentium: Si sumantur ex his portiones æquales ab æqualibus ponderibus distractæ, quæ pulsantur viribus æqualibus, tempora vibrationum sunt ut diametri.

Sint hujusmodi chordæ AB, ab tensæ a gravibus æqualibus C, c, (Fig. 81.) & sit distractio BC chordæ subtilioris major distractione be chordæ crassioris. Facta CG = ca, & fixo de more clavo in puncto C, addantur hinc inde duo pondera minima æqualia producentia distentiones inassignabiles CD, cd. Facile demonstrare possum, curvas nascentes in punctis C, c, seu scalas tenacitatum analogas esse, si referantur ad abscissas. Hinc per lemma tertium, dum chorda, remotis ponderibus infinitesimis, se contrahit per fluxiones DC, dc, tempora restitutionum se habebunt in ratione composita ex dimidiata massarum CG, ca, & ex dimidiata spatiorum confectorum DC, dc. Massa autem partis CG ad massam chordæ crassioris se habet in ratione composita longitudinis CG, vel ca ad longitudinem CA, & massæ chordæ subtilioris BA, ad massam crassioris ba; quæ massæ ob altitudines æquales sunt ut bases circulares in utraque chorda, vel ut quadrata diametrorum; hoc est vocando x diametrum funis AB, & y alteram diametrum funis ab, & sumendo massam chordæ crassioris pro unitate, massa CG exponitur per

$$\text{magnitudinem } \frac{ca \cdot x^2}{CA \cdot y^2}; \text{ igitur } T : t :: x \cdot \frac{\sqrt{DC} \cdot \sqrt{ca}}{y \cdot \sqrt{CA}} : \sqrt{dc}; \text{ sed prædi-}$$

cta tempora ex nostro canone sunt etiam ut diametri chordarum; ergo

$$x : y :: x \frac{\sqrt{DC} \cdot \sqrt{ca}}{y \sqrt{CA}} : \sqrt{dc}, \text{ ex qua analogia altera fluit } DC : dc :: CA :$$

ca. Quod erat inveniendum.

COROLLARIUM.

Auferatur clavus G, & tunc onus infinitesimum superadditum funem ulterius extendat usque ad punctum E: & cum distentiones sint ut chor-

$$\text{darum longitudines, erit } CG = ca : CA :: CD : CE, \text{ hoc est } \frac{ca \cdot CE}{CA} = CD$$

$\equiv CD$, quo valore ipsius CD substituto in superiori analogismo, alter

$$\text{eritur } EC:dc::\overline{CA}^2:\overline{ca}^2:$$

$$SCH \sim rUMI.$$

Simplices, & elegantes sunt explicatae proprietates. Exoritur illo-
rum, qui sola crassitudine differunt, & qui a ponderibus chordarum jam
thmetice crescentibus extenduntur. Datis duabus chordarum jam
stratarum longitudinibus AC , & ac (Fig. 81.), reliquæ omnes a quibus-
cumque potentiis æqualibus provenientes tali pacto determinari possunt.
Voco cognitæ AC , & ac ; m , n , binasque alias distracti funis longitudes
 AD , & ad ; x , y . Jam cum per corollarium superius ubique sit $xx:yy::$

$$dx:dy; \text{ ergo } -\frac{dx}{xx} = -\frac{dy}{yy}, \text{ \& integrando addita constante, } g + \frac{1}{x} =$$

$$\frac{1}{y}; \text{ sed eo casu, quo fit } x=m, \text{ altera indeterminata } y \text{ datæ } n \text{ æqua-}$$

$$\text{lis evadit; igitur constans } g = \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \text{ \& æquatio curvæ quæsitæ tran-}$$

$$\text{sit in sequentem } \frac{1}{n} - \frac{1}{m} + \frac{1}{x} = \frac{1}{y}, \text{ vel } mxy - nxy + mny = mnx,$$

qui locus est ad hyperbolam vulgarem, cujus reductionem Analistis re-
linquo, solamque constructionem exhibeo.

Ponatur AC æqualis longitudini AC chordæ gracilioris (Fig. 82.)
& Ca ipsi normalis æqualis longitudini chordæ crassioris. Abscindatur
 $CB = CA$, & fiat $AB:AC::CB:CD$, actaque perpendiculari DQ ,
intra asymptotos DQ , DC describatur hyperbole, quæ transeat per
punctum a . Producta Ca , sit $Ce = CD$ & per punctum e agatur eH
parallela asymptoto DR . Si sumatur $eF = AC$, hoc est longitudini m
chordæ subtilioris jam distractæ, erit $FG = Ca$ longitudo chordæ cras-
sioris ab æquali pondere distractionem passæ. Inclinata porro eN ad an-
gulum semirectum; ita ut abscissa eM sit æqualis MN , hæ lineæ nobis
representant longitudes æquales utriusque chordæ in statu naturali.
Hinc si recta MK , vel MH exponit distractiones a quibuscumque pon-
deribus factas in chorda graciliori, correspondentes SL , TO exhibent
distentiones, quas eadem potentia efficiunt in chorda crassiori. At or-
dinatæ, & abscissæ inter puncta e , & M ad compressiones pertinent.
Existente MO compressione alicujus cylindri subtilioris, NI erit com-

pressio crassioris; dummodo inter bases cylindrorum sit eadem proportio, quæ inter bases chordarum. Compressio autem usque ad punctum *e* pervenire nequit, nisi cylindrus ita comprimi possit, ut ad altitudinem infinitesimam reducat, quo in casu erit *ea* altitudo cylindri crassioris. Sed de compressionibus redibit sermo.

SCILICET L I U M II

Adhuc, ut magis actum puto, nisi ostendam canonem quartum a tertio addere, ejusque esse consecrarium. Iisdem positis (Fig. 81.), accipiat altera chorda PQ ipsi AB æqualis tam diametro, quam longitudine. Fiat ut massa *ab* ad massam PQ; ita grave *c* ad aliud R suspendendum ex puncto Q, cui conveniat distentio QR = *bc* (tunc enim distentiones sunt æquales, dum funibus æque longis aptantur pondera in ratione crassitudinum, quod ab aliis demonstratum est) ex puncto R pendeat aliud grave infinitesimum æquale jam applicatis in punctis C, *c*, oriaturque nova distentio RT: manifestum est, quod hoc pondere diminuto in ratione massæ PQ ad massam *ab*, eo casu distenderet funem per solum spatium RS = *cd*, & tunc restitutiones per dicta spatia *dc*, SR eodem tempore fierent. Id constat ex lemmate secundo: sunt enim scalæ tenacitatum, seu virium sollicitantium analogæ ad ordinatas, & massæ movendæ in eadem ratione cum viribus. Verum cum pars curvæ distentionum respondens abscissæ evanescenti RT, a linea recta non aberret per primum canonem, dum chorda resilit, plus temporis non infumit percurrendo spatium TR majus, quam SR minus, remotis scilicet ambobus ponderibus infinitesimis seorsim applicatis. Modo comparando funes æquales AB, PQ primum distentos a ponderibus inæqualibus C, & R, deinde ab æqualibus infinitesimis D, T, tempus restitutionis per DC, ad tempus restitutionis per TR, vel SR est in ratione reciproca dimidiata ponderis C, sive *c* ad pondus R ex canone tertio, hoc est in directa subduplicata massæ PQ, vel AB ad massam *ab*, aut sicut diameter chordæ AB ad diametrum chordæ *ab*: sed tempora per SR, & *dc* sunt æqualia; ergo tempora per DB, *dc* se habent ut diametri chordarum subtilioris, & crassioris Q. E. D.

Huc usque dicta, præmissis aliquibus corollariis, ad ulteriora viam aperiant.

COROLLARIUM I.

Quoniam ex traditis canone tertio $\frac{AC^2}{C} : \frac{ac^2}{c} :: CD:cd$ (Fig. 80.)

quæ analogia, si sumatur ex chorda *ca* pars *cg* toti CA æqualis transsit in

in sequentem $\frac{AC}{C} : \frac{ae}{e} :: CD : ee$, sequitur, quod si differentia ga inter ²⁵³

funium longitudines sit inassignabilis; ita ut massa eg accipi possit tanquam æqualis utrique massæ ce , CA ; tunc tertius prodit analogismus $\frac{1}{C} : 1 :: CD : ee$, in quo sola consideratur tenacitas, & vis elastica fi-

brarum.

COROLLARIUM II.

Verum dum chordæ æquales inæqualiter distractæ ulterius distrahuntur, tria elementa distinguenda veniunt.

Primo quo magis fibræ tenduntur, eo magis distentioni resistunt vi propriæ tenacitatis.

Secundo quo funis magis tenditur, eo magis in longitudinem excrescit, & ex hoc capite minus resistit ulteriori distentioni.

Tertio minuitur resistentia ex alio capite; fit enim chorda subtilior, quo magis in longum deducitur. Ex tribus hisce elementis, quorum duo alteri contraria sunt, ejusque actionem limitant, semper oritur compensatio, & fieri potest, ut secunda distractio CD sit major, minor, & æqualis, si cum analogâ ed comparetur, quod ex formula manifestum est.

COROLLARIUM III.

Oppositum contingit in compressione, cujus elementa sunt conspiciantia. Cylindrus compressus resistit ulteriori compressioni, non solum ob fibrarum majorem rigiditatem, sed insuper quia fit brevior, & crassior.

SCHOLIUM.

Fortasse minus veritati consonat, quod docuit in Actis Academiæ Regiæ Parisiensis anni 1705. Summus Vir Jacobus Bernoullius, distractionem nihil aliud esse, quam negativam compressionem; & semper contingere, ut crescentibus arithmetice ponderibus, distractiones decrescant. Id vero equidem experimento, sed unico confirmat: quod si in multis chordis ex diversa materia confectis, & varix longitudinis periculum fecisset, miram in distentionibus observasset irregularitatem. Iterum verosimile putat, legem distractionum variam esse pro varia in diversis corporibus fibrarum structura: at mutata chordarum materia, soni sunt quidem graviores, vel acutiores, constante tamen manente inter sonos assignata proportione. Neque melior est Hirii senioris sententia asse-

afferentis tensionem sequi proportionem directam virium tendentium; compressionem vero reciprocam comprimentium.

PROBLEMA PRIMUM.

Ponderibus arithmetice crescentibus, determinare in eadem chorda scalam, seu curvam tenacitatum.

Pono (Fig. 80.) constantem $\frac{AC^2}{C} =$, elementum $CD = du$ quod

statuo æquale differentiis singulis ponderum crescentium in proportionem Arithmetica. Sit pondus variabile $c = u$, $ac = x$, $cd = \pm dx$ (signum affirmativum locum habet in distractionibus, & negativum in compres-

sionibus) & cum sit $\frac{AC^2}{C} = \frac{ac^2}{c} :: DC : dc$, habebimus, $c \frac{xx}{u} \pm du = \pm$

dx , hoc est $\frac{du}{u} = \pm \frac{da}{xx}$, quæ æquatio integrata dat sequentem con-

structionem.

Lineæ Af , MO (Fig. 83.) normaliter se intersecant in puncto R . Ipsi Af citra, & ultra punctum R instant perpendiculares AB , ab æquales longitudini corporis distrahendi, & comprimendi, & hinc inde intra asymptotos jam designatas describantur hyperbolæ vulgares BEH , beb transeuntes per puncta B , b . Replicentur AB , ab in CD , cd , & distractio DE referatur ad potentiam CK , compressio vero de ad potentiam ck . Tum ex origine R gemina intelligatur descripta logarithmica scilicet MKI transiens per punctum K , cujus ordinatæ decescant, & altera mik transiens per punctum k , cujus ordinatæ crescant: patet, quod si chordæ CD sollicitatæ a pondere CK debetur distensio DE , grave FL agens in eandem CD , vel FG efficit distensionem GH . Sic si potentia ck agens in cylindrum ba , vel de producit compressionem de , altera potentia fl gignet compressionem gb .

SCHOLIUM I.

Quod caput rei est in hoc situm puto, absurdum primo aspectu videri, quod chordæ AB nulli adhuc distractioni obnoxie respondeat potentia finita AI nullum producens effectum. Ni fallor arcani quid lateat in constructione, & ipsa geometrica effectio, quod mirum profecto est, physicam proprietatem nos docet.

Vim

Vim elasticam intra certos terminos contineri experimentis didicit solertissimus Gravesandus, quibus & nostræ consonant observationes. Is igitur suorum elementorum lib. 1. cap. 26. ubi agit de legibus elasticis fibræ, inquit, nullam habent elasticitatem, nisi certa cum vi tensæ sint, ut patet in chordis parum tensis, & quarum extremitates fixæ sunt, quæ si a situ paululum removeantur, ad illum non redeunt. Quisnam vero sit gradus tensionis, a quo elasticitas inchoetur, experimentis nondum fuit determinatum. Quando nimia cum vi fibra tenditur, elasticitatem amittit, & neque gradus hic tensionis notus est: illud constat, tensionem fibrarum, quæ elasticitatem constituit, certis limitibus terminari.

Observabam ego aurum, quod per exigua foramina veluti netur; & in longum filum extenditur, magnam acquirere elasticitatem ex partium constipatione: at dum igne candescit, & rarefcit, ita elasticitatem amittit, ut quasi linum illud trahere possis, & ducere, atque in tenuissimum filum extendere.

Mirum igitur non est, si nostra constructio pondus AI designet; quod quidem chordam distrahat, sed adhuc inertem, & nondum elasticam. Porro linea AB non exprimit veram, & naturalem funis longitudinem, sed potius eam, quam acquirere debet, ut elasticus fieri incipiat, & ut fibris debita rigiditas inducatur, qua valeant se restituere. Quod dictum est de distractionibus, dicendum pariter de compressionibus.

SCHOLIUM II.

Alterum inconueniens ex nostra constructione sequi videtur, quod nempe potentia finitæ RM conveniat infinita distensio; sed præter id, quod funis nimis distensus elasticitatem amittit; natura ipsa huic difficultati occurrit funem rumpendo, eisque fibras a se invicem divellendo.

SCHOLIUM. III.

Nostra æquatio $\frac{du}{u} = \frac{dx}{xx}$. Geometris ignota non est. Si enim

proponatur determinanda densitas aeris a solo proprio pondere compressi in duplici hypothesi, quod scilicet densitas sit oneri imposito proportionalis, & gravitas aeris sit in ratione reciproca duplicata distantia a centro telluris, formula nostra satisfacit, ut videre est apud Taylorum, & Varignonium. Sed data occasione de fluidis elasticis agamus.

PROBLEMA SECUNDUM:

Investigare legem compressionis in fluidis elasticis relatam ad potentias comprimentes.

Sint duo rubi vitrei *ab*, *AB* æquales (Fig. 84), & æqualem aeris quantitatem continentes, qui ut præscindere possimus ab aeris gravitate, disponantur in situ horizontali. Aer *AB* cogatur a data vi *V* in spatium quodcumque *AC*, atque aer *ab* a vi majori *n* redigatur in spatium minus *ac*. Deinde vires hinc inde infinitesimæ æquales superadditæ efficiant ultiores compressiones *CD*, *cd*, quæ ex nostris principiis, hoc est Canone tertio, erunt in ratione composita inversa virium *V*, *n*, & directæ longitudinum *CE*, *ce*, videlicet $\frac{CE}{V} :: \frac{ce}{n} :: DC : dc$, vel

denominando constantes $\frac{CE}{V} = a$, $DC = du$, & variables $ce = x$;

$dc = -dx$ (crescente enim potentia arithmetice per infinitesimam *du*; quam constanti *DC* æqualem possum statuere, ipsa *ce* decrescit) habebimus $-dx = xdu$, quæ æquatio differentialis est ad hyperbolam Apollonianam.

Ionianam.

Curva itaque intra Asymptotos *eb*, *eg* descripta, & experimentibus *ch*, *di* potentias comprimentes, abscissæ *ce*, *de* designabunt spatia decrescientia ab aere semper magis compresso occupata: sed densitas aeris sub altitudine *ed* ad ejusdem densitatem sub altitudine *ee* se habet inverse, ut *ed*: *ee*, hoc est directe ut *di*: *ch*; igitur densitates aeris sunt viribus comprimentibus proportionales. Q. E. I.

S C H O L I U M.

Hæc lex vera est tam in aere humili, quam sublimi, ut amicus meus didicit experimentis seorsum in utroque institutis. Verum quidem est, quod si comparentur utriusque densitates, ut ab Academicis Parisiensibus factum lego, huic canoni nullo modo respondent: verum ni fallor caloris habenda ratio est; constat enim aerem telluris superficiæ proximum calidiorem esse, quam remorum, & montanum, & ex hoc capite magis pro sua densitate rarefcere inferiorem, quam superiorem, quod Gallorum observationibus optime congruit, & sancitam legem tot experimentis comprobata potius confirmat, quam evertit.

Interim illustris Nevvtonus hanc notissimam fluidorum elasticorum affectionem ostendit, supponendo particulas aeris vi aliqua prædatis esse, qua se invicem repellant, & hanc vim decrefcere statuit ea propor-

portionē, qua inter easdem particulas distantia crescit. Verum nostra demonstratio nihil assumit, & ex phænomenis, atque principiis virium elasticarum, quod propositum erat deducit.

PROBLEMA TERTIUM.

Invenire proportionem inter vires elasticas duorum corporum ex diversa materia confectorum.

Sint geminæ chordæ AB, ab ejusdem longitudinis, & crassitudinis; quæ materia differant (Fig. 80.) Earum tenacitatem, seu vim elasticam aliter metiri non possumus, quam per potentias, quas adhibere oportet, ut prædictæ chordæ acquirant distentiones æquales BD, bd. Jam ex Lemmate secundo eum scholæ tenacitatum in hac hypothesi sint analogæ ad abscissas, facile infertur tempora restitutionum esse inter se in ratione dimidiata directâ massarum, & inversa pariter dimidiata potentialium tendentium: ex quo fit, quod potentix tendentes, seu ob legem actionum, & retroactionum, resistentiæ, seu tenacitates, & elasticitates chordarum servant proportionem compositam ex inversa quadratorum temporum restitutionis, & ex directâ massarum, seu specificarum gravitatum. Q. E. I.

SCHOLIUM.

Experimentum facilius sumitur in corporibus similibus, puta sphaeris. Sit e.g. altera sphaera vitrea, & altera eburnea, quarum gravitates specificæ g, G notæ sint ex regulis hydrostaticis. Investigetur ratio diametrorum a, A vel circino, vel melius ex sphaerarum ponderibus in aere, & tempora restitutionum, seu tremitus ex sonis determinetur. Jam sorge sphaeram ex ebore ejusdem diametri cum sphaera vitrea, hæc se restituet tempore $\frac{aT}{A}$; nam hujusmodi tempora in sphaeris ejusdem ma-

terix sunt ut diametri ex doctissimi Carrè observationibus; igitur vires elasticæ vitri, & eboris erunt inter se, ut $\frac{gaa}{aa} : \frac{GAA}{TT}$.

Ex allatis principiis methodo synthetica omnia demonstrari possunt, quæ ad vires elasticas pertinent, sive agatur de nervorum oscillationibus, aut de tremitibus corporum solidorum, vel de curvatura funium, & laminarum elasticarum: sed modo elementa solum, & principes proprietates harum virium profecutus sum, cætera in aliud tempus rejicio.

I. **N**El sovrapposto Schediasma suppone il Conte Jacopo, che leggi simili diano norma e alla consuete vibrazioni delle corde, che oscillano di traverso a due scannelli appoggiate, e alle vibrazioni delle corde, che oscillano per lungo, mentre il peso tendente a vicenda ascende, o discende. La prima supposizione ne chiama due altre, cioè che le corde sieno prive di naturale rigidità, e che il peso stirante sia minimo in relazione alle masse delle corde; ammesse le quali circostanze, osserveremo in progresso, che da canoni analoghi vengono regolati i due descritti generi di vibrazioni. Due rigidità vogliono nelle corde distinguersi: l'una, che chiamiamo naturale, consiste in quella ripugnanza, che ha la corda a lasciarsi allungare anche prima, che le venga applicata veruna forza tendente; l'altra, che chiamiamo artificiale, s'eguaglia all'accrescimento di ripugnanza per essere ulteriormente distesa, che dalla forza, o peso tendente nella corda proviene. Le due rigidità si possono parimente nominare intrinseca, ed estrinseca; dipendendo quella da cagione interna, cioè a dire dalla struttura della corda, e dallo intralciamento delle sue fibre, e questa da cagione esterna, cioè a dire dalla forza stirante. Conciossiachè ella è considerazione anzi geometrica, che fisica l'assumere corde solide prive di naturale rigidità, stimiamo opportuno, accontentandosi più alla Natura, di mettere a computo il detto elemento nella soluzione del seguente Problema, e di supporre altresì finita la proporzione fra le masse delle corde, ed i pesi tendenti.

*Trovare la proporzione fra gli allungamenti delle corde, ed i pesi
e forze, che li producono.*

II. Prima di tutto egli è necessario di porre in chiaro, quali sieno quelle forze, o pesi, che producono gli allungamenti nelle corde.

Sia la corda AB (Fig. 84.) tesa del peso P, con cui stia in equilibrio; egli è certo, che per allungarla sarà d'uopo aggiungere al peso P un nuovo peso per esempio p. Si ponga in B un impedimento NO, il quale non permetta, che il punto B della funicella AB possa muoversi da B verso A, e levato poscia il peso P, la corda AB eserciterà contro l'impedimento NO quello stesso sforzo, che esercitava contro del peso P. Se torneremo ad attaccare alla corda un peso o minore, o eguale a P, non cagionerà questo veruna distensione, impiegandosi tutta la sua energia o a minorare, o a togliere interamente di mezzo il contrasto dell'impedimento NO colla corda AB, il quale tornato ad appendere alla stessa il peso P, non sostiene più veruna fatica. Chi vorrà dunque allungare la corda AB, dovrà applicarle un peso $P+p$ maggiore di P, ed il peso p aggiunto al dato P sarà quello, che produrrà in essa la distensione.

III. Di-

III. Dilucidato un tal punto a solo fine di evitare gli sbagli, avanziamoci a ricercare l'allungamento inassegnabile dl operato nella corda qualunque AB , la cui lunghezza $L + l$, dalla forza minima dp aggiunta alla forza, o peso finito $P + p$ tirante la corda stessa. Avvertasi, che per L s'intende la lunghezza della corda corrispondente al peso conosciuto P , e per la distensione cagionata dal peso variabile p . Più elementi possono influire nel mentovato allungamento, la forza dp , la lunghezza della corda $AB = L + l$, il peso tendente $P + p$, la rigidità naturale r della corda, la grossezza della corda.

CANONE I.

Essendo tutti gli altri elementi pari, la distensione dl è come la forza minima dp , che la genera.

CANONE II.

Essendo gli altri elementi dati, la distensione dl è come la lunghezza $L + l$, della corda AB .

Veggansi le dimostrazioni di questi due canoni nello Schediasma dell'Autore.

CANONE III.

Posti costanti tutti gli altri elementi, e nulla la rigidità naturale della corda, la distensione dl è inversamente come il peso $P + p$ tendente la corda.

Supponendosi nulla la rigidità naturale della corda, la forza $P + p$ s'eguaglia alla rigidità artificiale d'essa corda, con cui sta in equilibrio. Un peso adunque minimo proporzionale a $P + p$ produce un allungamento costante, e per conseguenza, fatto uso del primo canone, un peso costante dp genera un allungamento in ragione inversa del peso tendente $P + p$.

CANONE IV.

Posti tutti gli altri elementi pari, e nullo il peso tendente la corda, l'allungamento dl sta in ragione reciproca della rigidità naturale r della corda.

La dimostrazione di questo canone è affatto simile a quella del canone precedente.

CANONE V.

Se due corde non differiscono, salvo che nella rigidità, e nel peso tendente, la distensione dl cagionata dalla stessa forza minima dp , è in ragione inversa della somma $r + P + p$ della rigidità, e del peso tendente, cioè a dire dl come $\frac{1}{r + P + p}$. Abbiamo detto della somma,

e non del prodotto, perchè se fosse dl come $\frac{1}{r \cdot P + p}$, s'incontrerebbe

nell'assurdo, che supposto uguale a nulla il peso tendente $P + p$ la distensione dl si scoprirebbe infinita.

Questo canone non è, che una conseguenza dei canoni terzo, e quarto assieme combinati.

CANONE VI.

Se gli altri elementi tutti saranno costanti, nulla la naturale rigidità di due corde, ed ineguali solamente le basi, un pari allungamento dl verrà prodotto dalla forza minima data dp .

Si considerino le due corde come fasci ineguali di funicelle di pari diametro. Il numero delle funicelle d'un fascio al numero delle funicelle dell'altro fascio starà come la base d'una corda a quella dell'altra. Tanto nel fascio piccolo, quanto nel grande si concepiscano e il peso tendente $P + p$, e la forza minima dp divisi in tanto numero di parti eguali, quante sono le funicelle componenti un fascio, e si scoprirà, che a due funicelle a diversi fasci appartenenti toccano e pesi tendenti, e forze minime, che si corrispondono in ragione inversa delle basi delle corde. Essendo dunque nelle dette funicelle le forze minime come i pesi tendenti, combinati i canoni primo, e terzo, si troverà costante la distensione dl in ambe le funicelle. Quello, che s'è detto d'una funicella, si può applicare a tutte l'altre componenti la stessa corda, ed indi cavare la conseguenza, che sono eguali le distensioni di due corde, la cui rigidità naturale sia nulla, ed in cui tutti gli altri elementi, a riserva delle basi, sieno comuni. Questo sesto canone s'uniforma col terzo, il quale considerate due corde, in cui l'unico elemento variabile sia il peso tendente $P + p$ e la rigidità naturale eguale a nulla, stabilisce la distensione dl in ragione inversa del peso tendente, o sia come $\frac{1}{P + p}$. Supposto costante $P + p$, si trova pure costante l'allungamento

dl , come vuole il sesto canone. Quindi i canoni terzo, e sesto s'uniscono in un solo, nè trattandosi di corde, la cui rigidità naturale sia nul.

nella, importa in riguardo alle distensioni considerare l'elemento della varia grossezza,

CANONE VIII.

Essendo costanti tutti gli altri elementi, e nullo il peso tendente; le distensioni di due corde differenti di grossezza serberanno la ragione inversa delle naturali rigidità, e si verificherà essere dl come $\frac{1}{r}$.

Avvertasi, che il quarto, ed il settimo canone sono una cosa stessa. Amendue suppongono nullo il peso tendente, e variabile la rigidità: quello vuole la grossezza costante, e questo variabile. Se due corde differentemente grosse saranno della stessa materia, si ritroveranno le rigidità, come le basi, o grossezze, cioè r come g , ed in virtù della stessa forza minima dp ne risulteranno allungamenti in ragione inversa delle grossezze, ch'è quanto dire dl come $\frac{1}{g}$.

Paragonate assieme due corde di grossezza, e di materia differente; e posto che la specie b esprima la rigidità variabile di corde dello stesso diametro, ne proviene la totale rigidità r come hg , e dl come $\frac{1}{r}$.

come $\frac{1}{hg}$.

La dimostrazione del presente canone riesce semplicissima. Se fosse dp come r , l'allungamento dl si scoprirebbe costante; dunque supponendosi dp costante, il detto allungamento per il primo canone è come $\frac{1}{r}$.

come $\frac{1}{hg}$.

Non si trascuri il corollario, che in riguardo a corde fornite di finita naturale rigidità, l'elemento della varia grossezza serve a determinare la misura d'essa rigidità.

CANONE VIII.

Se gli unici elementi variabili sieno la grossezza, e la rigidità si avrà dl come $\frac{1}{P+p+r}$, vale a dire le minime distensioni inver-

samente come l'aggregato del peso tirante $P + p$, e della rigidità r .

Qua-

Questo canone nascente dalla combinazione del sesto, e del settimo; non è che una replica del canone quinto.

IV. I canoni fra loro diversi sono il primo, che vuole dl come dp ; il secondo, che vuole dl come $L+l$; il quinto, che vuole dl come

$\frac{1}{r+p+p}$. Gli altri tutti s'uniformano con il quinto, usato al più

l'artificio di supporre o la rigidità, o il peso tendente eguale a nulla. Combinati per tanto assieme i tre diversi canoni, si trova essere dl come $\frac{L+l}{r+p+p} dp$, o sia $bdl = \frac{L+l}{r+p+p} dp$, ch'è quanto a dire le mi-

nime distensioni in ragione composta diretta delle lunghezze delle corde, e della forza minima producente esse distensioni, ed inversa della somma della rigidità naturale delle corde, e del peso tendente.

V. Si vuole osservare, che nella stessa corda la rigidità r non è costante; imperciocchè quanto più in vigore dei pesi aggiunti p cresce la lunghezza $L+l$, altrettanto cala la base, a cui è proporzionale la rigidità. Chiamata adunque b la rigidità della corda corrispondente alla lunghezza L , ed al peso tirante p , avremo generalmente $r = \frac{bL}{L+l}$.

La quantità $\frac{L}{L+l}$ è proporzionale alla base variabile della corda, la

quale moltiplicata per la lunghezza variabile $L+l$, mi dà il prodotto costante L , indice della massa, che nella corda più, o meno allungata resta sempre la stessa. L'espressione $r = \frac{bL}{L+l}$ s'adatta anche a corde

diverse, purchè per b s'intenda quella rigidità, che in esse corde corrisponde alla lunghezza L , ed al peso tendente p amendue dati. Per computare la specie b , bisogna aver riguardo alla rigidità della materia, onde è formata la corda, ed alla base della stessa corda tesa dal peso p . Le basi si ritrovano esattamente col pesare le corde, e coll'avvertire, ch'esse basi sono proporzionali ai pesi divisi per le lunghezze.

Sospiutto nella formula superiormente trovata in cambio di r il suo valore $\frac{bL}{L+l}$, ci si presenterà l'equazione differenziale $bdl =$

$\frac{L+l}{bL+p+p} dp$, che generalmente esprime la relazione fra gli allunga-

menti delle corde, e le forze, o pesi, che li producono.

VI. Si metterà in maggior lume la verità della nostra formula, avvertendo dedursi da essa il noto canone, che se a due corde della stessa materia, pari in lunghezza, differenti di base, e tese da pesi alle basi proporzionali, genereranno questi distensioni minime eguali.

Sia L la lunghezza della corda corrispondente al peso tendente P , ed aggiunto il peso minimo dp , si avrà l'espressione. $bdl = \frac{Ldp}{b+P}$. Per

le cose dette nel canone settimo la rigidità b di corde della stessa materia, ma di base differente è proporzionale alla base: ma anche il peso P si vuole proporzionale alla base; dunque la somma $b+P$ sta come la base, e supponendosi pure come la base il peso aggiunto dp , e costante la lunghezza L ; ne segue, che relativamente alla corde, di cui parliamo, si troverà costante il prodotto $\frac{Ldp}{b+P}$, e conseguentemente l'allungamento

minimo dl ad esso prodotto proporzionale; il che ec.

Egli è da notarsi per altro, che non tutte le materie, che collo stesso nome si chiamano, sono del pari rigide. Tutti gli ottoni per esempio non saranno dotati della stessa rigidità, ed oltre a ciò rendendosi una corda vie più sottile, col seguir a passare per trafilata, la quale sempre più la costringe; paragonate assieme due corde della stessa materia una sottile, e l'altra grossa, si troverà la prima alquanto più rigida di quello porti la proporzione della base, ciò che è stato da noi confermato colla esperienza. Nella addotta dimostrazione si prescinde da sì fatti elementi.

VII. Col mezzo della formula $bdl = \frac{Ldp}{b+P}$ si troverà il tempo,

in cui una corda AB si vibra per lungo. Si tolga al peso tendente P una minima porzione f , acciocchè rotto l'equilibrio, la corda si metta in oscillazione. E qui ci dichiariamo di supporre, che nello stesso istante si comincino ad accorciare le fibre tutte componenti la corda, e le più vicine, e le più remote dal peso P ; il che si verificherà almeno sificamente, trattandosi di corde, la cui lunghezza sia moderata. Sia $BF = f$ (Fig. 86.) la forza minima iniziale, che sollecita al moto il punto estremo B della corda AB , e Bb sia lo spazio in fine del quale la forza sollecitante è nulla. Eguagliandosi il detto spazio alla somma degli accorciamenti delle fibre tutte, onde è formata la corda AB ; egli è facile da capire, che l'area triangolare bBF pareggia l'intera azione delle forze sollecitanti. Ora a questa azione s'egguaglia l'aggregato delle forze vive acquistate e dal peso tirante P , e da tutte le membra particole, che compongono la corda, per ritrovare il quale ci serviamo del seguente artificio. La lunghezza AB (Fig. 87.) della corda rappresenti la sua massa m , ed istituita l'analogia $m : P :: AB : BH$, una

una

una tal linea rappresenterà la massa del peso P tendente la corda. Le due linee bD , bG normali tra loro, e con l' Ab s'eguagliano alla velocità massima u del punto B nel sito b , e del peso tendente P , onde sia $DG = u^2$, ed agevolmente si scoprirà, che la forza viva del peso P giunto in b è proporzionale al parallelepipedo $BK = Pu^2$. In riguardò alla forza viva acquistata dalla corda AB , si compia la piramide ABE , e fatta la riflessione, che le velocità massime di due particole bB , cC stanno fra loro come gli spazj trascorsi nello stesso tempicello, i quali serbano la ragione delle distanze AB , AC dal punto fisso A ; deducasi, che se bG esprime la massima velocità della particola bB , la linea cI dinoterà la velocità massima della particola cC , ed il quadrato NI , il quadrato d'essa velocità. Quindi i due solidi bE , cO espongono le forze vive delle due fibre bB , cC . Ma da tutti i solidi bE , cO cc. dinotanti le forze vive delle corrispondenti particelle viene formata la piramide $ABE = \frac{mu^2}{3}$; dunque la stessa è proporzionale alla somma

3

delle forze vive di tutte le fibre componenti la corda AB .

VIII. Ciò dimostrato riflettasi, che se si desse una corda matematica AB (Fig. 86.) sollecitata dalla scala di forze bBF , tesa dallo stesso peso P , e in questo solo differente dalla corda fisica AB , che la sua massa m fosse tutta unita nel punto B , acquisterebbe essa la medesima

3

forza viva. Essendo perciò nell'uno, e nell'altro caso il punto estremo B delle due corde fisica, e matematica dotato in siti analoghi della stessa velocità, e scorrendosi lo stesso spazio Bb ; egli è evidente, che la corda matematica sarebbe isocrona alla fisica. Trovato per tanto il numero di vibrazioni, che farebbe la corda matematica in un minuto secondo, si caverà la conseguenza, che un pari numero di oscillazioni fa nello stesso tempo la corda fisica.

IX. Rivolgendosi alla corda matematica AB , la cui massa eguale alla terza parte di quella, onde è fornita la corda fisica di pari lunghezza L , stia tutta concentrata nel punto B ; supponiamo, che il detto punto seguitando dal peso P sia giunto nel sito C , e che indi muova un menomissimo passo Cc . Si tiri l'ordinata $CD = p$, e denominata $bC = l$, sarà la infinitesima $Cc = -dl$, e per le note formole si avrà

$$-pdl = \frac{m}{3} + P. udu. \text{ Ma conforme s'è determinato superiormente,}$$

3

$$bdl = \frac{Ldp}{b+p}; \text{ dunque fatta la sostituzione,}$$

L

$$\frac{L}{b \cdot b + P} : -pdp = \frac{m + P}{3} \cdot udu; \text{ ed integrando;}$$

$$f^2 - p^2 = \frac{b \cdot b + P}{L} \cdot \frac{m + P}{3} \cdot u^2. \text{ S' aggiunge la costante } f^2; \text{ perchè nel}$$

principio del moto, quando la velocità $u=0$, la forza sollecitante s' eguaglia ad f peso minimo detratto dal finito P . E fatta l' estrazione della

$$\text{radice } \sqrt{f^2 - p^2} = \sqrt{\frac{b \cdot b + P}{L} \cdot \frac{m + P}{3} \cdot u}. \text{ Ma } u = -\frac{dl}{dt}, \text{ e}$$

$$dl = \frac{Ldp}{b \cdot b + P}; \text{ dunque } u = -\frac{Ldp}{b \cdot b + P \cdot dt}; \text{ e per conseguenza esse}$$

guita la sostituzione, dopo le debite operazioni ,

$$dt = \frac{\sqrt{\frac{L \cdot m + P}{3}} \cdot -dp}{\sqrt{f^2 - p^2}};$$

L' integrale di $-\frac{dp}{\sqrt{f^2 - p^2}}$; quando il punto B, compiuta una semivibrazio-

ne, sia giunto in b ; s' eguaglia al quadrante diviso per il raggio, o sia propriamente alla frazione $\frac{355}{226}$, e perciò integrando,

$$t = \frac{\sqrt{\frac{L \cdot m + P}{3}} \cdot \frac{355}{226}}{\sqrt{b \cdot b + P}}; \text{ ed il tempo d' una intera vibrazione del}$$

XIII. Torniamo a prender per mano l'equazione differenziale del numero V., cioè $bdl = \frac{L+l}{bL+P+p} dp$, da cui generalmente s'esprime

la relazione fra gli allungamenti delle corde, e le forze, o pesi, che li producono. Si moltiplichi per $\frac{bL}{L+l} + P+p$, e trasportato un ter-

mine da una parte all'altra, mutato il segno, troveremo

$\frac{bbLdl}{L+l} = \overline{L+l} \cdot dp - P - bdl$. Dividansi tutti i termini per

$\overline{L+l}^{i+1}$, ed avremo $\frac{bbLdl}{\overline{L+l}^{i+1}} = \frac{\overline{L+l} \cdot dp - P - bdl}{\overline{L+l}^{i+1}}$, ed integran-

do, non omissa l'aggiunta della costante,

$c - \frac{bbL}{b+1 \cdot \overline{L+l}^{i+1}} = \frac{P+p}{\overline{L+l}^i}$. Si determina il valore della costante c

ponendo il peso aggiunto $p=0$, nel qual caso è parimente $l=0$, onde
abbiasi $c = \frac{bb}{b+1} + \frac{P}{L^i}$. Si sostituisca un tal valore, e si troverà

$\frac{bb}{b+1 \cdot L} + \frac{P}{L^i} - \frac{bbL}{b+1 \cdot \overline{L+l}^{i+1}} = \frac{P+p}{\overline{L+l}^i}$, o sia moltiplicando per

$\overline{L+l}^i$, $\frac{bb+P}{b+1} \cdot \frac{\overline{L+l}^i}{L^i} - \frac{bb}{b+1} \cdot \frac{L}{\overline{L+l}} = P+p$; equazione finita

esprimente la relazione fra le distensioni l ; ed i pesi, o forze p , dai quali vengono cagionate.

XIV.

XIV. Abbiamo promesso di provare essere il coefficiente $b=1$. Otterremo ciò, considerando le compressioni dell'aria, la quale ha la proprietà, che le sue densità sono proporzionali ai pesi comprimenti. Offriamo nell'ultima premessa formola, che posta la rigidità $b=0$, ne

risulta $P. \frac{L+l}{L} = P+p$, espressione, da cui si deduce, che al peso

tendente $P+p=0$ corrisponderebbe la lunghezza $L+l=0$ della corda, che non fosse dotata di veruna naturale rigidità.

Passando dalle corde, che si rendono elastiche per via di stiramento, a quelle, che divengono elastiche per via di compressione, si cavi la conseguenza, che levato qualsivisia peso comprimente ad una corda, o elastro, la cui rigidità naturale sia nulla, si dilaterà esso infinitamente. Ora ella è tale la proprietà dell'aria, la quale minorandosi sempre più il peso comprimente, è capace d'una indefinita rarefazione. Relativamente dunque all'aria la specie b s'eguaglia a nulla almeno fisicamente.

Sia un tubo cilindrico AF (Fig. 88.) ripieno d'aria compressa dal peso P , e sia la lunghezza AB d'esso tubo uguale ad L . Al peso P aggiungasi il peso p , che generi la compressione $AC=l$, onde la nostra corda si scorti, e si riduca alla lunghezza $BC=L-l$. Il peso comprimente $P+p$ accrescasi di nuovo per una flussione infinitesima dp , a cui corrisponda la minima compressione $Cc=dl$, e fatto uso degli stessi canoni come nelle corde solide, che si stirano, col solo divario, che sia $b=0$, scopriremo $bdl = \frac{L-l}{P+p} dp$, equazione differen-

ziale esprimente la relazione fra le compressioni dell'aria, ed i pesi, che le producono.

Dividansi ambi i membri dell'equazione per $L-l$, ed avremo $\frac{bdl}{L-l} = \frac{dp}{P+p}$, o pure $0 = \frac{dp}{P+p} - \frac{bdl}{L-l}$, ed integrando, presi i logaritmi

nella Logistica della sottotangente 1, $\log. c = \log. \frac{P+p}{L-l} + b$,

$\log. L-l$, e passando dai logaritmi alle quantità ordinarie, $c =$

$$\frac{P+p}{L-l}.$$

Si stabilisce il valore della costante c ponendo $p=0$, nel qual incontro è pure $l=0$, e per conseguenza $c=P. L$. Adempiuta la formula-

situazione nell'ultima sovrapposta formola, troveremo $P \cdot L^b = \frac{P+p}{L-l}$.

Ora essendo, conforme vuol l'esperienza, le densità d , D dell'aria come i pesi comprimenti P , $P+p$, e deducendosi dalla ritrovata equazione l'analogia $P : P+p :: \frac{1}{L^b} : \frac{1}{L-l}$, avremo $d : D :: \frac{1}{L^b} : \frac{1}{L-l}$.

$\frac{1}{L-l}$: Ma le densità, che generalmente serbano la ragione compo-

sta, diretta delle masse, ed inversa dei volumi, nel nostro caso, in cui la massa è sempre costante, sono inversamente come i volumi, ed i volumi dei cilindri FA, FC, che hanno comune la base, sono come le lunghezze BA = L, BC = L-l; dunque $d : D :: \frac{1}{L} : \frac{1}{L-l}$.

Ma abbiamo pure scoperto essere $d : D :: \frac{1}{L^b} : \frac{1}{L-l}$; dunque

$\frac{1}{L} : \frac{1}{L-l} :: \frac{1}{L^b} : \frac{1}{L-l}$; e perciò $\frac{1}{L-l} = L^{b-1}$; il che non

può mai verificarsi, se non posto $b=1$:

Se $b=1$ nelle compressioni, deve avere lo stesso valore anche negli stiramenti, servendo all'une, ed agli altri la stessa formola differenziale

$bdl = \frac{L-l \cdot dp}{bL + P+p}$, ed essendo la Natura costante nelle sue leggi:

Ciò, come vedremo, viene esattamente confermato dalla esperienza:

$$\frac{bb + P \cdot \overline{L + l}}{b + 1} = \frac{bb \cdot L}{b + 1 \cdot \overline{L + l}} = P + p, \text{ sostituita in cambio di } b \text{ l'ua}$$

mità; ci si presenta sotto la forma seguente

$$\frac{1}{2} \frac{b + P}{L} \cdot \overline{L + l} = \frac{1}{2} \frac{b \cdot L}{\overline{L + l}} = P + p. \text{ Nell'affc AD (Fig. 89.) sc}$$

gnifi $AB = L$, ed indi a squadra conducansi AK , e $BF = P + \frac{1}{2} b$:

Congiunti con una linea, che si proroghi indefinitamente, i punti A , F , si segni $BH = P$, onde resti $HF = \frac{1}{2} b$, e fra gli assintoti AK ,

AG descrivasi l'iperbola comune $iCHI$, la quale passi per il punto H ; affermiamo, che posta l'assisa $AD = L + l$, farà l'ordinata $DI = P + p$, peso tendente, atto a ridurre la corda alla lunghezza AD .

Per la natura dell'iperbola $iCHI$ abbiamo $\frac{FH \cdot AF}{AG} = GI$. Ma

stante la similitudinè dei triangoli ABF , ADG , $\frac{AF}{AG} = \frac{AB}{AD}$; dunque

$\frac{FH \cdot AB}{AD} = GI$, o sia analiticamente $\frac{1}{2} \frac{bL}{\overline{L + l}} = GI$, linea esprimente la

metà della rigidità naturale della corda, mentre il peso tendente l'ha ridotta alla lunghezza $AD = L + l$. Ad AD infinita corrisponderebbe GI infinitesima, e minima conseguentemente sarebbe in tal incontro la rigidità naturale della corda divenuta infinitamente sottile. I mentovati triangoli ABF , ADG ci suggeriscono l'analogia.

$$AB : BF :: AD : DG$$

$$L : P + \frac{1}{2} b :: L + l : \frac{P + \frac{1}{2} b \cdot \overline{L + l}}{L},$$

da

da cui si deduce il valore di DG. Essendo pertanto

$$DG = \frac{P + \frac{1}{2}b}{L} \cdot \frac{L + l}{2}, \quad GI = \frac{\frac{1}{2}bL}{L + l}, \text{ ne risulta}$$

$$DI = DG - GI = \frac{P + \frac{1}{2}b}{L} \cdot \frac{L + l}{2} - \frac{\frac{1}{2}bL}{L + l} : \text{Ma per la nostra equa-}$$

$$\text{zione } \frac{P + \frac{1}{2}b}{L} \cdot \frac{L + l}{2} - \frac{\frac{1}{2}bL}{L + l} = P + p; \text{ dunque presa } AD = L + l;$$

farà la corrispondente ordinata $DI = P + p$; il che ec.

XVI. Alla lunghezza della corda $AB = L$ corrisponde per la costruzione il peso dato $BH = P$, e perciò condotta per il punto H la linea mHM parallela ad AD , si scoprirà $MI = p$, peso aggiunto, da cui è stata prodotta la distensione BD .

Nel punto C, in cui si tagliano la linea AD , e l'iperbola $iCHI$; il peso tendente s'eguaglia a nulla, e per conseguenza AC si è la lunghezza naturale della corda non istirata da peso alcuno. Il doppio della linea CE dinota la rigidità naturale della corda, mentre è nullo il peso tendente. Per ritrovare il valore di $AC = L + l$, si ponga nella nostra formola $P + p = 0$, e fatti i dovuti computi, scopriremo la lunghezza

naturale della corda $AC = L + l = L \cdot \sqrt{\frac{b}{b + 2P}}$. In questa circostanza

$l = BC$ è quantità negativa $= L \cdot \sqrt{\frac{b}{b + 2P}} - L$, la quale ci manifest

sta, che levato il peso tendente $BH = P$, la corda si scorta per la por-

zione BC . La linea CB adunque eguale ad $L - L \sqrt{\frac{b}{b + 2P}}$ misura

l'allungamento cagionato dal peso $BH = P$. Si troverà il valore di $CE = \frac{1}{2}bL$, surrogando in vece di $L + l$ la rinvenuta pari grandezza

$$\frac{\frac{1}{2}bL}{L + l}$$

L

$L\sqrt{\frac{b}{b+2P}}$, onde abbiati, adempiuti i calcoli necessarij

$CE = \sqrt{b^2 + 2bP}$, e conseguentemente $2CE = \sqrt{b^2 + 2bP}$, rigidità

4

naturale della corda non istirata da peso alcuno.

Posta la lunghezza AD infinita, farà parimente infinito il peso tendente DI uguale adeguatamente a DG ordinata al triangolo ADG; giacchè in tale ipotesi è infinitamente picciola l'ordinata GI all'iperbola. Per allungare adunque immensamente una corda, non ci vuol meno d'un peso infinito. In fatto però questo allungamento infinito non segue. La tenacità, che connette l'una con l'altra le particole componenti la corda, è finita, e quindi accresciuto il peso tendente fino ad una data misura, la tenacità resta superata dalla forza del peso, e la corda si spezza. Ha sperimentato M. Saureur, che una corda d'acciajo si rompe, quando è tirata da un peso, che sia all'in circa 12000. volte maggiore del peso di 40. oncie del piede di Parigi di detta corda: che per ispezare una corda d'ottone, ci vuol un peso 9000. volte più grande del peso di 40. oncie d'essa corda: e per rompere una corda di rame, un peso 5000. volte maggiore del nominato peso di oncie 40.

XVII. Esaminata quanto basta la premessa costruzione relativamente agli allungamenti della corda AC, resta che si dicano alquanto parole di quella porzione di curva da C verso A, in cui divenendo negativo il peso tendente, cioè a dire cangiandosi di stirante in premente, ci si presenta agli occhi una legge matematica, ma non fisica di compressioni della corda AC. Per vedere come nelle compressioni si modifichi la formula del numero XV, il peso premente $mi = p$ abbia cagionato nella corda $AB = L$ resa dal peso $P = dm$ l'accorciamento $Bd = l$, onde alla corda resti la lunghezza $Ad = L - l$, ed avremo per l'equazione al trian-

golo ADG $dg = \frac{1}{2} \frac{b+P}{L} \cdot \frac{L-l}{L}$, e per l'equazione all'iperbola,

$gi = \frac{1}{2} \frac{bL}{L-l}$, e conseguentemente, giacchè $di = mi - md = p - P$, $gi =$

$dg = di = p - P = \frac{1}{2} \frac{bL}{L-l} - \frac{1}{2} \frac{b+P}{L} \cdot \frac{L-l}{L}$. Questa formula tira l'origine

dalla espressione differenziale $dl = \frac{L-l}{bL + P+p} dp$, la quale suppone, che

la minima compressione dl sia in ragione composta, diretta della forza inassegnabile dp , che la produce, e della lunghezza $L-l$ della corda, ed inversa della differenza $bL + P+p$ fra la rigidità naturale della corda

bL , ed il peso $p+P=di$, che nella corda AC non è tirata da forza al-

cuna ha cagionata la compressione Cd .

Ora essendo il resto pari, le minime compressioni fisiche stanno in proporzione reciproca della somma, e non della differenza della rigidità, e del peso premente, riuscendo tanto più piccole, quanto è maggiore l'aggregato della rigidità, e del peso, che preme.

Se L sarà la lunghezza d'un cilindro, ed b la rigidità naturale corrispondente a un dato peso premente P , e che inoltre sia $L-l$ la lunghezza, a cui si riduce il cilindro presso dal peso $P+p$, nel quale stato la rigidità naturale s'esprime per bL ; si verificherà la seguente formola.

differenziale $dl = \frac{L-l}{bL + P+p} dp$, la quale essendo un dato corpo privo

di qualunque rigidità naturale, si riduce alla quì sottoscritta

$dl = \frac{L-l}{P+p} dp$, ch'è quella stessa da noi ritrovata. (numero XIV) re-

lativamente all'aria I. La nostra costruzione pertanto non dà la norma alle compressioni fisiche dei corpi.

XVIII. Resta, che la legge delle distensioni delle corde contrasse-

gnata dalla equazione $\frac{1}{2} b + P \cdot \frac{L+l}{L} - \frac{1}{2} bL = P+p$ si confermi

solla esperienza. Dalla premessa formola si deduce essere

$b =$

$$b = \frac{2pL - 2Pl \cdot L + l}{2L + l \cdot l} \quad (1)$$

$$L + l = \frac{L}{b + 2P} \cdot P + p + \sqrt{P + p^2 + b^2 + 2bP} \quad (2)$$

Amendue queste espressioni verranno a scita per confrontare colla teorica alcuni esperimenti, che siamo per riferire. Furono questi fatti con somma diligenza molti anni fa nella occasione di esaminare una legge, che appunto essi esperimenti fecero riconoscer per falsa. Raccomandata una corda d'ottone al chiodo A (Fig. 90.), il quale era distante dallo scannello NO. oncie $32\frac{1}{2}$ del piede di Parigi, equivalenti a linee 390, s'at-

tacò primieramente ad essa corda il peso P di libbre 2, e segnossi con inchiostro il punto B, in cui la corda toccava lo scannello NO. S'applicò poscia alla corda il peso $P + p$ eguale a libbre $2 + 4 = 6$, ed osservossi, che il punto B era disceso sotto dello scannello NO linee $1\frac{1}{8}$.

Aggiunto poi al peso $P = 2$ il peso $p = 8$, onde il peso totale $P + p$ fosse di libbre 10, cagionò esso peso aggiunto 8 la distensione di linee $2\frac{1}{4}$, la quale era doppia di quella prodotta dal peso aggiunto 4. Nell'equazione segnata (1) si faccia $L = 390$, $P = 2$, $l = 1\frac{1}{8}$, $p = 4$, dati

somministratici dalla prima esperienza, e troveremo il valore della rigidità della corda tesà dal peso $P = 2$, cioè a dire

$$b = 1134 + \frac{37022}{68761} = 1134 + \frac{7}{13}.$$

Dopo ciò nella equazione segnata

(2) si ponga in cambio di b il ritrovato valore $L = 390$, $P = 2$, $p = 8$ peso aggiunto adoprato nella seconda esperienza, e si scoprirà l'allungamento generato dal peso $p = 8$, vale a dire $l = 2 + \frac{3}{4} + \frac{1}{207}$. Avendo

coll'esperienza rinvenuto $l = 2 + \frac{3}{4}$, giudichi il Lettore, se si può spe-

rare maggiore accordo fra il nostro canone, e l'esperimento, consistendo tutto il divario in $\frac{1}{207}$ di linea, minuzia totalmente inosservabile.

XIX. Merita riflessione la rigidità grande delle corde di metallo. La rigidità della nostra corda d'ottone equivale a libbre $1134 + \frac{7}{13}$.

La maniera, con cui si lavorano le corde sonore, aumenta moltissimo la loro rigidità. Diventano esse così sottili, passando innumerabili volte per trafilà, che sempre più le costringe, ed irrigidisce.

L'essere la rigidità b assai grande in relazione ai pesi adopati nelle due esperienze, si è il motivo, per cui le distensioni $1 + \frac{3}{8}$, $2 + \frac{2}{4}$, $3 + \frac{1}{207}$

sono adeguatamente come i pesi aggiunti 4, 8. Fingasi b infinita, nel qual caso farà infinitesimo l'allungamento l prodotto dal peso aggiunto p , che si suppone finito. Nell'equazione (1) si cancellino tutti i termini relativamente nulli, e resterà $b = \frac{pL}{l}$, e conseguentemente $l =$

$\frac{Lp}{Lb}$, da cui si deduce, che essendo $\frac{L}{b}$ quantità costante, le distensioni

l stanno sempre come i pesi aggiunti p . Or ecco la ragione, per cui essendo la rigidità b assai grande in riguardo ai pesi usati nelle esperienze, si sieno trovati gli allungamenti nella stessa adeguata proporzione dei pesi aggiunti.

SCHEDIASMA XXIV. (*)

Sopra alcune proprietà delle corde elastiche.

IN certa opera, che manoscritta va per le mani degli Intendenti, un Dotto Matematico, il quale non stima per anco bene di esporri in pubblico, impugna una mia Proposizione, che si legge nella Dissertazione intorno la vera misura delle forze elastiche inserita negli Atti dell'Accademia di Bologna. Ho detto nel Corollario primo del Lemma quarto, che date due funicelle elastiche in tutto pari, fuorchè nella lunghezza, per istenderle proporzionalmente, di modo che soffrano gli stiramenti in ragione delle lunghezze, ci vogliono forze tali, che serbino fra loro la medesima proporzione.

Mi

(*) Questo Schediasma, e il seguente furono composti nell'anno 1734, come si ricava da una lettera del Co. Giovanni Rizzetti 20. Marzo 1734, dalla risposta del C. J., e da una Scrittura dello stesso Conte Rizzetti.

Mi sono ingegnato di addurre nel Lemma suddetto una chiara dimostrazione: sebbene questa verità può prendersi per un assioma. In fatti se i due nervi si suppongono della stessa materia, e della stessa grossezza, i numeri delle fibre, che li compongono, saranno come le lunghezze: ma per istendere ugualmente due minime fibre uguali, si richiedono forze pari; non essendoci ragione, per cui abbia ad impiegarfi maggior forza piuttosto contro l'una, che contro l'altra; dunque per allungare due aggregati pari di fibre, ci vorranno due aggregati pari di forze: e se faranno ineguali, come nella nostra ipotesi, i numeri delle fibrille, bisognerà moltiplicare le due minime forze uguali, che stendono ugualmente due fibre uguali per i predetti numeri, altrimenti la forza medesima, che si spende contro una sola fibra, sarà sufficiente, restando avvalorata non si fa come, a stenderne infinite. Perciò le forze totali consumate contro le due funi saranno come le loro lunghezze, o come le loro distensioni.

A questa maniera di dimostrare non saprei qual eccezione avesse ad opporsi, senza distruggere da capo a fondo i principi dell'umano discorso. S'io mi fo a provare, che le forze vive di due corpi moventesi con pari velocità sono proporzionali alle masse, d'altro raziocinio non posso valermi, che d'un similissimo al già proposto, dividendo cioè colla mente ambo i corpi in minimi elementi uguali, ed assumendo, che sia pari la forza viva di due particelle eguali di massa, e che camminano con eguale velocità, indi passando a concludere, che a proporzione della quantità delle parti elementari si moltiplica nell'uno, e nell'altro corpo la forza viva. E se in questo caso l'argomento si è bello, e buono, ne c'è chi contraddica; io dimando per qual cagione lo stesso giro di discorso applicato alle nostre funi prenda faccia di paralogismo.

Il mentovato Geometra si fa forte sulla speranza, che ci fa vedere, qualmente appesi due gravi eguali alli punti B, b (Fig. 91.) delle due funicelle AB, ab pari in tutto il rimanente, salvo che nelle lunghezze, dopo essere questi discesi, e fatte alquanto reciprocazioni di calare abbasso, e di salire in alto, finalmente si fermano nei punti C, c , ed in essi s'equilibrano colle tenacità delle corde. Quindi si è dato a credere, che le distensioni BC, bc quantunque ineguali, e proporzionali alle lunghezze AB, ab possano essere prodotte da forze pari vale a dire dall'innata gravità, che risiede nei due pesi uguali applicati alle due corde. Se la conseguenza regga, lo vedremo a suo luogo e tempo, e frattanto in grazia dell'Oppositore daremo di penna a quel celebre assioma, che gli effetti prodotti sono in qualunque incontro proporzionali alle loro cagioni, mentre esse in generarli intieramente si consumano; atteso che solamente nel caso nostro particolare abbiamo due cause uguali, cioè i momenti di due pesi uguali, da cui vengono prodotti effetti ineguali, ed in qualunque ragione, siccome certamente lo sono i due diversi stiramenti BC, bc .

[Ma

Ma non tanto per rispondere alle difficoltà mosse dal mio eruditissimo Avversario, quanto per dilucidare la presente materia, mi metto ad investigare alquanto prime originali proprietà delle funi elastiche.

Sia la corda AB nel suo stato naturale, a cui si attacchi nel punto infimo B un dato peso, la massa, e la gravità del quale si esprima per la retta BE: allungherà questo la fune, discendendo per la verticale BCD, prima con moto accelerato da B sino in C, indi per vigore dell'impeto concepito con moto ritardato da C sino in D, dove si ridurrà alla quiete. Prevalendo allora l'energia della corda, che tenta di rimettersi alla sua primitiva dimensione, sarà obbligato il corpo D ad ascendere tirato all'insù contro la sua naturale inclinazione, accelerando il suo moto fra li due termini già segnati D, C, e ritardandolo fra gli altri due C, B. Così continuerebbe a reciprocare all'infinito a guisa d'un pendolo, senza mai fermarsi, se il nervo AB fosse perfettamente elastico, e se il giuoco si facesse in uno spazio vano. Ma perchè la prima condizione non si verifica, e la resistenza dell'aere debilita a poco a poco, e finalmente estingue affatto l'impeto impresso; interverrà, che dopo parecchie oscillazioni si fermi il peso immoto nel punto C, e mantenga stirata la fune per tutto il tratto BC.

Ciò dall'esperienza ci viene messo sotto gli occhi, ma non è così facile a scoprirsi, come in tale incontro operi la Natura. Fingasi, che il grave D, senza essere sospeso dalla corda, percorra liberamente lo spazio BD sollecitato dalla gravità costante BE: egli è certo per le cose dimostrate dal Galileo, che la scala delle velocità crescenti riferite agli spazj passati sarà la parabola BKL. Ognuno s'accorge, ch'io non metto in conto il contrasto dell'aria, che nel caso nostro appena è assegnabile, e può trascurarsi.

Supponiamo in oltre, che la curva BFH colle sue applicate ci rappresenti le tenacità crescenti della funicella AB. Non occorre presentemente investigar l'indole di questa curva, e ci basti il sapere, che nel vertice B non avendo per anco la corda sofferto stiramento di sorta alcuna, essendo la sua resistenza inassegnabile, la curva nell'apice B con l'asse si congiunge: ma perchè quanto il nervo è più stirato, tanto più le ordinate esprimenti le tenacità vanno aumentandosi; ne siegue, che la curva si discosterebbe all'infinito dall'asse, se le fibre, le quali non anno fra loro una infinita connessione, finalmente non si staccassero, e la corda non si rompesse.

Egli è per tanto manifesto, che crescendo sempre più la lunghezza della fune, mentre non resti spezzata dal peso, può giungere la sua tenacità a pareggiare il momento BE del grave, come accade per cagion d'esempio nel punto C, ed anche a superarlo, come in tutti i punti inferiori.

Poilo il peso nel sito B, la sua gravità BE opera senz'alcuna diminuzione, e s'impiega tutta a produrre nella massa D il primo grado di moto: ma giunto che sia al punto O, dall'azione costante della gra-

vi-

vità MO' fa di mestieri sottrarre la reazione NO dell'elastro; così che la forza della gravità in due si divide: una parte NO se ne spende contro la tenacità della fune, e l'altra sovrabbondante MN in accelerare il moto del corpo D , che discende.

Pervenuto il peso al punto C , essendo ivi pari l'azione della gravità, e la reazione della corda, espresse entrambe dall'ordinata FC , la celerità d'esso mobile nè accresciuta nè diminuita lo fa trascorrere uno spazio infinitesimo con moto equabile. Nei punti poscia più bassi, come nel sito R , la tenacità PR dell'elastro supera la gravità costante QR , e succede, ch'essendo maggiore la resistenza ritardante della forza accelerante, una porzione, vale a dire PQ , se ne spende a distruggere l'impeto impresso, che il grave discendendo s'aveva acquistato, finattantochè viene totalmente estinto nel punto D dalle innumerabili resistenze crescenti, delle quali è scala il trilineo FHG .

Non è difficile a concepirsi, qualmente dopo la discesa segua l'ascendimento della palla D ; conciossiachè costituita questa in riposo nel luogo D , viene spinta abbasso dalla forza più debole DG , e tirata all'insù dalla più gagliarda DH , con cui la corda procura di restituirla. La porzione dunque HG purgata da ogni contrasto di reazione contraria è quella, che principia a comunicare il moto alla sfera verso B , il quale viene accelerato per tutto il tratto DC dalle sollecitazioni esposte dalle ordinate PQ ec. che tutte insieme formano l'area FHG . Ma l'impeto acquistato viene poi estenuato dalle iterate azioni della gravità, che fra li punti C , B è sempre maggiore della forza, per cui la fune si accorcia; di modo che prescindendo dall'imperfezione dell'elastro, e dalla resistenza dell'aria, rimonterebbe il globo fino al punto B , ed ivi si troverebbe di bel nuovo posto in quiete, per tornar a discendere, e continuare all'infinito le reciprocazioni.

Io giudico, che la materia, su cui versiamo, sia oltre ogni credere delicata, e perplessa; laonde chi non ista bene attento cade facilmente in qualche equivocazione. Andrò dimostrando alcuni Teoremi, che serviranno a liberarci dai pregiudizj.

TEOREMA I.

Pervenuto che sia il peso B al sito D , dove cessata la discesa comincia esso a disporsi alla salita; io dico, che il rettangolo $BEGD$ è precisamente uguale all'area $BFHD$.

La gravità costante BE con impressioni uniformi accompagna il globo B per tutto lo spazio BD , e perciò la somma di tutte queste sollecitazioni ci viene rappresentata dal predetto rettangolo BG ; ma nella massa B ridotta allo stato di quiete nel punto D non si ravvisa alcun effetto cagionato dal cumolo delle mentovate impressioni; dunque egli è d'uopo che sieno state distrutte dalle replicate resistenze, con cui vi si ha opposto la tenacità della fune. Frattanto le resistenze crescenti ci vengono esposte dalle ordinate della curva BFH , e la loro som-

somma dall' area della curva medesima; per la qual cosa essendo l'aggregato delle azioni eguale, e contrario all' aggregato delle reazioni, si raccoglie, che il rettangolo BEGD è uguale all' area BFHD. lo che ec.

Facendo uso del computo per confermare l' addotta verità, pongasi la gravità costante $BE = g$, la tenacità variabile della corda $= s$, gli spazi crescenti BO , $BD = s$, le loro flussioni $= ds$, le velocità del globo per esempio in O , ed $R = u$, e le loro differenze du . Per i noti canoni delle forze continuamente applicate avremo $gds = tds = mudu$,

e sommando $gs = \int tds = \frac{mu^2}{2}$: ma nel punto D per l' ipotesi è la

velocità $u = 0$; dunque $gs = \int tds$. In questo mentre essendo nel caso nostro $s = BD$, col prodotto gs si esprime il rettangolo BG ; e coll' integrale $\int tds$ la intiera area $BFHD$; per ciò sono fra loro eguali le due menzionate superficie.

COROLLARIO I.

Saranno similmente uguali i due trilinei BEF , FHG ; laonde rappresentandoci il primo la scala di tutte quelle forze derivate dalla gravità costante, che libere dalle resistenze accelerano il globo B per lo spazio BC , ed il secondo la scala delle sollecitazioni negative, che estinguono l' impeto concepito, s' inferisca, che l' aggregato delle impressioni, per cui si comunica ad un mobile una data celerità, come CI , è uguale alla somma di tutti gl' impulsi contrarj, da quali essa velocità resta distrutta.

COROLLARIO II.

Fingasi, che il grave sia disceso per lo spazio BO , in tal caso dal rettangolo BM si rappresenta la somma di tutte le impressioni uniformi partecipate dalla gravità, dalle quali sottratte le resistenze, che sono tutte contenute nel trilineo BNO , resta il trapezio misto $BEMN$; che ci dinota l' aggregato di tutte quelle sollecitazioni, dalle quali viene accelerato il globo B per il tratto BO ; così che il quadrato della velocità OS acquistata nel punto O , si trova essere in data ragione all' area $BEMN$.

Similmente il quadrato della celerità, da cui resta affetto il mobile nel punto R fra li due termini C , e D , è in data proporzione alla differenza, che passa fra i due trilinei BEF , FPQ , cioè a dire all' area del mistilineo $QPHG$.

CO.

COROLLARIO III.

Le forze morte sollecitanti il peso B per l'abscissa BC purgate dalle resistenze sono contenute nel trilineo BEF, ed operano in maniera tale, come se la suddetta massa B piombando liberamente nel vano, venisse successivamente accelerata dalla stessa scala d'impressioni, mentre nell'uno, e nell'altro caso, dopo trascorsi eguali spazj si troverebbe affetta dalla medesima velocità.

COROLLARIO IV.

La curva, che colle sue applicate ci mette sotto gli occhi le velocità del grave B, il quale cala abbasso per lo spazio ED, è una spezie d'ellissoide BID. La celerità, che nel punto B è nulla, vassù aumentando sino al punto C, a cui corrisponde la massima CI. Quindi di mano in mano si fa minore, sino a ridursi a nulla nel punto D. E si noti, che la medesima curva, la quale serve per la discesa, presiede alle abscisse al rovescio principiando dal punto D, ci rappresenta altresì le velocità acquistate nella salita.

TEOREMA II.

Prendasi per mano un'altra funicella più corta *ab*, che dalla prima AB non sia differente in conto alcuno, salvo che nella diversa lunghezza; io dico, che per istirare ambe esse corde proporzionatamente, così che sieno le distensioni BC, *bc* in ragione delle lunghezze AB, *ab*, ci vogliono somme tali di forze morte, che serbino fra loro la medesima proporzione.

Col premesso giro di discorso proverò, che la distensione *bc* equivale a tutti gl'impulsi della gravità contenuti nel trilineo *buse*: ma questo all'altro BNFE sta come *bc*: BC, o come *ab*: AB, conforme ho dimostrato altrove; dunque per avere gli stiramenti *bc*, BC proporzionali alle lunghezze delle corde, si richiedono aggregati, tali di forze sollecitanti, che sieno nella stessa ragione: il che ec.

COROLLARIO I.

La distensione BC non dipende dalla velocità CI, da cui si trova animato il grave B nel punto C; ma bensì da quella forza, che avrebbe aggiunta al mobile B la celerità IK, quand'esso fosse liberamente disceso, e ch'è stata consumata contro la tenacità della fune, appunto per ciò, che allo stesso grave non è stata comunicata. La cosa mi sembra evidente; imperciocchè se la gravità costante BE non fosse stata impedita, accelerando il globo B per lo spazio verticale BC, avrebbe

Opera Ricc. T.III.

N n

in

in esso certamente impressa la celerità CK, il cui quadrato si trova proporzionale al rettangolo BEFC; ma realmente nel punto C il peso non cammina, salvo che colla velocità CI, il cui quadrato sta in data ragione al trilineo BNFE; dunque la restante azione della gravità esposta dall'area BNFC, o dalla differenza fra i due quadrati CI, CK s'è consumata nello stiramento della corda elastica.

COROLLARIO II.

Stando il grave immoto sospeso nel punto C, allora si fa l'equilibrio tra la tenacità della corda, ed il peso B, venendo ambe queste forze morte esposte per la medesima ordinata CF. Ogni qual volta la fune liberata dal grave B principia a restituirsi, altra forza nel primo istante non può impiegarfi, fuorchè la morta CF: ma con eguale forza morta il corpo B viene stimolato alla discesa; dunque niuna di queste potenze prevalerà; non essendoci motivo, per cui prevaglia piuttosto l'una che l'altra. Il lodato Signore tira una precipitosa conseguenza, ed è, che alla forza morta del peso B non avvalorata in conto alcuno dal moto debba attribuirsi il totale effetto dello stiramento BC; quasi che la gravità non abbia operato in tutti i punti di mezzo per esempio in O, in cui ci ha spesa una parte del suo vigore espresso per ON.

COROLLARIO III.

S'aggiunge inconveniente ad inconveniente; attesochè malamente dal mio riverito Avversario si confondono le forze vive, e le morte, e l'energia della percossa coll'azione semplice della gravità. E' manifesto, che senza moto non può mai allungarsi la corda AB; dunque per far l'effetto ci vuole una forza viva, o sia una morta nel caso nostro variabile infinite volte replicata: e se così è, come mai può paragonarsi questa forza con una sola sollecitazione del grave B, la quale si sa essere infinitamente più picciola, esprimendosi la prima per l'area BNFC, e la seconda per un elemento infinitesimo dell'area stessa?

S C O L I O.

Per maggiormente dilucidare la materia, e toglier di mezzo ogni ambiguità, dispongo le predette funi AB, *ab* (Fig. 92.) in sito parallelo all'Orizzonte, colla condizione, che i punti A, *a* sieno fermamente raccomandati a due chiodi, e gli altri B, *b* siano liberi. Alla estremità *b* della più corta *ab* attacco il corpo (*m*) animato dalla velocità (*a*), il quale camminando per un piano orizzontale perfettamente liscio, impieghi tutta la sua forza impressa in distendere la corda fino al punto *c*, ove pervenuto si ritrovi in quiete.

E

E' cosa manifesta, che giunta a tal termine la massa (m), quella forza viva, che in essa risiedeva, s'è intieramente consumata nello stiramento; e perciò se l'azione è uguale alla reazione, e la causa produttrice all'effetto prodotto; deesi conchiudere, che tutte le resistenze della funicella sieno equivalenti all'energia del corpo (m), la quale da esse viene successivamente per così dire assorbita.

Ed in fatti la corda ab col rimettersi in virtù della sua molla, restituisce alla palla (m) ritornata in b la sua primiera velocità, di maniera che nel primo caso la massa in moto fa la figura di cagione agente, e la tenacità di effetto resistente; e nel secondo l'azione sta dalla parte della fune elastica, e la reazione dalla parte della massa (m), che cangiando stato passa dalla quiete al moto.

Ora se per allungare proporzionatamente amendue i nervi, anno ad impiegarli forze uguali, conforme l'opinione, che da me si combatte, basterà applicare al punto estremo B della corda più lunga AB la stessa massa (m) fornita della medesima velocità (a), onde per questo mezzo s'ottenga la distensione BC proporzionale alla maggiore lunghezza AB . Che ciò possa mai succedere, io per me nol credo, nè mi persuado, che il mio dotto Avversario sel creda.

Descritte le due scale delle tenacità crescenti bnf , BNF anno esse la proprietà, che partite l'abscisse bc , BC in data ragione nei punti analoghi o , O , sieno eguali le ordinate on , ON , le quali ci rappresentano tanto le tenacità delle corde nei siti o , O , quanto i pesi, che ci vogliono per mantenerle stirate, e far sì, che non comincino a ricuperare le loro primiere dimensioni.

Ricorriamo in questo mentre alle comuni formole da tutti i Geometri ricevute, ed avremo per una parte $\int rds = mudu$, e per l'altra $\int Rds = MVDV$, e sommando, non ommessa l'aggiunta della costante, $c - \int rds = \frac{mu^2}{2}$, $C - \int Rds = \frac{MV^2}{2}$: ma nei punti b , B le

due quantità integrali $\int rds$, $\int Rds$ si trovano $= 0$, e di più $u = a$ ed $V = A$; dunque le costanti, che nella doppia integrazione debbono aggiungersi, sono $c = \frac{ma^2}{2}$, e $C = \frac{MA^2}{2}$. All'incontro essendo per l'i-

potesi ambe le velocità u , V affatto estinte nei punti c , C ci si presenteranno due altre equazioni $ma^2 = 2 \int rds$; $MA^2 = 2 \int Rds$: e giacchè $r = R$, e come bc : BC , o come ab : AB , così ds : dS ; avrà luogo anche il seguente analogismo ab : AB :: ma^2 : MA^2 .

N n 2

Quindi

Quindi per fare, che le funi ab , AB soffrano le distensioni bc , BC proporzionali alle loro lunghezze, prese ad arbitrio le masse (m) , (M) , debbono ad esse comunicarsi velocità tali (a) , (A) , che i prodotti (ma^2) (MA^2) sieno fra loro in ragione delle lunghezze medesime. Ciò supposto, chi mi contende, che per avere i divisati effetti non possa io mettere in opera due masse, le quali si rispondano in proporzione di ab : AB ? ed in tal caso farà di mestieri, che le menzionate masse vengano animate da pari celerità, onde sia $a=A$. Appresso è cosa manifesta, che le forze vive di due corpi, i quali camminano con eguali velocità, sono proporzionali alle masse; dunque resta evidentemente conchiuso, che per allungare proporzionatamente le nostre due corde, si richiedono due forze vive, che fra loro si corrispondano in ragione delle lunghezze.

Assunte poi eguali le masse (m) (M) , egli è d'uopo per le premesse formule, che si rinviengano in proporzione delle lunghezze ab , AB , non già le velocità semplici (a) , (A) , ma bensì i loro quadrati (a^2) (A^2) . Frattanto le forze vive, che debbono adattarsi alle corde, si sono già dimostrate almeno in un caso particolare proporzionali alle predette lunghezze; dunque generalmente, ed in tutti gl'incontri esse forze vive si trovano essere in ragione composta semplice delle masse, e duplicata delle velocità, o come i quadrati delle celerità, se sono uguali le masse.

Sarebbe una spezie di paradosso, che per ottenere i medesimi effetti, avessero ad applicarsi forze tali, che serbassero ora una proporzione, ed ora un'altra; quasi che la reazione d'un nervo elastico, che sempre persevera la stessa, dovesse stare in guardia, e discernere da qual sorta di forza ad un pari stiramento viene ridotta, per opporsi secondo le regole dei Cartesiani una volta con maggiore, e l'altra con minore contrasto.

SCHEDIASMA XXV.

Confutazione dell'ipotesi, che due corpi dotati di eguali quantità di moto urtando in due corde del tutto eguali le ripieghino per eguali faette.

Sieno due funi elastiche fg , FG (Fig. 93.) della stessa materia di pari lunghezza, e grossezza, ed ugualmente stirate, sopra le quali cadano le palle a , A da sublimità tali ab , AB , che giunte in b , B abbiano acquistata una pari quantità di moto; onde le masse a , A si rispondano in proporzione inversa delle velocità in b , B , ch'io chiamerò u , U . Fingasi, che dall'azione d'esse sfere si pieghino le corde ugualmente, e dopo estinto da una parte, e dall'altra tutto il moto, si riducano alle posture simili, ed uguali fdg , FDG : si proponga d'investigare, quali conclusioni nascano dalla premessa ipotesi.

1. Siano pervenuti i due globi alli punti e, C ; così che si dia uguaglianza fra le facette bc, BC : parmi cosa chiara, ch'essi avranno perdute quantità di moto, per produrre i restanti effetti uguali, e far passare le corde delle distensioni uguali feg, FCG alle maggiori, ma uguali fdg, FDC . In fatti se le predette funicelle fossero disposte in sito orizzontale, e ridotte alle lunghezze pari feg, FCG , per incurvarle quanto portano le facette uguali cd, CD , farebbe d'uopo giusta la nostra ipotesi, che fossero investite dalle palle a, A , in cui risiedessero quantità di moto minori bensì delle prime, ma però uguali.

2. Quindi ne siegue, che chiamate nu, nU le velocità residue in e, C , avremo $anu = AmU$: ma $au = AU$; dunque $n = m$, e conseguentemente le velocità costanti nu, nU come le primitive u, U .

3. Seguitino ad operare i nostri globi per gli spazj uguali, ed infinitesimi ce, CE , ed essendo le velocità restanti ne' punti e, E ($n^o. 2^o.$) in proporzione costante, cioè $nu - ndu : nU - ndU :: u : U$; dunque posti eguali, ed ugualmente distanti dalli punti b, B gli elementi ce, CE delle abscisse, avremo le flussioni negative delle ordinate alle curve delle velocità decrescenti in data ragione di $u : U$.

4. I tempi impiegati dalle sfere a, A in istendere ugualmente le due funi sono direttamente come le masse a, A . Nel camminare che fanno le palle per gli spazj uguali, ed elementari ce, CE ci spendano i tempi minimi dt, dT , i quali sono in ragione composta, diretta degli spazj ce, CE , ed inversa delle velocità nu, nU , da cui restano asfette le masse ne' punti e, C : ma le masse, che sono per l'ipotesi in proporzione reciproca delle celerità primitive u, U , si trovano essere altresì nella medesima ragione ($n^o. 2^o.$) colle residue nu, nU ; dunque $a : A :: dt : dT :: Ndt : NdT$: la qual analogia verificandosi sempre, si N numero finito, o infinito (perchè un pari numero d'elementi uguali ce, CE si contiene tanto in bd , quanto in BD) ne siegue, che siccome $a : A :: t : T$.

5. In questo mentre le resistenze r, R ; che si oppongono al moto dei globi nei punti e, C moltiplicate rispettivamente ne' tempi elementari mentovati dt, dT , che si spendono in percorrere gli spazj minimi, ed uguali ce, CE , sono per i principj del Galileo eguali alle flussioni delle quantità del moto, che per una parte, e per l'altra si perdono dalle due sfere, nel ridurre le corde dagli stiramenti uguali feg, FCG agli altri uguali feg, FEG ; dunque $rdt = - andu$, ed $RdT = - AndU$, cioè $rdt : RT :: andu : AndU$: ma $dt : dT :: a : A$ ($n. 4^o.$), ed $ndu : ndU :: u : U :: \frac{1}{a} : \frac{1}{A}$ ($n. 3^o.$); dunque $ra : RA :: au : AU :: t : T$

1, ed in conseguenza $r : R :: u : U :: \frac{1}{a} : \frac{1}{A}$.

6. Nella ipotesi pertanto, che da me si va esaminando, non solamente le resistenze delle due corde ridotte alle distensioni pari feg, FCG

FG non sarebbero uguali, siccome vuole la ragione; non sapendosi assegnare il perchè l'una sia dell'altra maggiore; ma quello ch'è peggio, si potrebbero fissare in qualunque ragione, che più ci piacesse d'eleggere. In fatto potendo io assumere le masse in qualsivoglia proporzione ad arbitrio, e non ostante ciò lasciarle cadere da tali altezze, che comincino ad agire contro ambo le corde con una quantità di moto costante, ed $= au$, o sia AU ; accaderà, che in differenti supposizioni le resistenze r , R si risponderanno con relazioni affatto diverse; tutto che le distensioni sieno pari: non già perchè si mutino le forze, alle quali le nostre funi fanno contrasto, ma perchè stando ferme le medesime forze, si vanno cangiando le masse, e le velocità.

7. E se così è, le quantità del moto eguali au , AU non producono effetti pari consumandosi intieramente. Sarebbono questi uguali, ogni qual volta l'aggregato di tutte le resistenze della corda fg fosse uguale all'aggregato di tutte le resistenze dell'altra corda FG : ma presi ad arbitrio i due punti c , C corrispondenti alle sette uguali be , BC , e lo stesso dicasi di tutti gli altri, la resistenza della prima in c a quella della seconda in C sta come $\frac{1}{a} : \frac{1}{A}$ (n. 5.); dunque tutte le resisten-

ze della prima a tutte della seconda sono nella stessa ragione di $\frac{1}{a} : \frac{1}{A}$

ed essendo per la supposizione a minore di A ; il cumulo delle resistenze della fune fg è maggiore del cumulo delle resistenze della fune FG ; dunque la forza della palla a , che supera un maggior contrasto, è più grande di quella dell'altra palla A , con che si distrugge totalmente l'ipotesi.

8. Ma quando s'abbia l'egualità $au = AU$ giusta il canone Leibniziano, non s'incontrano assurdi. In questa sentenza le velocità restanti in c , C sono in ragion inversa dimidiata delle masse, cioè $nu : nU :: ndu : nU :: 1 : 1$, i tempi del moto per eguali spazj ce , CE

$$\sqrt{a} \sqrt{A}$$

in ragione subduplicata delle masse medesime $dt : dT :: t : T :: \sqrt{a} : \sqrt{A}$, e finalmente nell'equazioni $r dt = - a x du$, $R dT = - A x dU$, o sia nell'analogismo $r dt : R dT :: a du : A dU$, surrogati i valori già trovati, $r \sqrt{a} : R \sqrt{A} :: a : A$, cioè $r : R :: a : A$. In ordine a ciò si

scoprono uguali le resistenze r , R , come esser debbono.

9. In poche parole dimostro per altra strada il principio Leibniziano. Giacchè le due resistenze uguali in c , C moltiplicate nelle differenze uguali degli spazj ce , CE sono per il canone noto uguali ai momenti delle velocità, ch'io chiamerò x , y , dalle quali restano affette

le

le palle a , A ne' punti c , C ; moltiplicati essi momenti per le masse corrispondenti, avremo $rdS = -axdx$, ed $RdS = -A\gamma d\gamma$, ed integrando non ommessa l'aggiunta delle necessarie costanti; $\int rds = p - \frac{axx}{2}$,

$\int RdS = P - \frac{A\gamma\gamma}{2}$: ma nei punti b , B , mentre le facce s sono $= 0$,

le velocità residue x , γ non sono diverse dalle primitive u , U ; Resolate pertanto le due formule, sarà $\int rds = \frac{au^2}{2} - \frac{ax^2}{2}$,

$\int RdS = \frac{AUU}{2} - \frac{A\gamma\gamma}{2}$: ma nel fine del moto, vale a dire ne' punti

d , D , sono le velocità variabili x , ed γ ambe $= 0$; dunque in tale circostanza, dappoichè s'è consumata nel produrre l'effetto tutta l'energia di ciascuna palla, avrassi $\int rds = \frac{auu}{2}$, $\int RdS = \frac{AUU}{2}$: ma

$\int rds = \int RdS$ per l'uguaglianza, che passa fra gli aggregati delle resistenze r , R ; dunque $auu = AUU$, conforme richiede la regola del Leibnizio.

SCHEDIASMA XXVI. (*)

Della proporzione, che passa fra le affezioni sensibili, e la forza degli obbietti esterni, da cui vengono prodotte.

CHè si sarebbe mai dato a credere poter le scienze Matematiche poggiar tant'alto, che giungano sino a misurare le interne sensazioni della nostra Anima? Ma se si rifletterà trovarsi in queste il più, ed il meno, e restar conseguentemente abbracciate dall'idea generale della quantità; si scoprirà, che con profitto può la Geometria applicarci le sue figure, e l'Analisi i suoi canoni.

Pr.

(*) Questo Schediasma assieme coll'Annotazione del Sig. Ab. Co. Girolamo Lioni uscì alle stampe l'anno 1722. nel primo Tomo de' Supplementi al Giornale de' Letterati d'Italia.

Prima di tutto mi pongo a considerare una delle nostre fibre destinate dalla Natura a ricevere le impressioni delle cose esterne; e perchè è stata disposta, e collocata in maniera, che di traverso, ed in tutti i punti di sua lunghezza viene pressa, e sollecitata da forze assolute uguali, dovrà inarcarsi, e piegarsi in una curva del genere dell'elastica. Il dottissimo Inglese Taylor parlando delle corde sonore, che percosse tremano, ed oscillano, s'è preso il pensiero d'investigare l'indole, e le proprietà: supponendosi però, che sia inassegnabile il massimo allontanamento della corda dall'asse del moto, di modo che non si muti la forza della tensione con accrescere la lunghezza del nervo teso, riesce la sua soluzione talmente limitata, e ristretta, che mal può adattarsi al nostro disegno.

Nella materia, su cui pretendo di versare, sono, s'io non m'inganno, superflue queste analitiche sottigliezze, mentre per una parte ci fanno entrare in un laberinto di computi, e per l'altra la curva cercata, senza l'ajuto di qualche arbitraria limitazione, è difficilissima a determinarsi. Siam dunque concesso il battere la strada più piana, e procedere con una Geometrica semplicità. In fatti le fibre de' nostri organi non sono elleno fisicamente minime? e quando sono obbligate dall'azione degli obbietti esterni a cangiarsi di rette in curve, non è forse ugualmente impercettibile la differenza, che passa tra l'arco della curva, e le due toccanti, che lo stringono, e con seco si confondono? Ora se la piccola fibra AB (Fig. 94.) ricevendo in ogni suo punto le impressioni della forza agente, viene stretta a prendere prossimamente la figura inflessa ADB; lo stesso effetto potrebbe prodursi da un impulso determinato, che tutto raccolto nel mezzo, contro il solo punto C esercitasse la sua azione.

S'esprima questa forza per la retta DH, e prolungata la metà della fibra BD verso I, si tiri la retta HI parallela all'altra metà DA; onde si formi il triangolo isoscele DIH, dal cui vertice I si lasci cadere sopra la DH la perpendicolare IG. Quindi dal centro B all'intervallo BC si descriva l'arco di cerchio CE, il di cui seno retto sia CF normale alla secante BD.

Fatta questa preparazione, egli è certo, che la forza rappresentata per la retta DH si risolve nelle due forze collaterali DI, IH, la prima delle quali tirando la metà BE della fibra con la direzione BDI cagiona la distensione ED, e la seconda, essendo parallela all'altra metà AL, produce con pari forza la distrazione uguale LD. Ora per abbracciare sotto una sola formula tutti i casi, è noto in primo luogo, che tese due fibre in tutto eguali, suorchè nella lunghezza, da potenze uguali, le distensioni faranno come le lunghezze. 2. Che stirate ugualmente due fibre pari in lunghezza, ma di diverso diametro, le forze applicate faranno in ragion duplicata de' diametri stessi. 3. Che tese due fibre perfettamente uguali secondo la direzione delle fibre medesime da due potenze differenti, non c'è noto con qual legge rispondano le forze alle distensioni; onde si dovrebbe supporre con una ge-

ne,

nerale espressione la distensione data per una funzione indeterminata della potenza. Ma perchè in qualunque modo l'accennata relazione si esprima, cioè per le ascisse, e per le ordinate di qualsivoglia curva, almeno, quando le distensioni saranno minime, la proporzione nascente della curva locale non sarà sensibilmente diversa dalla sua tangente; ne segue, che per le conseguenze fisiche da dedursi in progresso, cioè per il prossimo, se non per l'esatto, potremo valerci dell'ipotesi semplicissima, che le distensioni s'erbino sempre la ragione delle potenze.

Se ne può addurre in prova l'esperienza delle corde sonore, le quali battute o leggiermente, o con violenza, appena mutano tuono: segno manifesto, che tutte le loro oscillazioni si fanno in tempo eguale; essendo proposizione notissima, e già dimostrata, che l'isocronismo intanto può aver luogo, in quanto si verifica il canone, che le forze tendenti sieno proporzionali alle distensioni. Se dunque negli stromenti da suono s'ammette la legge come vera, ed un orecchio musico fra le massime, e minime vibrazioni di una stessa corda a gran pena può discernere la differenza d'un coma; non so vedere, perchè abbia a rigettarsi, quando si tratta delle sensazioni dipendenti dalle distrazioni delle nostre fibre, che quanto sono più piccole, tanto meno dall'addotta legge si discostano.

Premesso ciò, combinando insieme le mentovate proporzioni nelle fibre della stessa materia, le distensioni saranno in ragion composta, diretta delle potenze tendenti, e delle lunghezze, e reciproca delle grossezze. Nel caso dunque nostro la distrazione DE farà come il prodotto ID. CB diviso per la grossezza della fibra, che io chiamerò g : ed essendo che l'angolo CBD si suppone minimo, l'intercetta DE si trova uguale al seno verso EF, com'è facile a dimostrarsi; dunque DE, o pure DF doppia di DE farà come la quantità $\frac{ID \cdot BC}{g}$ ma stante la si-

g

militudine de' triangoli IDG, CDF, avremo $ID : DG :: CD : DF$, la qual analogia ci darà l'equazione $\frac{ID \cdot DF}{CD} = DG$, o surrogata in

cambio della ID la grandezza equivalente $\frac{g \cdot DF}{BC}$, farà DG come $\frac{g \cdot DF^2}{CD \cdot BC}$

ma il rettangolo BDF è sempre uguale al quadrato della faccetta DC, cosichè $BD \cdot DF$, o per essere DE minima, $CB \cdot DF = CD^2$; dunque sostituiti opportunamente i valori, $\frac{g \cdot DC^2}{CB}$ comè DG, o pure DH: ed

in conseguenza la potenza ID, o la distensione DE come la quantità

$$\frac{DH}{\frac{2}{3} \cdot CB}, \text{ il che ec.}$$

$$\frac{2}{3}$$

Limitando l'espressione alla sola corda, o fibra AB inflessa dalla potenza DH supposta variabile, troveremo essere la facetta CD, come la radice quadrata della forza relativa ID, o della distensione DE, o pure come la radice cubica della forza assoluta DH, e conseguentemente il quadrato DH come il cubo ID, o sia DE. Se ci fosse frattanto chi bramasse una formula più rigorosa, e precisa, sebbene meno elegante, per le distensioni della stessa fibra; proceda col seguente metodo, che agevolmente può estendersi a tutti i casi, e rendersi universale. Ponga $DI = x$, $IG = z$, $DG = y$, e $CB = a$ unità, e stabilita la distensione $DE = u$ data in qualsivoglia modo per la forza DI. o sia x applicata direttamente, osservi, che per la similitudine de' due triangoli DIG, DBC si verificherà la seguente analogia $DI, x : IG, z :: DB,$

$$a + u : BC, a; \text{ dunque } \frac{ax}{a+u} = z, \text{ ovvero } \frac{xx}{a+u} = zx = xx - yy, \text{ e}$$

$$\text{conseguentemente } yy = xx - \frac{xx}{a+u} = \frac{2xx + uxx}{a+2u+uu}, \text{ il che ec.}$$

Si noti, che supponendosi minima la $u = DE$, svaniranno nell'omogeneo di comparazione della nostra equazione i seguenti termini, cioè nel numeratore il termine $u x x$, ch'è infinitamente minore dell'altro $2 x x$, e nel denominatore i due membri $2 u$, $u u$, che comparati colla quantità costante a sono inassegnabili. Resterà pertanto yy ad $u x x$ in data proporzione, e adottando l'ipotesi, che le distensioni u sieno come le forze x , avremo $y^2 : a x^2$ in ragione costante, come nella prima formula.

L'esperienza s'accorda prossimamente, e quanto basta col nostro canone; imperocchè avendo io tesa con forza orizzontalmente una breve corda di metallo, e legata strettamente a due punti immobili, adattai al punto di mezzo un grave pendente da un sottilissimo filo; che piegasse la corda, e formasse la facetta non maggiore d'un dito; per ottenere una facetta doppia, era d'uopo, che ci applicassi un peso otto volte più grande.

Dalla formula ritrovata, quantunque semplicissima, m'ingegnerò di dedurre alcune verità importanti per la Fisica, che riusciranno forse nuove, ed inaspettate. Primo bramerei pure d'introdurre nella scienza delle

coſe naturali un gran principio; che mi verrà facilmente ammefſo da quelli, che ſi ſono preſi il penſiero d'unir la Fiſica alla Geometria; e conſiſte in ciò, che la Natura, o per dir meglio, il ſuo ſapientiffimo Autore fa ſempre tutto ciò, che ſta ben fatto, e che atteſe le circonſtanze, far meglio non ſi potrebbe: dal qual aſſioma, che ſi vede meſſo in pratica in quel poco, che con l'ajuto delle Matematiche potiamo capire intorno il mirabile mecca niſmo delle coſe naturali, e che ſi dee giudicare aver luogo anche in quel molto, per non dirlo infinito, che ſupera la noſtra capacità; io tiro una evidente dimoſtrazione dell'eſiſtenza d'una mente infinita, che tutto opera, e tutto diſpone, contro la greggia de' ſeguaci d'Epicuro, e di Scratone.

Applicando al noſtro caſo il principio, era di neceſſità, che l'Anima unita al corpo, e col ſuo mezzo a tutto il mondo materiale, veniſſe ammonita di tutto ciò, che ſi fa al di fuori, e formaſſe almeno un giudizio conſuſo delle imprefſioni più ſi acche, e più robuſte, che paſſano a lei per lo canale de' ſenſi. Il criterio non poteva eſſere eſquiſitamente diſtinto, perchè non c'è vera proporzione fra l'eſterne operazioni degli obbietti, e gl'interni ſentimenti della mente. Negli obbietti non c'è, che materia, forza, e moto; negli organi, che tenſione, e reſiſtenza; nell'anima poi tutto è affezione, tutto ſenſo, tutto coſcienza, che ſi chiama, ſecondo la varietà de' membri del noſtro corpo, che ne ricevono l'imprefſione, o luce, o ſuono, o dolore, o che ſo io, come prima d'ognuno, ed anche dello ſteſſo Cartefio, ha notato nel ſuo Saggiatore l'incomparabile Galileo. Non oſtante ciò le noſtre ſenſazioni, quantunque d'una ſfera ſuperiore ai ſintomi della materia, doveano da queſti prender norma, e creſcere, o ſminuirſi a miſura non già della maggiore, o minore attività degli oggetti, ma benſi dell'imprefſione più debole, o più forte, che ſi riceve negli organi. Queſto canone debbe ammetterſi per incontraftebile in ogni ſiſtema, tanto nell'antico, e comune, quanto ne' moderni delle cagioni occaſionali, o dell'armonia preſtabilita; mentre quand'aveſſe luogo una diverſa proporzione, la legge, con cui ſi lega l'anima al corpo, farebbe affatto arbitraria, e nulla avrebbe che fare il ſenſo col ſenſorio.

Ed in vero eſſendo le fibre de' noſtri ſenſi un non ſo che di mezzo fra gl'impulſi eſterni, e le interne affezioni, ed eſſendo ugualmente eſpoſte all'azione degli obbietti ſi acchi, e vigorofi, ſe veniſſero o comprefſe, o ſtirate direttamente, di modo che le ſenſazioni corriſpondeſſero in proporzione all'energia degli agenti eſtrinſeci; accaderebbe, che la Natura o le avrebbe formate molli, delicate, e capaci di riſentirſi ad ogni debole imprefſione, ed in tal caſo non avrebbero potuto reggere agli urti gagliardi; o pure lavorandole robuſte, e forti ſarebbono ſtate inſenſibili a' tocchi più languidi.

Venendo poi deſtinate all'uno, ed all'altro uffizio, come richiedevaſi alla noſtra conſervazione, ed alla noſtra maggior perfezione, era neceſſario, che la Natura le diſponeſſe in maniera, che riceveſſero non direttamente, ma di traſverſo gl'impulſi degli oggetti; onde ſtabilitò

prima un giusto equilibrio tra l'impeto esterno, e la resistenza interna del sensorio, in virtù del canone generalissimo delle forze composte, quanto più fosse vigoroso l'agente, altrettanto nell'applicare obliquamente la sua azione perdesse di vigore, e quanto fosse più fiacco, altrettanto a proporzione della propria forza operasse con maggiore energia.

E qui si noti per togliere di mezzo ogni ambiguità, che mentre non si adatti la forza esterna a stirare direttamente le fibre, come talvolta può succedere, la sua virtù dall'applicazione obliqua viene sempre avvalorata; essendo in ogni incontro le due forze laterali DI , IH maggiori della Diagonale DH , a cui si vanno sempre più accostando, quanto essa va più crescendo, senza però mai potersi pervenire ad una perfetta egualità, se non in caso, che la forza DH diventasse infinita, e la fibra fosse per impossibile capace d'una infinita distrazione. La maggior parte dunque degli obbietti farebbono poca impressione ne' nostri sensi, se non venisse accresciuta la loro azione, con le leggi però, e dentro i limiti, che si anderanno spiegando.

Per mettere in tutto il suo lume la verità, si replichi la fibra AB in ab (Fig. 94., 95.), e fingasi, che dalla forza ab minore di DH , venga piegata fino in d ; onde abbiassi la nuova faetta cd , e la distensione de . Fatta la preparazione come sopra, dalla risoluzione della forza dh risulterà la forza id , che tirando direttamente la semifibra be , cagionerà la distensione ed . Quindi essendo la tangente cd minore di CD , farà l'angolo cdl , o l'opposto al vertice idg , maggiore del corrispondente CDB , o pure IDG . Facciasi l'angolo kdg uguale all'altro IDG , e per la similitudine de' due triangoli rettangoli IDG kdg avrassi l'analogia $kd : dg :: ID : DG$, ed in conseguenza $DG : dg$, o sia $DH : dh$ avrà maggior proporzione di $ID : id$, oppure di $De : de$. La forza pertanto minore dh , che si risolve nelle due laterali id , ih , operando con la forza id , cagiona a proporzione maggior distrazione nella mezza fibra be , di quello faccia la forza più grande DH , che agisce con la forza ID contro la metà della fibra uguale BE .

Presa di bel nuovo per mano la nostra generale espressione, sia $DH : dh :: 8 : 1$, e sarà $ID : id :: DE : de :: 4 : 1$, di modo che fissate le forze degli oggetti in proporzione ottupla, le sensazioni si corrisponderranno in ragione quadrupla, e chi volesse una sensazione ottupla dell'altra bisognerebbe, che la virtù dell'oggetto più forte fosse ventidue volte maggiore di quella del più debole.

2. Con un solo artificio però non ottiene la Natura un sol fine; ma molti, ed ugualmente mirabili. Avendo ella esposte obliquamente le nostre fibre all'azione degli oggetti, che sono fuori di noi, ottiene, che non solamente raffrena la gagliardia de' più robusti, ma acquiesce la debolezza de' più fiacchi, e fa che si senta, per dir così, l'insensibile.

Si danno alcuni suoni, o per fievellare esattamente, certi tremori dell'aere così languidi, che nelle nostre orecchie non producono suono. Si danno certe pressioni dell'etere, o certi tocchi di luce tanto delicati, che nel fondo de' nostri occhi non formano senso di luce; e la ragione si è, perchè la sollecitazione delle fibre è sì fattamente minima, che riesce totalmente impercettibile. La Natura però ha corretto il disordine, se non quanto vorrebbe la nostra curiosità, almeno quanto richiede la nostra conservazione; e se certi impulsi deboli non si distinguono, segno è, che non ponno recare a noi nè profitto, nè nocimento. Frattanto i nostri sensi ricevono perfezione da ciò, che le loro fibre vengono di traverso spinte, e percosse. Supponiamo, che la distensione d'una fibra non si renda sensibile, se non allora quando arriva ad essere, per esempio, una parte determinata di tutta la sua lunghezza, e collocata la fibra ab nel sito verticale VX . (fig. 95., 96.), la distensione XY , che si finge la più picciola fra le sensibili, sia effetto della potenza YZ , che tira direttamente. Egli è certo per l'ipotesi, che sminuita la forza YZ , succederebbe bensì qualche distrazione, ma della linea delle impercettibili: sicchè dunque tutti gli agenti men vigorosi non farebbero soggetti alla giurisdizione del nostro sensorio. Che se la fibra si trova orizzontalmente disposta in ab , o in qualsivoglia altra positura, di modo che sia voltata verso l'oggetto, viene in tal caso a dilatarsi la sfera del sensibile, ed una impressione molto più debole della già determinata YZ , acquistando forza, giugne a farsi sentire. Si applichi alla suddetta fibra ab la potenza db , che formi la distensione de uguale alla metà di XY , ed avremo id uguale a YZ , e per la similitudine de' due triangoli ide , bdc , come $bd:dc$ così $id:de$, o pure $id = YZ$ $db::bd:2dc$; così che supposte le due fibre ab , UX ugualmente stirate, saranno le potenze YZ , db in ragione della secante bd alla doppia tangente de .

S'intenda ab , o UX divisa in parti 100., e sia $XY = ed + dl = 2$ (ipotesi, in cui s'assume farsi allora la minima delle sensazioni, quando la fibra cresce per la centesima parte della sua lunghezza) la tangente dc sarà prossimamente diece; dunque $YZ:db::100:20$: dal che si deduce, che se per fare una impressione sensibile nella fibra verticale VX vi si richiede la forza YZ , basterà una sola quinta parte di essa nell'esempio addotto per distendere ugualmente una fibra situata di traverso, e per produrre una sensazione.

3. Non debbo tralasciare un'altra curiosa osservazione. Supponiamo, che la minima distrazione d'una fibrella, di cui potiamo essere consapevoli, di modo che sarebbe a noi totalmente insensibile, se fosse più picciola, s'esprima con l'unità; e supponiamo in oltre, che ad una distensione centupla non possa la fibra senza suo nocimento resistere: egli è chiaro, che fra la minima, e la massima sensazione della medesima specie passerà la proporzione come cento ad uno. Se le sensazioni risponderessero esattamente alla forza degli obbietti, ne seguirebbe, che nell'addotta ipotesi tutto il sensibile resterebbe ristretto fra que-

questi due limiti cento, ed unità. La Natura però non rinchiude fra così angusti termini la sfera delle cose sensibili; imperocchè essendo le distrazioni delle fibre, e conseguentemente le sensazioni come le radici cubiche de' quadrati delle forze esterne, accaderà, che limitate le sensazioni, per esempio come uno a cento, s'empierà la linea del sensibile come uno a mille. Quindi esperimentiamo, che il nostro udito si risente ad un leggier sibilo, e tollera i rimbombi de' tuoni, e delle bombardie; e la nostra vista sensibile ad un barlume riflesso, sopporta senza suo danno la luce d'un grand'incendio, nè si dà per vinta, se non allo sfrenato splendore del Sole.

4. Io non voglio internarmi a quistionare cosa sia quella molesta sensazione, che dolore s'appella, e che su d'infinita ottimamente dal grande Sant'Agostino *compassio mentis ex corpore, & in corpore*. Consista pure o nella soluzione del continuo, o nel moto disordinato degli spiriti animali, o nel violento stramento delle fibre; egli è manifesto, che quando gli organi dalla forza d'un agente troppo gagliardo mal si difendono, e tesi oltre il dovere o si rompono, o corrono rischio di rompersi, si sente certamente il dolore. E' manifesto altresì, secondo l'opinione dell'ingegnosissimo Borelli, che i fughi spiritosi dimoranti nel midollo de' nervi ponno facilmente essere irritati, in quanto agitati da un moto perturbato, ed irregolare si portano a scuotere con disordine le fibre delicatissime del cervello, onde nasce la passione convulsiva, cui diamo nome di dolore. Comunque vada la faccenda, io dico, che la Natura ha procurato di risparmiarci al possibile un sentimento, quanto necessario alla nostra conservazione, perchè ci ammonisce di ciò, che s'aggirar si debbe; altrettanto molesto, perchè non potiamo sottrarci ad un male, senza sperimentarne un'altro. Ha fatto ciò col metter freno agli oggetti oltre modo robusti, e col diminuir la loro energia, alle nostre fibre obbliquamente applicandoli.

Ripigliando l'ipotesi altre volte fatta, il vigore esterno può crescere dall'unità sino al mille senza nocimento dell'organo, in cui le distensioni crescono con altra legge dall'unità sino al cento, e quando queste crescessero a proporzione degli agenti esterni, una forza poco più maggiore della centupla sarebbe sufficiente a guastare, ed a rendere inutile il sensorio.

5. Con le dottrine premesse rendo facilmente ragione d'alcuni fenomeni naturali. Usciti noi di notte tempo da una camera ben illuminata all'aria poco meno che oscura, e tenebrosa, restiamo per qualche spazio privi dell'uso della vista, finattanto che l'occhio assuefatto a quel debole barlume ritorna a far il suo ufizio, ed a distinguer gli obbietti. Dagli Ottici se ne ascrive comunemente la causa alla variazione del diametro della pupilla, che in passando dalla luce più forte ad una più debole, vassi a poco a poco dilatando. La ragione è buona, ma non la giudico sufficiente. Direi di vantaggio, che durando l'impulso del lume maggiore, di cui s'era imbevuto l'occhio, e per cui nelle fibre della retina s'era fatta una certa distensione; prima che
que-

questa si restituifca interamente , il barlume languido della notte non fa impressione fenfibile. Si può confermare il detto con una fperienza rapportata dal Signor della Hire il Giovine, ed accennata in fimil propofito anche dal Sig. Abate Girolamo Lioni nella vita di Monfignor del Torre pag. 65. 66. Intredotto quefti di giorno in una camera ofcura, in cui confervava un barometro luminoso, nello fcuoterlo, ch'egli fece, non vide lume di forza alcuna, e fofpettò, che l'effetto aveffe folamente a fuccedere di notte; ma fermatofi per qualche fpazio di tempo nella camera, e follecitato di bel nuovo lo ftromento, vide a comparire il confueto chiarore, e conclufe, che l'impressione della luce diurna, che rimoffo l'oggetto fi mantiene nell'organo, era ftata la cagione, per cui non avea da principio potuto diftinguere la luce languidiffima, che fi genera da bilanciamenti dell'argento vivo, e forma un delicatiffimo Fofforo.

Sieno per efempio due luci in ragione come uno ad otto: quando agifcano fepparatamente, le fenfazioni, che per la nofta regola faranno come uno a quattro, corrifponderanno fra loro con una proporzione fenfibile. Unifcanfi le predette due luci, e fi faccia un lume come nove, la fenfazione, che ne rifulterà, farà ella maggiore delle due come tredici a dodici proporzionalmente, ed appena l'una dall'altra potrà diftinguerfi.

Per lo motivo addotto succede, che fvanifca: agli occhi noftri il lume d'una face alla prefenza del Sole; che ingombrata l'orecchia da un grave rimbombo non s'odano i fuoni fievoli; che refo ftupido un membro, fenta meno il dolore. Accade all'oppofito, che la mano troppo riscaldata giudica fredde le cofe repide, ed intirizzata dal freddo fente con rincrefcimento un calor blando; a' quali fenomeni altri fe ne potrebbero aggiugnere, che col mezzo degli accennati principj felicemente fi fpiegano.

6. Ne' Fanciulli le fibre fono più picciole, e più molli. Per quello riguarda la grandezza, fe foffero proporzionali alla mole del corpo, ed in conseguenza fimili a quelle degli uomini, richiamata a memoria la nofta formula $\frac{gDC^1}{CB^1} : DH$ (Fig. 94.) farebbe g come CB^2 cioè la

grosfezza come il quadrato dellà lunghezza: e perchè la forza DH fta come la fezione delle fibre medefime, o come il rettangolo della lunghezza nel diametro della fibra; ftante che a mifura di quefte due dimenfioni ricevono l'impressione dagli oggetti efterni, avremo fempre $DC^1 : CB : DH :: DC^2 : CB^2$, o pure $DC^2 : CB^2$ in ragione costante: ma $DC^2 = BC \cdot DF$; dunque costante altresì farà la proporzione di DF , o DE a BC ; laonde le diftentioni faranno come le lunghezze. Per quefto capo dunque le fenfazioni d'un Fanciullo non faranno differenti da quelle d'un uomo: ma fatta la rifleffione effere le fibre d'un Fanciullo più delicate, e più capaci di diftentione, ed oltre di ciò, che il capo con tutti i fuoi organi, a proporzione dell'altre membra, è più grande ne' giovanetti che negli adulti; fi conchiuderà, che

fe

le sensazioni de' fanciulli sono più vive di quelle degli uomini: anzi negli uomini stessi in quella guisa, che di rado si trovano due volti affatto simili, si dee credere, che per lo più le loro fibre sieno di diversa struttura, e che ognuno abbia, al pari della Fisonomia, le sue particolari sensazioni. Io ne ho in me medesimo la prova, mentre la Natura mi ha posto in fronte due occhi dissimili, come altre volte ha fatto col celebre Pietro Gassendo; il destro de' quali è ben conformato, e perfetto, ed il sinistro vizioso, e presbita. Con questo vedo gli oggetti non solo più rimoti, più piccioli, e manco distinti, ma di più la luce stessa, il che fa a nostro proposito, mi comparisce alquanto più smorta, ed i colori più languidi, e più diluti. Correggo ad arbitrio il difetto della grandezza, e della confusione con l'uso d'una lente convessa; ma per questo nè la luce si fa più viva, nè il colore più florido, indizio manifesto esserci fra le fibre dell'uno, e dell'altro occhio una diversità organica.

7. In passando dalla gioventù alla vecchiezza, le fibre non si mutano di grandezza, acquistano però una certa rigidezza, che le rende meno atte alla distensione. La rigidità di due fibre per altro eguali in mole, ed in gravità specifica, o la loro resistenza ad esser distratte, altronde non può misurarsi, che dalla forza, cui si richiede per produrre in essa una pari distrazione.

Sia per tanto AB (Fig. 94., 97.) la fibra d'un'uomo giovane, e quella d'un vecchio egualmente lunga, grossa, e pesante, ma più indurata, e meno flessibile. S'adatti ad ambe la stessa potenza DH, e si pieghi la prima sino in D, e la seconda sino in Q; onde sia la saetta CD maggiore della saetta OQ, e la distensione DE maggiore della distensione QP. Vada crescendo la forza DH applicata alla fibra MN sino a diventare RT; di modo che si facciano eguali le saette RO, DC, e le distrazioni RS, DE. Supposta la solita preparazione, essendo simili due triangoli isosceli DIH, RUT, avremo l'analogia TR:HD::VR:ID, vale a dire come le forze assolute, così le collaterali direttamente applicate a stendere ambedue le fibre; dunque come le potenze TR, HD, così la rigidezza delle fibre medesime: ma come il quadrato della potenza TR al quadrato della potenza HD, così il cubo della distensione RS = DE al cubo della distensione QP; dunque supponendo, che gli oggetti esterni agiscano contro le fibre AB, MN con egual forza, come la rigidità della fibra MN a quella della fibra AB, così reciprocamente DE:√DE:QP. √QP, cioè i quadrati della rigidità saranno in proporzione inverfa de' cubi delle distensioni.

Le durezza pertanto delle fibre, o la loro resistenza alla distrazione riescono con una legge, e le distensioni e le sensazioni decrefcono con un'altra: così che più aumentano le rigidità di quello calano le sensazioni, e con un mirabile artificio della Natura meno si perde nel senso, che nel sensorio. Il senso de' vecchi si fa di giorno in giorno più ottuso, ma non quanto richiederebbe la rigidezza delle lor fibre, che sebbene s'indurano, non lasciano però d'essere più sensibili di quello si converrebbe

be

be alla lor durezza: Se faremo poi osservazione, per quello particolarmente riguarda il senso della vista, che gli occhi de' vecchi diventano presbiti, onde gli oggetti appariscono minori in vecchiezza, che in gioventù, e che parimente le impressioni della luce, e de' colori, a causa dell'induramento delle fibre, si fan più languide; termineremo questa Fisco-Matematica ricerca con una riflessione morale, ed è, che invecchiando noi, il mondo sensibile si va per noi successivamente, ed insensibilmente perdendo.

ANNOTAZIONE

Del Sig. Abate Conte

GIROLAMO LIONI.

IL Sig. Conte Jacopo Riccati nella sua dissertazione della proporzione, che passa fra le affezioni sensibili, e la forza degli obbietti, accennò aver notato l'incomparabile Galileo nel suo Saggiatore avanti il Cartesio, che negli obbietti v'è solo materia, forza, e moto, e che le affezioni sensibili riseggon nell'anima con vario nome di luce, di suono, ec., secondo la varietà de' membri del nostro corpo, che ne ricevono l'impressione. In prova dunque d'una tale verità, ed acciocchè alcuno non creda doversi al Cartesio, come pur troppo è invalso, la lode di aver tirata la prima linea in una tale speculazione, più precisamente diciamo averci chiaramente il detto Galileo nel Libro di sopra riferito insegnato, che i Sapor, Odori, Colori ec. per la parte del soggetto, nel quale par, che riseggano, non sono altro, che pur nomi, ma tengono lor residenza solamente nel corpo sensitivo; sicchè rimosso l'animale, sieno levate, ed annichilate tutte quelle qualità. E' così mirabile in via di metodo la spiegazione, che fa l'Autore del suo concetto, che si possono riscaldare (come si suol dire) queste vivande, e sperare, che riscaldate conferiscano più che mai allo stomaco de' Filosofi.

Comincia egli da un'affezione, la quale per essere la più materiale, si può dire, che si tocca con le mani. Muove la sua destra ora sopra una statua di marmo, ora sopra un uomo vivo: dipoi osserva, che essendo l'azione rispetto alla mano la medesima sopra l'uno, e sopra l'altro soggetto, se l'affezione fosse della mano, essa sarebbe all'uno e all'altro comune. Ma perchè vede star ferma la statua, e riferirsi a quel toccamento l'uomo, conchiude essere l'affezione tutta dell'uomo, e niente della mano.

Da questa sensazione più materiale passa ad un'altra un poco più delicata. Con la mano va leggermente toccando un uomo vivo ora in una parte del corpo, ora in un'altra. Osservando, poi che l'uomo toc-

Opere Ricc. T. III.

P p

co

co in alcune parti del corpo sente solo il comun toccamento; e tocca in alcune altre, per esempio sotto le ascelle, sente un'altra affezione chiamata solletico, la discorre così. Se oltre il moto avesse la mano in se un'altra facoltà, cioè il solleticare, si sentirebbe questa affezione in qualunque parte del corpo si movesse la mano. Ma perchè si sente il solletico in una parte, e non si sente nell'altra, ne ricava la medesima conclusione di prima.

Seguitando poi sempre a passare dal più materiale al più delicato, una penna, dic' egli, leggermente fregata sopra il nostro corpo, fa quanto a se da per tutto la medesima operazione; e pure in noi toccando sotto le narici eccita una titillazione quasi intollerabile, ed in altra parte appena si fa sentire. Onde rinnovato l'argomento. conchiude essere quella titillazione tutta di noi, e non della penna.

Dall'esempio del nostro Autore potiamo dunque imparare il vero metodo di filosofare. Ci fa egli prima toccar con le mani, che è tutta ne' corpi animati l'affezione chiamata tatto, indi passando sempre dal più semplice al più composto, s'avvicina a poco a poco, e quasi per gradi a sensi più delicati. Il tatto (seguita egli) fatto dalla solidità della materia, par, che abbia riguardo all'elemento della Terra. E perchè alcuni corpi di questa si vanno continuamente risolvendo in particelle minime, delle quali altre, come più gravi dell'aria, scendono al basso, ed altre più leggeri salgono all'alto, di qui nascono due altri sensi; mentre quelle vanno a ferire due parti del corpo assai più sensitive della pelle, che non sente l'incurfioni di materie così sottili. Que' minimi dunque, che scendono, ricevuti sopra la parte superiore della lingua arrecano i sapori, gli altri, che ascendono, entrando per le narici vanno a ferire certe mammillule, che fanno sentire gli odori. E ben si veggono providamente disposti, quanto al sito, la lingua, ed i canali del naso; quella distesa di sotto per ricevere l'incurfioni, che scendono; e quelli accomodati per quelle, che salgono. Da questi sensi, che riguardano l'elemento della terra, passa col metodo di sopra indicato al senso de' suoni, che pare di maggiore delicatezza, giacchè riguarda l'elemento dell'aria, quando da frequente tremore in minutissime onde increspata muove certa cartilagine del timpano, che è nell'orecchio.

Quindi conclude, che ne' corpi esterni per eccitare in noi i sapori, gli odori, e i suoni, si richieggano bensì grandezze, figure, molitudini, e movimenti, ma tolti via gli orecchi, le lingue, e i nasi, restino le figure, i numeri, e i moti, non gli odori, nè i sapori, ne i suoni; i quali perciò fuori dell'animale vivente non sono altro, che nomi; come pure altro, che nome, non è il solletico, e la titillazione, rimosse le ascelle, e la pelle del naso.

Finalmente viene alla Vista, senso il più delicato degli altri, e mediante il suo metodo arriva a capire in un certo modo gli effetti, e le cause, non ostante che se ne intenda poco de' mezzi. In fatti della sensazione della vista, e delle cose attenenti ad essa, confessa d'in-

ten-

tendersene poco; ma ad ogni modo capisce, ch  nell'occhio la luce fa con la debita proporzione come nella lingua, e nel naso que' minimi, i quali eccitano i sapori, e gli odori, e come nell'orecchio l'aria ondeggiant , la quale eccita i suoni. Capito questo, il resto pone in silenzio, mostrando in questa parte il nostro Autore un carattere molto diverso da quello del Cartesio, mentre in vece d'ingombrare i libri con ipotesi dubbie, c'insegna pi  tosto a tacere. Di ci , che tace il Galileo, si credeva, che avesse abbastanza parlato il Signor Nevvton nel suo famoso libro della Generazion dei Colori, ma giacch  dalla Lettera Diottrica del Signor Giovanni Rizzetto qu  dietro stampata, vengono a quest'Autore chiuse le parole in bocca, noi ne restiamo ancora a digiuno. Solamente ci va lusingando la notizia, che in detta Lettera abbiamo, d'esserfi fatta la scoperta della generazione de'Colori apparenti; onde speriamo di veder in breve rivelata la generazione anche degli altri colori, che si chiamano permanenti. Intanto ritornando al nostro primo proposito, avremo con quest'Annotazione evidentemente dimostrato, che la sentenza tanto decantata, e comunemente attribuita al Cartesio intorno alle affezioni sensibili, che riseggon nella nostr'anima,   nata prima in Italia, ed   stata pubblicata dal Galileo nel suo Saggiatore.

ANNOTAZIONE DELL' EDITORE.

I. SI ristringe l'Autore a vane ipotesi nel premesso Schediasma, e primieramente suppone, che la forza $DH = f$ (Fig. 94.) dell' obbietto esterno agisca tutta raccolta nel punto medio C della fibra $AB = zL$, di modo che essa fibra in virt  dell'azione della forza DH prenda la figura triangolare ADB . Suppone in secondo luogo, che essendo nulla la forza P tendente la fibra nella sua naturale positura ACB , la distensione $ED = l$ sia prodotta dalla forza DI nascente dalla nota risoluzione della forza DH . Suppone finalmente, che gli allungamenti $ED = l$ s'erbino sempre la ragione delle potenze DI . Ora giacch  ci   riuscito nell'Annotazione allo Schediasma XXIII. di scoprire le vere relazioni fra le distensioni $ED = l$, e le forze, che direttamente le generano; abbiamo presa risoluzione di maneggiare la cosa con maggior generalit , non ritenendo, salvo che la prima fra le tre supposizioni del Conte Jacopo.

Trovare la proporzione fra le saette, e le forze applicate a squadra alla metà delle corde appoggiate a due scannelli, e raccomandate a due chiodi immobili.

II. Al punto di mezzo C della corda $AB = 2L$ raccomandata a due chiodi immobili A, B, e tesa da una forza equivalente al peso dato P s'applichi con direzione normale ad AB la forza $DI = f$ la quale produca la saetta $CD = s$; si cerca la relazione fra la forza f , e la saetta s .

Tolta in prestanza la preparazione dal nostro Autore, riflettiamo, che la semicorda $BD = BE + ED = L + l$ è tesa nella positura ADB da una forza, o peso $DI = P + p$ maggiore di quello eguale a P, che la stirava nella situazione ACB, per la quantità accresciuta p , da cui, conforme a ciò che abbiamo spiegato nella citata Annotazione, è stato prodotto l'allungamento ED. Chiamisi b la rigidità naturale della corda nel sito ACB, e la mentovata Annotazione c'insegna

effere $\frac{1}{2} \frac{b+P}{L} \cdot \frac{L+l}{L} = \frac{1}{2} \frac{bL}{L+l} = P + p$ (1). La similitudine dei tri-

angoli BDC, IDG suggerisce l'analogia $DG : DI :: DC : BD$;
 $\frac{1}{2} f : P + p :: s : L + l$

da cui deducesi l'equazione $\frac{P+p}{L+l} \cdot s = \frac{1}{2} f$. (2). Finalmente il trian-

golo rettangolo BCD ci somministra la formola

$$BD = \sqrt{\frac{BC^2 + CD^2}{L+l}} = \sqrt{\frac{L^2 + s^2}{L+l}} \quad (3)$$

Nella equazione (2) in cambio di $P + p$ si sostituiscia il suo valore preso dalla equazione (1), e si avrà, adempiuti i necessarij calcoli,

$$\frac{b+2P}{L} \cdot \frac{s}{L+l} = f. \text{ In vece di } L+l \text{ pongasi il suo valore}$$

contenuto nella equazione (3), e si scoprirà

$b +$

$$\frac{b+2 P \cdot S}{L} - \frac{bLS}{L^2+S^2} = \frac{2PS}{L} + \frac{bS^2}{L^2+LS^2} = f \text{ (4), formola, che esprime}$$

la relazione cercata fra le faette S , e le forze f , che le producono.

III. Per maggiormente confermare la verità della nostra formola poniamola al cimento dell'esperienza. Da essa formola si deduce quest'

$$\text{altra } b = \frac{L^2 f + L^2 S^2 - 2PL^2 S - 2PS^2}{S^2} \text{ (5); Ora perchè qualunque}$$

benchè menomo sbaglio, che si commetta nel misurare la faetta S ; porta grandissimo divario nel valore della naturale rigidità b della corda ACB tesa dalla forza equivalente al peso P ; fa d'uopo rettificare il valore della faetta S prodotta dalla forza f , paragonando assieme i suoni delle due semicorde CB, DB. Il suono, o numero n di vibrazioni, che fa la corda CB per esempio in un secondo, s'eguaglia all'unità divisa per il tempo t , durata d'una d'esse vibrazioni espressa in parti di secondo, onde abbiassi l'equazione $n = \frac{1}{t}$. Ma nelle cor-

de fisiche di massa m , che si vibrano di traverso;

$$f = \frac{\sqrt{Lm}}{\sqrt{P \cdot \frac{36}{24} \frac{17}{113}}} \cdot \frac{113}{355}, \text{ dinotando le quantità } \frac{36}{24} \frac{17}{113} \text{ la lunghezza}$$

d'un pendolo a secondi, e $\frac{113}{355}$ la proporzione del diametro al circolo;

$$\text{dunque } n = \frac{\sqrt{P \cdot \frac{36}{24} \frac{17}{113} \cdot \frac{355}{113}}}{\sqrt{Lm}}. \text{ Ed essendo che relativamente a qua-}$$

lunque corda le grandezze $\frac{36}{24} \frac{17}{113}$, $\frac{355}{113}$ sono sempre costanti; ne se-

gue che generalmente il suono n come $\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{Lm}}$. Se il peso, o forza ten-

dente P si mantiene costante, e la massa m della corda sta come la lun-

ghez-

ghezza L , ciò che interviene in corde, che non differiscono, salvo che nella lunghezza, allora si trova n come $\frac{1}{L}$, o sia il suono in ragione

inversa della lunghezza della corda. Se la massa m non si diversifica, ciò che succede nelle semicorde CB , DB , in tal caso si scopre n co-

me $\frac{\sqrt{P}}{\sqrt{L}}$, cioè in ragione composta, diretta dimezzata della forza ten-

dente P , ed inversa parimente dimezzata della lunghezza L . Abbiamo notate queste due circostanze; perchè verranno a festa nelle nostre esperienze.

IV. Si determinerà la proporzione fra i suoni n , N delle corde CB , BD col seguente metodo. Si prenda una corda acb (Fig. 98.) unisona alla ACB , si sottoponga ad essa uno scannello d in sito tale, che le corde db , DB si corrispondano all'unifono, e ne seguirà, che i suoni n , N staranno fra loro in ragione inversa di $cbadb$, onde si verifichi l'analogia $n : N :: db : cb$.

La dimostrazione è semplicissima. I suoni delle due corde cb , db tefe dallo stesso peso, e che non differiscono, salvo che in lunghezza, serbano la ragione inversa delle lunghezze cb , db , ch'è quanto dire si corrispondono nella proporzione $db : cb$: ma le corde cb , db sono unifone alle corrispondenti CB , DB ; dunque i suoni n , N di queste ultime stanno come $db : cb$; il che ec.

V. Insegnata la maniera di scoprire la proporzione fra i suoni n , N , c'innoltriamo ad indagare, come per le spezie n , N , e per le altre quantità date si possa esprimere il valore della faetta $CD = s$. Effendo pari la massa delle corde CB , BD , le lunghezze come $L : L + l$, i pesi tendenti come $P : P + p$, avremo per le cose dette nel numero

$$\text{III } n : N :: \frac{\sqrt{P}}{\sqrt{L}} : \frac{\sqrt{P+p}}{\sqrt{L+l}}, \text{ o sia } n^2 : N^2 :: \frac{P}{L} : \frac{P+p}{L+l} \text{ ma con-}$$

forme si è fatto vedere superiormente (num.II.), $\frac{P+p}{L+l} = \frac{1}{2} \frac{f}{s}$; dunque

sostituito questo valore in cambio di $\frac{P+p}{L+l}$ nella sovrapposta analogia, si

avrà $n^2 : N^2 :: \frac{P}{L} : \frac{1}{\frac{2}{S}} f$, e conseguentemente l'equazione $\frac{n^2}{N^2} \cdot \frac{fL}{2P} = S$ (6)

VI. Al punto medio C della corda d'ottone AB situata orizzontalmente, la cui semilunghezza $CB = 30$ mezz'oncie, e la forza tendente P equivalente ad oncie 140., attecchammo il peso, o forza $DH = f = 4$, la quale produsse la faetta $CD = s$, che con diligente misura trovammo eguale a $\frac{3}{7}$. I suoni n , N delle semicorde CB , DB ,

usato il metodo esposto al numero IV. li ritrovammo corrispondersi nella ragione 119. 120. Quindi si verificava $n^2 : N^2 ::$

$\frac{119^2}{120^2} : \frac{120^2}{120^2}$, o sia prossimamente $118 : 120 :: 59 : 60$, e passando all'equazione, $\frac{n^2}{N^2} = \frac{59}{60}$. Sostituiti nella formula del numero preceden-

te $\frac{n^2}{N^2} \cdot \frac{fL}{2P} = S$ in vece di $\frac{n^2}{N^2}$, di f , di L , e di $2P$ i valori sommi-

nistratici dalla esperienza, avremo $S = \frac{59 \cdot 4 \cdot 30}{60 \cdot 2 \cdot 140} = \frac{59}{140} = \frac{3}{7} - \frac{1}{140}$

La frazione $\frac{1}{140}$, per cui la faetta rettificata differisce da quella, che

s'è scoperta colla misura, sfugge la più scrupolosa diligenza da chi esperimenta, consistendo in $\frac{1}{24}$ di linea. Fatto uso del valore purificato

della faetta $CD = S = \frac{59}{140}$ nella formula (5), si troverà dopo i ne-

cessarij computi $b =$ ad oncie 24054 $=$ a libbre 2004 $\frac{1}{2}$, valore della

rigidità naturale della corda ACB corrispondente al peso, o forza tendente $P =$ ad oncie 140.

VII. Applicammo al punto medio C della corda ACB la forza $f = 15 \frac{3}{4} = \frac{78}{4}$, la quale cagionò la faetta $CD = s$, che

accu-

accuratamente misurata si trovò eguale a $\frac{7}{5}$. I suoni n; N delle due

femicorde CB, DB serbavano la proporzione 11:12. Se per mezzo della relazione de' suoni cercheremo il valore della facetta, scopriremo $CD = S = \frac{1573}{1120} = \frac{7}{5} + \frac{1}{224}$. La differenza $\frac{1}{224}$ si sottragge alla at-

tenzione de' più circospetti osservatori. Sostituiscasi nella formola (5) in cambio di b il valore determinato nel numero superiore, ed in vece di L, f, P le grandezze 30, $\frac{78}{5}$, 140 a norma della presente espe-

rienza, e poste in opera le regole per sciogliere le equazioni cubiche, si si presenterà $S = \frac{211}{150} = \frac{7}{5} + \frac{1}{150}$. La $\frac{1}{150}$ parte di mezz'on-

cia consiste in $\frac{1}{26}$ di linea, divario totalmente inosservabile. Molto mi-

minore si è la differenza fra i due valori

$\frac{211}{150} = \frac{7}{5} + \frac{1}{150}$, $\frac{1573}{1120} = \frac{7}{5} + \frac{1}{224}$, il primo somministraci dalla

nostra equazione, ed il secondo ricavato dalla proporzione fra i suoni delle due femicorde CB, DB. Chi volesse schivare l'imbroglione di decipherare la sovrapposta equazione (5) cubica, tenga un metodo inverso, e supposta $S = \frac{211}{150}$, cerchi il valore della rigidità b , che troverà e-

guale ad oncie 24013, e pochissimo differente dall'altro determinato nel numero precedente eguale ad oncie 24014. La cagione di questa diversità dipende da qualche piccola adeguazione usata nello stabilire la grandezza della facetta $S = \frac{211}{150}$.

VIII. Quanto inosservabile è la differenza fra la facetta scoperta colla misura, e quella, che abbiamo ricavata dalla nostra equazione, altrettanto riesce menomissima l'alterazione, che la facetta $S = \frac{211}{150}$ in-

tro-

troduce nella proporzione dei suoni $n : N$, che s'è rinvenuta come $\frac{505}{11}$.

12. Giacchè nel numero (V) abbiamo dimostrato essere $\frac{n^2}{N^2} \cdot \frac{fL}{2P} = S$,

avremo per conseguenza $\frac{n^2}{N^2} = \frac{2PS}{fL}$, e fatti $P = 140$, $S = \frac{211}{150}$, &

$= \frac{78}{5}$, $L = 30$, si troverà $\frac{n^2}{N^2} = \frac{1477}{1755}$. La differenza fra le ragio-

ni $\frac{1477}{1755}$, $\frac{121}{144}$ somministrategli, quella dalla nostra formola, e questa

dalla osservazione, consiste nella frazione $\frac{212688}{212355}$, che prossimamente

equivale alle seguente $\frac{639}{638}$. Se dunque fra le proporzioni dei quadrati

dei suoni n^2 , N^2 o ricavate dalla formola, o scoperte colla esperienza c'è il divario $\frac{639}{638}$; fra le ragioni dei suoni n , N passerà la differenza

renza $\frac{638}{638} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1277}{1276}$, la quale, adempiuti i dovuti calcoli, si trova

equivalere alla decimasesta parte d'un coma, minuzia, di cui l'orecchio non se ne accorge.

IX. Si conchiuda, che l'esperienza conferma la verità della nostra teorica, andando esse d'accordo con quella maggiore fisica adeguazione, che in così fatte indagini può mai sperarsi. Notiamo per altro, che se alla metà della corda AB si applicassero forze notabilmente maggiori della adoperata nell'esperimento secondo, ne risulterebbero faette alquanto più piccole di quello richiede il nostro canone, perchè in esso s'è trascurata la resistenza, che patisce la corda ripiegandosi nei siti A, D, B.

X. Affine d'internarci più a fondo nel magistero della Natura; la quale ha collocato le fibre in maniera, che ricevano di traverso le impressioni degli obbietti esterni, daremo prima la costruzione della for-

mola (4) $\frac{2P + b \cdot S}{L} = \frac{bLS}{L^2 + S^2} = \frac{2PS}{L} + \frac{bS^2}{L^2 + S^2} = f$, e fatte le do-

vute considerazioni sopra la relazione fra le fiette S , e le forze f , che le producono, indagheremo quali conseguenze derivino dalla varia modificazione delle costanti P , b , L , che contrassegnano la tensione, la rigidità, e la lunghezza della fibra AB , mentre si trova in linea retta. C inoltreremo poscia ad esaminare con simil metodo la proporzione fra le forze f , e le aumentazioni di tensione p da esse cagionate nella fibra AB .

XI. Segnate a squadra (Fig. 100.) le linee $CF = L$, $FK = 2P + b$, per i punti C , K si tiri la linea CK , che si continui indefinitamente, ed a questa facciasi perpendicolare KT , che taglia la linea CF prodotta nel punto T . Col vertice C , parametro CT , e colla condizione che le coordinate formino l'angolo CKF , descrivasi la parabola Apolloniana CQV . Si segni arbitrariamente l'assissa CG , e condotta l'ordinata GQ , che si continui in D , si delinei $CB = L$ parallela a DG , e congiungansi con una linea i due punti B , Q . Si tagli $PA = 2P$, onde resti $AK = b$, e si tiri AX normale KT . Determinata $CR = KX$, e descritta RZ parallela a BQ , facciasi $HG = CZ$, ed il punto H apparterrà alla curva CHE , che si vuol descrivere, le cui assisse $CD = S$, e le ordinate $DH = f$. Per il punto B si meni BP parallela a CK , e si continui DG fino in P .

Per la proprietà della parabola CQU si verifica l'equazione $\frac{\overline{CG}^2}{CT}$

$= GQ$. La somiglianza dei triangoli CDG , CFK , CKT ci somministra le analogie $CD : CF :: CG : CK$, $CD : CK :: CG : CT$. Dalla prima ricaviamo essere $CD : CK :: CD^2 : CF \cdot CG$, e quindi

la seconda prende il seguente aspetto $\overline{CD}^2 : CF \cdot CG :: CG : CT$,

e ci dà l'equazione $\frac{\overline{CD}^2}{CF} = \frac{\overline{CD}^2}{CT}$. Avremo dunque $GQ = \frac{\overline{CD}^2}{CF} = \frac{S^2}{L}$

Aggiunta $GP = L$, si forma $PQ = L + \frac{S^2}{L} = \frac{L^2 + S^2}{L}$. I triangoli

simili QPB , RCZ suggeriscono l'analogismo

$PQ : PB = GG : RC = KX : CZ$, da cui deducesi l'equazione $\frac{CZ = CG \cdot KX}{PQ}$. Ma stante la similitudine dei triangoli CDG , KXA ,

abbiamo $CD : CG :: KX : AK$, e conseguentemente $CG \cdot KX = CD \cdot AK$; dunque $CZ = HG = \frac{CD \cdot AK}{PQ}$, o sia analiticamente $CZ =$

HG

307
 $HG = \frac{bLS}{L^2 + S^2}$. Finalmentè l'analogia, che ci viene additata dai tri,

$$\text{angoli simili } CDG, CFK, \text{ cioè a dire } CF : FK :: CD : DG, \\ L : 2P + b :: S : \frac{2P + b \cdot S}{L}$$

determina il valore di $DG = \frac{2P + b \cdot S}{L}$. Avremo pertanto $DH =$

$$DG - HG = \frac{2P + b \cdot S}{L} - \frac{bLS}{L^2 + S^2} : \text{ma } \frac{2P + b \cdot S}{L} - \frac{bLS}{L^2 + S^2} =$$

f ; dunque posta $CD = S$, farà la corrispondente ordinata $DH = f$; il che ec.

XII. La nostra curva è fornita d'un altro ramo simile al CHE, nel quale tanto le faette S , quanto le forze f sono negative. Questo ramo serve per le faette Cd (Fig. 94) della corda AB . La linea $HG =$

$$\frac{bLS}{L^2 + S^2} \text{ (Fig. 100.) ha un massimo valore } KE = \frac{1}{2} b \text{ corrispondente}$$

a $CD = S = CF = L$. In tale incontro la linea BQ tocca la parabola CQU nel punto U , e l'angolo CBQ , come altresì l'eguale CRZ ascende al massimo, e massima conseguentemente diviene la grandezza di $CZ = HG$.

$$\text{Conciosiachè } DH = f = \frac{2P + b \cdot S}{L} - \frac{bLS}{L^2 + S^2} = \frac{2PS}{L} + \frac{bS^2}{L^2 + LS^2}$$

$$\text{e } DY = \frac{2PS}{L}, \text{ formola nascente dall'analogia } CF : CD :: FA : DY, \\ L : S :: 2P : \frac{2PS}{L}$$

ne risulta $YH = \frac{bS^2}{L^2 + LS^2}$; valore della intercetta fra l'inclinata CA ,

e la curva CHE .

$$\text{Quando le faette } S \text{ sono minime, l'intercetta } YH = \frac{bS^2}{L^2 + S^2} \text{ scos}$$

presì infinitesima del terzo grado, ed incomparabile con $DY = \frac{2PS}{L}$

infinitesima del primo grado. Cancellato adunque il termine relativamente nullo, ci si presenta $DH = DY = f = \frac{2PS}{L}$, ed in questo ca-

so le faette sono come le forze, verificandosi la proporzione $L : 2P :: S : f$. Non trascuriamo di avvertire, che la linea CA tocca la curva CHE nel punto C.

Se le faette divenissero infinite, ipotesi per altro, che non è fisica, trascurato il termine infinitamente piccolo $\frac{bLS}{L^2 + S^2} = HG$, si trovereb-

be $DH = DG = \frac{2P + b \cdot S}{L} = f$, espressione, da cui dedurrebbesi

l'analogia $L : 2P + b \cdot S :: S : f$, la quale c' insegnerebbe, che anche in tal circostanza le faette serberebbero la ragione delle forze. Egli è facile da scoprire, che la linea CK serve di asintoto alla curva CHEb, la quale giace tutta dentro l'angolo KCA.

XIII. Nei casi intermezzi, mentre cioè le faette sono finite, meno crescono, o scemano le faette di quello crescano, o scemino le forze, che le producono, dovendosi per gradi passare dalla ragione $L : 2P$ alla più rimota $L : 2P + b$.

Per ciò dimostrare rigorosamente, sia $CD = S$, e conseguentemente $DH = f = \frac{2PS}{L} + \frac{bS^2}{L^2 + LS^2}$, Si segni $Cd = nS$, vale a dire in

qualunque proporzione con CD , e si avrà $db = F = \frac{2PnS}{L} + \frac{bn^2S^2}{L^2 + Ln^2S^2}$. Se le forze serbassero la ragione delle faette dovrebb-

be essere $nf = \frac{2PnS}{L} + \frac{bn^2S^2}{L^2 + LS^2} = F = \frac{2PnS}{L} + \frac{bn^2S^2}{L^2 + Ln^2S^2}$. Ora diciamo;

che posto $n > 1$, e per conseguenza $nS > S$, è parimente $F > nf$; e posto $nS < S$, è parimente $F < nf$, laonde meno crescono, o scemano le faette di quello crescano, o scemino le forze, che le producono. Cominciamo dal provare, che ad $n > 1$ corrisponde F

$= \frac{2PnS}{L} + \frac{bn^2S^2}{L^2 + Ln^2S^2} > nf = \frac{2PnS}{L} + \frac{bn^2S^2}{L^2 + LS^2}$. Se così è, tolto di

mez-

mezzo il termine comune $\frac{2PnS}{L}$, resterà $\frac{bn^2S^2}{L^2+Ln^2S^2} > \frac{bnS^2}{L^2+LS^2}$, e divi-

dendo per $\frac{bnS^2}{L}$, $\frac{n^2}{L^2+Ln^2S^2} > \frac{1}{L^2+S^2}$. Moltiplichiamo ambi i membri

per $L^2+n^2S^2$, L^2+S^2 , e ci si presenta $n^2L^2+n^2S^2 > L^2+n^2S^2$; e sottratta la quantità comune n^2S^2 , $n^2L^2 > L^2$, o $n > 1$, conseguenza vera, e conforme all'ipotesi stabilita. Se si supporrà $n < 1$, ne seguirà essere $n^2L^2 < L^2$, ed indi tornando indietro per la strada ora calcata, si scoprirà $F = \frac{2PnS}{L} + \frac{bn^2S^2}{L^2+Ln^2S^2} < nf = \frac{2PnS}{L} + \frac{bnS^2}{L^2+LS^2}$

XIV. Egli è per tanto manifesto, che stando dentro i limiti delle quantità finite, meno crescono, o scemano le faette, di quello crescano, o scemino le forze, che le producono: verità, che ottimamente si accorda colla esperienza. In fatti c'insegna l'esperimento sopra riferito al numero VI, che applicata al punto medio d'una corda, la cui semilunghezza $L=30$, la forza $f=4$, produsse questa una faetta, che con diligente misura si trovò eguale a $\frac{3}{7}$. Col mezzo della proporzione fra

i suoni della corda, mentre dimora in linea retta, e mentre sta in equilibrio colla forza f , la stessa faetta si scoprì eguale a

$\frac{59}{140} = \frac{3}{7} - \frac{1}{140}$, e questo valore s'è stabilito fisicamente giusto. Se

le faette crescessero in proporzione delle forze, si determinerebbe la faetta S generata dalla forza $F = \frac{78}{5}$ colla seguente analogia

$4 : \frac{59}{140} :: \frac{78}{5} : S = \frac{1301}{1400} = 8 + \frac{61}{280}$. Ricorrendo all'esperimento

descritto al numero VII. osserviamo, che la forza $\frac{78}{5}$ cagionò una fa-

etta, che o sia eguale a $\frac{7}{5}$, come si rinvenne colla misura, o a

$\frac{7}{5} + \frac{1}{224}$, come si trovò col mezzo della proporzione dei suoni, è

sempre notabilmente minore di $8 + \frac{61}{280}$. Con ragione adunque ab-

biamo poco fa asserito uniformarsi colla esperienza la legge, che non oltre passando i termini delle grandezze finite, meno crescono, o scemano le saette di quello crescano, o scemino le forze, onde vengono generate.

XV. Innoltriamoci alle conseguenze fisiche, e notiamo, che mentre le forze sono minime anche fisicamente, producono saette a se stesse proporzionali, e mantenendosi, come in progresso vedremo, adeguatamente costante la naturale tensione della fibra, fa questa le sue vibrazioni più, e meno estese nel tempo stesso, le quali risvegliano nell'anima sensazioni più, o meno forti, ma tutte aggradevoli. Che se la forza si aumenta soverchiamente, allora la fibra troppo si tira, e corre rischio di patir danno. Ad un tale inconveniente mette in parte riparo la legge, che mentre le forze non sono minime, più crescano le forze delle saette. La forza f generi la saetta S . Sia 2 . S quella saetta, che comincia a danneggiare l'organo, e conforme che ci vuole una forza maggiore di $2f$ per produrre la saetta $2S$, ne segue, che la forza xf si dee contare nel numero di quelle, che non molestano la fibra.

XVI. Consideriamo presentemente le alterazioni, che cagiona nelle saette S la varia grandezza della rigidità b . Presa nuovamente per mano la formola $\frac{2PS}{L} + \frac{bS^2}{L^2 + LS^2} = f$, riflettasi, che posta la saetta S infinitesi-

ma, e stando la rigidità b dentro i termini del finito, la linea $YH =$

$\frac{bS^2}{L^2 + LS^2}$ è incomparabile colla linea $DY = \frac{2PS}{L}$. Quindi in tale ipotesi,

qualunque sia il valore finito della rigidità b , la forza $f = DH = DY$ produrrà sempre la saetta costante $S = CD$.

Si fingano infinite le saette S , e allora si troverà $DH = DG = f$

$= \frac{2P + b}{L} \cdot S$: formola, da cui si ricava, che nella detta circonstanza

più cresce, o cala la rigidità b , di quello che all'incontro calino, o crescano le saette S generate dalla forza invariabile f . Ciò tanto maggiormente si verifica, mentre si tratti di saette finite.

Che

Che se queste si assumano minime fisicamente, quali sono, relativamente alla lunghezza delle fibre, le faette in esse operate dalle forze non nocive degli oggetti esterni; si cavi la conseguenza, che per diversificare notabilmente le faette prodotte da una forza data, bisogna, che le rigidità stieno fra loro in una proporzione molto lontana. L'esperienza c'insegna, che le sensazioni d'un uomo adulto sono più vive di quelle d'un vecchio, e meno vive di quelle d'un giovane. S'infersca adunque, che gran diversità ci ha da essere fra le rigidità delle fibre d'un adulto, d'un vecchio, e di un giovane, e si ammiri l'artificio dell'Autore della Natura, che ciò non ostante le sensazioni per una parte non isvaniscano, e per l'altra non divengano moleste. Merita d'essere distintamente avvertita la bellissima proprietà, che i discapiti dell'organo superano di gran lunga quei delle sensazioni.

XVII. Sia S la minima faetta, sino a cui faccia d'uopo incurvare una fibra di data massa, tensione, e lunghezza, perchè vibrandosi risvegli nell'anima una distinta sensazione. La forza f operi questa faetta nella fibra d'un uomo adulto, la cui rigidità b . Per produrre la stessa faetta nella fibra d'un uomo vecchio fornita di maggiore rigidità H , ci vorrà una forza più grande F . Quindi la forza primiera f genererà nella fibra del vecchio una faetta minore di S , a cui non corrisponderà sensazione distinta. In fatti osserviamo, che per farci intender dai vecchi bisogna alzare la voce, e che a quel lume fiacco, a cui legge un adulto, non legge un vecchio. Per la stessa ragione un lume ancora più tenue basterà a un giovane, e non ad un uomo adulto.

Ma questo vantaggio, che le fibre d'un giovane sieno più pieghevole di quelle d'un adulto, viene compensato dal maggior pericolo, che dalla troppa azione delle forze esterne restino danneggiate. Supponga S la massima faetta, che non porta pregiudizio a una fibra. Venga questa prodotta dalla forza f nella fibra d'un adulto, la cui rigidità b . Egli è chiaro, che la stessa forza, innocente in riguardo all'adulto, reccherà nocimento alla fibra più molle dell'uomo giovane, cagionando in essa una faetta maggiore di S , che si suppone la massima fra quelle, che all'organo non son nocive. Anno sperimentato in Bologna, che l'empito della materia elettrica, che per lo più non apporta danno agli uomini di età consistente, riesce ai giovanetti sommamente pregiudiziale.

Le fibre degli uomini sani, ed adulti sono nell'ottimo stato di perfezione. Le ha il Sapientissimo Iddio dotate di quella rigidità conveniente, onde faccia in loro una impressione sensibile, ma non nociva, la forza ordinaria di quegli oggetti esterni, con cui siamo in commercio, e dei quali importa alla nostra conservazione, ed al nostro ben essere, che ci accorgiamo. Prima di giugnere alla virilità, le fibre non sono ancora quanto basta robuste, per resistere a certe forze più vigorose. Quando poi c'incamminiamo dalla virilità alla vecchiezza, il mondo sensibile (per valerci d'una espressione, con cui da fine il nostro

Au-

Autore alla sua dissertazione) si va per noi successivamente, ed insensibilmente perdendo.

XVIII. Agli ammalati danno fastidio quegli oggetti, che in tempo di sanità riuscivano loro gratissimi. Nelle stanze degl' infermi bisogna chiudere le finestre, parlar sottovoce, perchè la forza anche moderata della luce, e del suono gli offende. Questi effetti crediamo, che poco, o nulla dipendendo dalla rigidità, che nelle fibre degli uomini infermi si scemi, traggano principalmente l'origine dal minoramento della forza de' muscoli, che pongono in tensione le fibre, la quale forza da noi s'esprime per la lettera P. Disponiamoci adunque a far vedere a chi legge, quanto influisca nelle sensazioni l'alterazione di un sì fatto elemento.

XIX. Supposta nulla la forza P, che tira la fibra, mentre si trova in linea retta, svanisce nella Fig. 100. la linea $FA = 2P$, e la linea CA cade sopra la CF. Perciò in tale ipotesi avremo $YH = f = \frac{bS^2}{L^2 + LS^2}$;

e mentre S sia minima relativamente ad L, $YH = f = \frac{bS^2}{L^2}$, conforme

ha trovato il Conte Jacopo nel suo Schediasma.

Più conseguenze si posson dedurre dalla premessa formola, e primieramente per cagionare eguali faette in fibre di pari lunghezza, ci vorrebbero forze proporzionali alle rigidità. Che se la forza esteriore fosse costante, le faette starebbero inversamente come le radici cubiche delle rigidità. Quindi si scopre, quanto giovi alla buona economia delle sensazioni, che le fibre sien poste in tensione, avendo non ha molto osservato, che la diversa misura della rigidità altera pochissimo le piccole faette, che dalle fibre tese nell'oscillare si scorrono.

Serbando le forze la ragione dei cubi delle faette, non si compierebbero in pari tempo le vibrazioni più, o meno dilatate della stessa fibra; imperciocchè richiede necessariamente l'isocronismo, che le forze stieno come le faette, o come gli spazj da passarsi.

Finalmente le fibre non istirate riuscirebbero inettissime per oscillare, perchè in una vibrazione c'impiegherebbero un tempo infinito. Fingasi tutta raccolta nel punto D la massa della corda ADB (fig. 99.) ciò che non turba l'essenziale delle deduzioni. La scala delle forze sollecitanti riferite alle faette, o sia agli spazj da percorrersi sarebbe la parabola cubica CnN corrispondente all'equazione $\frac{L^2}{b} \cdot f = S^2$, le cui

ordinate DN, dn esprimono le forze, e le assisse DC, dc le faette. Sanno i Geometri, che la forza viva acquistata dalla corda AB, quando è ritornata nella positura ACB s'eguaglia all'area $CDNnC$, la quale è

le è proporzionale a $\overline{DC}^4$, ch'è quanto a dire ad una flussione infinitesima del quarto grado. Essendo finita la massa della corda concentrata in D, ne segue, che il quadrato della velocità nel sito C deve ascriversi al quarto ordine delle quantità minime, e che per conseguenza la detta velocità spetta al secondo grado degli infinitamente piccioli. Ora con una velocità, che al più giunge ad essere infinitesima dell'ordine secondo, non si può passare lo spazio DC minimo del primo grado, salvo che in tempo infinito. Se alle faette infinitesime si sostituiranno le fisicamente minime, agevolmente ci accorgeremo, che rimossa dalla linea retta ACB una fibra priva di tensione, si fermerebbe senza restituirsi nella situazione ADB.

XX. Abbandonata un'ipotesi non accettata dalla Natura, consideriamo variabile sì, ma sempre finita la forza tendente P. Mentre le faette sien minime, la formola $\frac{2PS}{L} = f$ m'insegna, che prese come

costanti la forza estrinseca f , e la lunghezza L della fibra, le faette S stanno reciprocamente come le forze tendenti P.

Supponendo infinite le faette, si verifica l'equazione $\frac{2P + b}{L} \cdot S$

$= f$, da cui possiam ricavare, che essendo date le quantità b , f , L; le faette S abbracciano la ragione inversa della somma della doppia forza tendente P, e della rigidità b . In tale circostanza meno crescono, o calano le faette, di quello che all'incontro calino, o crescano le forze tendenti. Le faette frattanto, per cui si ripiegano le fibre, s'accostano molto più al minimo, che all'infinito, e perciò quasi colla stessa proporzione, onde si minorano, o s'aumentano le tensioni, tutto al rovescio s'aumentano, o si minorano le faette. Quindi s'ondeveramente abbiamo asserito al numero XVIII, che quel fastidio, che recano agli ammalati certi oggetti loro aggradevoli in tempo di sanità, dipende principalmente dal decremento della forza tendente.

Se la tensione s'ingrandisce smoderatamente (messo da parte il danno, che potrebbe patir la fibra) l'impressione della forza f scemerebbe talmente, che o sievolissima, o nulle si risveglierebbero le sensazioni nell'anima.

Non trascuriamo d'avvertire, che se alquanto meno crescono, o calano le faette, di quello che al contrario calano, o crescono le tensioni, egli è tutto frutto della rigidità delle fibre, tolta di mezzo la quale, svanirebbe nell'equazione $\frac{2PS}{L} + \frac{bS}{L + kS} = f$ il termine $\frac{bS}{L + kS}$,

e le faette seguirebbero esattamente la proporzione reciproca delle forze tendenti.

XXI. I tempi delle vibrazioni di due corde egualmente lunghe, e di pari massa stanno inversamente come le radici delle forze tendenti. A norma di ciò se decreterà notabilmente la tensione delle fibre, oscilleranno queste più lentamente. Da un tale principio pensiamo, che proceda quella languidezza, che si osserva negli occhi de' moribondi.

XXII. Se le fibre sien simili, tese da forze proporzionali alle loro basi, composte di materia egualmente rigida, e fornite di massa proporzionale a quella degli organi, a cui devono partecipare il moto; l'elemento della varia lunghezza nulla influisce nella vivacità delle sensazioni. Le masse delle nostre fibre si corrispondono nella proporzione dei quadrati. Ed essendo che le tensioni P , e le rigidità b stanno come le basi; ne segue, che da loro la ragione dei quadrati L^2 delle lunghezze viene abbracciata. Nella stessa proporzione si riferiscono pure le forze esterne; stante che a misura delle superficie ricevono le fibre l'impressione degli oggetti, conforme al numero VI. riflette ottimamente l'Autore.

Ciò premesso diciamo, che le faette serbano la ragione delle lunghezze. In grazia della semplicità ci serviamo d'una dimostrazione indiretta. Sia adunque $S = nL$, cioè le faette come le lunghezze, e sostituito questo valore nella formola $\frac{2PS}{L} + \frac{bS^2}{L^2 + LS^2} = f$, troveremo $2n$.

$$P + \frac{n^2}{1+n^2} \cdot b = f. \text{ Ma i coefficienti } 2n, \frac{n^2}{1+n^2} \text{ sono quantità costanti,}$$

e tanto le tensioni P , quanto le rigidità b stanno come L^2 ; dunque f come L^2 : conseguenza, che va d'accordo col vero.

Si potrebbe agevolmente provare, che i tempi delle vibrazioni delle nostre fibre, anche per faette, che non sien minime, accettano la ragione delle lunghezze d'esse fibre, e si caverebbe poscia la conseguenza, ch'essendo i tempi proporzionali agli spazj, che si scorrono, e crescendo, o calando le velocità con pari legge, si trovano queste eguali in siti analoghi, di modo che le forze vive acquistate dalle fibre seguiranno la proporzione delle loro masse. Ora dovendosi comunicare il moto ad organi, la cui massa è proporzionale a quella delle fibre, acquisteranno essi pari velocità, alle quali, corrisponderanno sensazioni egualmente spiritose.

XXIII. Se le stabilite misure delle forze tiranti, e della rigidità si suppongono variate, vagliono le stesse conseguenze per noi dedotte, mentre abbiamo trattato delle fibre di eguale massa, e lunghezza, ma diversamente rigide, e diversamente tese. Fatta la riflessione, che la materia componente le fibre dei fanciulli è più molle di quella, onde consta.

stano le fibre degli adulti, si conchiuderà, che le sensazioni dei primi sono più vive di quelle dei secondi. 315

XXIV. Ne risulterebbero sensazioni diversamente vivaci, quando le masse delle fibre simili, rigide, e tese proporzionatamente, non si corrispondessero come le masse degli organi, a cui deve passare il tremoto. Le fibre di maggiore, o di minor massa relativa sveglierebbero più, o meno brillanti le sensazioni.

XXV. Resta, che si dica qualche cosa delle fibre dissimili. Considerando la dissomiglianza nelle basi o troppo grandi, o troppo piccole, le quali anno parte nella determinazione della rigidità, egli è facile lo stabilire la proporzione delle forze estrinseche, e delle saette. Bisognerebbe poscia computare le forze vive guadagnate dalle fibre, e paragonarle colle masse degli organi, ai quali devono partecipare il moto, per dedurre la relazione fra l'energia delle sensazioni. Frattanto ci contenteremo di notare col Conte Jacopo, che in quella guisa, che negli uomini di rado si trovano due volti affatto simili, si dee credere, che per lo più le loro fibre sieno di differente struttura, e che ognuno abbia al pari della fisonomia le sue particolari sensazioni.

XXVI. Esaminata quanto basta la proporzione fra le forze f , e le saette S , ci accingiamo a confrontare colle stesse forze gli accrescimenti di tensione p , ch'esse producono nelle fibre. Gioverà questo paragone per indagare la fatica, che soffre l'organo, la quale sta in ragione composta, diretta delle aumentazioni di tensione p , ed inversa della forza P dei muscoli tiranti le fibre, cioè a dire come $\frac{p}{P}$.

Trovare la relazione tra le forze applicate a squadra al punto medio d'una fibra, e gli accrescimenti di tensione, ch'esse nella detta fibra cagionano.

Ripetuta la curva $CHEb$ (Fig. 101.), le cui assisse $CD = S$, e le ordinate $DH = f$; tiriamo a squadra di CD , e parallela a DH la linea $CB = L$. Condotta poscia la diagonale BD , e segnata $CN = \frac{1}{2} DH = \frac{1}{2} f$, descriviamo NO parallela a DB . Nella HD prorogata tagliamo

$DI = NO$, e per il punto I , e per altri similmente determinati fare passare la curva MIi , diciamo, che l'ordinata DI esprime l'intera tensione $P + p$, che patisce la corda CB , dopo che la forza DH ha in essa operato la saetta CD ; e che per conseguenza, sottratta $DR = P$, e deli-

R 1 2

nea-

neata MR parallela a CD , il residuo RI s'eguaglia all'accrecimento di tensione p causato nella mentovata corda dalla forza DH .

Dai triangoli simili CDB , CNO si ricava l'analogia

$$CD : DB :: CN = \frac{1}{2} DH : NO = \frac{DI}{\frac{1}{2} f \cdot \frac{L+l}{S}}, \text{ che ci addita il valore}$$

$$S : L+l :: \frac{1}{2} f$$

di $DI = \frac{1}{2} f \cdot \frac{L+l}{S}$. Ma per l'equazione (2) contenuta nel numero II,

$$\frac{P+p}{L+l} \cdot S = \frac{1}{2} f, \text{ o sia } \frac{1}{2} f \cdot \frac{L+l}{S} = P+p; \text{ dunque } DI = P+p,$$

il che ec.

XXVII. Egli è chiaro in primo luogo, che quando s'eguagliano a nulla la forza DH , e la saetta CD , è nullo parimente l'accrecimento di tensione RI , e perciò la nostra curva passa per il punto M .

In grazia delle conseguenze stimiamo opportuno di porre sotto gli occhi di chi legge la formola, in cui non si contengono, salvo che le due incognite f , p . Nell'ultima equazione si collochi in cambio di S

il suo valore $\sqrt{2Ll+l^2}$, onde s'abbia $\frac{1}{2} f \cdot \frac{L+l}{\sqrt{2Ll+l^2}} = P+p$. Maneg-

$$\text{giata questa a dovere, si troverà } L+l = \frac{L \cdot P+p}{\sqrt{P+p - \frac{1}{2} f^2}} \quad (7).$$

Una tale espressione di $L+l$ si sostituisca nella formola

$$(1) \frac{1}{2} b + P \cdot \frac{L+l}{L} = \frac{1}{2} bL = P+p, \text{ della quale abbiamo fatto uso}$$

nel

$$\text{del numero II, e ne risulterà } \frac{\frac{1}{2}b + P}{P + p} \cdot \frac{P + p}{P + p} = \frac{\frac{1}{2}b \sqrt{\frac{P + p}{P + p - \frac{1}{4}f^2}}}{\frac{P + p}{P + p}}.$$

$$= P + p; \text{ ed adempiuti i necessarij calcoli, } \frac{P + b f^2}{8 \cdot P + p} =$$

$$\sqrt{\frac{P + p}{P + p - \frac{1}{4}f^2}} = \text{CO} \quad (3)$$

A buon conto si noti, che restando esclusa dalla formola la specie L, la varia lunghezza della fibra non ha per se stessa luogo nel determinare l'accrescimento di tensione p , il quale, essendo il retto pari, si scoprirà sempre costante, qualunque sia la lunghezza della fibra. Abbiamo detto per se stessa, perchè, conforme si è veduto nel num. XXII, la lunghezza delle fibre c'entra nello stabilire la misura della forza esteriore f .

Quando è minima la forza f , si trova

$$\sqrt{\frac{P + p}{P + p - \frac{1}{4}f^2}} = \frac{P + p}{P + p} = 1. \text{ Avremo pertanto}$$

$$\frac{P + b f^2}{8 \cdot P + p} = \frac{P + p - f^2}{8 \cdot P + p}, \text{ o sia } \frac{b + P + p}{8 \cdot P + p} \cdot f^2 = p, \text{ e cancellate}$$

è quantità relativamente nulle, $\frac{b + P}{8 \cdot P^2} \cdot f^2 = p$. Supponendosi data la

grandezza $\frac{b + P}{8 \cdot P^2}$, ne segue, che le aumentazioni di tensione p stanno

come i quadrati f^2 delle forze minime, onde vengono prodotte, e che conseguentemente appartengono al secondo ordine degli infinitamente piccoli.

Su-

Superiormente abbiamo avvertito essere la forza infinitesima

$$f = \frac{2PS}{L}, \text{ e quindi dedurremo } \frac{b+P}{8P^2} f^2 = \frac{b+P}{2L} S^2 = p. \text{ Imparia-}$$

mo da questa formula, che a $CD = S$ minima corrisponde $RI = p$ infinitesima del secondo grado, che la linea MR tocca la curva MH nel punto m , e che fa detta curva verrebbe combaciata nel nominato punto da una Parabola Apolloniana, il cui vertice m , ed il parametro $\frac{2L}{b+P}$,

Immaginiamoci infinita la forza f , e dalla sola considerazione della figura ricaveremo, che siccome in tal caso $CD = S$ eguaglia adeguatamente $DB = L + l$, non altrimenti $CN = NO$, ovvero analiticamente $\frac{1}{2}f = P + p$, e trascurata, se così piace, la quantità incomparabile

$P + \frac{1}{2}f = p$, cioè a dire gli accrescimenti di tensione p come le forze

infinitesime f , da cui sono cagionati. Il valore di $p = \frac{1}{2}f$ non resta in conto

alcuno alterato, dalla diversa misura della rigidità b , e della forza tendente P .

Nella supposizione, che abbiain per le mani, è $CO = \frac{1}{2}b + P$,

E vaglia il vero, giacchè per l'equazione (8) $CO = \frac{P + \frac{bf^2}{8 \cdot P + p}}{2} =$

$\sqrt{\frac{P + p}{2} - \frac{1}{4}f^2}$, ne risulta $\frac{1}{2}b + P = \frac{P + \frac{bf^2}{8 \cdot P + p}}{2}$, e conseguente-

mente $\frac{1}{2}f = P + p$. pongasi in vece di $P + p$ il suo valore $\frac{1}{2}f$ nella

formula $CO = \frac{P + \frac{bf^2}{8 \cdot P + p}}{2}$, e ne proverrà $CO = P + \frac{1}{2}b$, conforme

si dovea ritrovare.

L' analogia $\frac{CB}{L} : \frac{CD}{S} :: \frac{CO}{P + \frac{1}{2}b} : \frac{CN}{\frac{1}{2}f}$ somministra l' equazione

superiormente scoperta nel numero XII. conveniente alle forze infinite
 $\frac{P + \frac{1}{2}b}{L} \cdot S = \frac{1}{2}f$. Sostituito in cambio di $\frac{1}{2}f$ il suo valore $P + p$, c'è

si presenta $\frac{P + \frac{1}{2}b}{L} \cdot S = P + p$: espressione, da cui si raccoglie, che

segnata $FQ = \frac{FK}{2} = P + \frac{1}{2}b$, e congiunti i punti C, Q con una linea;

che si continui all'infinito, servirà questa d'asintoto alla curva MI.

XXVIII. Avendo osservato, che posta f minima, la tensione ag-
giunta p è immensamente più picciola, e che dividendo f infinita, p
 $= \frac{1}{2}f$; ne dedurremo; che stando nei confini del finito, l'accresci-

mento di tensione p è sempre minore della metà della forza f . Questa
riflessione ci addita il magistero ammirabile della Natura, la quale ha
disposto, che le forze estrinseche agiscano trasversalmente, e non diret-
tamente nelle fibre degli organi. Se agissero direttamente, s'aumenterebbe
la tensione per la intiera forza f . Operando le forze esteriori di
traverso, s'accresce la tensione per la quantità p , che quando le fibre
non restano molestate, è assai più minore di f , e che mentre f sia
molto grande, non può mai giungere a parreggiarne la metà. Con sì
stupendo artificio si mettono le fibre in una agitazione spiritosa, atta
a risvegliare nell'anima le sensazioni con pochissima alterazione della
loro consueta tensione.

XXIX. Conciossiachè in un caso estremo sta p come f , e nell'al-
tro p come f , s'inferisca, che più crescono, o scemano le aumentazioni
di tensione p , di quello che parimente crescano, o scemino le forze
finite trasversali.

Più conseguenze fisiche possono ricavar si. E primieramente aumen-
tandosi la forza esteriore, cresce, e con maggior proporzione la fatica
dell'organo; e perciò quando la mentovata forza è troppo grande, e
continuata, l'organo facilmente si stanca. L'assidua contemplazione dei
luminosi corpi celesti affatica talmente gli occhi degli Astrologi, che
a più d'uno è accaduto di rimaner privo della vista in tempo della
vecchiaja.

Agevolmente si passa dall'insensibile al sensibile, o al rovescio; dal piacevole al disgustoso, o al rovescio. All'accrescimento di tensione p non corrisponda sensazione. Se per eccitarla faccia bisogno l'ingrandimento di tensione $4p$; s'otterrà questo effetto con aumentare la forza trasversale f pochissimo più del doppio.

Nell'organo delicatissimo della vista, che ricoprendolo colle palpebre, o colle mani, o volgendo altrove la faccia si difende dall'empito d'una luce troppo violenta, la Natura si serve d'una bellissima industria, perchè non si passi con tanta facilità dal sensibile all'insensibile, dal grato all'ingrato. Consiste questa nel poterli allargare, o restringere il diametro della pupilla. Le dilatazioni, e i restringimenti si osservano grandissimi in quegli animali, che sono destinati a vedere di giorno, e di notte. Se il lume infiacchisce, s'allarga assai la pupilla, con che molto lume debole fa la stessa impressione, come un lume mediocre e di forza, e di quantità. Accrescendosi il vigore della luce, si restringe la pupilla, e la minore quantità compensa la forza maggiore. Anche gli altri organi avranno forse degli equivalenti artifizi, che non ci sono per anco noti.

XXX. Faccioci ora a ponderare qual parte possa avere la diversa rigidità b delle fibre nella fatica degli organi, la quale, supponendosi costante la forza tendente P , serba la ragione degli accrescimenti di stiramento p .

La formula propria delle forze minime $\frac{b+P}{8p^2} \cdot f^2 = p$ ci manife-

sta, che assumendosi siccome dato il coefficiente $\frac{f^2}{8p^2}$, le aumentazioni

di tensione p , mentre la forza f sia picciolissima, stanno come la somma $b+P$ della rigidità, e della forza tirante. In tale circostanza adunque la fatica dell'organo s'aumenta, o si minora proporzionalmente meno di quello cresce, o si diminuisce la rigidità.

S'è già avvertito al numero XXVII, che essendo infinita la forza f , la varia rigidità b delle fibre nulla influisce nella misura dell'aumento di tensione $p = \frac{1}{2} f$.

Quindi una forza finita cagionerà incrementi di tensione, che all'ingrandire, o all'impiccolire della rigidità si troveranno meno diversi di ciò, che richiede la legge delle forze minime.

Dalle premesse verità si desume la ragione, per cui un'adulto più d'un giovane, ed un vecchio più d'un adulto è soggetto a stancarsi. Un adulto per modo d'esempio non durerà tanto a leggere quanto un giovane, né un vecchio quanto un adulto.

Per

Per risparmiare frattanto più che fosse possibile agli organi ³²¹ la fatica, ha il Sapientissimo Iddio providamente ordinato, che gli accrescimenti di questa riescano a proporzione minori di quelli della rigidità.

XXXI. Di maggiore rilievo sono le conseguenze, che derivano dall'alterazione della forza tendente P .

Impariamo dalla formola spettante alle forze infinitamente piccole

$$\frac{b+P}{8P^2} \cdot f^2 = p, \text{ che le aumentazioni di tensione crescono, o calano con}$$

proporzione più rimota di quella, onde all'incontro calano, o crescono le forze tendenti P . In fatti se b variasse nella stessa ragione di P , si troverebbe $\frac{b+P}{8P^2}$ come $\frac{1}{P}$, e l'accrescimento di tensione p starebbe in-

versamente come la forza stirante P . Ma supponendosi la rigidità b costante, ne segue, che se cala la forza tendente P , la somma $b+P$ è proporzionatamente maggiore di P , e se la detta forza ingrandisce, la quantità $b+P$ è a proporzione minore di P . Perciò rettamente abbiamo asserito, che gli accrescimenti di tensione si corrispondono in una relazione più lontana della reciproca delle forze tendenti. E giacchè la fatica dell'organo sta come $\frac{p}{P}$, si conchiuda, che essendo minima la

forza esteriore, più si aumenta, o si minora la fatica dell'organo di quello ricerca la ragione inversa duplicata delle forze tendenti.

Rivolgiamoci all'opposto limite della forza f infinita, e supponendoci, che questa non patisca alterazione, troviamo costante l'incremento di tensione $p = \frac{1}{2} f$. A norma di ciò la fatica dell'organo $\frac{p}{P}$ ser-

berà la ragione reciproca delle forze tendenti P .

Quindi possiamo sicuramente affermare, che quando è finita la forza f , la fatica dell'organo prende regola da una proporzione più lontana della inversa delle forze stiranti.

Ora si capirà la ragione, per cui alle donne infievolite dal parto recente, nelle quali s'è scemata la tensione delle fibre, cagioni stanchezza, e fastidio la forza quantunque moderata del lume, del suono, e degli odori. Gioverà pure a coloro, che si fan cavar sangue, il riparare gli occhi dalla luce soverchia, potendo questa produrre nelle fibre meno tese dell'organo della vista una impressione troppo grande, e nociva.

XXXII. Conchiuderemo questa Annotazione coll'indagare, se la varia lunghezza delle fibre rechi modificazione veruna alla fatica degli organi. Mentre le fibre sieno simili di figura, stirate da forze propor-

zionali alle loro basi, formate di materia egualmente rigida; le forze tendenti P , le rigidità b , e le impressioni f delle forze esterne stano come L^2 . Aggiungiamo, che ancora gli accrescimenti di tensione p abbracciano la medesima ragione. Ci serviamo qui pure, come altrove abbiamo praticato, d'una dimostrazione indiretta. Supposti b , f , e $P+p$ come L^2 , cerchiamo la proporzione di P , e trovandola anch' essa come L^2 , inferiamo, che se P serberà la ragione di L^2 , verrà pure questa accettata da $P+p$, e conseguentemente ancora da p . Presa per mano

la formula (8) $\frac{P + bf^2}{8 \cdot P + p} = \sqrt{\frac{P + p - \frac{1}{4} f^2}{4}}$ osserviamo che nella ad-

dotta supposizione ciascuno dei due termini $\frac{bf^2}{8 \cdot P + p}$, $\sqrt{\frac{P + p - \frac{1}{4} f^2}{4}}$

sta come L^2 , e perciò P , che s'eguaglia alla differenza dei termini stessi, si scopre proporzionale ad L^2 , il che ec.

Venendo la fatica dell'organo contrassegnata dalla frazione $\frac{p}{P}$, ed

essendo nel nostro caso tanto il numeratore, quanto il denominatore come L^2 ; si raccoglie, che gli organi e grandi, e piccioli forniti delle descritte proprietà sosterranno una pari fatica.

XXXIII. Che se le forze tendenti, e le rigidità non si corrispondono nella ragione delle basi delle fibre simili, si verificano le medesime conseguenze, che abbiamo ricavate trattando delle fibre egualmente lunghe, e grosse, ma diversamente rigide, e tese. Essendo le fibre dei fanciulli proporzionatamente più molli di quelle degli uomini fatti, si capisce il perchè l'organo per esempio della vista si stanchi più facilmente in questi, che in quelli.

XXXIV. Relativamente a due fibre varie solo nella lunghezza; l'impressione f delle forze esterne sta come L . Le cose dette nel numero XXIX. ci ammoniscono, che gli accrescimenti di tensione p proporzionali alla fatica del sensorio $\frac{p}{P}$ nella presente supposizione di P co-

stante, abbracciano una ragione media tra f^2 , ed f . Ma le forze f serbano la relazione della lunghezza L ; dunque la fatica dell'organo seguita una proporzione di mezzo fra L^2 , ed L .

A norma di ciò paragonati assieme due sensorj composti di fibre del pari grosse, rigide, e tese, e diverse solamente nella lunghezza; quello sosterrà maggiore fatica, che sarà fornito di fibre più lunghe. Finiamo colla riflessione, che dipendendo la fatica dell'organo dalla combinazione di più elementi, non ci dobbiamo maravigliare, se l'azione del

del medesimo obbietto esterno affatichi diversamente gli organi d'uomini, quantunque sani, e che nel fiore dell'età si ritrovano. 323

SCHEDIA SMA XXVII. (*)

Delle Resistenze.

LA materia, sopra cui io mi sono proposto di ragionare, è circondata per tutti i versi da un numero così grande di difficoltà, che non so, se mi verrà fatto di stabilire una teorica, la quale risponda se non esattamente, almeno prossimamente ai fenomeni. Troveremo per istrada alcune verità, che almeno in apparenza vicendevolmente si distruggono, e vedremo talmente moltiplicarsi, e confondersi i dati, e le circostanze, che faremo assai, se ci riuscirà di fissare talora i limiti, da cui vengono circonscritte le leggi della Natura, ed oltre i quali non può essa trascorrere; quantunque dentro questi confini la sue operazioni, secondo i casi, in maniere infinite vada variando.

Per coloro, che vogliono assumere il malagevole impaccio d'applicare alla Fisica la Geometria, parmi s'io non prendo errore, che abbia a farsi gran conto del metodo dei limiti, conciossiachè non può abbastanza mettersi in chiaro, quanto sia differente la Geometria della Natura da quella degli Uomini. Essa, che istituisce i suoi computi col fatto, non resta punto imbarazzata nè dalla diversità dei Canoni, nè dall'accoppiamento degli elementi: laddove l'intelletto umano nè per via di naturale discorso, nè con l'aiuto de' metodi, che spesso siate ci

SS 2

ab-

(*) Non è finito il presente Schediafma; imperciocchè promettendo l'Autore di parlare delle resistenze, che dipendono dalla coesipazione delle parti, dalla tenacità, dal fregamento, e dalla inerzia della materia; non si veggono trattati, salvo che i due primi punti. Quantunque il Conte Jacopo abbia maneggiata compiutamente questa materia nel Saggio intorno il sistema dell'universo, libro primo, capitolo sesto; ciò non ostante s'è stimato bene di non omettere lo Schediafma XXVII. contenendosi in esso varie avvertenze, che meritano d'esser lette. Impariamo da una lettera dell'Autore al Sig. Abate Giuseppe Suzzani scritta l'anno 1732., che gli era riuscito di scoprire, che le resistenze dipendenti dalla inerzia della materia stanno tra il quadrato, ed il cubo della velocità. Poco tempo dopo una tale invenzione ha il Conte Jacopo composto il presente Schediafma, e forse lo scriveva nel febbrajo del 1733., come si conghietture da una lettera all'Autore del Sig. Conte Giovanni Rizzetti, il quale molto comenda la scoperta del metodo dei limiti, di cui nel principio dello Schediafma mostra il Conte Jacopo di compiacersi.

abbandonano, può reggere allo scioglimento di certe quistioni, nelle quali c'entrano parecchi dati sì fattamente misti, e modificati, che in alcune congiunture o si rendono del tutto ignoti, o per lo meno difficilissimi a maneggiarli.

In questa positura di cose io non so, e me ne rimetto all' altrui giudizio, se debba compiacermi meco medesimo della maniera, con cui foglio farmi strada a sì fatte speculazioni. Il mio artificio consiste in mettermi a considerare il lavoro della Natura, quand'essa in certi particolari incontri si trova, per così dire, obbligata ad operare colla maggiore semplicità, mentre facendosi il transito a poco a poco da una legge all'altra, secondo che si vanno alterando le circostanze, regolarmente negli estremi si rinvencono i Canoni meno composti: ma nei casi di mezzo, a causa della mistione, e combinamento degli elementi, per lo più la cosa si riduce a tale, che bene spesso riesce malagevole, e talvolta impossibile venirne a capo. Se ciò succede, come suole frequentemente succedere, egli è manifesto, che altro partito non ci rimane a prendere, suorchè porsi ad investigare le due leggi dei limiti, e con l'ajuto d'esse andare in traccia delle intermedie, le quali se ci verrà fatto di scoprire, avremo conseguito l'intento; e quando no, ci sarà almeno concesso di far uso d'una discreta approssimazione dentro a que' termini, fuori de' quali siamo sicuri, che la Natura operando non esce; e si escluderanno altresì tutte quelle leggi, che per via d'una qualche arbitraria ipotesi ad essa si sogliono attribuire.

Ho dato un saggio di questo metodo in parlando generalmente dei Canoni, per cui si regolano le comunicazioni dei moti, tanto fra i corpi molli, ed inerti, quanto fra quelli, che sono dotati di un qualche grado di forza elastica; ed ora ne aggiungerò un altro esempio tolto da quel genere di resistenze, che dipendono dall'inerzia della materia, e nel tempo stesso farò vedere, che dandosi mano una verità con l'altra, dalla teorica della comunicazione dei moti si caveranno i canoni, ed i limiti delle mentovate resistenze.

Prima però d'entrare in materia, piacemi d' esporre brevemente tutto ciò, che in tal proposito è stato pubblicato. Al Galileo si debbe la lode d'averci, per dir così, aperte le porte della Fisica, col mettersi avanti d'ogni altro a riflettere seriamente sulle leggi del moto: e quantunque egli non ignorasse, che le sue regole venivano sensibilmente alterate dagli ostacoli delle resistenze; ad ogni modo non si prese la cura di ridurli a computo, perchè la Geometria a' suoi tempi non aveva fatti tali progressi, che potesse a lui servire di scorta in ricerche tanto difficili, e delicate. Mancò dunque a questo grand'uomo il metodo, e non l'ingegno: ed in fatti non molto dopo il celebre Inglese VVallis osservò, che col mezzo delle sue serie interpolate, quando la resistenza del mezzo fluido si stabilisce in ogni punto dello spazio trascorso proporzionale alla velocità attuale del mobile, si poteva rinvenire di passo in passo la giusta misura della velocità decrescente. Nè credo già, ch'egli si persuadesse d'aver a prima vista scoperta la vera legge della

Na-

Natura: ma facendo uso delle sue progressioni in quella arbitraria supposizione, a cui adattar si potevano, diede altrui motivo di pigliar per mano la materia, e di condurla a qualche maggior perfezione.

Alcune sperienze fatte colla possibile accuratezza anno insegnato al Sig. Mariotte, che il contrasto fatto da un fluido ad un corpo solido non seguita la ragione della velocità semplice, ma piuttosto della duplicata, e pareva, che le osservazioni venissero confermate dal seguente raziocinio. Conciossiachè quanto il mobile più velocemente cammina, altrettanto caccia dal suo luogo una maggior copia di fluido, e con maggiore celerità; dunque la resistenza sta in ragione composta della materia fluida messa in moto, e della velocità del solido, da cui resta determinata quella del fluido: ma alla predetta celerità è sempre proporzionale la quantità del liquido, che di passo in passo viene spinta fuori di luogo; dunque la resistenza si trova essere in ragione duplicata, o come il quadrato di quella velocità, con cui il corpo duro attualmente si fa strada a traverso del mezzo resistente.

Questa determinazione avvalorata degli esperimenti, e dalla ragione su concordemente abbracciata dai Matematici, sinattantochè l'incomparabile Cavalier Nevvton nelle prime edizioni de' suoi Principj s'ingegnò di conciliare insieme le due differenti sentenze. Si diede egli a credere, che se un solido procede a passo lento per un mezzo viscido, e tegnente, la resistenza sia in ragione della velocità, e che s'alzi al quadrato della velocità stessa, ogni qual volta le particelle componenti la massa liquida non sono fra loro congiunte con sensibile adesione. E perchè forse non si da fluido, i di cui elementi non si trovino legati insieme da qualche tenacità, onde per separarli, e distinguerli ci voglia una forza ora minore, ed ora maggiore secondo le circostanze; si fece a conchiudere, che gl'impedimenti, da' quali il moto a poco a poco s'estingue, anno ad esprimersi per la velocità semplice con l'aggiunta del suo quadrato, di modo che sia $R = au + buu$.

Nell'ultima ristampa poi del citato libro, qualunque se ne fosse la cagione, quest' Uomo illustre cangiò ipotesi; e fattosi a considerare tre essere gl'intoppi, che ritardano il moto dei solidi, mentre oltre l'energia della materia fluida, ed oltre la viscosità, ponno le minime particole far contrasto colla loro asprezza, ed opporsi con una specie di fregamento, a tutti e tre questi diversi elementi assegnò le proprie leggi. Fece dunque costante l'ostacolo, che procede dalla tenacità, e variabili gli altri due, vale a dire quello, che nasce dalla frizione proporzionale alla velocità, ed il principale cagionato dall'inertza in ragione duplicata della velocità medesima. Così avraffi l'intera resistenza $R = c + au + buu$.

Delle affezioni del moto, e delle conseguenze, che derivansi da premeffi canonici, parecchi valent' Uomini anno fatto parola, ed oltre il lodato Cavalier Nevvton, ci si sono impiegati di proposito li Signori Leibnizio, Varignone, ed Ermanno, i quali nulla anno trascurato di ciò, che alla Geometria, ed all'Analisi s'appartiene: ma quanto a me

desti.

desidererei, che avessero data di tempo in tempo una qualche occhiata alla Fisica, e si fossero consigliati colla Natura, perchè il trattenerli su certe leggi non dimostrate, e scelte non per altra ragione, se non per essere le più semplici, serve bensì allo scioglimento d'alquante delle più ardue quistioni, ed all'ampliamento dei metodi: ma nulla giova alla spiegazione dei fenomeni, ed all'avanzamento della scienza naturale.

Ho pertanto meco stesso deliberato di non lasciarmi trasportare dalla corrente, ed aprirmi un nuovo sentiero, raccogliendo alcune fondamentali incontestabili osservazioni, e mettendomi anzi gli occhi ora l'una, ed ora l'altra a suo luogo e tempo, per vedere quali necessarie illusioni abbiano immediatamente a dedursene. Procurerò poscia accoppiando insieme i fenomeni, e le conseguenze, di scoprire le vere leggi, o almeno di restringerle fra loro confini, e mostrare fin dove o per un verso, o per l'altro può giungere la Natura.

Parlerò in primo luogo delle resistenze di que' corpi, che stanno di mezzo tra i duri, e i fluidi, ed in un medesimo tratto anche dei solidi, facendomi a considerare la costipazione delle parti, le ammassature, la tenacità, ed il fregamento. Quindi passerò ad investigare in qual maniera i due ultimi assegnari elementi possano operare nei mezzi fluidi, e finalmente mi fermerò a stabilire le regole di quella sorta d'ostacoli, che dipendono dalla semplice inerzia della materia.

Delle resistenze, che principalmente dipendono dalla costipazione delle parti.

ESPERIENZA.

Siamo debitori della seguente esperienza ammessa per bella, e per buona da tutti i Geometri alla sagacità del Sig. Marchese Giovanni Poleni pubblico Professore delle Scienze Matematiche nella Università di Padova. Fatta egli fare una cassetta colle sponde alte a misura del bisogno, la riempì tutta di fevo gelato, e ne spianò accuratamente la superficie: indi preparò due palle di pari diametro ben tornite, e ben lisce, e dello stesso metallo per esempio di ottone, una piena, e l'altra vuota. Questa ultima divisa in due emisferi si apriva, e si chiudeva con una spira, per poterli introdurre nel corpo vano alcuni pezzetti di piombo secondo le occorrenze, ed in tal guisa ridurre il peso della prima a quello della seconda in data proporzione.

Poscia lasciata cadere da una determinata altezza la sfera solida sul piano orizzontale del fevo, penetrava essa fino ad un certo segno la materia molle, e cedente, formando la sua buca, di cui si misurava attentamente la profondità. Ma per ottenere, che il globo vuoto escavasse parimente la propria fossa di saetta eguale alla già escavata, si osservava es-

essere necessario il farlo discendere da sublimità tale, che all'altra già fissata fosse in ragione reciproca dei pesi delle due palle.

Replicata l'esperienza in molte, e diverse maniere, ora mutando l'altezza, da cui piombava la sfera solida, ed ora variando la gravità della vuota, il fatto ci fa vedere, che in qualunque incontro ha luogo il canone assegnato con tanta aggiustatezza, quanta mai se ne può sperare dalle osservazioni. E giacchè le velocità acquistate dai gravi cadenti sono in ragione dimidiata delle altezze verticali, da cui discendono, cioè come le predette altezze, così i quadrati delle velocità; ne siegue, che per avere due fosse ugualmente profonde, fa di mestieri, che le due palle, quando arrivano a toccare la superficie del fevo, sieno dotate di pari forza computata alla Leibniziana, vale a dire, che sieno uguali i due prodotti delle masse, ovvero dei pesi moltiplicati nei quadrati delle rispettive celerità.

Sembra, che possa assumersi come un assioma, che due buche uguali escavate in una materia omogenea abbiano a prendersi per due effetti uguali: ed essendo altresì un primo incontrastabile principio, che due effetti eguali vengano generati da cause uguali, mentre ambedue nel produrli tutte s'impiegano, e si consumano, conchiude il lodato Signor Poleni, che mal corrispondendo gli effetti pari alla disuguaglianza, che passa fra le forze vive, mentre queste si misurino dalla quantità del moto, debba riceverli per vera la sentenza dell'incomparabile Leibnizio, per cui le forze de' corpi in moto restano determinate dalle masse moltiplicate non già nella velocità semplice, ma nella duplicata.

Prima di passar oltre, e farmi ad esaminare le risposte, colle quali i Cartesiani anno tentato di deludere una speranza così palpabile; non farò fuori di proposito, ch'io da essa ricavi alcune fondamentali conseguenze.

PROPOSIZIONE PRIMAA.

TEOREMA.

Premesso lo sperimento del Signor Poleni, suppongo, che la palla A (Fig. 102.) cadente dall'altezza AC fatta abbia la minima fossa in C tinta di nero; egli è certo, che nel correre lo spazio infinitesimo eguale alla faccetta della fossa medesima, non perde essa palla, e non una parte inassegnabile di quella finita velocità, che nella discesa per AC si aveva acquistata; dunque camminerà per detto spazio con eguale velocità: ma il tempo, in cui si compie il cammino, sta come lo spazio diviso per la celerità; dunque $\frac{dS}{V} = dT$. Fatto un simile discor-

so intorno la sfera B, che caduta dalla sublimità BD escava in D la sua picciola fossa contraddistinta con l'inchiostro eguale alla già escavata in

ta in C, avremo $\frac{ds}{u} = dt$: ma le saettè espresse per dS , ds sono egua-

li per l'ipotesi, e le due velocità V , u sono in proporzione dimidia-
ta di AC: BD; le quali altezze sono per le condizioni della sperienza
in ragione inversa delle masse A: B; dunque $\sqrt{A} : dT :: \sqrt{B} : dt$,

o sia $\sqrt{A} : \sqrt{B} :: dT : dt$; e perciò le minime fosse uguali in C, e D
si fanno dalle palle A, B in tempi tali, che si trovano essere in ragio-
ne sudduplicata delle masse A. B.

Ora è cosa facile a dimostrarsi, che le velocità perdute da ambe
le palle nel formare le fosse uguali sono nella medesima proporzio-
ne, in cui si rinvengono le celerità U , u ; conciossiachè essendo per i
noti canoni delle forze continuamente applicate $rdT = -AdU$, ed

$rdt = -Bdu$, e per le cose dette di sopra $dT : dt :: \sqrt{A} : \sqrt{B}$,

farà altresì $\frac{1}{\sqrt{A}} : \frac{1}{\sqrt{B}} :: -dU : -du$: ma le radici delle masse sono

in ragione reciproca delle velocità in C, e D; dunque $U : u :: -dU :$
 $-du$ e conseguentemente saranno nella medesima proporzione le velo-
cità restanti $U - dU$, $u - du$.

Proseguiscano i due globi A, B la loro operazione, penetrando
per altri due spazj uguali contrassegnati coi punti: e perchè i tempi
s' esprimono per le velocità applicate agli spazj trascorsi, avrassi

$\frac{dS}{U-dU} : \frac{dS}{u-du} :: dT : dt$: ma gli spazj per la ipotesi sono eguali, e le

velocità residue serbano la ragione reciproca dimidiata delle masse, co-

me si è dimostrato; dunque $\sqrt{A} : \sqrt{B} :: dT : dt$. Quindi si proverà,

che le celerità restanti dopo fatte le seconde fosse, saranno in ra-
gione delle primitive U , u ; e così di mano in mano collo stesso me-
todo si metterà in chiaro, che facendosi le terze, e le quarte fosse ugua-
li, e procedendosi in simil maniera all'infinito, gli elementi del tempo
si troveranno sempre come le radici delle masse; laonde i tempi in-
tieri impiegati nello scavar le buche CE, DF saranno in proporzio-
ne sudduplicata delle medesime masse A, B, lo che dovea dimostrarsi.

COROLLARIO.

Dal progresso della nostra dimostrazione si raccoglie, che presi ad arbitrio i due punti G, H egualmente distanti dalla superficie del sevo segnati nell'asse delle due fosse, quando le sfere A, B faranno pervenute ai predetti punti, conserveranno in se stesse velocità tali, che faranno fra loro in ragione, come le velocità primitive U, u, o pure in proporzione inversa sudduplicata delle masse A, B; conciossiachè i minimi strati eguali in G, ed H oppongono alla discesa delle palle una pari resistenza, essendo composti della stessa materia, e nei predetti siti egualmente compressa, e costipata. Perciò le due scale, o curve delle celerità decrescenti, che principiano nei punti C, D, e terminano coi loro vertici in E, ed F, avranno le ordinate, che corrispondono a due abscisse uguali, in data ragione costante.

S C O L I O.

Se vero fosse, che due piccioli strati di sevo egualmente grossi (Fig. 193.) Gg, li presi in diverse distanze dalla superficie, avessero una pari densità, e consistenza; accaderebbe, ch'essendo in ogni punto dell'asse CE costante l'opposizione del corpo cedente, e viscoso, il quale va di passo in passo estinguendo l'impeto della palla; s'avrebbe per iscala delle velocità decrescenti la parabola Apolloniana ELK, e descritta come nella figura.

Ma perchè quanto più la sfera si profonda nel sevo, tanto più lo va comprimendo; s'aumenta per questo capo la resistenza dei strati inferiori più densi, e più costipati relativamente ai superiori. Bisognerebbe per tanto farsi a cercare la legge di questo accrescimento, per poter determinare la scala delle resistenze, la quale in vece d'essere una linea retta parallela all'asse CE, degenererebbe in una curva, le di cui applicate principiano da una costante rispondente al punto C, anderebbono sempre crescendo sino alla massima, che al punto E apparterrebbe.

Io confesso di non avere sufficienti dati per una tale investigazione, e perciò altro non rimane, fuorchè appigliarsi o all'uno, o all'altro de' due partiti; cioè o prendere la cosa generalmente in qualsivoglia ipotesi delle resistenze variabili, salva però la condizione, e l'andamento della curva locale di sopra avvertito, o pure scegliere la supposizione più semplice delle resistenze costanti, trascurando le picciole aumentazioni nascenti dalla maggiore costipazione. Oltrechè le osservazioni ci mostrano, che il canone dal fatto insensibilmente discorda; le verità, che si andranno scoprendo, ci serviranno, per metter in chiaro un'altro esperimento da soggiungerli in appresso, in cui il condensamento colla tenacità non si accoppia.

PROPOSIZIONE SECONDA.

TEOREMA.

Nella posizione delle resistenze costanti (Fig. 102.) le due sfere A, B di ugual diametro cadenti dalle sublimità AC, BD sopra materie di differente consistenza escavano le buche CE, DF.

Dico in primo luogo, che le profondità di esse buche sono in proporzione diretta delle forze vive AV^2 , BU^2 , e reciproca delle resistenze R, r. Chiamati S, s gli spazj passati CG, DH, ed u, v le velocità restanti nei punti G, H, avremo per i canoni già dimostrati $-RdS = Audu$; $-rds = Bv dv$. Quindi integrando coll'aggiunta delle costanti, $g - RS = \frac{Au^2}{2}$; $b - rs = \frac{Bv^2}{2}$; ma quando nel principio

della immersione sono uguali a zero gli spazj S, s, scopresi $g = \frac{AV^2}{2}$,

ed $b = \frac{BU^2}{2}$; dunque $\frac{AU^2}{2} - RS = \frac{Au^2}{2}$, e $\frac{BU^2}{2} - rs = \frac{Bv^2}{2}$. Com-

piute poi che sieno le fosse CE, DF, diventano nulle le velocità costanti u, v; dunque $AV^2 = 2RS$; $BU^2 = 2rs$, e conseguentemente

S : s :: CE : DF :: $\frac{AU^2}{R} : \frac{BU^2}{r}$; il che doveva dimostrarsi.

Dico in secondo luogo essere i tempi T, t, in cui si formano le suddette fosse CE, DF, come le quantità del moto AU, BU divise per le rispettive resistenze R, r. Già si sa, che $-RdT = Audu$, e $-rds = Bv dv$; dunque sommando, non ommesse le necessarie costanti, $AV - RT = Au$, e $BU - rt = Bv$; ma terminate le buche, le velocità u, v sono = 0; perciò $AV = RT$, e $BU = rt$; laonde

T : t :: $\frac{AV}{R} : \frac{BU}{r}$, il che ec.

COROLLARIO.

Se alle due proporzioni $T : s :: \frac{AV}{R} : \frac{BU}{r}$, $S : s :: \frac{AV^2}{R} : \frac{BU^2}{r}$ sag-

giungerà la terza $T^2 : s^2 :: \frac{AS}{R} : \frac{RS}{r}$, che dalle prime combinate infie-

me si deriva, e queste analogie si metteranno a confronto, facendo eguali ora i tempi, ora le resistenze, ora le profondità delle fosse, ora le quantità del moto, ed ora le forze misurate alla maniera del Leibnizio; si scopriranno parecchi Teoremi, che per brevità tralascio, riferbandomi di farne uso secondo le congiunture.

S C O L I O I.

Nello sperimento del Sig. Poleni, in cui s'è adoprato il fevo, e poteva sostituirsi con pari successo la creta molle, il mele, ed ogni altra materia cedente, e viscosa, nasce la resistenza da varj elementi, ed in particolare dall'inerzia del corpo semifluido cacciato di luogo, dalla costringazione delle parti, e dalla loro tenacità. Ma messa in cambio l'arena sottile, o qualche polvere ben macinata, come ha fatto il dottissimo Gravesande, non si diversificano le leggi della Natura; non ostante che tolta affatto di mezzo la tenacità, predomini la costringazione con l'aggiunta di qualche picciolo fregamento.

S C O L I O II.

Nei corpi duri dall'energia della percossa si produce la confusione, che negl'inerti si conserva, e si restituisce o in tutto, o in parte negli elastici: ed è cosa certa, che se la materia, la quale riceve in se stessa l'impeto, persisterà immobile; allora le ammaccature saranno pari, quando si troveranno eguali le forze delle percosse computate alla Leibniziana. Nè dee aver alcun riguardo alla varia figura dei corpi agenti, da cui viene regolata quella delle confusioni; perchè non ostante qualunque vestigio, che resti nella materia paziente, essendo uguali i colpi, faranno altresì, se non eguali, almeno equivalenti le impressioni: dal qual principio ci si apre la strada di misurare le resistenze di varj corpi differenti fra loro, o per la materia, o per la figura.

Delle resistenze procedenti dalla sola tenacità.

ESPERIENZA.

Per camminare con passo fermo nella presente ricerca, fa di mestieri lo scegliere alcune sperienze semplici, e per quanto si può esatte, nelle quali, esclusi gli altri elementi, c'entri la sola tenacità. Abbiamo certi corpi pieghevoli, che stanno di mezzo fra i duri, e i molli, composti di fibre talmente intralciate, che agevolmente si divellono, fra quali il celebre Inglese Sig. Desaguliers ha prescelti alquanti fogli di carta disposti orizzontalmente in picciole, ed uguali distanze, e quanto basta egualmente tirati.

Sieno essi fogli collocati, come nella Fig. 104., e facciasi, che la palla A cadente da varie sublimità nel mezzo de' predetti strati di carta orizzontali, ne rompa ora più, ed ora meno a misura della propria forza: ha osservato l'Autore, che il numero dei fogli lacerati è proporzionale prossimamente all'altezza della discesa. Per cagion d'esempio il globo A piombando da uno spazio espresso per l'unità abbia vigore abbastanza di spezzare tre fogli, e sul quarto si fermi; accaderà, che discendendo da una doppia altezza, ne rompa sei, e da una tripla nove, e così di mano in mano.

Ben è vero, che lo sperimento in tutti gl'incontri non risponde precisamente alla regola; e ciò, perchè nè i fogli sono egualmente crassissimi, nè ugualmente tesi, ed in oltre perchè la forza della palla negli intervalli fra strato e strato viene avvalorata dalla gravità, che non manca di esercitare la sua azione, la quale però si rende tanto più fiavole, quanto i fogli sono fra loro meno lontani.

Non ostante ciò lo stesso Sig. Desaguliers ingenuamente confessa; che il successo della osservazione è favorevole al Leibnizio; accostandosi assai da presso i due numeri dei fogli spezzati a quella proporzione, che passa fra i quadrati delle velocità acquistate dalla palla A in discendendo da due diverse sublimità: laddove non anno che fare nè punto, nè poco colle due differenti quantità del moto, o sia colle forze misurate alla Cartesiana. In fatti poste le altezze in ragione tripla, e poco che la sfera cadendo dalla simpla laceri tre fogli di carta, piombando essa dalla tripla, giusto l'accennata comune opinione, non potrebbe rompere più di cinque fogli, e sul sesto si fermerebbe; essendo

come $1 : \sqrt{3} :: 3 : \sqrt{27} = \frac{5}{5}$ prossimamente; e pure l'esperienza

ci fa vedere, che ordinariamente ne spezza nove, ed al decimo s'appoggia.

Lo Scrittore Inglese per tirarsi d'impaccio, e soddisfare in qualche maniera alla difficoltà nascente dal fatto ricorre opportunamente al tempo, rendendoci avvertiti, che quanto la palla cammina più celere; altrettanto nel farsi strada a traverso d'un foglio tempo minore ci spende. Di questa eccezione, o piuttosto pregiudizio ci occorrerà di ragionare a suo luogo: intanto io noto, che non tutta l'energia della sfera A s'impiega a rompere i fogli, ma una porzione se ne dee spendere nello stirare quelle fibre, che lacerate non vengono, e che sono tanto manco soggette all'azione, quanto più si discostano dal sito di mezzo; in cui si fa la percossa. Da sì fatta distribuzione però non resta punto turbata l'esperienza; attesochè sebbene l'azione si divide in due parti, una delle quali si consuma in rompere parecchie fibre, e l'altra in istendere il rimanente, ad ogni modo nell'uno, e nell'altro effetto s'impiegano forze tali, che serbano fra loro una ragione costante, ed è sempre pari la resistenza, per cui ognuno dei fogli al vigore dell'azione fa contrasto.

PROPOSIZIONE TERZA.

PROBLEMA.

Trovare le velocità decrescenti d'una palla, la quale discendendo da una determinata altezza rompa un dato numero di fogli.

La sfera A cadente dalla sublimità AE abbia tanto vigore, quanto basti a rompere li quattro fogli di carta contrassegnati nella Figura 105. colli numeri 1, 2, 3, 4, compiuto il qual'effetto, perda essa tutto il suo moto. Colla retta orizzontale Aa si esponga la velocità della palla nel punto E, in cui giunge a toccare il primo strato, senza per anco aver esercitata alcuna azione, e dividasi in quattro parti eguali la verticale AE.

Perchè il globo A, dopo lacerato il primo foglio, conserva una forza sufficiente per romperne altri tre, agirà contro il secondo con tanta velocità, come se fosse disceso dall'altezza BE. S'esprima questa velocità per la retta Bb, ed essendo le predette celerità Aa, Bb in ragione sudduplicata degli spazi passati AE, BE, ne siegue, che il punto b sarà ad una parabola, che abbia il suo vertice in E, e passi per il punto a.

Similmente dopo rotto il secondo foglio, mantiene in se la sfera A il vigore di spezzarne altri due, e perciò eserciterà la sua azione contro il terzo, come se fosse caduta dalla sublimità CE, e conseguentemente questa celerità ci verrà rappresentata dalla ordinata Cc appartenente alla parabola già descritta. Camminando in tal guisa la faccenda, avremo per iscala delle velocità decrescenti nel rompere, che fa la palla successivamente alquanti fogli di carta, una curva parabolica Apolloniana, lo che ec.

CO.

COROLLARIO I.

Tirate le linee bf , cg , db parallele all'asse AE , determineremo la velocità af perduta dalla sfera nel rompere il primo foglio, la bg similmente perduta nel rompere il secondo, e così di mano in mano: ma per la natura della parabola si fa essere af minore di bg , e bg minore di cb ; dunque quanto la palla cammina con maggiore celerità, tanto meno ne perde in lacerando i fogli disposti in serie, e producendo effetti pari. Tutto all'opposto interviene in quella sorta di resistenze, che dipendono dall'inerzia della materia, come a suo luogo dimostreremo.

COROLLARIO II.

Perciò la forza viva della sfera A computata alla Leibniziana, la quale si trova essere come i quadrati delle applicate Aa , Bb , Cc , ec. decresce aritmeticamente, come altresì nella medesima progressione va ricrescendo la forza di passo in passo perduta. Ora perchè un foglio mai non si spezza, se prima le sue fibre non sono ridotte ad un certo stato di stiramento, per il qual effetto ci vogliono forze uguali; è cosa chiara, che il corpo A nel rompere parecchi fogli un dopo l'altro, perde in ciascheduna azione un pari grado della propria forza, ed in conseguenza si sperimenta sempre uguale la resistenza, che procede dalla tenacità dei fogli supposti della stessa materia, e di pari crassizie, qualunque possa essere la massa, la figura, e la velocità del mobile.

COROLLARIO III.

I tempi seguitano la proporzione della velocità perduta; di maniera che, se dalla intercetta fa ci viene rappresentato il tempo, in cui si rompe il primo foglio, le altre gb , bc , ec. ci determinano i tempi impiegati a spezzare il secondo, ed il terzo strato. Quindi i tempi consumati in produrre il totale effetto restano espressi dalle applicate Aa , Bb , Cc . mentre però la massa del globo A non patisca alterazione.

COROLLARIO IV.

Considerata la cosa più generalmente, se prenderemo due sfere di ugal volume, e di differente peso, e le lasceremo cadere da varie altezze, chiamate le masse M , m , le sublimità S , s , i numeri dei

fo-

fogli rotti N, n , i tempi spesi nel produrre gli effetti intieri T, t (con questo però, che le palle, compiute le loro operazioni, restino affatto prive di forza, e non si mettano in conto i tempi impiegati nello scorrere con celerità prossimamente equabile ognuno de' piccioli intervalli tra foglio, e foglio) avremo le seguenti analogie

$$N : n :: MU^2 : mU^2 :: MS : ms \text{ con parecchie altre, che dal} \\ T : t :: MU : mU :: \sqrt{MN} : \sqrt{mn}$$

combinamento delle accennate possono agevolmente dedursi.

ANNOTAZIONE TRIMA.

Da quanto fin ora s'è detto, e dimostrato, hassi secondo me a cavare una conclusione principale, ed è, che nell'una, e nell'altra esperienza gli effetti generati mal corrispondono alle forze vive acquistate dalle palle cadenti, se queste forze si misurano dalle quantità del moto, o dalle masse moltiplicate nelle velocità. E se così va la faccenda, fa di mestieri ricorrere al futterfugio del tempo, e sopra di ciò farli ad ascoltare con attenzione le sottigliezze, con cui i Cartesiani, ed i Nevvtoniani tentano di soddisfare alla opposizione.

Penfano, che la forza viva abbia a distinguersi dall'azione, intendendo per forza quella quantità di moto, che nel mobile attualmente risiede, e per azione la forza medesima modificata dal tempo consumato in produrre l'effetto intiero. Alla sola forza non debbe attribuirsi l'operazione; ma bensì alla forza congiunta col tempo, venendo dal combinamento di questi elementi determinata l'energia dell'azione, e conseguentemente la quantità dell'effetto, che ad essa in ogn'incontro si trova essere proporzionale. E qui come se la loro ingegnosa specolazione dovesse essere ricevuta per un primo principio, o per una verità chiaramente dimostrata, fanno le maraviglie, come mai il dottissimo Leibnizio abbia potuto trascurare la considerazione dei tempi, e sia caduto in un errore sì manifesto, che non ammette nè difesa, nè scusa.

ANNOTAZIONE SECONDA.

Il celebre Sig. Croufaz si è il primo, che sia pervenuto a mia notizia, il quale per mettere a coperto la sentenza dei Cartesiani, e nel tempo medesimo salvare la debita analogia tra la cagione, e l'effetto, s'è ingegnato di spiegare lo sperimento del Signor Poleni nella seguente maniera.

Voleva egli, che la sfera A più pesante (Fig. 101.) impiegasse minor tempo nell'escavare la sua fossa, di quello facesse l'altra più leggera B nel profundare la propria buca, e che questi tempi serbassero la proporzione delle velocità acquistate nei punti C, D , e fossero in ragione inversa dimidiata delle masse A, B . La cosa sta tutto al ro-

ve-

vescio, come ho fatto chiaramente vederè nella Proposizione seconda; nè credo, che molto ci voglia a capire, anche senza l'aiuto della Geometria, che di due palle atte ad escavare due fosse uguali, quella ci spenderà minor tempo, che principia ad internarsi nella materia cedente con maggiore celerità.

Misurando per tanto il citato Sig. Croufaz ambe le azioni colle masse moltiplicate prima nelle velocità acquistate, indi ne' tempi consumati nel formare le buche, i quali tempi a parer suo sono proporzionali a quelli delle cadute, esprime malamente il vigore d' ambe esse azioni per i prodotti AU , BU , che suppone fra loro eguali, e conseguentemente capaci di generare effetti pari, quantunque sieno questi senza fallo in ragione delle masse A , B ; stantechè le celerità V , U nel caso nostro sono reciprocamente come i tempi T , t . Toccherà dunque a lui lo spiegare, qualmente due azioni, che ponno determinarsi in qualsivoglia proporzione, producano due fosse, o due effetti uguali, e come fusista la necessaria corrispondenza, che dee passare fra la cagione generatrice, e l'effetto generato.

ANNOZZIONE TERZA.

Ma se applicando il tempo alla maniera del Sig. Croufaz nell'esempio, che abbiain per le mani, in vece di togliersi, s'accresce l'inconveniente; veggiamo, se possa riuscir meglio la cosa, adattandolo in un modo diverso conforme il sentimento degl' Inglese.

Atteso che le velocità V , U si scoprono essere reciprocamente come $\sqrt{A} : \sqrt{B}$; le quantità del moto, o le forze Cartesiane faranno direttamente nella medesima proporzione. Ma gli effetti generati, o sieno le fosse escavate si trovano uguali, dunque fa di mestieri modificare in maniera per mezzo dei tempi, o per qualche altra strada le predette quantità del moto, che si riducano all'egualità; acciocchè la ragione serbi coll'effetto la debita analogia. Può farsi ciò in due modi; o moltiplicandole nelle velocità, o dividendole per i tempi; essendosi dimostrato, che questi sono in ragione diretta dimidiata delle masse. Nel primo caso abbiain i prodotti uguali AV^2 , BU^2 , e conseguentemente le forze vive misurate giusta la sentenza del Leibnizio, e come richiede lo sperimento. Nel secondo c'è l'uguaglianza fra le due frazioni $\frac{AV}{T}$, $\frac{BU}{t}$, e di questa ipotesi si vale l'acutissimo Signor Pemi-

berton, per render qualche ragione del Fenomeno, intorno cui si fa parola.

Parmi, che il Sig. Croufaz, sebbene prendeva un gravissimo sbagli nella determinazione dei tempi, ciò non ostante la discorresse assai più coerentemente ai principi della sua scuola, in supponendo, che quanto più dura l'azione, tanto più la forza agente venga avvalorata dal

tempo; tutto all'opposto dell'Autore Inglese, il quale per adattarsi piuttosto al bisogno, che alla verità, pensa, che quanto è più lungo il tempo dell'azione, altrettanto si diminuisca l'effetto prodotto dalla forza agente; cosicchè i tempi abbiano ad aiutare non già la forza viva operante, ma la morta resistente. Perciò poste uguali dall'una, e dall'altra parte le resistenze, essendo come $RT : Rr :: AV : BU$, si pretende, che si generino effetti pari, e si formino fosse uguali; perchè le resistenze corroborate dai tempi, nel mentre che si percorrono spazi eguali nella materia tenace, distruggono quantità di moto ad esse proporzionali.

Il divisamento di avvalorare colla durata del tempo la reazione in cambio dell'azione, riesce per mera fortuna nel caso nostro: ma in altri incontri va a terminare in assurdi manifesti. E per metterne sotto gli occhi un esempio, diceva il Leibnizio, che tanta forza ci vuole per far salire la massa quattro ad un'altezza espressa per l'unità, quanta se ne richiede per far ascendere la massa $= 1$ all'altezza quattro: ma spiegando io in alto la massa quattro colla velocità $= 1$, monta essa alla sublimità simple, e gittando in su la massa $= 1$ colla velocità $= 2$, sale essa all'altezza quadrupla; dunque sono dotati di egual forza due gravi, le masse de' quali stanno in ragione come $1 : 4$, e le velocità all'incontro come $2 : 1$; ma l'uguaglianza non può conseguirsi, se le forze non sono fra loro in proporzione composta, semplice delle masse, e duplicata delle velocità; dunque le forze vive si misurano per i quadrati delle velocità moltiplicati nelle masse.

Alla premessa riflessione del Leibnizio cosa rispondono concordemente i suoi Avversari? Non negano, che l'effetto delle due differenti salite, cioè della massa m alla sublimità $\frac{1}{m}$, e della massa $\frac{1}{m}$ all'altezza

m sia un effetto pari, in cui debba egual vigore impiegarsi: soggiungono bensì bastare, che la velocità del grave, il quale comincia ad ascendere più celere, sia appunto alla velocità del più lento come

$\sqrt{m} : \sqrt{\frac{1}{m}}$, e ciò perchè oltre le masse, e le celerità, anno anche a com-

putarsi i tempi delle salite. La massa m s'estolle alla sublimità $\frac{1}{m}$, prin-

cipiando ad ascendere colla velocità $\frac{1}{\sqrt{m}}$, e compiendo la salita nel

tempo $\frac{1}{\sqrt{m}}$: laddove all'incontro la massa $\frac{1}{m}$ comincia il suo moto colla

celerità $\sqrt{m}$, ed impiegandoci il tempo espresso per $\sqrt{m}$ monta alla sublimità m . Ora moltiplicando ambo le masse rispettivamente nelle ve-

locità impresse, e nei tempi dell' azioni, cioè $m \cdot \frac{1}{\sqrt{m}} \cdot \frac{1}{\sqrt{m}}$, e

$\frac{1}{m} \cdot \sqrt{m} \cdot \sqrt{m}$, avremo prodotti, e conseguentemente effetti eguali.

Io non mi fermo ad esaminare il valore della risposta, che dai Cartesiani si adatta agli elastri del Sig. Giovanni Bernoulli, ed a cento altri casi simili: mi so semplicemente ad avvertire, che nella sferienza del Sig. Poleni la maggior forza produce un effetto pari a quello della minore non per altra ragione, se non perchè ci consuma più tempo a produrlo. Tutto al rovescio nell'esempio del Leibnizio la forza più debole per lo medesimo motivo, che più tempo c'impiega, genera un effetto eguale a quello della più robusta.

Per sostenere in qualche modo la comune opinione, bisogna necessariamente dire, che nel primo caso il tempo più lungo avvalorì la resistenza del fevo, e stia dalla parte della reazione; e nel secondo, che in vece di avvalorare la reazione della gravità, la quale come fa la tenacità del fevo, va anch'essa estinguendo la forza del grave ascendente, si disponga non si fa come a corroborare l'azione del mobile.

Forse è d'uopo aver riguardo non mica alla maggiore, o minor forza, che nel corpo agente risiede, ma piuttosto a qualche altra ignota circostanza, per distinguere qual parte venga favorita dal tempo, e per sapere s'esso computar si debba in ajuto dell'azione, o della reazione: ed io intanto aspetterò, che dagli Avversari del Leibnizio, per non incorrere in qualche equivocazione, me ne venga assegnato il generale, e vero criterio.

ANNO TAZIONE QUA RTA.

Questa incostanza di operare mi ha fatto cadere in sospetto esserci in sì fatte ricerche nascosta una qualche grande ambiguità: scbbene essa non è tanto occulta, che un occhio alquanto attento non giunga facilmente a scoprirla. L'equivoco consiste in ciò, che il tempo non ci ha punto che fare, o se pure c'entra, ha egli da entrarci tanto dalla parte dell'azione, quanto della reazione, il che è lo stesso, come se nè per l'una, nè per l'altra parte c'entrasse.

E' cosa manifesta, che le due palle A, B (Fig. 102.) perdono tutte le loro forze acquistate nelle discese, in formando le due fosse uguali CE, DF; mentre la materia cedente a poco a poco va estenuando le sudette forze, sino ad estinguerle intieramente. Ben è vero, che la sfera A consuma più tempo in escavar la sua buca, di quello faccia la palla B,

c

e queſti tempi ſono in ragione dimidiata delle maffe: ma è altrettanto vero, che la reſiſtenza del ſevo contenuto nella foſſa CE fa per più tempo contraſto all' azione della palla A, ed il ſevo della buca DF per minor tempo ſi oppone all' azione della ſfera B; dunque ſ' io metto in conto la durata dell' azione, non debbo ommettere quella della reazione; e ſe la prima avvalorà la forza agente, la ſeconda del pari avvalorà la reſiſtente.

Egli è un aſſioma ricevuto da tutti i Fiſici, e Matematici, che l' azione è ſempre uguale, e contraria alla reazione; dunque ciò ſi verifica in qualunque elemento di tempo; dunque anche nei tempi intieri, ne quali l' azione, e la reazione ſi compie, ha luogo lo ſteſſo canone. Quindi ſe per cagion d' eſempio la forza F ſi equilibra colla reſiſtenza R in qualunque tempo T, dico, che un'altra forza eguale in qualſivoglia altro tempo t vincerà un'altra reſiſtenza equivalente, nè potrà mai ſuperarne una maggiore, nè laſciarſi eſtinguere da una minore.

ANNO TAZIONE QUINTA.

Se la preſente materia aveſſe biſogno d' una più chiara dilucidazione; facciaſi, che le tante volte nominate due ſfere A, B abbiano in diſcendendo acquiſtate due quantità di moto ad arbitrio AV, BU: e giacchè i tempi ſpeſi nella eſcavazione delle due buche ſeguitano la proporzione delle quantità ſteſſe; ne ſiegue, che fatto uſo dei tempi giuſta l'ipoteſi del Sig. Crouſaz, le azioni, e conſequentemente gli eſſetti prodotti, o ſia le profondità delle foſſe avrebbero ad eſſere in ragione compoſta, duplicata delle maffe, ed altreſi duplicata delle velocità, cioè come $AVT: BUt$, ovvero come $A^2V^2: B^2U^2$: lo che non può mai verificariſi, fuorchè nell'unico caſo, in cui ſieno eguali le maffe; mentre allora lo ſperimento non diſcordando dalla teorica, ci fa vedere, che le ſaette delle buche ſono proporzionali ai quadrati delle celerità.

All'oppoſto ſe il tempo ſ' applica ad avvalorare le reſiſtenze; ſeguitando le veſtigia del Sig. Pemberton, ſcopriremo una generale uguaglianza fra le due frazioni $\frac{AV}{T}$, $\frac{BU}{t}$, ed in ordine a ciò dovrebbero

eſſere uguali tutti gli eſſetti; coſicchè due palle di pari diametro o gravi, o leggiere, e cadenti da qualſivoglia altezza avrebbero ſempre ad internarſi egualmente nel ſevo, e formare due foſſe ugualmente cupe. E pure la ragione c' inſegna eſſere queſto un manifeſtiſſimo aſſurdo; e l'oſſervazione ci ammoniſce ciò non aver luogo, ſe non nell'unico incontro, che i quadrati delle velocità ſieno in ragione inverſa delle maffe. L'equivocazione dello Scrittore Ingleſe è nata dal non aver egli eſſeſo il ſuo computo a tutti i caſi, ma ſolamente a quell' unico, in cui per mera fortuna l'eſperienza non era ripugnante alla ſua conſoluzione.

Supponiamo, che sieno eguali le quantità del moto AV, BU, e conseguentemente anche i tempi T, t, ne quali si escavano le due fosse CE, DF: ma le profondità delle fosse stesse faranno ineguali, ed in proporzione come le velocità V, U, ovvero reciprocamente come le masse A, B, la qual ragione può determinarsi a piacere.

Ora io dimando in che modo possa mai succedere, che due forze eguali in sentenza degli Avversarj, operanti in tempi parimente uguali producano effetti tanto diversi; perchè il senso comune m'insegna, che stando tutte le cose pari, maggior forza ci voglia ad escavare una buca, quanto essa è più profonda. Nè giova in tale incontro ricorrere ai tempi conciossiachè adattandoli alle forze agenti, o alle resistenti, stante l'uguaglianza notata, niun profitto se ne ritragge, e questa egualità si mantiene sempre la stessa non solo fra i tempi intieri, ma di più fra le loro flussioni. Altro dunque non rimane, se non valersi della regola Leibniziana; mentre così troveremo le fatte delle buche proporzionali alle forze vive, ed all'energia delle cause rispondere ottimamente gli effetti.

ANNOTAZIONE SESTA.

Credeva il Sig. Desaguliers, che la speranza dei fogli di carta da lui tentata per contrapporla a quella del Sig. Poleni, veduto il successo mal corrispondere all'impegno, e all'aspettazione, dovesse col solito sutterfugio del tempo accomodarsi all'ipotesi Cartesiana. Ma sembra a me non esserci forse sperimento, che più di questo mostri gli assurdi, che in via di conseguenze si deducono dalla comune sentenza. Veggiamolo in una particolare supposizione.

Prendasi la palla A (Fig. 106.) la di cui massa sia M, e si lasci cadere dall'altezza Aa esposta per l'unità, onde sia parimente M il numero dei fogli rotti. Abbiafi la seconda sfera B più leggiera di massa m, ed istituita l'analogia m: M:: Aa: Bb, discenda questa dalla sublimità Bb, nel qual caso per le cose dette di sopra romperanno esse palle un numero pari di fogli. Pongo in uso il terzo globo C uguale in massa al globo A, ma che cada dall'altezza Cc = Cb; cosicchè il numero de' fogli rotti rispetto agli altri lacerati dalla palla A, ovvero B stia in ragione, come gli spazj trascorsi Cc. Aa.

Fatta questa preparazione, mi metto a confrontare le azioni delle due sfere A, B, delle quali sono pari gli effetti. La sublimità Bb ci viene espressa dalla frazione $\frac{M}{m}$, la velocità del corpo B nel punto b

per $\frac{\sqrt{M}}{\sqrt{m}}$, la sua quantità di moto per $m \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{m}} = \sqrt{M}m$, alla qual

grati

grandezza è sempre proporzionale il tempo speso nella rottura dei fogli. All'incontro abbiamo nella palla A tanto la quantità del moto, quanto il tempo dell'effetto intiero esposto egualmente per M.

Ora perchè l'esperienza ci fa vedere, che le predette due sfere A, B acquistano in virtù delle discese tanta energia, quanta basta a lacerare un numero eguale di fogli; se deesi aver riguardo alla corrispondenza fra la cagione, e l'effetto, abbiamo a conchiudere, che se non sono eguali le forze vive, lo sieno almanco le azioni. Ma nella nostra posizione le quantità del moto si rispondono in ragione dimidiata delle masse, come altresì i tempi, ne quali gli effetti si compiono; dunque se dietro le vestigia del Sig. Croufaz, e degli altri Cartesiani io moltiplico le forze vive nei tempi, mi si presentano le azioni in proporzione semplice delle masse, alla quale non adattandosi in conto alcuno gli effetti prodotti, è d'uopo, che per non urtare nell'assurdo, mi disponga ad abbracciare il parere del Sig. Pemberton, dividendo le quantità del moto per i tempi, e facendo, che i tempi medesimi in cambio delle forze vive avvalorino le resistenze. Così essendo

$$\frac{\sqrt{M}}{\sqrt{m}} = \frac{\sqrt{M}}{\sqrt{m}}, \text{ ed eguali in conseguenza le azioni, si manterrà ferma}$$

$$\sqrt{M} = \sqrt{m}$$

l'analogia fra le cagioni, e gli effetti.

In tal maniera cammina la faccenda nel caso proposto. Frattanto s'io mi volgo a paragonare insieme gli sforzi delle due palle A, C trovo, che per essere elleno di pari massa, il numero dei fogli spezzati è proporzionale alle sublimità Aa, Cc, e che le quantità del moto, ed i tempi sono in ragione sudduplicata delle stesse sublimità, o co-

me 1 : $\frac{\sqrt{M}}{\sqrt{m}}$. S'io mi servo dell'artificio adoperato nell'esempio ante-

cedente, e che divido giusta il metodo del Sig. Pemberton le forze vive Cartesiane per i tempi corrispondenti, computandoli dalla parte delle resistenze; le azioni, che in tal modo diventano eguali, avrebbero a produrre effetti uguali, e non mai proporzionali alle altezze delle cadute, conforme l'esperienza c'insegna. Ed ecco che per iscanfare l'inconveniente, fa di mestieri, ch'io mi dichiari del partito del Sig. Croufaz, corroborando le quantità del moto, o le forze agenti con l'ajuto dei tempi; mentr'essendo allora le azioni, ed in conseguenza gli

effetti in ragione duplicata di 1 : $\frac{\sqrt{M}}{\sqrt{m}}$, o come 1 : $\frac{M}{m}$, avremo i nu-

meri

342
meri degli strati rotti proporzionali alle sublimità, e la teorica s'accorderà coll'osservazione.

A questo passo ho ben giusto motivo di maravigliarmi, e di mettere in considerazione il gran giudizio, ed il discernimento, di cui debbe essere dotato il tempo, che accompagna l'azione della sfera A; conciossiachè, se mettesi a confronto il suo effetto con quello della palla B, è necessario, che il tempo abbia tanta discrezione di avvalorare la resistenza, udita però prima, e ben' imparata la lezione del Signor Pemberton. Quando poi si tratta di far paragone tra le azioni, e gli effetti de' due globi A, C, bisogna, che il tempo mutata opinione, secondo la massima del Sig. Croufaz si disponga a mettersi dalla parte della forza agente, e s'ingegni a tutto potere di corroborarla, perchè non nasca un qualche mostro in Natura.

Il peggio si è, che spesso fiate il tempo non sa che partito prendere, come chiaramente appare in paragonando gli sforzi, e gli effetti delle palle B, C; attesochè essendo eguali le altezze Cc, Bb, e conseguentemente le velocità V, U, accade, che le forze vive seguitino la proporzione delle masse in qualunque ipotesi, nella qual ragione si trovano essere anche i tempi, e gli effetti. Non ponno dunque i tempi applicarsi nè alle forze vive agenti, nè alle morte resistenti; perchè nel primo caso le azioni, e gli effetti, che ad esse rispondono, farebbono come i quadrati delle masse, e nel secondo eguali: all'una, e all'altra delle quali conclusioni manifestamente ripugna l'esperienza.

Nè giova il far passaggio dalle quantità finite alle infinitamente picciole; mentre ci si fanno incontro i medesimi inconvenienti, come ne resterà pienamente convinto, chi si prenderà la briga di farne il calcolo. Resta per tanto, che si torni ad inculcare ciò, che altre volte s'è insinuato, che non potendosi far uso del tempo, se non si adatta egualmente all'azione, ed alla reazione, senza incorrere in paralogismo, siamo in piena libertà di trascurare questo elemento in qualunque incontro; purchè non si prenda errore nella estimazione delle forze vive, che sono sempre come le masse moltiplicate nei quadrati delle attuali velocità.

SCHEDIASMA XXVIII.

*Della Forza, colla quale i corpi fluidi urtano nei solidi,
o sia della Resistenza, con cui i mezzi fluidi s'oppongono
al moto dei solidi.*

NOn è egli una cosa stravagante, che i Cartesiani, e i Leibniziani; i quali sono fra loro tanto discordi nel determinare la vera misura delle forze vive, facendola i primi in ragione semplice delle velocità, ed i secondi in duplicata; non ostante ciò talvolta si porgono amichevolmente la mano, e convengono in parecchie conclusioni, che siccome dipendono certamente dai loro principj, così con differenti mezzi dovrebbero essere dimostrate? Io per me credo, e ne sono rimasto appieno convinto in leggendo alcune Dissertazioni uscite alla luce in questi ultimi tempi, che i Fautori della sentenza Leibniziana non abbiano bene scandagliato il fondo della materia, e che nelle loro posizioni frequentemente si contraddicano, con che a taluno anno fatto credere, che la Natura in differenti casi metta in opera leggi diverse, ed in questo solo incontro si dimentichi della sua costanza, e della sua semplicità.

Per cagion d'esempio tutti questi Signori dimostrano le leggi della comunicazione del moto fra i corpi molli, ed inerti, o per via del centro di gravità, che non muta nè velocità, nè direzione, o assumendo, che tanto avanti, quanto dopo l'urto la stessa quantità di moto si conservi, senza mai far parola delle forze vive proporzionali, secondo la loro opinione, ai quadrati delle velocità. Niuno (trattone il Sig. Gravesande, il quale però non ha messo in chiaro la faccenda quanto basta) mette in considerazione quella porzione di forza viva, che nella collisione dei corpi molli in tutto, o in parte s'estingue, impiegandosi nelle mutue contusioni, e nell'alterar la figura dei corpi medesimi, passando in questa guisa ad essere forza morta, la quale se allora viene per così dire a risuscitare, come accade nei corpi elastici, ci fa chiaramente comprendere verificarsi nell'uno, e nell'altro caso il canone del Leibnizio.

A di-

(*) Fu composto questo Schediasma l'anno 1736., come chiaramente apparisce da una lettera dell'Autore al Sig. Abate Giuseppe Suzzani, e da varie risposte dello stesso Sig. Abate. Il Padre Vincenzo Riccati lo ha inserito nel suo Dialogo sopra le forze vive, e sopra le azioni delle forze morte stampato in Bologna l'anno 1749. Così parla l'Interlocutor Lelio alla pagina 386. „ Non devo ricevere quella lode, che non è mia. Tutta questa speculazione mi è stata suggerita, e privatamente comunicata dal Conte Jacopo Riccati.

A disegno io mi servo di questo esempio, dipendendo da esso una buona parte di ciò, che sono per dire. Tutti i Matematici concordano, che l'azione d'un fluido contro un corpo duro abbia a misurarsi colla massa del fluido stesso moltiplicata nel quadrato della velocità. Tutti altresì confessano succedere lo stesso effetto, o che il fluido percuota il corpo duro, o che il corpo cammini con pari celerità per lo fluido stagnante. Quanto alla seconda proposizione può essa passare per un assioma, ma della prima non è stata data sin ora una compiuta dimostrazione.

Il Sig. Mariotte la discorreva nella seguente maniera. La forza d'un fluido è tanto maggiore, quanto è più grande la velocità, con cui le sue particelle si muovono; dunque da un canto questa forza è proporzionale alla velocità medesima: ma dall'altro canto se nel fluido viene accresciuta la celerità, con un maggior numero delle sue parti in un dato tempo percuote il solido, e questo numero di parti percotenti serba la ragione della velocità stessa; dunque considerati i due elementi, l'azione intera del fluido sarà in proporzione composta della sua velocità, e del numero delle parti, che agiscono nel tempo dato, vale a dire in ragione duplicata della velocità medesima.

Pare, che i Leibniziani non dovessero ammettere l'addotta dimostrazione, e taluno potrebbe persuadersi, che a norma dei loro principj s'avesse piuttosto a discorrere così. L'azione del fluido si misura dalla forza della percossa, e dal numero delle particelle, dalle quali in un dato tempo il corpo duro viene percosso: ma questo numero sta in ragione della velocità stessa; dunque l'intera azione del fluido è proporzionale al cubo, e non al quadrato della velocità.

Chi in tal guisa pensasse, andrebbe errato di lunga mano; ma per soddisfare alla difficoltà, che sembra a prima vista insuperabile, è d'uopo dimostrare il seguente

TEOREMA.

Le azioni d'un fluido, che urta in un corpo duro con differenti velocità, o quelle d'un solido, che cammina con velocità diverse per un fluido quieto, sono in ragione dei quadrati delle velocità stesse.

Sia il parallelepipedo ABC (Fig. 107.), il quale cominci a muoversi con una data velocità per un fluido stagnante, ed avanzi cammino per lo spazio infinitamente piccolo BE: egli è certo, che in virtù di questo moto viene cacciato di luogo il fluido contenuto nel sito BH, e viene spinto innanzi colla stessa velocità, con cui il solido di passo in passo cammina, non essendoci altra differenza fra la velocità del solido prima dell'urto, e quella del solido, e del fluido insieme dopo l'urto, se non d'una quantità infinitesima, stante l'ipotesi assunta. Se dunque il solido perde di velocità, mentre il fluido a poco a poco ne va acquistando, siamo nel caso, in cui deono necessariamente aver luogo le leggi delle comunicazioni dei moti.

Sup:

Supponiamo primieramente, che la predetta comunicazione si faccia colle regole già note dei corpi molli. E giacchè le masse del solido ABC, e del fluido BH, stante che essi corpi anno per base comune il rettangolo EH, sono in ragione composta dell'altezza AB all' altezza BE, e della gravità specifica del solido a quella del fluido; ponendo $AB = a$, $BE = s$, la gravità specifica del solido $= m$, quella del fluido $= n$, avremo la massa solida $ABC = am$, e la fluida $BH = ns$. Pongasi in oltre $= u$ la velocità, che si concepisce nel solido, prima ch'esso s'avvanzi per lo spazio minimo BE, e dopo fatto questo passo, e spinto fuori di luogo il fluido BH, la sua velocità sarà

$$= \frac{am u}{am + ns}, \text{ come si rende manifesto, adattando al nostro caso i cano-}$$

ni della comunicazione del moto fra i corpi inerti; ma la predetta velocità è parimente uguale alla velocità n meno la porzione infinitesima du , che si perde dal solido in esercitando la sua azione contro del fluido; dunque siamo pervenuti alla equazione $\frac{am u}{am + ns} = n - du$, e ri-

dotta l'equazione, $nus = amdu + nsdu$. Ma nella nostra supposizione essendosi preso per infinitesimo lo spazio BE $= s$, che equivale alla flussione $= ds$, avremo $nuds = amdu + nsdu$, o pure $\frac{nuds}{am} = du$

e moltiplicando ambi i membri per u , $\frac{Nu^2 ds}{am} = udu$. Essendo in

oltre cosa certa, che la resistenza del fluido moltiplicata nell'elemento negativo dello spazio è uguale al momento della velocità, cioè a dire $-Rds = ndu$; dunque $\frac{nu^2 ds}{am} = udu = -Rds$, ed in conse-

guenza $\frac{nu^2}{am} = R$. Quindi tanto l'azione del solido, quanto la reazio-

ne del fluido, che sono sempre uguali, e contrarie, s'esprimono per quantità $\frac{nu^2}{am}$, lo che ec.

Supponiamo in secondo luogo, che la comunicazione del moto nel nostro caso si faccia colle regole dei corpi elastici. In tale ipotesi avanzato che sia il solido per lo spazio minimo BE, la sua velocità sarà

$\frac{amv}{am} - \frac{mvs}{m} = v - dv$, e riducendo l'equazione col metodo di sopra

espresso, $-\frac{2mvdv}{am} = dv$, o sia $-\frac{2mvdv}{am} = vdv = -Rdv$; dunque

$$R = \frac{2mv^2}{am}.$$

COROLLARIO I.

E' cosa degna da essere avvertita, che si comunichi il moto dal solido al fluido o colle leggi dei corpi molli, o con quelle degli elastici, la resistenza e nell'una, e nell'altra supposizione è sempre proporzionale al quadrato della velocità, con questa sola diversità, che la resistenza nel primo caso è minore per metà paragonata con quella, che ha luogo nel secondo caso.

S C O L I O.

In passando dalla Geometria alla Fisica, resta a vedersi quale delle due accennate leggi sia più conforme al modo di operare della Natura.

Da un canto io noto, che muovendosi un corpo solido per un mezzo fluido, non succede ciò, che si osserva nell'urto dei corpi elastici, i quali dopo la percossa l'uno dall'altro si staccano. Non così fa il fluido cacciato di luogo dal solido; conciossiachè incontrando nell'atto di muoversi l'intoppo del fluido contiguo, e replicandosi di passo in passo gli ostacoli, è d'uopo, che il fluido o patisca qualche condensazione, mentre sia elastico, o almeno in qualunque caso dia transito al corpo duro muovendosi in giro, come l'esperienza ci dimostra. In oltre noi veggiamo, che i corpi duri, e massicci restano col tempo corrosi dall'urto de' fluidi anche più sottili, e per tacere degli effetti dell'acque correnti, l'aere medesimo, ch'è così raro, altera, e scioglie insensibilmente tutti i misti, facendo forza di mestruo universale. Una parte dunque della forza della percossa si consuma in agire contro la superficie dei solidi.

Dall'altro canto non c'è fluido, che di qualche forza elastica non sia dotato. Dell'aria la cosa è chiara, e gli altri fluidi, che di compressione non son capaci, mentre tieno chiusi in un vaso, spruzzati violentemente contro un corpo duro patiscono riflessione. Il punto sta, se questa forza di molla si ponga in azione, allora quando i solidi a traverso de' fluidi si fanno strada. Pare, che sia legge stabile della Natura, che insinuandosi un corpo, ed aprendosi il passaggio per mezzo un

al-

altro o solido, o fluido, la comunicazione del moto si faccia con i cannoni dei corpi molli, ed inerti. Ne abbiamo un indicio nella luce, la quale, sebbene è dotata d'una perfetta virtù elastica, non ostante ciò in penetrando un qualche mezzo diafano o liquido, o consistente, ci fa chiaramente comprendere, che le sue refrazioni prendono regola dall'accennata legge dell'urto dei corpi molli, come all'opposto le sue riflessioni dall'altra legge dell'urto dei corpi elastici manifestamente dipendono.

Ma perchè c'insegua l'esperienza non andar mai disgiunta la refrazione dalla riflessione, e che lo stesso diafano in parte permette il passaggio al lume, che si refrange, ed in parte riflettendolo vi si oppone; dobbiam conchiudere, che avendosi a computare l'intera resistenza, con cui il diafano fa contrasto all'azione della luce, è d'uopo l'unire insieme ambe le leggi delle comunicazioni del moto, e stabilirne una terza. Anche sulla materia, di cui trattiamo, non essendoci in Natura nè corpi perfettamente molli ed inerti, nè (trattane forse la luce) corpi isquisitamente elastici, i primi de' quali non sieno dotati di qualche minimo grado di forza elastica, come si ricava dal suono muto, ed ottuso, che si sente nell'atto della percossa; ed i secondi non sieno soggetti a qualche piccola contusione, o almeno non trattengano in se stessi a causa del tremito, che dura dopo l'urto, una qualche porzione di forza; è cosa chiara, che parte della forza viva si cambia in morta, spendendosi in ammaccare, ed in agire contro la superficie del solido, e parte si conserva in passando da un corpo all'altro, o in facendo, che il fluido si rifletta, e si pieghi in varj moti irregolari, e tortuosi.

Quindi io son di parere, che niuna delle due leggi accennate abbia luogo in Natura, ma che in maniera si contemperino, che ne nasca in fra due una di mezzo, e che la resistenza sia maggiore di quella, che richiedono i corpi perfettamente molli, e minore dell'altra, ch'è propria dei corpi perfettamente elastici. Tutta dunque l'alterazione considererà nel modificare il coefficiente $\frac{n}{am}$, che dovrà moltiplicarsi

per un numero rotto maggiore dell'unità, e minore del binario.

Crederci, che con qualche accurata esperienza si potesse trovare il prossimo, se non il preciso: ma alla resistenza, che nasce dall'inertzia della materia, e su cui abbiamo sin'ora versato, dee aggiungersi l'altra nascente dalla tenacità, la quale io so, e ne ho una dimostrazione, che sebbene in qualsivoglia fluido è sempre diversa, è però nello stesso mezzo sempre costante, qualunque si finga essere la velocità.

COROLLARIO II.

Non farà fuori di proposito l'avvertire, che sul principio del moto il solido urta nel fluido quieto, ma nel progresso cacciando di luogo le particelle fluide, e queste comunicando il moto alle più vicine, e di mano in mano alle più lontane, viene a camminare per un mezzo, che si muove anch'esso con qualche celerità per la medesima direzione. In questa guisa si sminuisce bensì alquanto la resistenza, ma non si muta la legge, avendosi a far il computo sulla velocità relativa del solido rispetto a quella del fluido, succedendo lo stesso, come se il corpo duro camminasse con una celerità minore di quello, che in fatti ha, e con essa si aprisse la strada per mezzo un liquido quieto, e stagnante.

COROLLARIO III.

In qualunque modo, e per qualsivoglia dei canoni già messi in considerazione facciasi la comunicazione dei moti tra il solido, e il fluido, resta s'io non m'inganno, confermata la legge Leibniziana intorno le forze vive. E la ragione si è, perchè se nelle leggi della comunicazione del moto tanto fra corpi molli, quanto fra gli elastici, senza ricorrere alla sentenza del Leibnizio, non ponno salvarsi i Fenomeni, nè si può spiegare, onde nasca la contusione nei primi, nè l'accrescimento di forza, che succede talvolta nell'urto dei secondi; egli è manifesto, che la stessa opinione dee aver luogo anche nell'azioni del fluido contro il solido, o nelle resistenze, con cui ai solidi s'oppongono i fluidi; stante che dipendono queste necessariamente, come s'è fatto vedere, dai Canoni della comunicazione dei moti.

SCHE-

SCHEDIASMA XXIX. (*)

PROBLEMA.

Data in qualsivoglia modo la forza centripeta per la distanza dal centro, e messa la resistenza in ragione composta della velocità attuale duplicata, e della densità del fluido, investigare le leggi della discesa d'un grave.

STando ferme le condizioni del quisito, ci si presenta la formola generale $-fds + cn^2 \Delta ds = u du$, in cui f ci espone la forza centrale, S lo spazio da trascorrersi sino al centro, Δ la densità del mezzo, ed u la velocità attuale. Per separare le incognite, preparata la formola giusta il metodo a me familiare, sarà $-fds = n^2 \cdot \frac{du - c \Delta ds}{n}$.

Faccio $c \Delta ds = \frac{dx}{x}$, onde essendo Δ dato per s , sia data altresì per x

la spezie x , ed avrò $-fds = n^2 \cdot \frac{du - dx}{n x}$. Metto poi $\frac{du}{n} = \frac{dx}{x} = \frac{dp}{p}$,

ed integrando, $lu - lx = lp$, e passando dalle quantità logaritmiche alle comuni, $u = xp$, ed $u^2 = x^2 p^2$. Quindi fatte le opportune sostituzioni, $-fds = \frac{n^2 dp}{p} = x^2 p dp$, o pure $-\frac{fds}{xx} = p dp$, e sommando,

$$2 \int -\frac{fds}{xx} = p^2 + g: \text{ ma } p^2 = \frac{u^2}{x^2}; \text{ dunque } 2x^2 \int -\frac{fds}{xx} = u^2 + gx^2.$$

La costruzione dipende generalmente dai logaritmi, e dalle quadrature; e se la densità si finge costante, ciò non altera punto l'operazione: come altresì per i varj casi di ascesa, e di discesa basta mutare i segni del più, e del meno. Appresso la soluzione serve a misurare il moto del pen-

(*) Si ricava da una lettera 23. Luglio 1738. del Co. Giordano Riccati al Padre D. Ramiro Rampinelli, che in quel tempo era stato dall'Autore scritto il presente Schediasma.

350
pendoli in qualunque curva, e specialmente nella Cicloide; sopra di che ho fatto alcune scoperte sin ora non osservate.

E perchè negli incontri particolari si facilita l'effezione geometrica, ne prendo per mano un esempio. Ceda il grave per una verticale verso il proprio centro, e sia la densità del mezzo in proporzione reciproca della lontananza dal centro medesimo, cioè $\Delta = \frac{n}{s}$, e di più la

gravità accelerante come qualsivoglia dignità della menzionata distanza; ovvero $f = as^m$. Regolando su tali dati la formula, trovo $c\Delta ds =$

$$\frac{cnds}{s} = \frac{dz}{z}; \text{ dunque } s^{nc} = z, s^{anc} = zx, \text{ e perciò}$$

$$2s^{anc} \int -\frac{as^m ds}{s^{anc}} = n^2 + gs^{anc}. \text{ In questo mentre si rinviene la quan-}$$

$$\text{tità } \int -\frac{as^m ds}{s^{anc}} = -\frac{as^{m-anc+1}}{m-2cn+1}; \text{ dunque } -\frac{2as^{m+1}}{m-2cn+1} = nn + gs^{anc}. \text{ Ora}$$

sa d'uopo determinare la costante aggiunta g . Quando il grave comincia a discendere, si trova rimoto dal centro per la linea data b , ed allora $n = 0$, con che l'equazione si riduce a $-\frac{2ab^{m+1}}{m-2cn+1} = g b^{anc}$, ov-

$$\text{vero } -\frac{2ab^{m-2cn+1}}{m-2cn+1} = g; \text{ laonde l'espressione principale piglia la seguen-}$$

$$\text{te forma } \frac{2ab^{m-2cn+1} s^{anc} - 2as^{m+1}}{m-2cn+1} = n^2.$$

Qui non vogliono trascurarsi alquanto determinazioni. Prima di tutto stabilisco l'esponente $m = 0$, onde la gravità si assuma come costante, e si modifichi l'equazione come segue $\frac{2ab^{-2cn+1} s^{anc} - 2as}{-2cn+1} = nn$;

$$\text{Se farà } c = 1, n = 1, \text{ avremo } \frac{2as - 2as^2}{b} = n^2, \text{ il qual luogo è all'ellissi}$$

ordinaria. Cominciando pertanto il moto alla distanza del centro segnata b , passa dalla celerità nulla alla massima corrispondente alla metà del suo viaggio $= \frac{b}{2}$, indi perdendo il mobile a poco a poco la
ve-

velocità acquistata, giunto al suo centro si ravvifa in istato di quiete; similmente stando intatta la resistenza proveniente dal quadrato della velocità, e la coefficiente $c = 1$, se si muta la densità del mezzo, e sia n un qualunque numero intero, ed assertivo (conciossiachè ripugna, che si assuma negativo) egli è evidente, che sarà negativo il binomio $-2n+1$, e che l'equazione piglierà l'aspetto $b^{2n-1} s = s^{2n}$.

$$= \frac{2n-1}{2n} \cdot b^{2n-1} s^{2n-1}. \text{ Anche qui, la velocità è nulla in due casi;}$$

vale a dire nel cominciamento del moto, quando $s = b$, e nel fine, mentre il mobile giunge al centro, ed è $s = 0$. Per rinvenire poi la massima ordinata delle infinite curve locali, prese le differenze nell'ultima espressione, e fatta la flussione $du = 0$, nascerà l'equazione

$$b^{2n-1} ds = 2ns^{2n-2} ds, \text{ o pure } \frac{b}{\frac{1}{2n-1}} = s, \text{ assai, a cui risponde}$$

la massima applicata; o la massima velocità:

Si noti, che quanto è più grande la quantità $2n$, altrettanto vassà impicciolendo la grandezza $\frac{1}{2n-1}$, ch'è il denominatore della frazione $\frac{b}{\frac{1}{2n-1}}$, discostandosi sempre più da $\frac{b}{2}$, ed avvicinandosi a $\frac{b}{1}$, per

la qual causa lasciato cadere il peso dalla sublimità b , può intervenire, che trascorso qualsivis minor spazio, acquisti esso la velocità massima, la quale totalmente non perda, se non se pervenuto che sia al proprio centro, e compiuto un lunghissimo viaggio. Ma assunta la $2n$ minore

dell'unità, quanto il predetto denominatore $\frac{1}{2n-1}$ sarà più grande, altrettanto sarà più piccola la frazione $\frac{b}{\frac{1}{2n-1}} = s$, e conseguente-

mente si accosterà al centro la massima celerità; di modo che potrà venir guadagnata dal grave nello scorrere per un lunghissimo tratto, e poi

352
poi perduta nell'avanzar cammino per un quanto si voglia minimo spazio. In questo mentre fatta infinitesima la coefficiente n , la velocità massima corrisponderà al centro verificandosi allora l'espressione

24. $b - s = u^2$, e la scala delle celerità crescenti acquistate da un peso libero da ogni resistenza sarà la parabola Apolloniana, conforme la dottrina del Galileo.

Non debbo trascurare l'ipotesi di $n = \frac{1}{2}$. Ripetuta la formola

generale $\frac{2ab^{-2n+1}s^{2n} - 2as}{-2n+1} = u^2$, e surrogata in iscambio di $2n$ l'uni-

rità, la cosa si riduce a $\frac{a}{s} = u^2$. In tale incontro egli è d'uopo ri-

correre ai logaritmi, ed ommessa l'Analisi, metto anzi gli occhi la costruzione. Sia (Fig. 108.) A il centro, AB la sublimità, B il principio della discesa, per il qual punto passi il ramo d'una logaritmica decrescnte BDF, la di cui tangente sia $= a$ indice della gravità costante: dico, che il rettangolo ACD è sempre uguale al semiquadrato della velocità, dalla quale resta affetto il mobile nel punto C, dopo aver percorso lo spazio BC. Anche nella supposizione, che abbiain per le mani, la velocità oltre l'esser zero nel punto B, tale sarà altresì nel centro A; perchè assunta Ac inassegnabile, il rettangolo di Ac nell'asintoto infinito AG è una grandezza minore di qualsivisia data.

Per ben concepire l'economia di questi moti, fa di mestieri determinare le scale delle forze attualmente acceleranti, e ritardanti, il che si consegue col prendere la gravità costante espurgata dalle resistenze, e col descrivere le scale stesse, che farebbono discendere il grave colle medesime leggi di celerità nel vano. L'impulso vero sollecitante si misura dall'apotome $a = \frac{u^2 n}{s}$, la quale moltiplicata nell'elemento

$-ds$ dello spazio decrescnte ci dà il momento della velocità $u du$:

Ora per le nostre formole si ha $\frac{2ab^{-2n+1}s^{2n} - 2as}{-2n+1} = u^2$; dunque nell'

la suddetta apotome sostituito in iscambio di u^2 , il suo valore, si trova $a = \frac{2anb^{-2n+1}s^{2n-1} + 2an}{-2n+1} = F$, impressione variabile, che real-

mente accelera, e poscia ritarda il grave per tutto il corso della c
du- a^2

duta, ovvero $\frac{a}{-2n+1} = \frac{2anb^{-2n+1}}{-2n+1} = F$. A questo passo anno a

distinguerli due casi, secondo che la coefficiente $2n$ è maggiore, o minore dell'unità; perchè se si desse uguaglianza, bisogna come ho detto valersi dei logaritmi.

Nel primo caso essendo negativa la quantità $-2n+1$, ci si presenta l'espressione $\frac{2ans^{2n-1}}{2n+1 \cdot b^{2n-1}} = \frac{a}{2n-1} = F$. Sia pertanto (Fig. 109.)

A il centro, AB la sublimità $= b$, e col vertice A intorno l'asse AB s'intenda descritta la parabola ADC, che soddisfaccia all'equazione

$$\frac{2ans^{2n-1}}{2n-1 \cdot b^{2n-1}} = y. \text{ Pongasi } BE = \frac{a}{2n-1}, \text{ e dal punto E si tiri la retta}$$

EF parallela alla verticale BA, che tagli la curva nel punto D, indi conducansi a BA le normali DG, FA parallele all'applicata CB. Nel principio della caduta si ha la forza centrale $EC = a$, gravità costante, che poi dall'ostacolo delle resistenze si va minorando; così che nel punto D la forza agente si pareggia colla resistente, e diventa nulla. Ivi cessando l'accelerazione, si rinviene la massima velocità, ed in progresso cominciando il ritardamento cagionato dalle impressioni negative contenute nel trilineo DFA, si perde passo passo la celerità acquistata, che s'uguaglia a zero nel centro A, purchè, come succede nella nostra ipotesi, la somma delle forze positive esposta dall'area DEC sia pari a quella delle negative espressa per l'area DFA.

Ciò si verifica ogni qual volta l'area parabolica ABC si eguaglia al rettangolo AE; conciossiachè detrazto dall'una parte, e dall'altra il comune trapezio misto compreso dalle tre rette DE, EB, BA, e dalla curva DA, rimangono eguali fra loro i due trilinei DEC, DFA. Ora abbiamo l'elemento dell'area parabolica $\frac{2ans^{2n-1} ds}{2n-1 \cdot b^{2n-1}} = y ds$, ed inte-

grando, $\frac{as^{2n}}{2n-1 \cdot b^{2n-1}} = \int y ds$, e posta $s = b$, ABC spazio parabolico =

$\frac{ab}{2n-1}$: ma anco il rettangolo AE si misura col prodotto $\frac{a}{2n-1} \cdot b$; dun-

que s'è provata l'uguaglianza del rettangolo AE con l'area ABCD, e conseguentemente dei due trilinei DEC, DFA.

Facendomi strada al secondo caso, cioè a dire quando la spezie $2n$ è minore dell'unità, ed è positivo il binomio $-2n+1$, mi si presenta la forza variabile $F = \frac{a}{1-2n} - \frac{2anb^{1-2n} s^{2n-1}}{1-2n}$, ed atteso che

l'esponente $2n-1$ è negativo, la curva locale nascente dalla equazione seguente $\frac{2anb^{1-2n} s^{2n-1}}{1-2n} = y$ sarà una iperboloide, ch'io suppongo

delineata (Fig. 110.) dentro gli assintoti BA, AH. Metto poscia BE $= \frac{a}{1-2n}$, e tiro la normale EF intersecante la curva nel punto D.

Ad esso, o sia a G corrisponde la massima celerità, e l'aggregato di tutte le impressioni positive, ed acceleranti è compreso dallo spazio CED, siccome quello delle ritardanti, e negative dall'area estesa all'infinito IDFH, le quali due superficie sono fra loro eguali.

Spesse volte le verità dimostrate ci compariscono innanzi sotto l'aspetto di paradossi. Primieramente la scala delle forze centrali acceleranti si esponga (Fig. 111.) per la retta CD parallela alla linea BA della caduta, e colle ordinate all'iperbola volgare IF descritta fra gli assintoti BA, AG s'esprimano le densità variabili del mezzo, onde la resistenza in qualunque punto H s'abbia moltiplicando l'applicata HF nel quadrato della velocità acquistata dal mobile nel sito H. Io voglio supporre, che in tali circostanze il grave pervenuto al centro A si trovi in istato di quiete. Ora minorata a mio piacimento la densità del mezzo, onde mi venga rappresentata dalla iperbola analoga ef, male la discorrerei, s'io dicessi, che non alterandosi nè punto nè poco l'impressione sollecitante BC, mentre la densità più grande del fluido fa, che il corpo pesante si riduca alla quiete nel centro A, la indefinitamente più picciola si comporterà in maniera, che lo stesso corpo giunto in A sarà fornito d'un qualche grado di velocità finita. La dimostrazione mi ammonisce, che non debbo fidarmi di questo raziocinio, quantunque a prima vista plausibile.

Secondariamente tengo ferma la scala EF delle densità, ed altresì quella della gravità costante CD, e posto che in sì fatta posizione perda il mobile nel centro A tutta la velocità guadagnata colla caduta, parerebbe, che accresciuto l'impulso accelerante, mettendo la gravità costante multipla di a , o di BC, si avesse ad ottenere, che in A camminasse il grave con una data celerità. E pure la cosa non è così; perchè aumentata sempre più la gravità, tanto e tanto il peso non si avvanzerà mai a scorrere qualsivoglia minimo spazio al disotto del centro A.

Ap-

Appresso si determini la sublimità AB o più lunga; o più corta, ed anche o massima, o minima fisicamente, avranno sempre luogo le verità enunziate.

In terzo luogo posso fingermi estenuata quanto mi piace la densità del fluido resistente, che non ostante ciò, arrivato che sia il grave al centro A, sarà privo affatto di moto. Che se la densità stessa diventerà infinitesima, allora il mobile resterà affetto da una velocità finita e

sposta per $\sqrt{2ab}$. Ecco dunque una spezie di salto, per cui si passa da una grandezza nulla ad una determinata. Trovo l'ipotesi, che fa la ve-

locità $= \sqrt{2ab}$, mettendo $n = 0$, e trovo l'altra, che stabilisce la velocità $= 0$, ponendo n uguale a qualunque quantità finita o grande, o piccola: ma cerco iudarno la supposizione, che mi dia nel centro

una celerità minore di $\sqrt{2ab}$. Svanisce il paradosso, ogni qual volta si riflette, che allo sminuirsi della spezie n , o della densità del mezzo, ne nasce un doppio effetto, cioè a dire, che la velocità massima ricresce accostandosi sempre più rispetto alla sua grandezza a quella, che

ha luogo nel vuoto, e si esprime per $\sqrt{2ab}$; ed in oltre, ch'essa velocità massima va sempre più avvicinandosi al centro. Presa pertanto l'abscissa variabile AG (Fig. 112.) nell'ipotesi, che al punto G corrisponda la massima velocità, per le cose dette di sopra ci si presenta l'equazione locale $\frac{b}{2n} = S$, curva appartenente al genere delle

$$\frac{1}{2n^{2n-1}}$$

percorrenti, o esponenziali, per costituire la quale si dee ricorrere ai logaritmi. Noto però, che fatta $n = 0$, anche S diventa zero, e posta n infinita, si trova $s = b$; e la ragione si è, perchè la quantità

$$\frac{1}{2n^{2n-1}}, \text{ ovvero } \frac{1}{2n} = \sqrt{2n} \text{ s'eguaglia all'unità. Principia dunque}$$

la curva dal punto A, ed è assintotica rispetto all'orizzontale BC, come la delineata ADE. In questo mentre essendo $n = \infty$, la velocità massima si rinviene nulla nel punto B, e mentre sia $n = 0$, essa massima celerità rispondente al centro A si misura dal prodotto $\sqrt{2ab}$. Per la qual causa ne'punti intermedj, per esempio G, giacchè n si fa uguale ad una quantità data, la predetta velocità massima GF spettante al punto G starà dentro i limiti stabiliti.

Le conclusioni fin qui rapportate anno luogo con le debite modificazioni in infinite ipotesi differenti, e specialmente in quella, nella

Y y 2

quale

quale la forza centripeta si assume proporzionale alla distanza dal centro, onde sia $m=1$, e la formola generale $\frac{2ab^{m-2n+1}s^{2n}-2as^{2n+2}}{m-2n+1} = nS$

si tramuti nella particolare $\frac{2ab^{m-2n+1}s^{2n}-2as^{2n+2}}{2-2n} = n^2$. In due incontri si

trova nulla la velocità, e messa $s=b$, e qualora nel centro diventa $S=0$. Fatta $2n=1$, si scopre l'equazione $2as - \frac{2as^2}{b} = \frac{n^2}{b}$, simi-

lissima a quella, che ci si è affacciata nella antecedente supposizione della gravità costante, posta ivi però la grandezza $2n=2$, e mentre la sublimità b nell'uno, e nell'altro caso faccia figura d'unità. Cosa curiosa si è, che presa la gravità o costante, o pure variabile in ragione delle lontananze dal centro, se nella prima supposizione la resistenza si espone per $n^2 \cdot \frac{1}{s}$, e nella seconda per $\frac{n^2}{2} \cdot \frac{1}{s}$, la scala delle celerità

può essere la medesima. Ora altronde io so, che non variata punto la densità del mezzo $= \frac{1}{s}$, la resistenza dipendente dall'inerzia della ma-

teria, se ne fluidi elastici s'espone per n^2 , in quelli, che sono privi d'elasticità, debbe esprimersi per $\frac{n^2}{2}$.

Ho soddisfatto al Problema proposto, calcando le vestigia impresse da' Geometri di prima linea: ma per dir il vero si racchiude nel progresso dell'analisi una tacita supposizione, e consiste nel fingere, che il mezzo fluido resistente al moto del solido sia affatto spogliato di gravità, e che tutto l'intoppo derivi solamente dalla densità, e dall'inerzia. Mentre non si ammetta in Natura la materia sottile del Cartesio, egli è manifesto, che l'ipotesi mal si accorda colla Fisica. Dove poi ci guidi la correzione di sì fatta licenza, io per ora non prendo la briga d'investigarlo.

SCHEDIASMA XXX. (*)

PROBLEMA.

Del moto dei pendoli a Cicloide, posta la resistenza del mezzo in ragione duplicata dell'attuale velocità.

DIScenda la ghianda del pendolo dal punto di quiete B (fig. 113.); e vada accelerandosi il moto per gli archi crescenti BD della Cicloide: egli è certo, che s'io esporrò il peso assoluto della predetta ghianda, o per dir meglio (quand'essa è collocata in un fluido dotato di gravità) il suo peso specifico, e relativo per il doppio diametro del cerchio governatore della curva, la forza tangenziale sollecitante il mobile in qualsivoglia punto, per esempio D; mi verrà rappresentata dall'arco DC, che va a terminare nel punto infimo della Cicloide: dalla qual forza continuamente applicata dee sottrarsi quella della resistenza, che nella nostra ipotesi è proporzionale al quadrato della attuale velocità, e per il prodotto nu^2 generalmente si espone. Quindi chiamati S gli spazj trascorsi come BD, ed a l'arco intiero CB, avremo la formula fondamentale (1°) $ads - sds - nu^2ds = udu$.

E quì prima di passar oltre non voglio lasciar d'avvertire, che mentre il pendolo dopo esser disceso per l'arco BC è obbligato a salire per l'arco BE, la nostra espressione differenziale, che serve per la discesa, non patisce alcuna alterazione nel caso della salita. La ghianda monta in virtù dell'impeto impresso, e vi si oppone tanto la sollecitazione della gravità, quanto la resistenza del mezzo. La prima in qualunque punto E è uguale all'arco CE, e si esprime per $s - a$, e la seconda per nu^2 ; dunque moltiplicando ambo queste quantità per l'elemento crescente dello spazio $+ds$, e poscia uguagliandole al momento decrecente della velocità $-udu$, troveremo $sds - ads + nu^2ds = -udu$, o sia $ads - sds - nu^2ds = udu$.

Per separar le variabili nella equazione (1°) misse, e confuse; metto in opera i miei soliti artifizj. Prima d'ogni altra cosa faccio $z = \log$.

z , e differenziando, $ds = \frac{dz}{x}$, e dopo questa surrogazione preparo l'e-

quazione nella seguente maniera.

(1°)

(*) Con lettera in data de' 5. Marzo dell'anno 1732. comunicò il Conte Jacopo al Sig. Abate Suzzì la soluzione del presente Problema.

$$(2^a) \frac{adx}{x} - \frac{dx}{x} lz = n^2 \cdot \frac{du}{u} + \frac{ndx}{x}.$$

In secondo luogo pongo $\frac{du}{u} + \frac{ndx}{x} = \frac{dp}{p}$, e sommando $lu + nlx = lp$;

e passando dalle grandezze logarithmiche alle comuni, $ux^2 = p$. Sostituiti nella equazione (2^a) questi valori, nasce la

$$(3^a) \frac{adx}{x} - \frac{dx}{x} lz = \frac{n^2 dp}{p} = \frac{pdp}{x^2 n},$$

attesochè $n^2 = \frac{pp}{x^{2n}}$, e moltiplicando tutti i termini per x^{2n} , risulta la

$$(4^a) x^{2n-1} dx - x^{2n-1} dz/x = pdp,$$

nella quale sono separate le incognite.

Per integrare l'ultima formola, si richiede un poco d'industria, e massimamente per iscanfare l'imbarazzo delle quadrature, e ridurre la cosa a semplici logarithmi. Considero, che il primo termine $x^{2n-1} dz$, ed il terzo pdp ammettono una spedita integrazione; ma per quello appartiene al secondo $-x^{2n-1} dx/x$, questo da se solo non è agevolmente sommabile; può però rendersi tale aggiungendoci un altro termine, cioè a dire $-x^{2n-1} dz$; conciossiachè l'aggregato dei due ter-

mini $-x^{2n-1} dz/x - \frac{x^{2n-1} dz}{2n}$ si riduce all'integrale $-\frac{x^{2n}}{2n}$.

Frattanto perchè non resti turbata l'egualità dell'espressione (4^a) è d'uopo d'aggiungere, e di sottrarre nel primo membro la quantità $\frac{x^{2n-1} dz}{2n}$ nel seguente modo,

$$(5^a) x^{2n-1} dz + \frac{x^{2n-1} dz}{2n} - x^{2n-1} dz/x - \frac{x^{2n-1} dz}{2n} = pdp.$$

Facendosi poi strada alla integrazione, avrassi, non ommessa l'aggiunta della costante c , $\frac{x^{2n}}{4n} + \frac{x^{2n}}{2n} - \frac{x^{2n}}{2n} = \frac{p^2}{2} + c$; ma $p^2 = u^2 x^{2n}$; dun-

que

que surrogato questo valore, ed istituita la divisione di tutti i termini per z^n , e la moltiplicazione per $2n$,

$$(6^a) \frac{2an + 1}{2n} - lz - \frac{2nc}{z^{2n}} = na^2 = r.$$

Ora abbiamo a fissare il valore della costante c . Nel principio del moto, vale a dire nel punto B, tanto la velocità u , quanto la resistenza r si trova uguale a nulla, come altresì lo spazio S , o sia il logaritmo z , e conseguentemente in questa supposizione $z = 1$. Sottituiti i valori già determinati nella equazione (6^a) , si scoprirà

$$c = \frac{2an + 1}{4nn}, \text{ e } 2nc = \frac{2an + 1}{2n}, \text{ e si avrà la compita soluzione con}$$

tenuta nella espressione

$$(7^a) \frac{2an + 1}{2n} - \frac{2an + 1}{2n z^{2n}} = lz + r = S + r,$$

e ponendo $1 - \frac{1}{z^{2n}} = y$, troveremo $\frac{2an + 1}{2n} y = S + r$, la qual

equazione si convertirà facilmente nell'analogia $1 : a + \frac{1}{2n} :: y : S + r$

Poteva io servirmi d'un'analisi assai più ristretta, particolarmente dappoichè la soluzione più estesa, che prima mi è venuta alle mani, mi ha fatto venire in cognizione del risultato, e così praticano spesso siate certi Autori per occultare in parte il metodo: ma io ho voluto guidare il Lettore per quella medesima strada, che da me è stata battuta, avanti ch'io sapessi a qual termine fosse essa per condurmi. Per dir il vero la costruzione riuscirà semplicissima, purchè si osservi, che essendosi fatto lo spazio $s = l \cdot z$, e di più $1 - \frac{1}{z^{2n}} = y$, s'io prenderò

per ascisse gli spazj crescenti s , e per ordinate le variabili y , la curva locale indi nascente farà una logaritmica, che avrà per tangente costante una quantità $= \frac{1}{2n}$. Sia $1 - x = y$, e perciò $x = \frac{1}{z^{2n}}$,

io $z = x^{-\frac{1}{2n}}$; e $lz = lx^{-\frac{1}{2n}}$ Prese le differenze;

$$\frac{dx}{x} = ds = \frac{1}{2n} \frac{dx}{x}; \text{ dunque } \frac{dx}{dx} = \frac{1}{2n}, \text{ lo che ec.}$$

COSTRUZIONE.

Tutto il giro della costruzione si restringe in tirare due parallele indefinite GH, IK (Fig. 113, 114.) distanti per la normale GL, che fa figura d'unità, e può farsi uguale all'arco semi-cicloidale BC, da cui ci viene messa sotto gli occhi la gravità specifica della ghianda del pendolo oscillante in un mezzo grave, e resistente. Per il punto G segnato ad arbitrio passi la logaritmica *Glmno*, di cui sia asintoto la linea IK, e sotto toccante la retta esposta per $\frac{1}{2n}$: egli è manifesto,

che alle abscisse GL, GN espresse nella nostra analisi per l'indeterminata *S* risponderanno le ordinate LI, Na rappresentate per *y*. Facciamci a vedere cosa dalla costruzione si ricavi.

1. Discenda il pendolo dal punto di quiete *b*, e dopo aver camminato per l'arco *bc* in discendendo, ascenda per l'arco *Ce*, e si fermi nel sito *e*: dimandasi il valore della resistenza in qualunque punto di mezzo per esempio *d*. Abbiasi sotto l'occhio l'analogia

$$1 : a + \frac{1}{2n} :: y : s + r, \text{ e facciasi } GQ = bc = a, \text{ a cui si aggiunga}$$

la QH uguale alla tangente della logaritmica, e condotta la normale HK, e la diagonale GH, si prenda uguale all'arco *bd* l'abscissa GL, a cui risponda l'ordinata LI, e per il punto *l* passi la retta T/R parallela alla KG incontrando l'asse prodotto nel punto R: io dico, che l'intercetta GR ci dinota la resistenza $r = nu^2$, per cui il fluido s'oppone alla ghianda nel punto segnato *d*.

2. E perchè la secante TR taglia sempre la curva in due punti, cioè a dire nel punto già determinato *l*, ed in un altro per cagion d'esempio *n*, si deduce, che la medesima resistenza GR corrisponde a due archi cicloidali diversi, il primo de' quali si è *bd*, ed il secondo si trova, assumendo la curva *bCe* uguale all'abscissa GN.

3. Che se i due punti *n*, *l* s'andassero sempre più accostando, fino a farsi infinitamente prossimi; allora la secante TR si convertirebbe nella toccante Um S parallela alla KG, e lasciata cadere dal contatto *m* l'applicata mM, al punto D (posto l'arco *bd* = all'abscissa GM) converrà la massima resistenza GS.

4. Si osservi in questo mentre, che la diagonale GK interseca la logaritmica ne' due punti G, o; cosicchè condotta l'ordinata Go, e fatto l'arco *bCe* uguale alla retta GO, nei due siti *b*, ed *e* si scopre nulla la resistenza; lo che non può intervenire, salvo che nei due punti di

di quiete. Dunque cadendo la ghianda dal punto di riposo b , monterà fino al punto e , e l'ascissa GO ci darà la misura dell'arco bCe descritto dal pendolo parte nella discesa per bC , e parte nell'ascendimento per Ce .

5. La curva per tanto delle resistenze è una specie d'ellissoide, che principiando dal punto G si va allontanando dall'asse, fino ad acquistare la massima ordinata uguale all'intercetta GS , indi si ripiega, e discende, congiungendosi di bel nuovo con l'asse nel punto O , e ci viene rappresentata dalla curva $G XO$.

S C O L I O I.

Che la curva delle resistenze abbia un massimo, ci vuole poca fatica ad iscoprirlo. Essendo la resistenza nel punto di quiete $b=0$, mentre la forza accelerante si esprime per l'arco bC , e crescendo la prima in ragione duplicata della velocità attuale, che il pendolo di passo in passo si va acquistando, nel tempo medesimo, che la seconda decresece continuamente, quanto più il mobile s'accosta al punto C ; ci sarà necessariamente un sito per esempio D , in cui la forza sollecitante sarà pari alla resistente.

Per tutto lo spazio bD la ghianda acquisterà sempre nuovi gradi di celerità; perchè quella porzione della gravità, che opera per le direzioni delle tangenti, supera la reazione del mezzo. Tutto all'opposto nei punti di mezzo fra D , e C il pendolo dee ritardarsi, essendo maggiore la forza negativa, che fa contrasto, della positiva, che accelera. Quanto poi la velocità cala, altrettanto si minora colla legge assegnata la resistenza; dunque la massima velocità, e la massima opposizione sarà nel punto D , in cui le predette forze operanti in senso contrario si suppongono eguali. Perciò la resistenza nel punto assegnato s'esprimerà per l'arco DC , con cui si misura parimente la forza sollecitante, e lo spazio passato bD più la resistenza DC sarà uguale all'arco costante bC , che va a finire nel punto infimo della cicloide: le quali particolarità esponendosi in termini analitici ci danno $s+r=a$, ovvero $a-s=r$.

Quindi nella curva delle resistenze $G XO$, per avere la massima Mx , basterà condurre dal punto Q l'inclinata QX , che si pieghi verso l'asse QG con un angolo semiretto.

Fratanto essendo per le cose dette la resistenza SG più lo spazio percorso GM uguale all'arco $bC=GQ=a$, e stante la similitudine de' triangoli SmM , VmP verificandosi l'analogia $SM=a : Mm=y :$

$VP = \frac{1}{2n} : Pm = 1-y$, passeremo all'equazione $a - ay = \frac{y}{2n}$, che

ridotta ci dà il valore di $Mm=y = \frac{2an}{2an+1}$, e di $Pm=x = \frac{1}{2an+1}$.

Un'altra proprietà si osserva nella premessa legge di resistenza: Pongasi, che la massima velocità della ghianda corrisponda al punto D: io dico, che pervenuto il pendolo al punto più basso C conserverà in se stesso qualche grado di velocità; laonde dovrà necessariamente reciprocamente, qualunque sia il valore della coefficiente n .

La nostra formula ci dà in qualunque punto dell'asse GO,

$$\frac{2an+1}{2n} \cdot r = s+r: \text{ ma nel punto M corrispondente alla massima resi-}$$

stenza MX il valore dell'ordinata Mm si trova $= \frac{2an}{2an+1}$, dunque fatta

la surrogazione, si scopre $\frac{2an+1}{2n} \cdot Mm = s+r$. Osservando poi-

scia, che la logarithmica Gmo tanto maggiormente si discosta dall'asse GO, quanto più crescono le abscisse; egli è certo, che nel punto Q corrispondente all'infimo C della cicloide, l'applicata QZ è più grande di Mm: perciò in tal caso la quantità $\frac{2an+1}{2n} \cdot QZ$ è maggiore di s ;

ed essendo nell'incontro medesimo l'abscissa GQ = a , ne siegue, che la grandezza $\frac{2an+1}{2n} \cdot QZ - a$ è positiva: la quale uguagliandosi alla re-

sistenza $r = nu^2$, ci dimostra, che il quadrato u^2 è una quantità affermativa, e che la ghianda conserva nel punto C una velocità finita, per cui il pendolo viene obbligato ad ascendere.

E da ciò si conchiuda, che messo il pendolo una volta in moto (supposta la legge di resistenza, che abbiain per le mani) continua egli a reciprocare senza mai fermarsi. Di fatto per quanto sia vicino al punto più basso C, quello per esempio D, da cui la ghianda comincia a discendere, arrivata ch'essa sia in C mantiene in se un qualche grado di celerità, dal quale sarà costretta a salire per una qualunque, sebbene talvolta minima porzione della curva Cf. E così tornando sempre a discendere, e a rimontare, non si ridurrà mai ad uno stato di perfetta quiete. Ciò s'intenda detto in puro rigore di Geometria, e non già per quello appartiene alla Fisica, attese parecchie circostanze, dalle quali il Matematico suole prescindere.

S C O L I O III.

Il Sig. Cav. Nevvton, e dopo lui il Sig. Ermanno anno dimostrato alla loro maniera, che l'area intiera della scala delle resistenze compresa dall'asse GO, e dalla curva GXO è uguale alla metà della differenza, che passa fra i quadrati degli archi θC , Ce , per il primo de' quali discende il pendolo, ed ascende per il secondo.

Anche questa verità può dedursi dalle nostre formule; conciossiachè abbiassi giusta la determinazione de' citati Scrittori la semidifferenza de'

predetti quadrati $as - \frac{s^2}{2} = \int rds$: ma stante la mia equazione fonda-

damentale $a + \frac{1}{2n} \cdot y - s = r$, e moltiplicando tutti i termini per l'e-

lemento ds , $a + \frac{1}{2n} \cdot yds - sds = rds$, ed integrando, $a + \frac{1}{2n} \cdot$

$\int yds - \frac{s^2}{2} = \int rds = as - \frac{s^2}{2}$; dunque $a + \frac{1}{2n} \int yds = as$:

In questo mentre lo spazio logaritmico $GmoO$ esposto per $\int yds$

si fa essere uguale alla quantità $s - \frac{1}{2n} y$; dunque $a + \frac{1}{2n} \cdot s - \frac{1}{n} y$

$= as$, ed espurgata l'equazione, $a + \frac{1}{2n} y = s$: conclusione, che da

noi si trova col porre semplicemente nella nostra formula $r = 0$, e che ci fa vedere come da una verità all'altra si faccia passaggio.

S C O L I O IV.

Dalle cose dette possiamo inferire, che le oscillazioni più e meno estese ne' nostri pendoli cicloidal non si compiono in tempi uguali, e che mal s'accoppia la legge delle resistenze in proporzione dei quadrati delle velocità con un esatto isocronismo. Per dimostrare questa verità, s'intenda la cicloide BCF (fig. 113., e 115.) distesa in una retta uguale GPH, e supponendo, che il pendolo si parta dal punto di

Z z z

que-

quiete B, e descriva in una intiera oscillazione l'arco BCE, indi reciprocando l'arco ECb, e di bel nuovo l'arco bCe, e così di mano in mano, prendansi le tre rette GI, IL, LN eguali a' predetti archi, e si concepiscano delineate le scale delle resistenze tali quali sono da noi state determinate, e che ci sieno rappresentate dalle curve GMI, IOL, LeN. Quindi passino per il punto P corrispondente all' altro C le due linee gPh, iPl, che si taglino in croce, e si pieghino verso l'asse GH con un angolo semiretto, e finalmente si compiano i triangoli rettangoli, come nello schema.

Egli è certo, che le impressioni acceleranti nella discesa, e ritardanti nell' ascendimento comunicate alla ghianda dalla sua natural gravità, e che agiscono nella curva BCF per le direzioni delle toccanti, ci vengono esposte di passo in passo per le ordinate dei triangoli PGg, PIK. A cagion d'esempio, dopo esser disceso il pendolo dall' arco Bb uguale all'abscissa GL, nel punto b si trova sollecitato dalla forza tangenziale espressa per LQ: ma avendosi da questa a sottrarre la resistenza dinotata per LT, ne siegue, che nel suddetto punto b la forza accelerante purgata dalle resistenze, ci viene rappresentata dall' intercetta TQ. Messa dunque la LU = TQ, se faremo passare per il punto V, ed altri in simil maniera determinati la curva gURK, sarà essa la scala delle attuali sollecitazioni, per cui si regola il moto prima accelerato, e poi ritardato del pendolo.

L'andamento di questa curva è noto per le cose di sopra avvertite: conciossiachè nel punto G rispondente al punto B, l'ordinata Gg è uguale all'arco BC esprimente la gravità specifica intiera, che opera nel punto B senza intoppo di resistenza. Discende poscia la curva, accostandosi sempre più all'asse fino ad intersecarlo nel punto R, sito in cui la resistenza è massima, ed uguale alla forza tangenziale: indi si estende con un'altro ramo al di sotto, allontanandosi dall'asse, e terminando nel punto K, il quale corrisponde al punto I, o sia al punto E, dove tutto il moto si estingue. Tra li due limiti R, P analoghi agli altri due D, C la resistenza supera la forza, che agisce per la tangente, ed in conseguenza la velocità della ghianda si va minorando: ma fra gli altri due P, I, ovvero C, E ambo le predette forze cospirano a distruggere il moto acquistato, ed ogni applicata negativa alla curva per esempio NX in cambio d'essere uguale alla differenza tra le due mentovate azioni, trovasi formata dalla loro somma. Perciò essendo l'area Gg UR l'aggregato di tutte le impressioni acceleranti, e l'area RXXI quello di tutte le ritardanti, accederà, che le predette aree sieno fra loro uguali; richiedendosi un cumulo pari di forze morte tanto per generare, quanto per estinguere una data forza viva.

Ma quando il pendolo reciprocando percorre l'arco ECb uguale alla retta IPL, fingasi descritta la curva iSl, che ci metta sotto gli occhi la scala di quegli impulsi, da quali viene per tutto l'arco ECb la ghianda attualmente sollecitata, ed a questa curva le riflessioni già fatte

s'adattino. In altra occasione ho dimostrato (a), che le oscillazioni per gli archi BCE, ECb, bCe, ec. non ponno mai compiersi in tempi uguali, se le scale gRK, sI, ec. delle forze attualmente, e successivamente applicate al mobile non sono curve simili. E se così è, simili altresì esser debbono quelle delle resistenze GMf, IOL, ec. la ragione consiste in ciò, ch'essendo parimente simili i triangoli gGP, PIK, PLQ, ec., che sono le scale delle forze tangenziali, non possono mai per via di addizione, o di sottrazione generarsi curve simili, se prima fra le generatrici non si conserva la somiglianza.

Posta per tanto la similitudine, siccome richiede l'ipotesi dell'isocronismo, fra le curve GMf, IOL, ec., le loro aree saranno in ragione duplicata delle corde GI, IL, ovvero degli archi BCE, ECb: ma le predette aree si sono nello scolio precedente provate uguali alla metà delle differenze fra i quadrati degli archi BC, CE, ed EC, Cb; dunque posti i predetti $BC=a$, $CE=p$, $Cb=q$, ci si presenterà la

seguente analogia $a+p : p+q :: a^2 - p^2 : p^2 - q^2$, dalla quale col mezzo d'una facile deduzione si ricava quest'altra $a : p :: q$, e s'inferisce, che gli archi BC, CE, Cb, ec. costituiscono una continua progressione Geometrica.

Si perde dunque una quantità proporzionale di moto in un numero pari di vibrazioni, sieno esse o grandi, o picciole, che così richiedono gli archi decrescenti in serie geometrica: ma ciò ripugna alle esperienze Nevvtoniane, che si considerano in progresso. Perciò o le vibrazioni d'un pendolo a cicloide non sono isocrone nel pieno, o le resistenze non seguitano la proporzione, che passa fra i quadrati delle velocità, o quello che mi sembra più ragionevole, niuna di queste due leggi esattamente si verifica.

S C O L I O V.

Il Sig. Cavalier Nevvton nei Corollarj alla Proposizione 31. lib. 2. de' suoi Principj propone una regola generale, cioè che posta la resistenza r come qualsivoglia dignità n^a della velocità, gli archi successivamente descritti dal pendolo alzati alla medesima potestà sono proporzionali alle loro differenze. Se questo canone almeno prossimamente non discorda dalla verità; ne siegue, che chiamati x , y , z i tre archi BCE, ECB, bCe percorsi dalla ghianda immediatamente l'uno dopo l'altro, avremo l'analogia $x^n : y^n :: x-y : y-z$, per mezzo della quale si scopre il valore del terzo arco z , supposti noti i due primi, indi colla stessa regola il valore del quarto, e così di mano in mano viene a formarsi la progressione degli archi decrescenti.

Ora

(a) Schediasma XXIII., Lemma 1

Ora io noto, che postè le resistenze in ragione duplicata delle velocità, ed i quadrati degli archi come le loro differenze; quanto più piccioli sono gli eccessi d'un arco sopra dell'altro immediatamente prossimo, altrettanto la nostra serie s'accosta ad una armonica, e sarebbe esattamente tale, ogni qual volta le differenze fossero minime, ed inassegnabili. Veggasi il lodato Sig. Nevvton alla Proposizione 5.^a del citato libro. Ci valeremo dunque di questa supposizione fisicamente giusta con tanta maggior confidenza, quanto che andiamo in traccia del prossimo, e non dell'esatto.

Premesso ciò, bisogna farsi a sciogliere il seguente Problema. Sia il pendolo circolare BCI (fig. 116'), di cui s'è servito il mentovato Scrittore nelle sue osservazioni registrate allo Scolio generale della suddetta Proposizione 31., e partasi la ghianda dal punto di quiete B, descrivendo nella prima oscillazione l'arco BCD computate le resistenze, indi nella seconda l'arco DCE, e l'arco ECF nella terza, e così di seguito, sin tantochè in un numero determinato di vibrazioni si percorra nell'ultimo ascendimento l'arco dato CH, ed il pendolo abbia perduta una data porzione del suo moto: si cerca qualmente abbiano ad esprimersi gli archi BCD, DCE, ec. per una continuata progressione armonica.

Se il pendolo si vibraffe nel vano, monterebbe sino al punto I, e l'arco BCI sarebbe doppio di BC: ma nel pieno non oltrepassa il punto D; dunque fatto l'arco BCI = $2a$, s'esprimerà l'arco BCD per $\frac{1}{1+x}$ quantità $\frac{2a}{1+x}$, e gli archi susseguenti, che debbono costituire una

progressione armonica, per le frazioni $\frac{2a}{1+2x}$, $\frac{2a}{1+3x}$, $\frac{2a}{1+4x}$ ec., nelle

nelle quali stando i numeratori costanti, crescono i denominatori in serie aritmetica. Ma perchè il numero delle oscillazioni = n si suppone noto, e conseguentemente anche il numero de' termini componenti la progressione, ne segue, che l'ultimo arco GCH ci verrà esposto dalla frazione $\frac{2a}{1+nx}$, ed essendo l'arco CH = b , sarà altresì noto l'arco

GH, che per via di adeguazione è doppio di CH; dunque ci si affaccerà l'equazione $\frac{2a}{1+nx} = 2b$, dalla quale si cava il valore di $x = \frac{a-b}{nb}$,

e posta $a-b=c$, farà $x = \frac{c}{nb}$. La nostra serie armonica cammine-

rà per tanto nella seguente maniera.

$$\frac{2a}{1 + \frac{c}{nb}}, \frac{2a}{1 + \frac{2c}{nb}}, \frac{2a}{1 + \frac{3c}{nb}}, \frac{2a}{1 + \frac{4c}{nb}}, \text{cc. } \frac{2a}{1 + \frac{mc}{nb}}.$$

Quando si fa $n=m$, il termine $\frac{2a}{1 + \frac{c}{nb}}$ è precisamente $= 2b$:

$$\frac{2a}{1 + \frac{c}{nb}}$$

In questo mentre facciamci strada ad un altro Problema. Continuando il pendolo le sue reciprocazioni, e finalmente giunga a descrivere l'arco KCL, il quale sia in data ragione all'arco BCI $= 2a$: si domanda quante oscillazioni richiedonsi per ottenere, che la ghianda venga a percorrere il detto arco KCL $= 2g$. Facciasi $\frac{2a}{1 + \frac{mc}{nb}} = 2g$, ed in

$$\frac{2a}{1 + \frac{mc}{nb}}$$

virtù di questa equazione si cerchi il valore del numero delle vibrazio-

zioni posto $= m = \frac{a - g \cdot bn}{2g}$.

Ma perchè abbiamo a valerci degli sperimenti fatti colla sua famosa accuratezza dal tante volte lodato Cavalier Nevvton, fa di mestieri dalle formule antecedenti dedurre il seguente Teorema.

Si parta il pendolo dal punto di quiete E, e dopo parecchie oscillazioni nell'ultimo ascendimento descriva l'arco CF, di modo che posti gli archi CE, CD uguali, perda la quantità del moto espressa per la differenza FD, che all'arco CE, o CD abbia una data relazione. Similmente calando la ghianda dal punto di riposo K, e fatto l'arco CL $=$ CK, compiuto che sia un numero qualunque di vibrazioni, monti nell'ultima salita per l'arco CM, e perda la quantità del moto esposto per la differenza ML, con questa condizione però, che si serbi l'analogia DF : DC :: LM : LC; laonde per una parte, o per l'altra si perda una quantità proporzionale di moto giusta la frase Nevvtoniana: io dico, che come l'arco DC all'arco LC, così reciprocamente il numero delle vibrazioni, per cui si perde la quantità del moto DF, al numero delle vibrazioni, per cui si perde la quantità del moto LM, persistendo però nella supposizione, che gli archi decrefcenti costituiscano, come s'è detto di sopra, una progressione armonica.

In

In fatti assumendo, che il pendolo cominci il suo moto dal punto B, e si sappia per esperienza, ch'egli perde una data porzione di moto in un dato numero di vibrazioni, montando ultimamente per l'arco CD; posso determinare in quante oscillazioni giunge esso a descrivere prima l'arco EC, e poi l'arco CF. Prefa per mano la nostra ultima formula

$$\frac{a-g}{g} \cdot \frac{bn}{c} = m, \text{ in essa avremo } a = \text{all' arco BC, } b = \text{all' arco CD;}$$

$c = a - b =$ alla differenza ID, ed $n =$ al numero noto delle vibrazioni, nelle quali si perde il moto ID: ed oltre ciò la spezie g ci rappresenterà l'arco EC, ed m il numero cercato delle vibrazioni, compiuto il quale descrivesi dalla ghianda lo stesso arco EC.

Ora se noi chiameremo G l'arco CF, ci si presenterà la seconda equazione, cioè $\frac{a-G}{G} \cdot \frac{bn}{c} = M$, e sottratti l'uno dall'altro i membri

$$\text{delle due equazioni, } \frac{a}{G} \cdot \frac{bn}{c} - \frac{bn}{c} - \frac{a}{g} \cdot \frac{bn}{c} + \frac{bn}{c} = M - m, \text{ cioè}$$

$$\frac{a-a}{G} \cdot \frac{bn}{g} = M - m = x, \text{ esprimendosi per } x \text{ il numero delle oscil-}$$

lazioni, in cui il pendolo, che si parte dal punto di quiete E, arriva a descrivere l'arco CF, e perde la parte di moto espressa per DF.

Collo stesso giro di discorso, chiamando f l'arco KC, ed F l'arco CM, scopriremo, che il numero delle oscillazioni y , per cui si perde la porzione di moto ML, ci viene rappresentato dall'equazione

$$\frac{a-a}{F} \cdot \frac{bn}{f} = y, \text{ e voltate le due equazioni in una proposizione, avrassi}$$

$$\frac{a-a}{G} \cdot \frac{a}{g} : \frac{a-a}{F} \cdot \frac{a}{f} :: x : y : \text{ ma per l'ipotesi } G : g :: F : f; \text{ dunque se sarà}$$

$$G : g :: F : f :: x : y, \text{ troveremo } \frac{a-a}{G} \cdot \frac{a}{pG} : \frac{a-a}{F} \cdot \frac{a}{pF} :: x : y, \text{ o sia}$$

$$\frac{ap-a}{pG} : \frac{ap-a}{pF} :: x : y, \text{ vale a dire i due numeri delle vibrazioni, in cui}$$

si perde una quantità proporzionale di moto, in ragione reciproca degli archi $EC : KC$: lo che doveva dimostrarsi.

S C O L I O VI

Posso presentemente paragonare quanto risulta dal calcolo con ciò, che mi dà l'esperienza, e vedere nel tempo medesimo fino a qual segno l'ipotesi assunta s'accorda colle operazioni della Natura.

Fra le molte osservazioni del Sig. Nevvton io ne scelgo due fatte nell'aria, siccome le più esatte, e le più compiute. Nella prima si faceva uso d'un globo di legno, il cui diametro era di dita $6\frac{7}{8}$

misura di Londra, ed il peso d'oncie Romanæ $57\frac{7}{22}$, sospeso da un

tenuè filo, in maniera che tra il punto di sospensione, ed il centro d'oscillazione del globo ci fosse l'intervallo di piedi dieci, e mezzo. Lasciato cadere il pendolo da varj punti di quiete B, G, K, onde i primi archi di discesa BC, GC, KC fossero in ragion dupla, cioè di dita 64, 32, 16, 8, ec., si notava diligentemente il numero delle vibrazioni, nelle quali in qualunque caso si perdeva l'ottava, o la quarta parte del moto; così che per cagion d'esempio descrivendosi dal globo il primo arco $BC = CI$, giungesse esso a percorrere dopo un dato numero d'oscillazioni nell'ultimo ascendimento l'arco CD, e la differenza DI fosse l'ottava, o la quarta parte dell'arco primiero BC.

Atteso che gli archi costituiscono una serie geometrica decrescen- te, il cui esponente è uguale al binario per le cose da me dimostrate nell'ipotesi, di cui si fa parola, i numeri delle vibrazioni dovrebbero altresì formare una progressione crescente dello stesso genere, la quale però assai discorda dalla speranza, come appare dall'annessa tavola.

Archi di prima discesa ——— 64. 32. 16. 8. 4. 2.

Archi d'ultimo ascendimento — 56. 28. 14. 7. $3\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}$.

Vibrazioni secondo il calcolo — $9\frac{2}{3}$. $19\frac{1}{3}$. $38\frac{2}{3}$. $77\frac{1}{3}$. $154\frac{2}{3}$. $309\frac{1}{3}$.

Vibrazioni giusta l'esperienza — $9\frac{2}{3}$. $18\frac{1}{2}$. $35\frac{1}{2}$. 69. 121. 164.

Archi di prima discesa ——— 64. 32. 16. 8. 4. 2.

Opere Ricc. Tom. III.

A a a

Ar.

Archi d'ultimo ascendimento — 48. 24. 12. 6. 3. $1\frac{1}{2}$.

Vibrazioni secondo il calcolo — $22\frac{2}{3}$. $45\frac{1}{3}$. $90\frac{2}{3}$. $181\frac{1}{3}$. $362\frac{2}{3}$. $715\frac{1}{3}$.

Vibrazioni giusta l'esperienza — $22\frac{2}{3}$. $41\frac{2}{3}$. $83\frac{1}{3}$. $162\frac{1}{2}$. 272. 374.

Nella seconda sperienza dal medesimo filo lungo piedi $10\frac{1}{2}$ pendeva una palla di piombo di due dita di diametro, e di peso d'onze Romane $26\frac{1}{4}$. Eccone il risultato.

Archi di prima discesa 64. 32. 16. 8. 4. 2. 1.

Detti d'ultimo ascendimento 56. 28. 14. 7. $3\frac{1}{2}$. $1\frac{3}{4}$. $\frac{7}{8}$.

Vibrazioni secondo il calcolo 30. 60. 120. 240. 480. 960. 1920.

Dette giusta l'esperienza 30. 53. $90\frac{1}{2}$. 140. 193. 228. 226.

Archi di prima discesa 64. 32. 16. 8. 4. 2. 1.

Detti d'ultimo ascendimento 48. 24. 12. 6. 3. $1\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$.

Vibrazioni secondo il calcolo 70. 140. 280. 560. 1120. 2240. 4480.

Dette giusta l'esperienza. 70. 121. 204. 318. 420. 518. 510.

S C O L I O VII.

Sopra gli addotti calcoli non sarà fuori di proposito il fare alcune curiose annotazioni. Quando gli archi sono assai grandi, vanno essi decrescendo sensibilmente in una progressione armonica, e con tale pre-

precisione, che nulla più. Nella prima esperienza quel pendolo ³⁷¹, che percorre un arco di dita 64 nella sua prima discesa, si riduce a descrivere un'arco d'ultimo ascendimento di dita 56. in vibrazioni n°.

$9\frac{2}{3}$: si dimanda in quante oscillazioni seguendo il nostro computo si ridurrà a salire per un arco di dita 48. La formula dello scolio quinto ci dà generalmente $\frac{a-g}{g} \cdot \frac{bn}{c} = m$, la quale limitata giusta i dati,

o la ragione, che passa fra le quantità a, b, g, c , rinviene al n°.

$2\frac{1}{3} = m$, o pure $9\frac{2}{3} \cdot 2\frac{1}{3} = 22\frac{2}{9} = m$, numero pochissimo diver-

so dall'altro $22\frac{2}{3}$ somministratoci dallo sperimento.

Similmente se nella seconda tavola dell' antecedente scolio il pendolo del piombo si riduce dalle dita 64. alla 56. in oscillazioni n°. 30,

a norma del nostro canone moltiplicando il n°. 30. per $2\frac{2}{3}$ scopriremo,

che in 70. vibrazioni sarà obbligato a salire per un arco di dita 48. ma in tante appunto nè più nè meno è successo l'effetto per testimonianza del Sig. Nevvton; dunque negar non si può, che almeno nelle maggiori reciprocazioni dei pendoli abbia luogo la serie armonica.

Quanto più gli archi diventano piccioli, tanto più questa legge si discosta dall'esperienza, ed in progresso si allontana con tali eccessi, che il numero delle oscillazioni, che avrebbero ad impiegarsi, è qualche fiate più che quadruplo di quelle, che in fatto si osservano. Ha dunque ragione lo Scrittore citato di asserire. *Resistentia globi, ubi celerius moventur, est in duplicata ratione velocitatis quam proxime; ubi tardius, paulo major, quam in ea ratione.*

S C O L I O VIII.

Considerato l'andamento più da presso, e penetrando più addentro nella ricerca, mi metto sotto gli occhi le seguenti progressioni crescenti

1°. $a, x, 2x-a, 3x-2a, 4x-3a$ serie aritmetica

A 2 2 2

2°. a

2^a. $a, x, \frac{x^2}{a}, \frac{x^3}{a^2}, \frac{x^4}{a^3}$ serie geometrica

3^a. $a, x, \frac{ax}{2a-x}, \frac{ax}{3a-2x}, \frac{ax}{4a-3x}$ serie armonica

4^a. $a, x, y, u, z.$

5^a. $a, x, p, q, r.$

Queste due ultime progressioni da me tali si assumono; che nella quarta sia come il quadrato del primo termine a quel del secondo, così la differenza fra i due primi termini a quella, che passa fra il secondo, ed il terzo, e così successivamente, cioè come

$a^2 : x^2 :: a - x : x - y$, e come $x^2 : y^2 :: x - y : y - u$, ec.

Nella quinta poi voglio, che i termini di mano in mano sieno in ragione triplicata delle loro differenze, vale a dire come

$a^3 : x^3 :: a - x : x - p$, e come $x^3 : y^3 :: x - p : p - q$, ec.

Le progressioni di simil genere tutte così si costruiscono. Sia

$a^m : x^m :: a - x : x - y$; dunque $a^m x - a^m y = ax^m - x^{m+1}$, ovvero $x - \frac{x^m}{a^{m+1}} + \frac{x^{m+1}}{a^m} = y$. Dati pertanto i due primi termini a, x , per

aver il terzo, si contino nella progressione geometrica tanti termini, ommesso il primo, quante unità sono contenute nell'esponente $m+1$, indi sommati insieme il secondo e l'ultimo, dall'aggregato di essi si sottri il penultimo, ed il residuo sarà il terzo termine della nostra progressione. Per esempio sia $m=2$: prendo i tre termini $x - \frac{x^2}{a} + \frac{x^3}{a^2}$,

gli estremi col segno affermativo, ed il medio col negativo, ed ho il valore della quantità ignota y . Chi volesse poi il quarto termine u , perverrebbe all'equazione $y - \frac{y^2}{x} + \frac{y^3}{x^2} = u$, e così seguitando all'in-

finito.

In cercando il terzo termine della quinta serie, dispongo le quattro grandezze proporzionali $x, \frac{x^2}{a}, \frac{x^3}{a^2}, \frac{x^4}{a^3}$, e scelta la prima, la per-

ultima, e l'ultima coi segni appropriati, dico essere $p = x - \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^5}{a^4}$

Quello che fa presentemente a mio proposito si è; che nelle progressioni di sopra esposte, fissati i due primi termini a , x in ciascuna di esse uguali, il terzo dell'aritmetica $2x - a$ sarà minore del ter-

zo $\frac{x^3}{a}$ nella geometrica, e questo altresì minore del terzo $\frac{ax}{2a-x}$ nell'ar-

monica, il quale resterà superato dal terzo $y = x - \frac{x^3}{a} + \frac{x^5}{aa}$ della

quarta serie, e finalmente il terzo $p = x - \frac{x^3}{a^2} + \frac{x^5}{a^4}$ della quinta sarà

maggiore del terzo y della quarta. Ciò si verifica in tutti i termini, che compongono le colonne verticali delle predette progressioni, siccome ce ne può convincere il calcolo, senza che io mi prenda pensiero di dedurre la dimostrazione, che ci condurrebbe troppo lontani dal nostro soggetto.

Premesse queste necessarie avvertenze, si può francamente conchiudere, che preso per primo l'arco $BCI = a$, per secondo l'arco $BCD = S$, il quale nella prima oscillazione dal pendolo si percorre, e per terzo l'arco immediatamente susseguente DCE ; questi tre archi mal vengono espressi da' primi tre termini della serie quarta, e peggio da quei della quinta. La ragione si è, perchè se quando gli archi si assumono di picciola estensione, i termini, che compongono la terza progressione armonica, si discostano per lungo tratto dall'esperienza; tanto maggiormente si scosteranno que' termini, che formano le due serie inferiori, i quali crescendo quantunque di poco sopra quelli della terza c'infegnano, che ci vorrebbe un maggior numero di vibrazioni, di quello che portano i calcoli da noi fatti, perchè la ghianda perdesse una data porzione di moto: e pure gli esperimenti ne richiedono uno assai minore, siccome dalle tavole si rende manifesto.

E se così è, le resistenze dei mezzi fluidi, che fanno contrasto al moto dei pendoli, non istanno dentro i limiti tra il quadrato, ed il cubo delle attuali velocità, conforme dover intervenire nei corpi solidi, che per linea retta camminano, abbiain dimostrato, mentre però il fluido cacciato di luogo si trovi costituito in riposo. Bisogna dunque ricorrere a leggi, ed a limiti affatto differenti, che colla scorta dell'esperienza si anderanno investigando.

Sul principio del moto negli archi grandi la resistenza sta in proporzione duplicata della velocità, ma presto si riduce a tale, che gli archi successivamente descritti costituiscono una serie armonica. In pro-

grei.

gresso poi facendosi gli archi di mano in mano percorsi sempre più piccioli, si varia la progressione, disponendosi essi in certe serie ignote, che stanno di mezzo tra l'armonica, e la geometrica, allontanandosi nel proseguimento sempre più dalla prima, ed avvicinandosi alla seconda.

Merita la cosa, che si ponga in tutto il suo lume. Rimettiamoci a memoria, che se gli archi decrefcenti fossero disposti in una continua progressione geometrica, accaderebbe, che il pendolo tanto nelle reciprocazioni grandi, quanto nelle picciole verrebbe a perdere una quantità proporzionale di moto dopo compiuto un numero pari di oscillazioni. A cagion d'esempio se per la seconda tavola il globo da un arco di dita 64. passa ad un altro di dita 56. in trenta vibrazioni; in altrettante precisamente sarebbe transito da un arco di dita 32. a quello di dita 28, e da un arco di dita 16 a quello di dita 14, e così di seguito. Quali sieno in simili circostanze i numeri delle vibrazioni, che rispondono alla ragione armonica, e quelli, che ci vengono somministrati dall'esperienza, la tavola ce lo dimostra, ed il risultato apparirà dal seguente computo.

Vibrazioni secondo la

ragione Geometrica	esperienza	ragione armonica	esperienza
1 ^a . 30	30 + 13	60	60 - 7 = 53
2 ^a . 30	30 + 60 $\frac{1}{2}$	120	120 - 29 $\frac{1}{2}$ = 90 $\frac{1}{2}$
3 ^a . 30	30 + 110	240	240 - 110 = 140.
4 ^a . 30	30 + 163	480	480 - 287 = 193.
5 ^a . 30	30 + 198	960	960 - 732 = 228.

Avuto riguardo per una parte agli eccessi, e per l'altra alle differenze, si scopre, che nel principio del moto, quanto le vibrazioni s'estendono per uno spazio più grande, l'esperienza s'accosta più da vicino alla ragione armonica: ma nel progresso, qualunque sia l'andamento, l'approssimazione si volta dalla parte della serie geometrica, e tanto se le avvicina, ch'egli è necessario, che prima con quest'ultima si confonda, e poi se la lasci addietro, ogni qual volta potessero continuarsi le osservazioni sino agli archi minimi, ed al senso della vista totalmente impercettibili.

Io ne ricavo la prova dal fatto: conciossiachè se l'arco KC è di due dita, per perdere l'ottava parte del moto ci vogliono 228. oscillazioni, e 518. per perdere la quarta parte. Pervenuto poi l'arco NC alla

alla misura d'un solo dito, se gli archi di passo in passo decrefcenti si disponessero a formare una serie geometrica, quello espresso per l'unità non potrebbe ridursi a $\frac{7}{8}$, ovvero ad $\frac{1}{4}$, salvo che in tante vibrazioni

nè più nè meno, quante sono esposte da suddetti numeri 218, e 518: ma per tal effetto meno se ne impiegano, bastando secondo l'esperienza nel primo caso oscillazioni 216, e nel secondo 510; dunque gli archi successivamente descritti dal pendolo si fanno minori, messi a confronto con quelli, che si adattano alla progressione geometrica: e perciò si dee conchiudere, che si faccia passaggio ad altre progressioni incognite, che stanno di mezzo fra la geometrica, e l'aritmetica, e che discostandosi sempre più l'andamento dalla prima, si vada avvicinando alla seconda, alla quale non si può mai pervenire, attesi gli assurdi, che ne nascerebbono, se non in caso, che si percorra l'ultimo spazio fisicamente infinitesimo con una minima celerità, e la ghianda si riduca alla quiete, soffrendo per questo impercettibile tratto una resistenza quasi inassegnabile, e prossimamente uniforme.

I due limiti pertanto delle resistenze vengono determinati per una parte negli archi grandi da un contrasto proporzionale al quadrato della velocità, e per l'altra in quell'arco minimo, ed ultimo, che sta di mezzo fra i confini del moto, e della quiete, da una opposizione, che si può prender per costante.

S C O L I O IX.

Io non saprei dedurre altronde la causa fisica degli addotti fenomeni, sìorchè dai moti irregolari, e dai bilanciamenti, ai quali è sottoposto il fluido per occasione dell'iterate reciprocazioni del pendolo. Egli è necessario, che le minime particelle componenti il liquido si trovino perturbate, ed agitate con direzioni parte cospiranti, e parte contrarie, senz'aver mai l'opportunità di rimettersi in una perfetta quiete. E ciò tanto più succede in fatto, quanto le oscillazioni sono più corte. Nelle più lunghe, ed estese percorrendosi archi grandi, e discendendo la ghianda per una curva assai inclinata, incontra obliquamente gli strati del fluido disposti in diversi piani, ed il moto è misto di verticale, ed orizzontale: ma nelle piccole vibrazioni gli archi declinano pochissimo dalla linea retta, ed il pendolo andando, e ritornando per brevissimi spazj comunica sempre nuovo impeto alla medesima materia, che si mantiene, per dir così, in un perpetuo flusso, e riflusso, facendosi tante riflessioni, quante sono le reciprocazioni.

Qual meraviglia è dunque, se la resistenza cresce, non già assolutamente considerata, ma relativamente alla celerità, che nella ghianda risiede? Ha notato il Sig. Nevvton, che fatto oscillare nell'acqua un pendolo, ogni qual volta il vaso, che conteneva il fluido, era troppo angu-

angusto rispetto al diametro del globo oscillante, s'aumentava la resistenza; perchè l'acqua messa in moto era obbligata a riflettersi nelle vicine pareti del vaso oltre il dovere ristretto, nè potea cedere dai lati liberamente.

Dove ho favellato delle resistenze, ho messo in considerazione i moti del mezzo, a traverso del quale il solido s'apre la strada, e ne ho cercate le leggi nei casi più semplici, o almeno i limiti, da cui vengono circoscritte. La ricerca ci può dar qualche lume nel presente incontro, ma non già tale, che se ne possa aver il preciso, a causa degli ondeggiamenti irregolari, e contrari, e delle velocità variabili al fluido comunicate. Una conclusione però si verifica, ed è che quando il fluido contrasta al moto del solido colla sua inerzia animata da qualche grado di celerità opposta, egli è necessario, che il corpo si riduca finalmente alla quiete.

Da tutte queste investigazioni altro non si può concludere, se non che i pendoli a cicloide, i quali anno fatto tanto onore al celebre Ughenio considerati nel vano, per averne egli prima d'ogni altro scoperte le mirabili proprietà, non sono di molto uso nel pieno, dovendosi secondo il comun consentimento de' più periti Artefici preferire i circolari di gran diametro, e che percorrano archi assai piccioli. La ragione consiste in ciò, che se fra le infinite curve ci è quella, cui convengono le oscillazioni isocrone, non ostante la resistenza del mezzo, e le stravaganti leggi, dalle quali è regolata l'opposizione, una parte minima d'un cerchio per la teorica de' raggi osculanti fisicamente combacierà, e si confonderà colla curva medesima.

SCHEDIASMA XXXI. (*)

Sopra le leggi delle resistenze, con le quali i mezzi fluidi ritardano il moto de' corpi solidi.

LA Geometria, che ne' primi tempi nata da debolissimi principj, a guisa d'un Fiume reale ricevendo col progresso dei Secoli il tributo di nuove invenzioni, s'è andata di passo in passo ingrossando, finalmente solo a giorni nostri è giunta a metter foce nell'immenso Oceano dell' infinito. Quando la quantità s'è cominciata a risolvere ne' suoi elementi infinitamente piccioli di varj gradi, e s'è scoperto il me-

(*) Questo Schediasma unitamente coll' Annotazione del Sig. Abate Conte Girolamo Lioni fu impresso l'anno 1722. nel Tomo secondo de' supplementi al Giornale de' Letterati d'Italia. Il C. Jacopo per altro vi lavorava intorno l'anno 1717. Veggasi la seconda lettera dello Schediasma XXXVII. verso il fine.

metodo analitico di maneggiarli con egual franchezza; come se fossero grandezze finite, le Scienze Fisiche, e Matematiche sono comparse in pubblico sotto un' altro aspetto; e si sono poste in tutto il loro lume tante sublimi verità, che pare aver noi, per così dire, alle mani il computo stesso della Natura.

La principale difficoltà consiste in fissare le vere leggi, di cui la sagacissima Natura nelle proprie operazioni si serve; mentre in tal ricerca sogliono frequentemente riuscir inutili i nuovi calcoli, e molti Autori di gran nome si sono contentati d'applicarli ad alcune ipotesi più verisimili, che vere, e certamente non dimostrate, oppure d'abbracciare in molti casi sotto una formula generale tutte le possibili ipotesi, per mostrare, se mai venisse a manifestarsi la vera d' averla in qualche modo prevenuta.

S'io non prendo errore, uno degli usi migliori, che possa farsi del computo differenziale, ed integrale si è, che col suo mezzo restino convinte di falso parecchie leggi naturali, che dagli Scrittori si veggono adottate come infallibili; imperocchè una ipotesi, che non sia vera, non può mai reggere a tutte le conseguenze, che da essa si deducano, altrimenti come mai potrebbe rigettarsi, se a tutti i Fenomeni esattamente corrispondesse? So per esperienza quant'intoppi si frappongano a chi s'ingegna di battere questa strada. Accade talora, che ci sieno ignoti per la maggior parte i Fenomeni, e che le osservazioni sieno quasi impossibili a farsi con accuratezza; perchè il senso ci dà il prossimo, e non mai l'esatto. Succede bene spesso, che il metodo degli infiniti sul più bello ci abbandoni, a causa della confusione delle incognite, e delle loro flussioni, e per ciò abbiamo la necessità di raggirarci per sentieri diversi, e soddisfare a cento ardui Problemi, prima che si pervenga ad un effetto noto, e palpabile, che distrugga l'ipotesi asunta, e l'assurdo, da cui va accompagnata, chiaramente ci manifesti. Molte volte si viene a capo di ciò, che si cerca, per via di pazienza, o d'industria, ma non sarebbe già maraviglia, che si dovesse ancora la sua parte al caso, ed alla fortuna, che spesso fiate ha il suo ingegno.

Io mi sono proposto d'esaminare presentemente, se quelle leggi, con cui si pretende da' Matematici di primo grido, che i mezzi fluidi s'oppongano al moto de' corpi solidi, sieno tutte vere, e tutte possano in varie circostanze aver luogo; o pure se per avventura sieno false falsissime alcune d'esse, che vengono troppo coraggiosamente vantate per certe, e per evidenti.

Affine di farmi strada a ciò, ch'io sono per dire, è da sapersi, che l'incomparabile Galileo, il quale prima d'ogni altro, seoperte con ammirabile sagacità le leggi fondamentali del moto, ci ha per così dire, spalancate le porte della Natura, ha dovuto nelle sue dimostrazioni prescindere dalle resistenze, e filosofare su i moti accelerati, come se i gravi per lo vano verso il loro centro piombassero: non già perchè egli ignorasse, che da qualunque mezzo, quanto si voglia ra:

ro, e cedente viene a poco a poco ritardata la velocità del mobile; ma perchè a' suoi tempi non avea fatti tali progressi la Geometria, che col suo ajuto si potessero ridurre a calcolo le resistenze.

Il dotto VVallis Inglese principiò a metter mano in questa astrusa materia, supponendo, che la resistenza del mezzo fusse sempre in ragione della velocità, con cui il corpo solido attualmente cammina; non già per esser l'ipotesi o la più semplice, o la più vera, ma solo perchè ad essa poteva più facilmente adattare le proprietà delle sue geometriche progressioni. Qualche tempo dopo il famoso Cristiano Ughenio fattosi a specolare sopra lo stesso soggetto stabilì una nuova regola, essere le resistenze in proporzione non semplice, ma duplicata delle velocità; canone, che sarebbe stato concordemente, e senza contraddizione ricevuto, se il celebre Isacco Nevvton con una riflessione più ingegnosa, che s'oda, combinate insieme le due mentovate leggi, non ne avesse architettata una terza. Considera egli nel fluido una doppia repugnanza ad essere penetrato, o diviso. Nasce l'una dalla massa, o sia dalla quantità della materia fluida, cui debbe il moto comunicarsi, ed è sempre proporzionale alla densità; nasce l'altra dalla difficoltà, che si prova nello staccare una particella del fluido dalle contigue, e s'appella tenacità. Resta il mobile ritardato dalla prima in proporzione duplicata della propria velocità, e dalla seconda, se si porge fede alla teorica del Sig. Nevvton, in proporzione semplice della velocità medesima; e siccome quella ha il suo luogo ne' mezzi dotati d'una perfetta fluidità; così questa in certi mezzi tenaci, e viscosi, per i quali a lento passo il corpo duro si va avanzando. Perchè poi ogni liquore, oltre la massa, di cui è composto, e da cui la forza d'inerzia dipende, ha qualche grado in se stesso di viscosità, pare, che uniti insieme i due impedimenti, un terzo ne risulti, per cui il fluido s'opponesse al moto de' solidi, parte in ragione della velocità, e parte del suo quadrato, onde abbia a formarsi la somma di queste due quantità, per ben esprimere la forza negativa, cui si dà il nome di resistenza.

Messo da parte il canone Ugheniano, spero di far toccar con mano essere gli altri due ad una chiara, e manifesta speranza direttamente contrari. E' cosa maravigliosa, che avendo il lodato Sig. Nevvton, e dopo lui, per tacer di molti altri, li Sig. Varignon, ed Ermanno maneggiati per tutti i versi le formule, che dalle accennate leggi derivano, non s'ia mai loro venuto fatto d'incontrare qualche conseguenza evidentemente falsa, ed alle operazioni della Natura ripugnante. Anch'io lungamente, e senza profitto per un labirinto di calcoli raggirato mi sono, e finalmente ho scoperto ciò, che andava cercando, con la soluzione del seguente Problema, che non è già de' più facili della Geometria.

P R O B L E M A:

Determinare nella Cicloide il moto d'un Pendolo, a cui si resista dal mezzo in ragione della velocità.

• Il tante volte lodato Sig. Isacco Nevvton, non avendo alle mani la chiave analitica per soddisfare al quisito, si fece a scioglierlo per via di conghietture; e col supporre falsamente, che la palla del pendolo partita dal punto di quiete R (fig. 117.) discenda prima per l'arco maggiore RT, e poi monti in vigore dell'impeto concepito per l'arco minore TX, distesa la curva RTX in una retta uguale rx (fig. 118.); indi prese come abscisse gli spazj crescenti rt , ry , rx , ed alzate a piombo le ordinate tn , yn , che ci rappresentino le velocità acquistate dal mobile dopo avere trascorsi i predetti spazj, si diede a credere, che la curva locale, e nascente rxz fosse una spezie d'ellisse. All'incontro il Sig. Ermanno confessò ingenuamente, che „ si resistentia sint ut ce- „ leritates acquiritur, nondum constat, qua ratione curva rxz construi de- „ beat, ne quidem concessis quadraturis figurarum curvilinearum „ e perciò sospettò, che appartenesse piuttosto alla famiglia delle trascendenti. Ma perchè entrambi si sono per lungo tratto allontanati dal vero, il loro esempio ci può servire di ammaestramento, quanto sia cosa pericolosa il porli ad indovinare in Geometria.

Sia per tanto la cicloide QTU (fig. 117.), in cui si vibri un pendolo lasciato cadere dal punto di quiete R, che in forza della sua natural gravità descriva l'arco RST, con questa condizione, che in ogni punto, per esempio S, la resistenza del mezzo sia in ragione della velocità acquistata. Pongo l'arco $TS = y$, la resistenza nel punto S $= r$, la quale essendo alla velocità in data proporzione potrà essersi con l'equazione $r = 2bu$: e perchè s'intende espressa per il doppio diametro del cerchio generatore della cicloide la gravità costante, con la quale discenderebbe a piombo il mobile per il dato fluido, qualunque ella si possa essere (mentre fu questo punto mi riferbo di scoprire un grande inganno) la forza tangenziale nel sito S da essa derivata ci verrà rappresentata dall'arco ST, e conseguentemente avremo per i canoni noti l'equazione $y - 2bu. - dy = udu$, ovvero (A) $-ydy + 2budy = udu$.

Prima di tutto è d'uopo liberare la formula della confusione delle incognite, ed io potrei a tal effetto metter in uso la bella regola già pubblicata dal dottissimo Sig. Gabbriello Manfredi ne' nostri Giornali, e ch'essere familiare ai chiarissimi Signori Bernulli da varj Schèdiasmj inseriti negli Atti degli Eruditi di Lipsia bastantemente comprendo; per cui si fa succedere felicemente la separazione delle indeterminate nelle equazioni differenziali del primo grado, ogni qual volta in tutti i termini dell'espressione gli esponenti delle quantità variabili finite montano alla stessa dimensione. Facciassi dunque $u = yx$, ed $du = yxz$; quindi prese

Bbb 2 le

le differenze, $udu = yzdx + xzdy$, e sostituiti opportunamente nella nostra espressione (A) i valori della grandezza u , e della flussione udu , avrassi $-ydy + 2bxzdy = yzdx + xzdy$, cioè $-ydy + 2bxzdy - xzdy = yzdx$, ed istituite le necessarie divisioni, $\frac{-dy}{y} = \frac{xzdx}{a-2bx+zx}$. Che

se per avventura si desiderasse una formula più facile a maneggiarsi; pongasi $b-x=z$, onde sia $bb-2bx+xx=zz$, $-bdx+xdx=zdz$, e finalmente $a-2bx+zx=a-bb+xx$; così che surrogati i valori, risulti la nuova equazione differenziale $\frac{-dy}{y} = \frac{-bdx}{a-bb+xx} + \frac{xdx}{a-bb+xx}$

L'integrazione del primo, e del terzo termine sempre s'ottiene col mezzo dei logaritmi; ma quella del secondo può essere algebrica, se sarà $a=bb$, o pure trascendente, e dipendere dalla quadratura del cerchio, quando sia a maggiore di bb , ovvero da quella dell'iperbola in caso, che l'unità a sia minore del quadrato bb . Le curve dunque infinite, che soddisfanno alla quistione proposta, sono parte del genere delle analitiche, e parte delle meccaniche, secondo il diverso valore della quantità $2b$, che paragonata con l'unità, fissa la proporzione costante tra la velocità, e la resistenza.

Fatte queste osservazioni, non sarebbe difficile passare alla costruzione: ma a me, cui non tanto cale della soluzione, quanto della sua eleganza, e semplicità, sia permesso il battere una strada diversa, e di adoprare una mia particolar maniera di sviluppare le incognite, per cui si stendono i confini del calcolo sommatorio, e con l'aiuto di cui in certi casi più ardui infinite separazioni s'ottengono, che stancherebbono per altro la pazienza di qualunque indefesso Analista, come penso di far vedere a miglior occasione.

Intanto richiamata a memoria la nostra equazione (A) $-ydy + 2bdy = udu$, facciassi $u=my-p$ (la lettera p dinota una quantità indeterminata assunta, ed m una costante da determinarsi nel progresso dell'operazione) sarà dunque $uu = mmyy - 2myp + pp$, e prese le differenze, $udu = mmydy - mydp - mpy + pdp$, e nella formula (A) sostituendo i valori trovati, di modo che svanisca la ignota u , avremo (B) $-ydy + 2bmjdy - 2bpdy = mmydy - mydp - mpy + pdp$. Stabilisco la seguente equazione $-ydy + 2bmjdy = mmydy$, ovvero $-1 + 2bm = mm$, dalla quale si ricava $m + \frac{1}{m} = 2b$. Cancellati in questo mentre nell'espressione

(B) i termini, che si distruggono, resterà $-2bpdy = -mydp - mpy + pdp$,

pdp , cioè $2b-m \cdot pdy - m y dp = -pdp$, e collocato in cambio di $2b$ il suo valore $m + \frac{1}{m}$, (C) $pdy - m y dp = -mpdp$, ed integrando non ommessa

la costante, $g + \frac{y}{p^{mm}} = \frac{mp^{1-mm}}{mm-1}$ oppure (D) $g p^{mm} + y = \frac{mp}{mm-1}$:

Per fissar poi il valore della costante g , si offervi, che nel punto R principio della discesa, supponendosi la velocità nulla, l'arco $TR = x$ diventa uguale ad una costante per esempio c , e nello stesso caso si raccoglie dall'equazione assunta $u = my - p$, che si fa $p = mc$. Se dunque nella formula (D) in vece di y , p si sostituiranno i valori c , mc , sarà $g = \frac{1}{c^{mm-1} \cdot m^{mm} + 1 - m^{mm}}$ il qual valore posto in cambio di g nell'

equazione (D), avremo (E) $\frac{mp}{mm-1} - \frac{p^{mm}}{c^{mm-1} \cdot m^{mm} + 1 - m^{mm}} = y$; e

moltiplicando tutti i termini per m , e collocando in vece di my il suo valore $u + p$ cavato dall'espressione sussidiaria $u = my - p$, sarà

(F) $\frac{p}{mm-1} - \frac{p^{mm}}{c^{mm-1} \cdot m^{mm} + 1 - m^{mm}} = u$.

Le due equazioni fondamentali (E) (F) serviranno come di base alla costruzione; ma prima sarà ben fatto il considerare alcune determinazioni, che mettono in chiaro la natura del Problema.

I. La quantità m non può mai essere negativa, e molto meno immaginaria; e ciò, perchè, stante l'equazione $m + \frac{1}{m} = 2b$, verrebbe

ad essere negativa, o immaginaria la grandezza $2b$, la quale esprimendo, paragonata con l'unità, la proporzione della resistenza alla velocità, è d'uopo, che sia reale, e positiva; altrimenti la questione sarebbe stata proposta sotto un'ipotesi impossibile.

II. Sarà pertanto necessariamente affermativo l'esponente mm : Quindi nella formula (E) fatto l'omogeneo di comparazione $y = x - z$, con questa condizione, che si formino due parziali equazioni

$\frac{mp}{mm-1} = x$, e $\frac{-p^{mm}}{c^{mm-1} \cdot m^{mm} + 1 - m^{mm}} = -z$, la prima di esse

farà al triangolo, e la seconda ad una delle infinite parabole, e non mai

mai delle infinite iperbole. Questa riflessione ha parimente luogo nella formula (F) maneggiata con lo stesso metodo.

III. Ben è vero, che l'esponente m può essere razionale, sordo, ed anche misto di quantità reali, ed immaginarie. Nel primo caso le parabole sono quasi sempre algebratiche, negli altri meccaniche, e per la loro costruzione bisogna ricorrere alla quadratura dell'iperbola, o del cerchio.

IV. La stessa perplessità s'incontra ne' coefficienti de' termini, che per il differente valore della grandezza m compariscono o assertativi, o negativi. Se $m=1$, il primo termine nell'una, e nell'altra espressione (E) (F) diventa infinito, e dobbiamo servirci dei logaritmi. Supposto m maggiore dell'unità, i primi termini nelle predette equazioni saranno assertativi, ed i secondi negativi, e le parabole descritte volteranno in tal caso all'asse la loro convessità. Ma preso m minore dell'unità, succederà tutto l'opposto: il primo termine in ambe le formule sarà negativo, e positivo il secondo, e le parabole concave verso l'asse.

V. Deesi avvertire, che la quantità m ha due valori differenti, purchè non sia eguale all'unità, nel qual caso i due valori si confondono in un solo. Negli altri casi, se un valore si trova minore dell'unità, l'altro è maggiore. Prendasi per mano l'equazione $m + \frac{1}{m} = 2b$, e se

in vece di m collocherò l'altro valore $\frac{1}{m}$, non si muterà l'equazione.

Quindi ad una sola supposizione satisfaranno due costruzioni. La Figura 119. servirà per l'ipotesi, in cui m supera l'unità, e la 120. per quella, in cui resta superato.

La terza indeterminata p , che s'è introdotta a solo fine di liberar l'equazione (A) dalla confusione delle variabili, fa un altro giuoco, e serve ad un altro uffizio, cioè di somministrarci una elegantissima costruzione geometrica. Se s'avesse a costruire la curva cercata, col prendere per ascisse gli spazi passati, o da passarsi dal pendolo, e per ordinate le velocità acquistate in qualsivoglia punto de' suddetti spazi, egli è evidente, che con un nuovo calcolo analitico sarebbe d'uopo rintracciare l'indole, e le proprietà della curva descritta. Un simile inconveniente per lo più ci si fa incontro nelle costruzioni di tutti quei luoghi, che montano ad un grado elevato, e che lineari, o più che solidi s'appellano; mentre la formula algebrica non ci presenta a prima vista, e senza il tedio d'una ulteriore ricerca la natura, e l'andamento della curva locale. Nel maneggiare, secondo le occasioni, varj Problemi, mi sono venuti in mente certi particolari artifizj, che ad infiniti casi felicemente ponno adattarsi, e che da me comunicati ad un mio stimatissimo Amico, ne ha fatto un uso sì grande, che ha superata la mia aspettazione. Uno di questi consiste nel prendere una terza variabile, che serva d'asse comune a due curve note, con le ordinate delle quali, o con

o con una determinata porzione d'asse le due incognite principali ³⁸³ s'esprimano. Il caso, su cui versiamo, ce ne somministra l'esempio, e per mezzo delle intercette in due bilinei parabolici ci verrà fatto d'esprimere la relazione, con cui gli spazi rispondono alle velocità, e vedremo, per così dire, a nascere le ascisse, e le applicate d'infinite curve parte geometriche, e parte trascendenti.

C O S T R U Z I O N E.

Con lo stesso vertice A, α (Fig. 119., e 120.) al medesimo asse AB, ab si descrivano le due parabole dello stesso esponente mm AHC, abc ; AFD, afd . Il parametro della prima sia

$$\frac{1}{c^{mm-1} \cdot m^{mm} \cdot a - m^{mm}}, \quad \text{e quello della seconda} \quad \frac{1}{c^{mm-1} \cdot m^{mm} \cdot 1 - m^{mm} \cdot e}.$$

S'inclinino all'asse AB, ab dal vertice A, α le due rette AC, ac ; AE, ae , e sia AB:BC; $ab:bc::mm-1:m$; AB:BE; $ab:be::mm-1:1$. La retta AC, ac tagli la sua parabola nel punto più lontano C, c , e la retta AE, ae incontri la propria nel punto più vicino F, f ; onde si formino li due bilinei parabolici ANCO, $anco$; ALFK, $alfk$: egli è manifesto, che se dall'intercetta NO, no presa nel bilineo ANCO, $anco$ verrà espresso l'arco ST della cicloide, l'intercetta LK, lk corrispondente nell'altro bilineo ALFK, $alfk$ esprimerà la velocità del pendolo nel punto S.

C O R O L L A R I.

I. E' cosa mirabile, che le costruzioni della Figura 119., e 120.; sebbene pajono diverse, non sono in sostanza, che una costruzione medesima. Non ostante che le parabole della Figura 119. voltino il convesso verso l'asse, e quelle della 120. il concavo, stante il doppio valore della quantità m ; contuttociò una sola è la soluzione. In fatti s'io piglierò NO $= no$, avrò LK $= lk$. Il fatto sta certamente così, e basti di averlo accennato, risparmiando per ora la dimostrazione. Considereremo pertanto semplicemente la costruzione della Figura 119., che con quella della 120. perfettamente concorda.

II. Presa la ordinata IH $=$ alla costante c vale a dire all'arco RT della cicloide, la velocità nel punto F, o sia nel punto R, principio della discesa, comparisce nulla, e ciò dipende dalla determinazione della costante g .

III. La velocità cominciando dal nulla in F va a poco a poco crescendo, fino a diventar massima nel punto K; e poi si va diminuendo; sinattantochè torna nulla nel vertice A, cioè a dire nel punto infimo della cicloide. Ivi giunto il mobile perde tutto il suo moto, e viene posto in istato di quiete.

IV. La massima intercetta nel bilineo AHCO si trova essere $IH = c$ corrispondente al punto F della velocità nulla, e la massima velocità

LK resta determinata; quando $AM = p = c \cdot m \frac{m-1}{m+1}$.

V. Quando l'intercetta LK è la maggiore fra tutte, onde viene ad esprimere la massima velocità, in tal caso l'altra intercetta ON, che dinota lo spazio da passarsi, o sia l'arco ST della cicloide, si trova precisamente uguale alla resistenza del mezzo; così che $ON = 2bw = r$. La dimostrazione si deduce finalmente dalle nostre formule.

VI. Discenda il pendolo dal punto di quiete Q, e scorra lo spazio QT; indi dal punto di quiete R, e scorra lo spazio RT: dico, che in camminare per i predetti spazj v'impiegherà tempi uguali, e la cicloide sarà isocrona anche nella nostra ipotesi. Mutata semplicemente la grandezza della costante c, si descriveranno due nuovi bilinei parabolici maggiori, o minori delli delineati nella Figura 119., e 120., ma però simili. Ora prese due figure simili, in cui dalle abscisse s'esprimano gli spazj passati, e dalle ordinate le velocità corrispondenti, è agevole a provarsi, che combinando insieme i due moti, dopo avere trascorsi spazj proporzionali, i tempi si troveranno eguali. Questa verità si trova dimostrata dal Sig. Nevvton per altra strada.

VII. Resterebbero da considerarsi alcune altre particolarità, che stando ferma la nostra ipotesi delle resistenze, appartengono al moto del pendolo nella cicloide: come se il grave principiasse a discendere dal punto Q con un grado di velocità impressa da forza estrinseca; oppure che stando in riposo nel punto infimo T, venisse violentemente spinto in alto, ed obbligato a descrivere l'arco TXU. Con alterare opportunamente le nostre formule si scopriranno le proprietà di questi moti, nè io m'inoltrerò di vantaggio, essendosi detto quanto basta intorno il geometrico.

S C O L I O.

Mi fermerò piuttosto sulle conseguenze Fisiche, che sono le più importanti, ed in grazia delle quali la soluzione del Problema è stata premessa. Il terzo, ed il quinto Corollario m'insegnano, che partendosi il pendolo dal punto di quiete R va scorrendo con moto accelerato l'arco RS ora più lungo, ed ora più breve secondo la diversa proporzione, che passa fra la resistenza, e la velocità. Abbia dunque nel punto S acquistata la velocità massima corrispondente alla massima interc-

tetta LK, continuerà esso a camminare per il restante arco ST con moto ritardato; di modo che arrivato al punto infimo T della cicloide, resterà totalmente immobile. Ciò si ricava evidentemente dalla costruzione; imperocchè esponendo l'intercetta ON lo spazio ST, e facendosi sempre minori gli spazi, quanto più s'accostano al punto T, si scopre, che essendo nel punto A nulla l'intercetta descrivente, che ci rappresenta lo spazio da scorrersi fino al vertice della cicloide, nulla è parimente l'altra intercetta, da cui la velocità nel suddetto punto T resta espressa, e così il pendolo viene posto in istato di perfetta quiete. Questa conclusione dimostrata in tutto rigore di Geometria ha un non so che del mirabile; quando massime si rifletta, che la proporzione costante della velocità alla resistenza può fingerli grande quanto ci piace; che non ostante ciò, mentre la tenacità del fluido non sia infinitamente piccola, si verificherà sempre, che il pendolo compirà il suo moto in una mezza vibrazione; nè per quanto si supponga fisicamente minima la viscosità del mezzo, il grave potrà mai passare nè meno per un brevissimo spazio la linea verticale. Disceso al sito più basso, ivi dee necessariamente fermarsi; attesochè nel luogo assegnato da questa legge di resistenza viene estinta tutta la velocità, che dalla gravità continuamente operante è stata ad esso di passo in passo comunicata.

Ora qual'è in Natura quel mezzo fluido, in cui non si trovi qualche grado di tenacità? L'aria stessa non ne va affatto esente. Viscosa è l'acqua a parere del Sig. Nevvton, e più la dolce, che la salsa secondo il Sig. Montanari. Che che sia di ciò a tutte le spezie degli ogli non può negarsi una sensibile, e manifesta viscosità; e pure ho osservato più volte un pendolo a cicloide immerso nell'olio d'uliva, o di mandorle, e lasciato cadere da un punto di quiete, reciprocamente vibrarsi, e compire un buon numero d'oscillazioni. Anche lo stesso Sig. Nevvton ammonito, cred'io, dall'esperienza, col conghietturare, che la curva delle velocità relativamente agli spazi fosse una spezie d'elissi, ha tentato indarno di accordare il canone colle osservazioni. Supposta la legge del Sig. VVallis, poco uso potrebbe farsi de' pendoli, che in tutti i mezzi, trattone l'etere Cartesiano, ed il vuoto, estenderebbono il loro moto solamente alla metà della prima vibrazione. Se dunque non erra la Geometria in tirare dai dati le conseguenze, è d'uopo rigettar come falsa l'ipotesi, da cui nascono alcune illusioni repugnanti ai Fenomeni naturali.

Nè crediamo già di poter aggiustar le partite sostituendo il canone Nevvtoniano, per cui si computa la resistenza del fluido parte in ragion semplice, e parte in duplicata della velocità: conciossiachè senza tentare la soluzione d'un altro Problema, m'ingegnerò di metter in chiaro la faccenda con una sola, e semplicissima osservazione. Quando il pendolo resta semplicemente ritardato dalla viscosità del mezzo, quantunque appena sensibile, che all'azione della gravità fa contrasto, egli è certo per le cose dimostrate, che nel punto T la velocità è nulla, ed il mobile si trova ridotto alla quiete. S'aggiunga l'altra sorta

di resistenza, che nasce dall'inerzia della materia fluida, e ne seguirà, che debilitata dal nuovo ostacolo la celerità, in qualsivoglia punto, per esempio S, sarà minore di prima; stante che in ogni momento di tempo perde il grave, in vece d'un solo, due infinitesimi di velocità, per esser due le forze negative, che alla sua discesa s'oppongono. Se dunque nel sito infimo T era nulla la velocità nel primo caso, debb'esser nulla anche nel secondo, nè il pendolo può ascendere in conto alcuno per l'arco TX, e replicare le oscillazioni. Ed ecco convinta di falsità al pari con quella del VVallis anche la legge Nevvtoniana, e dando ad ambedue un perpetuo esilio dalla Fisica, le riporremo fra le ipotesi puramente matematiche.

Io sin ora non ho pensato, che a distruggere, senza prendermi la briga di edificare, e non avrò fatto poco, se mi sarà riuscito di liberare il mondo Letterato da certi errori, che appoggiati all'autorità d'Uomini incomparabili, e dall'universale abbracciati, sono difficilissimi da scoprirsi. Chi sa, che con altra occasione io non faccia come quegli Architetti ignoranti, i quali gittano a terra una fabbrica mal fatta, per innalzarne una peggiore?

ANNOTAZIONE.

Del Signor Abate Conte Girolamo Lioni.

LA presente Dissertazione del Sig. Conte Jacopo Riccati un importantissimo documento ci somministra, ed è, che non dobbiam fidarci di qualunque ipotesi, per quanto giusta, e ragionevole ella ci sembri, se non è rigorosamente dimostrata. Le idee delle scienze, e particolarmente delle Matematiche sono per lo più alle idee comuni, e popolari direttamente contrarie; e popolari chiamar si possono tutte quelle opinioni, che non si veggono stabilite con una severa dimostrazione, quantunque sieno uscite dalla bocca d'un Filosofo, o d'un Geometa.

La legge Nevvtoniana delle resistenze pareva così ben fondata, tanto per quello riguarda la tenacità, quanto l'inerzia de' mezzi fluidi, che non ci voleva meno d'una dimostrazione per convincerla di falsità, e per obbligarci ad abbandonarla, come poco conforme ai Fenomeni della Natura. Ecco come viene spiegata dal dottissimo Gravefande delle sentenze Nevvtoniane fedelissimo interprete (a) : „ Retardatio ex cohaesione partium in eodem spatio, manente eodem corpore, est semper eadem, quacumque fuerit corporis velocitas, eadem in omni casu cohesio superanda est; crescit igitur hæc resistentia cum spatio percurso, in qua etiam ratione crescit velocitas; est idcirco ut ipsa velocitas. Resistentia ex materiæ inertia, quando idem corpus per varia liquida, eadem cum celeritate, movetur, sequitur proportionem materiæ eodem tem-

(a) *Elem. Physico-Mathem. lib. 2. cap. 6.*

tempore removendæ, quæ est ut liquidi densitas. Quando idem corpus per idem liquidum variis cum celeritatibus fertur, resistentia hæc crescit cum numero particularum, in quas tempore æquali corpus impingit, qui numerus est ut spatium eo in tempore percursum, idest ut velocitas, sed crescit ulterius hæc resistentia in ratione viris, cum qua corpus in singulas particulas incurrit, quæ vis est etiam ut corporis velocitas, &c.; tota ergo resistentia est ut quadratum velocitatis. Corpori ergo in liquido moto partim resistitur in ratione velocitatis, partim in hujus ratione duplicata „.

Ora però, che siamo abbastanza illuminati, non ci riuscirà difficile lo scoprire il paralogismo, e mostrare in che consista il difetto del discorso sopra riferito in quella parte, che concerne la tenacità de' fluidi. Si vede per tanto ommesso un elemento, che dovea entrare necessariamente nel canone accennato; e questo si è il tempo. Imperocchè se per disunire due particelle d'un liquido strettamente congiunte insieme da quel vincolo, cui si dà nome di viscosità, o per ispezzare un corpo duro, le cui parti sono legate da innumerabili fibrille elastiche l'una con l'altra intrecciate, s'adopra una forza determinata; egli è manifesto, che per compire l'effetto si richiede un tempo determinato, e che per ottenerlo in tempo più breve una forza maggiore vi si ricerca; talmente che per fare in un istante la separazione, non ci vorrebbe meno d'una forza infinita. Che se l'azione è sempre uguale, e contraria alla reazione, le suddette particelle, o fibre, con una resistenza infinita s'oppongono ad una momentanea distrazione.

Quanto dunque con maggior celerità si muove un corpo solido per un mezzo tegnente, e viscoso, in tanto minore spazio di tempo supera l'unione delle parti, e conseguentemente incontra una più gran resistenza. Ma con qual legge cresca l'impedimento relativamente alla velocità, lasceremo di buona voglia all'industria dal Sig. Conte Riccati il determinarlo.

ANNOTAZIONE DELL' EDITORE.

Sarebbe da desiderarsi, che quanto è elegante, altrettanto fosse universale il metodo, con che il nostro Autore scioglie il proposto problema, ed alla costruzione lo conduce. Egli essendo pervenuto all'equazione $m + \frac{1}{m} = 2b$, in cui la b dev'essere reale, ed affermativa,

ha formato giudizio, che la m non possa esser nè negativa, nè immaginaria, perchè verrebbe, dic'egli, ad esser negativa, od immaginaria la grandezza $2b$. Quant'al negativo la conseguenza è verissima; perchè la somma di due quantità negative non può esser eguale ad una quantità positiva. Quant'all'immaginario, comunque ne' tempi, in cui è stata scritta la presente dissertazione, quando le teoriche non eran poste in quel lume, che an ricevuto di poi per le fatiche di molti valent'uo-

mini, la conseguenza potesse parer verisimile; pure ella è lontana dal vero, potendo la somma di due quantità immaginarie una quantità reale somministrare.

E per non dipartirci dalla formula, di che si tratta, cerchiamo generalmente, quando la quantità $f + g \sqrt{-1} + \frac{1}{f + g \sqrt{-1}}$ di due

immaginarj composta, sia nulladimeno reale. Ridotti i due membri alla stessa denominazione, si ha

$$\frac{ff - gg + 1 + 2fg \sqrt{-1}}{f + g \sqrt{-1}} = 2f \cdot \frac{ff - gg + 1 + g \sqrt{-1}}{2f} \quad \text{Qualunque}$$

volta $\frac{ff - gg + 1}{2f} = f$, fatta la divisione, rimarrà $2f$, ch'è una quan-

tità reale; nel qual caso si ritroverà $f = \sqrt{1 - gg}$.

Maneggiata l'equazione $m + \frac{1}{m} = 2b$, ritroveremo

$m = b + \sqrt{bb - 1}$ la quale è immaginaria, se sia $b < 1$, e può esprimersi così $m = b + \sqrt{1 - bb} \cdot \sqrt{-1}$. Adunque fatto il confronto colla formula uuniversale, sarà $f = b$, $g = \sqrt{1 - bb}$, e si verificherà; che $f = \sqrt{1 - gg}$. Di fatto la formula $b + \sqrt{1 - bb} \cdot \sqrt{-1} +$

$\frac{1}{b + \sqrt{1 - bb} \cdot \sqrt{-1}}$ ridotta alla stessa denominazione darà

$$\frac{2bb + 2b \sqrt{1 - bb} \cdot \sqrt{-1}}{b + \sqrt{1 - bb} \sqrt{-1}} = 2b, \text{ quantità reale.}$$

Quindi è manifesto, che nell'ipotesi di $b < 1$ la costruzione nella dissertazione contenuta non può aver luogo. E noi possiamo asseverare, che da molti anni l'Autore s'era avveduto della limitazione del suo metodo, e che aveva in animo di supplire a quel che mancava, e di re-
stringe-

stringer le conseguenze, ch'avea dedotte: ma in altri studj occupato, e da altri affari impedito non ha mai messo la mano all'opera, ed è passato a miglior vita con tal disegno. Siaci pertanto permesso di compier ciò, che l'Autore non ha potuto eseguire, e di dar la soluzione nell'ipotesi, che b sia minore dell'unità.

L'equazione da costruirsi è $-ydy + 2bndy = udu$: e perciocchè dev'essere $b < 1$, fatto il seno totale $= 1$, pongasi b eguale al co-seno dell'angolo ϕ , chiamandolo $= \text{Cos. } \phi$: dunque l'equazione sarà $-ydy + 2 \text{Cos. } \phi \, udy = udu$. A separare l'indeterminate, per modo che non inelegante riesca la costruzione, facciamo uso della seguente sostituzione $u = Mxy + Ny$. Le M, N sono quantità da determinarsi acconciamente nel progresso dell'analisi. Scacciata la u , si trova $-ydy + 2M \text{Cos. } \phi \, xydy + 2N \text{Cos. } \phi \, ydy = M^2 x^2 ydy + M^2 y^2 xdx + 2MNxydy + MNy^2dx + N^2ydy$. La qual equazione ridotta ci dà separate le variabili nella seguente maniera

$$\frac{-dy}{y} = \frac{M^2 xdx + MNdx}{1 - 2M \text{Cos. } \phi \cdot x + M^2 x^2 - 2N \text{Cos. } \phi + N^2} + \frac{MNdx}{1 - 2M \text{Cos. } \phi \cdot x + M^2 x^2 - 2N \text{Cos. } \phi + N^2}$$

Per conciliare alla formula maggiore semplicità, si discacci il secondo termine del divisore col porre $N = \text{Cos. } \phi$, e nascerà

$$\frac{-dy}{y} = \frac{xdx}{1 - \text{Cos. } \phi + xx} + \frac{\text{Cos. } \phi \, dx}{M} \quad , \text{ ovvero}$$

$$\frac{-dy}{y} = \frac{xdx}{\text{Sin. } \phi + xx} + \frac{\text{Cos. } \phi \, dx}{M}$$

L'ultimo membro porta alla quadratura del cerchio. A rinvenirlo pertanto nel circolo, il cui raggio eguagli l'arco cicloidale, per cui discende il mobile, che chiamiamo $= f$, si faccia $\frac{\text{Sin. } \phi}{M} = f$, dunque

$$M =$$

$M = \frac{\text{Sin. } \phi}{f}$. Quindi l'equazione diverrà

$$= \frac{dy}{y} - \frac{xdx}{ff+xx} + \frac{\text{Cos. } \phi \cdot f \, dx}{\frac{\text{Sin. } \phi}{ff+xx}}, \text{ ovvero}$$

$$\text{Tan. } \phi \cdot f \cdot \frac{dy + \frac{xdx}{ff+xx}}{y} = - \frac{ff \, dx}{ff+xx} :$$

Chiamato $= A$ l'arco circolare, il cui raggio $= f$, e la cui tangente $= x$, integriamo prendendo i logaritmi nel sistema, la cui sottangente $= \text{Tan. } \phi \cdot f$, ed il cui protonumero, cioè quel numero, ch'ha il logaritmo $= 0$, sia $= f$, e ritroveremo $ly + l \sqrt{ff+xx} = G - A$. Per definire la costante aggiunta G s'avverta, che posto $y = f$, sarà $ly = 0$, $u = 0$; dunque $x = - \frac{\text{Cos. } \phi \cdot f}{\text{Sin. } \phi} = - \text{Cot. } \phi \cdot f$, e l'arco A

si cangerà in un arco, ch'ha il raggio $= f$, e la tangente $= - \text{Cot. } \phi \cdot f$, il quale per esser negativo chiameremo $= B$; dunque avremo $lf \sqrt{1 + \frac{\text{Cot. } \phi}{\text{Cot. } \phi}} = G + B$, ovvero $lf \cdot \text{Cose. } \phi - B = G$. Sostituito però nella nostra formula cotai valore di G , s'otterrà

$$ly + l \sqrt{ff+xx} - l \cdot \text{Cose. } \phi \cdot f = - A - B, \text{ o chiamato}$$

$$A + B = z. \text{ ly } \frac{\sqrt{ff+xx}}{\text{Cose. } \phi \cdot f} = -z, \text{ e posto } e \text{ quel numero, ch'ha}$$

$$\text{per logaritmo l'unità, } y \frac{\sqrt{ff+xx}}{\text{Cose. } \phi \cdot f} = e^{-z}$$

Quest'ultima equazione ci somministra una costruzione, che non può essere più elegante. Col raggio $CA = f$ (Fig. 121.) si descriva il circolo AEB , indi pel punto A preso ad arbitrio si meni l'indefinita tangente DAM . Si conduca CD , che faccia colla CA l'angolo ACD , il quale insieme coll'angolo ϕ compia un retto. E' chiaro, che $AD = \text{Cot. } \phi \cdot f$, e $CD = \text{Cose. } \phi \cdot f$. Quindi l'arco AB sarà quello, che nell'analisi abbiamo chiamato $= B$. Poscia pel punto B si descriva una spirale logaritmica BHF , che faccia co' suoi rami CB , CH l'angolo ϕ , siccome esige $\text{Tan. } \phi \cdot f$ sottangente del sistema, in cui abbia:
mo

mò presi i logaritmi. Si taglino $AM = x$, farà AN l'arco chiamato nell'analisi $= A$; dunque $BAN = z$; dunque $CP = e^{-z}$.

L'equazione ci porge la seguente analogia $\sqrt{ff + xx} : \text{Cofe. } \phi . f$
 $:: e^{-z} : y$; ma $CM = \sqrt{ff + xx}$, $CD = \text{Cofe. } \phi . f$, $CP = e^{-z}$;
 dunque condotta dal punto P la PQ parallela a MD , faranno le $CQ = y$.

Resta da determinar le velocità acquistate per gli spazj passati BQ .
 La formula sussidiaria ci dà $u = \frac{xy \cdot \text{Sin. } \phi}{f} + y \cdot \text{Cof. } \phi$, o sia

$$\frac{fu}{\text{Sin. } \phi} = y \cdot x + \frac{f \cdot \text{Cof. } \phi}{\text{Sin. } \phi} = y \cdot x + \text{Cot. } \phi . f; \text{ ma } \frac{1}{\text{Sin. } \phi} = \text{Cofe. } \phi ;$$

dunque $\text{Cofe. } \phi . fu = y \cdot x + \text{Cot. } \phi . f$; dunque $CD = \text{Cofe. } \phi . f$;
 $DM = x + \text{Cot. } \phi . f$; $CQ = y$; $QP = u$. Quindi rappresentando BQ
 gli spazj passati, CQ que', che devono passarli fin all'infimo, le velo-
 cità verranno espresse dalle rette QP ordinate alla spirale logaritmica,
 le quali incontrano l'assisse nell'angolo ϕ , angolo, che la spirale loga-
 ritmica fa co' suoi rami.

Le determinazioni sono sì facili, che basterà succintamente accen-
 narle. Si meni il diametro EzE parallelo alla tangente AM . Il corpo
 partendo dal punto di quiete B va movendosi colle velocità espresse dall'
 ordinate alla spirale, e giunto al punto infimo C si trova avere la ve-
 locità CF . In così fatto movimento non s'accresce sempre la velocità
 del pendulo, ma dopo un determinato spazio a ritardar s'incomincia:
 e per ciò avremo in un dato punto la velocità massima.

Questa si determina agevolmente considerando, ch' allor s'avrà la
 massima velocità, quando la tangente della spirale sia parallela alla li-
 nea dell'assisse CD . Sia questa la HK ; dunque l'angolo DCH farà
 $= CHK$: ma questo essendo l'angolo, che la spirale fa col suo ramo
 $= \phi$, si avrà $DCH = \phi$. Quindi condotta la CH , che faccia colla CD
 l'angolo ϕ , e dal punto H , ov' ella incontra la curva spirale, menata
 HI parallela a DM , questa esprimerà la massima velocità. Perciò il moto
 da B in I farà accelerato, da I in C farà ritardato.

Poichè giunto il mobile nel punto infimo C è dotato della velocità
 CF , chiara cosa è, che monterà con moto ritardato, venendo sempre
 espresse le sue velocità dall'ordinate della stessa spirale, che pur conti-
 nua, finchè avendo passato lo spazio CzB , d'ogni movimento farà
 sfornito.

Sospeso il mobile dal punto zB tornerà a discendere, e l'ordinate
 alla parte della spirale $zBzF$ dinoteranno le sue velocità negative, e
 giunto in C si troverà avere la celerità CzF ; quindi di nuovo ascen-
 dendo monterà per lo spazio CzB . Le seguenti oscillazioni verranno
 ef.

esprime dagli infiniti successivi giri della spirale logaritmica. Dal che si ricava, che il pendolo non giungerà giammai ad una quiete perfetta.

Essendo gli archi della spirale logaritmica segati dal diametro BG, come BF₂B, 2B2F₃B sempre simili, saranno simili ancor le scale delle resistenze; dunque essendo simili le scale delle forze non impedita dalle resistenze, saranno altresì simili le scale delle forze sollecitanti; dunque i tempi dell'oscillazioni grandi, e piccole saranno eguali, ed il pendolo isocrono. Ma s'avverta, che non diceasi eguale il tempo della discesa a quel dell'ascesa, ma il tempo per ciascuna discesa, ed ascesa prese insieme è sempre lo stesso. E ciò si vuol intendere non solo dell'oscillazioni, che il mobile di fatto compie, ma ancora di qualunque altra; perchè da qualunque punto il mobile cominci a discendere, la spirale logaritmica, che ne determina le velocità, è sempre simile alla descritta.

Ma intorno a' tempi farà bene a dir qualche cosa di più preciso; giacchè il metodo da noi usato ce ne dà una determinazione elegante.

$$\text{E' noto esserè } dt = -\frac{dy}{u} \text{ ma } u = \frac{xy \text{ Sin. } \phi}{f} + y \cdot \text{Cos. } \phi =$$

$$\frac{\text{Sin. } \phi \cdot y \cdot x + \text{Cos. } \phi}{\text{Sin. } \phi} f = \frac{\text{Sin. } \phi \cdot y \cdot x + \text{Tang. } \phi \cdot f}{f}; \text{ dunque}$$

$$dt = \frac{-f dy}{\text{Sin. } \phi \cdot y \cdot x + \text{Tang. } \phi \cdot f} : \text{ ma } \frac{-dy}{y} = \frac{xdx + \text{Tan. } \phi \cdot dx}{ff + xx}, \text{ come}$$

$$\text{abbiam trovato di sopra; dunque } dt = \frac{f}{\text{Sin. } \phi} \cdot \frac{dx \cdot x + \text{Tan. } \phi}{ff + xx \cdot x + \text{Tan. } \phi} =$$

$$\frac{f dx}{\text{Sin. } \phi \cdot ff + xx} : \text{ ma } \frac{1}{\text{Sin. } \phi} = \text{Cose. } \phi; \text{ dunque } dt = \frac{\text{Cose. } \phi \cdot f dx}{ff + xx}$$

Essendo $\frac{f dx}{ff + xx}$ la differenza dell'angolo ACN, il cui integrale deve

annullarsi posta CN sopra CB, farà di mestieri aggiungere l'angolo costante BCA. Avrem dunque $t = \text{Cose. } \phi \cdot \text{Ang. BCN}$: laonde non cangiandosi l'angolo ϕ , i tempi saranno come gli angoli BCN. Le con-

se-

seguenze, che da ciò si deducono; son sì patenti, che ci abuseremmo dell'ozio de' nostri Lettori, se in esse trattener ci volessimo.

Sin ora abbiamo considerato come costante l'angolo ϕ . Che se come variabile si riguardi paragonando due mobili, che discendendo come sopra per BC patiscano due diversi generi di resistenza, allora suscitato il punto B, si prenderà come mobile il punto A, e descrivete l'altre spirali logaritmiche, l'ordinate loro parallele alla tangente al punto A daranno le velocità. Queste si troveranno sempre maggiori crescendo l'angolo ϕ , e diminuendo il suo complemento BCA, e s'aumenteranno ancora gli spazi della salita, per modo che se l'angolo ϕ diventa retto, che dà il caso di $\text{Cos. } \phi = 0$, e della resistenza nulla, la spirale logaritmica si cangia in un circolo, e le ordinate ortogonali al diametro BG rappresentano le velocità, essendo eguale lo spazio della salita CG allo spazio della discesa BC.

All'opposto se l'angolo ϕ si diminuisce, le velocità, e gli spazi della salita vanno sempre minorandosi, per modo che posto ϕ infinitesimo, e l'angolo BCA pressochè retto, ch'è il caso di $\text{Cos. } \phi = 1$, al punto C la velocità si ritrova infinitesima, e infinitesimo pure lo spazio d'ascendimento. Laonde in quest'ipotesi il mobile giungerà fino in C, dove si troverà spogliato d'ogni velocità.

Passiamo ai tempi. Quanto è maggiore l'angolo ϕ , e minore il suo complemento; tanto si minora la $\text{Cos. } \phi$, e l'angolo BCE, ch'alla discesa serve; dunque si minora il tempo della discesa, il quale alle predette due quantità s'è provato proporzionale. All'opposto calando l'angolo ϕ , il tempo della discesa s'accresce per guisa, che posto $\phi = 0$, divenendo la $\text{Cos. } \phi$ infinita, il mobile non arriverà al punto C se non dopo un tempo infinito.

Lo stesso vuol dirsi della discesa, e dell'ascesa prese insieme; perchè l'angolo DCG in tal caso è sempre lo stesso, cioè uguale a due retti, e però cotale tempo è proporzionale alla sola $\text{Cos. } \phi$.

Ma quant'al tempo dell'ascendimento la cosa è più varia; perchè delle due quantità, con che il tempo tien proporzione, crescendo l'una, l'altra divien minore. Se cresce la $\text{Cos. } \phi$, si diminuisce l'angolo ECG $= \phi$. Suppongasì passar ϕ successivamente dal retto ad angoli sempre minori. Egli è manifesto, che da prima calerà più l'angolo ϕ di quello, che cresce la sua coscangente; dunque il tempo dell'ascendimento si farà minore. Ma ciò accadrà fino ad un certo termine, dove si troverà scemar tanto l'angolo, quanto cresce la coscangente: e qui avremo il minimo tempo. Dopo questo termine crescendo più la coscangente di quello, che cala l'angolo ϕ , il tempo anderà crescendo, fino a diventar infinito nel caso estremo di $\text{Cos. } \phi = 1$, nel qual caso non s'avrà ascendimento di forte alcuna.

Per determinar poi l'angolo ϕ , che ci dà il minimo tempo della salita, basta ritrovare quel punto, in cui il complemento dell'angolo ϕ tanto cresce, quanto cresce la secante di questo medesimo complemento. A questo fine col raggio $\text{CO} = 1$ (Fig. 122.) descritto il cerchio OB;

Opere Ricc. Tom. III.

Ddd

e con-

e condotta la tangente OD, pongasi, che la secante CD sia quella, il cui incremento eguagli l'incremento dell'arco OB. Preso il punto *b* infinitamente vicino, si meni la secante *Cbd*, e col centro C si descriva l'archetto *Dm*: egli è chiaro, che dovrà essere $dm = Bb$. Ciò posto, si ha $dm : Dm :: OD : CO$; ma $Dm :: Bb :: CD : CB = CO$; dunque $dm : Bb :: CD : OD : CO^2$; dunque essendo i primi due termini dell'analogia eguali, verrà ad essere $CD : OD = CO^2$ ovvero $CD : CO :: CO : OD$. Perciò descritto un triangolo rettangolo in guisa, che l'ipotenusa sia ad un lato, come questo all'altro, l'angolo, che fa l'ipotenusa col lato medio proporzionale, è il complemento dell'angolo ϕ , e l'angolo, che fa l'ipotenusa coll'altro lato, è lo stesso angolo ϕ ricercato.

Ma del caso, ove $\text{Cof. } \phi = 1$, sebbene abbiamo alcuna cosa accennata, essendo il limite estremo dell'ipotesi da noi trattata; pure perchè le conseguenze, siccome immerse negli abissi dell'infinito, e dell'infinitesimo, non si veggono colla desiderata chiarezza, farà bene separatamente parlare svolgendone, e costruendone l'equazione. Essa è la seguente,

$-ydy + xudy = xdu$. Disponiamola nella seguente maniera

$-ydy + xdy = xdu - xdy$, ovvero

$-dy \cdot y - u = -u \cdot dy - du$; dunque

$\frac{dy}{u} = \frac{dy - du}{y - u}$. Pongasi $y - u = x$; dunque

$\frac{dy}{y - x} = \frac{dx}{x}$, o sia $x dy = y dx - x dx$, e però

$\frac{x dy - y dx}{x^2} = -\frac{dx}{x}$, la quale integrata da $\frac{y}{x} = G - lx$.

Si sono presi i logaritmi nella logistica, che ha la sottangente $= 1$:

A fissare la costante G s'avverta, che se $y = f$, $u = 0$; dunque $x = f$. Quindi sarà $1 = G - lf$, e supponendo $lf = 0$, $G = 1$. Avremo pertanto l'equazione completa $\frac{y}{x} - 1 = -lx$, oppure $y - x = -xlx$: ma

$y - x = u$; dunque $u = -xlx$, dalla quale trarremo la costruzione.

Sovra l'indefinita CR (Fig. 123.) eccitata la normale $CA = f$, colla sottangente $= 1$ all'asintoto CR si descriva la logistica ANR. Egli è manifesto, che essendo le $CM = x$, faranno le $MN = -lx$. Si ponga MQ

MQ eguale al rettangolo CM. MN diviso per l'unità: la curva AQC, che passa per tutti i punti similmente determinati, darà colle sue ordinate M Q le velocità $=u$. La massima velocità s'avrà, quando KL $=1$. Poichè $y=x+u$, colla CA faccia la CB un angolo semiretto, e si otterranno le PQ $=y$, mentre le MQ $=u$.

Passando a' tempi, la formula ci presenta

$$dt = - \frac{dy}{u} = - \frac{dx+du}{u} \text{ ma } u = -x/x,$$

e $du = -dx - dx/x$; dunque

$$dt = - \frac{dx + dx + dx/x}{-x/x} = - \frac{dx}{x}; \text{ dunque } t = -lx.$$

Quindi i tempi verranno espressi dall'ordinate alla logistica MN, e perciò il tempo per la AC espresso dall'asintoto sarà infinito; dal che si deduce, che il pendolo non giungerà mai al punto infimo.

Le cose tutte contenute nella presente annotazione danno a vedere, che se la specie chiamata $=b$ dall' Autore non è minore dell'unità, egli è impossibile, ch'il pendolo reciprochi le sue oscillazioni, come la speranza dimostra avvenire ne' nostri fluidi. Ma per fine ci sia permesso d'esporre in termini più conosciuti quello, che dinota la specie b . Sia $=p$ l'altezza, da cui il mobile discendendo nel vacuo acquista quella velocità, con che se viaggiasse nel pieno, patirebbe una resistenza eguale alla sua gravità. Cotal velocità adunque verrà espressa per $\sqrt{2p}$; dunque la resistenza $= 2b\sqrt{2p}$; ma questa dev'esser eguale alla gravità; dunque $2b\sqrt{2p} = 1$, ovvero $b = \frac{1}{2\sqrt{2p}}$. Ed ecco il valor della specie b .

Acciocchè il mobile reciprochi le oscillazioni fa di mestieri, che $b < 1$, dunque dev'essere $\frac{1}{2\sqrt{2p}} < 1$, ovvero $1 < 8p$; dunque $p > \frac{1}{8}$.

ma 1 esprime l'arco semicicloidale; dunque p dev'esser maggiore dell'ortava parte dell'arco semicicloidale, o sia della metà del raggio del circolo genitore. Per tanto se l'altezza, per cui il mobile discendendo acquista tal velocità, onde nel pieno la resistenza eguaglia la gravità, sarà maggiore della metà del raggio del circolo, che genera la cicloide; si anderanno dal pendolo reciprocando l'oscillazioni: ma se sia eguale, e molto più se minore, il pendolo d'ogni velocità sarà sfornito nel punto infimo; anzi non arriverà a cotal punto, se non in un tempo infinito.

E con ciò rimane compitamente sciolto il proposto problema, nè senza qualche eleganza.

D d d 2

SCHE-

SCHEDIASMA XXXII. (*)

PROBLEMA.

Determinare il moto d' un pendolo a cicloide, supposta costante la resistenza del mezzo.

Questo Problema è già stato sciolto dalli Signori Nevvton, ed Ermanno; ma perchè cglino non an fatto parola di alcuni particolari appartenenti alla Fisica; non farà fuori di proposito il darne una nuova, e più compiuta soluzione.

Oscilli il pendolo per la cicloide BCD (Fig. 124.) ed il principio della discesa si prenda dal punto di quiete B. La retta verticale BE doppia del diametro del cerchio generatore della curva ci esponga la gravità assoluta della ghianda B nel vano, e colla linea BG si esprima la gravità relativa, o specifica della medesima ghianda in un mezzo fluido resistente, e pesante. Condotta al punto B la toccante BF, e dalli punti E, G lasciate cadere sopra di essa le due normali EF, GH, egli è certo, che la linea BF uguale all' arco cicloidale BC ci rappresenterà la forza tangenziale, da cui nel punto B viene sollecitato il mobile in un mezzo vuoto, o infinitamente raro: come altresì la retta BH dinoterà la forza tangenziale, da cui nel punto B il pendolo, stando ferme le circostanze, viene accelerato nel pieno.

L'altra forza collaterale GH, derivata dalla verticale BG s'impiega in istendere il filo AB, nel qual effetto consuma tutta la sua energia, che dalla tenacità del filo è controbilanciata.

Da ciò si deduce, che tanto nel punto B, quanto in qualunque altro della cicloide, per esempio I, l'impressione acceleratrice per la toccante è nel vano uguale agli archi BC, IC, e nel pieno in data ragione costante agli archi predetti, cioè a dire come BG : BE, ovvero come la differenza fra le due gravità assolute del solido, e del fluido al peso assoluto del solido.

Stendo l'arco della cicloide in una linea retta bd (Fig. 124., e 125.); onde li punti b, c, d corrispondano agli altri B, C, D, e sia BC = bc, e CD = cd. Eretta sopra il punto b la perpendicolare bb, facciati questa uguale alla forza BH, cioè in data ragione alla retta bc, o sia alla curva BC, e tirata l'ipotenusa bc, il triangolo bbc ci metterà sotto gli occhi la scala delle infinite impressioni, per cui viene di passo in passo accelerato il pendolo per tutti i punti dell' arco cicloidale BC. Segnato nella curva ad arbitrio il punto I, e fattasi l'abcissa bi = all'

ar-

(*) Diede occasione a questo, ed al seguente Schediasma, che furono composti l'anno 1732, una privata amichevole controversia tra il Sig. Conte Giovanni Rizzetti, e l'Autore circa la resistenza dei mezzi fluidi.

arco BI , l'ordinata if al triangolo, che sta alla retta ic , o alla curva IC nella proporzione già assegnata, dinoterà la forza sollecitante il pendolo nel punto I .

In questo mentre supponendosi costante la resistenza del mezzo; sarà d'uopo il contrassegnarla con una quantità determinata, per cagion d'esempio colla retta ba , e dal punto a condotta la linea an parallela a bd , taglierà essa la diagonale bc nel punto g , e messa $gn = ga$, sia no perpendicolare ad an .

La preparazione per questa volta ci manifesta da se sola senz'altro ajuto le passioni de'moti da noi cercate, e sta in cambio di soluzione.

1°. Essendo la forza tangenziale sollecitante il pendolo nel punto B uguale all'applicata bb , se da essa sottrreremo la resistenza costante ba , resterà la quantità ab esprimente quella forza, che nello stesso punto B , non ostante l'impedimento del mezzo, attualmente stimola la ghianda alla discesa. Similmente essendo fi la forza tangenziale corrispondente al punto I , ed ie la resistenza costante, sarà ef l'impressione accelerante nel punto I purgata dalla resistenza.

2°. Nel punto k analogo all'altro K segnato nell'arco BC la forza tangenziale è uguale alla resistenza, e perciò operando le suddette potenze con direzione contraria, l'azione della prima resta equilibrata dalla reazione della seconda. Ma al di sotto del punto K fra li due limiti K, C , superate le forze acceleranti dalle resistenti, il mobile viene successivamente ritardato dalle impressioni negative, delle quali è scala il triangolo gmc . Finalmente passato il punto C , mentre il grave ascende, vi si oppongono unitamente tanto la forza per la toccante derivata dalla gravità, quanto la resistenza costante, e di queste potenze cospiranti a distruggere l'impeto impresso è scala il trapezio $cmno$.

3°. Il pendolo dal punto di quiete B sino al punto K acquista sempre nuovi gradi di celerità: e la ragione si è, perchè le forze acceleranti purgate dalle resistenze, ed espresse per le ordinate del triangolo bag agiscono contro la ghianda, come s'essa camminasse nel vano e quantunque sieno decrescenti, e vadano finalmente a terminare nel nulla; non ostante ciò ogni nuova sollecitazione produce un nuovo elemento di velocità, che alla già concepita si aggiunge. In ordine a ciò la velocità massima farà nel punto K , e non già nell'infimo punto C della cicloide; conciossiachè passato dal pendolo il predetto punto K , l'impeto acquistato si va a poco a poco debilitando, e le forze negative, che lo estinguono, ci vengono espulse dalle applicate del triangolo gno .

4°. Essendo pertanto il triangolo gno simile, ed uguale al triangolo hga , interviene, che tutto il moto generato dai successivi impulsi positivi contenuti nel triangolo hga saranno distrutti dalle successive impressioni negative contenute nel triangolo gno . Corrisponda il punto k all'analogo K , e facciasi l'arco KL eguale alla retta kl : io dico, che gli archi BK, KL saranno eguali, e che nel punto L cesserà tutto il moto del pendolo.

5°. La

5°. La scala delle velocità crescenti da B sino in K, è decrescenti da K sino in L, è la semiellittica Apolloniana bpl , il cui centro sia in k , e la proporzione fra il quadrato del semiasse maggiore kb , ed il quadrato del minore kp sia come $EB : GB$, vale a dire come il peso assoluto della ghianda nel vano al suo peso relativo nel pieno.

6°. Collocata la ghianda fra i due punti B, K in qualunque sito I , da cui cominci a discendere, i tempi impiegati a scorrere gli archi BK, IK faranno uguali. Ciò nasce dalla similitudine de due triangoli bga , fge , i quali fatta l'abscissa bi eguale all'arco BI, sono nell'uno e nell'altro caso le scale delle forze acceleranti. La medesima osservazione ha luogo anche negli archi trascorsi sino alla totale estinzione del moto; laonde tutte le vibrazioni o grandi, o piccole in tal sorta di pendoli si si compiscono in egual tempo, e sono isocrone.

7°. Fissato l'arco $IK = KC$, se la ghianda principierà a cadere dal punto di riposo I, attese le cose dimostrate si anderà accelerando sino al punto K, indi ritardando sino a giungere al punto infimo della cicloide, in cui cesserà tutto il moto, ed in conseguenza non ci sarà reciprocazione.

8°. Si può far cadere la ghianda dal punto di quiete M situato fra i punti I, K, ed allora trovandosi la massima velocità in K, preso l'arco $KN = KM$, sarà estinta nel punto N tutta la velocità acquistata, nella discesa.

9°. Esaminiamo cosa sia per risultare dal calcolo. Discenda il mobile dal punto di quiete N, e pongasi l'arco $NC = b$, e chiamati s gli spazj crescenti da N sino in C, uno de quali sia per cagion d'esempio NO, la forza sollecitante in O all'arco $OC = b - s$ sarà in proporzione, come $BG : BE$, o come $n : 1$, supposta n una frazione minore dell'unità. Avremo pertanto la predetta forza $= nb - ns$, da cui sottratta la resistenza costante r , perverremo alla nota formula $\frac{nb - ns - r}{ds} = u du$. Mentre r sia maggiore della quantità nb , lo che dee necessariamente succedere, potendo io diminuire quanto mi piace l'arco NC, stando sempre determinata, e costante la resistenza r ; accaderà altresì, che il binomio $nb - r$ sia una grandezza negativa $= -g$; dunque $-g ds = ns ds = u du$, ed integrando non ommessa l'aggiunta della costante, $e -gs = \frac{ns^2}{2} = \frac{u^2}{2}$; ma quando lo spazio s è nel punto $N = 0$, si tro-

va essere la velocità $u = 0$; dunque sarà parimente $= 0$ la costante aggiunta c ; così che la vera integrazione si ridurrà $-gs = ns^2 = u^2$, nella qual equazione non si scanferanno mai gli immaginari, se non si prendano negative le s . Di fatto se la resistenza costante fosse una potenza attiva, atta a generare il moto, la ghianda monterebbe all'insù, nel punto K sarebbe dotata della massima velocità, indi con moto ritardato perverrebbe sino al punto M, posto $KM = KN$, ed in questo spazietto reciprocerebbe le sue oscillazioni.

10°. Per-

10°. Persistendo nella nostra ipotesi, se la ghianda nel partirsi dal punto di quiete B descriverà l'arco BCQ, indi reciprocando l'arco QCI, e poi l'arco ICP, e di bel nuovo reciprocando l'arco PCM, e così continuerà a vibrarsi, dico, che gli archi BCQ, QCI, ICP, PCM, ec. costituiscono una progressione aritmetica decrescente. Chiamo p l'arco BC, e $2p$ l'arco intero BCD, che dal pendolo si descriverebbe nel vano: chiamo r la resistenza costante, ed il primo termine della nostra serie sarà l'arco BCQ, che diviso per metà nel punto O, e posto l'arco OC = q s'esprimerà per $2p - 2q$, essendo l'arco QD, o la differenza, che passa fra gli archi BCD, BCQ doppia di OC, e per conseguenza = $2q$. Il secondo termine della progressione, cioè l'arco QCI si esprime per la quantità $2p - 6q$; conciossiachè fatto l'arco CS = CQ, e CR = CO, in discendendo la ghianda dal punto di quiete Q, acquisterà nel punto R la massima velocità, e perderà tutto il suo moto pervenuta che sia al punto I, restando indietro per l'arco IS doppio di CR, o di CO; e conseguentemente = $2q$. Aggiunte pertanto le due differenze QD + SB = $4q$, l'eccesso, per cui l'arco BCD supera l'arco ICQ, si troverà = $6q$; dunque ICQ = $2p - 6q$. Per la stessa ragione sarà il terzo termine, o l'arco ICP = $2p - 10q$, ed il quarto, o l'arco PCM = $2p - 14q$, e così di mano in mano: di modo che la differenza costante, con cui un termine sorpassa l'altro immediatamente vicino, viene esposta per $4q$, ed è sempre quadrupla dell'arco dato OC.

11°. Osservo, che il suddetto arco OC sta alla resistenza costante r in ragion data, cioè a dire come il peso assoluto della ghianda al suo peso specifico, o come EB: CG, ovvero per servirmi dei simboli del n°. 9° come 1: n . Senza moltiplicar le figure fingasi, ch'essendo la retta bc = all'arco BC, o alla toccante BF, e di più la normale bb = BH, sia l'abscissa bk = all'arco BO, e conseguentemente la kc = all'arco OC. Condotta l'ipotenusa bc, dalla kg verrà determinata la resistenza costante r ; dunque ck = q ; kg = r ; cb: bb:: FB: HB:: EB: GB:: 1: n ; lo che dovea dimostrarsi.

Per ciò se q si scopre essere = $\frac{r}{n}$, la progressione aritmetica, di cui abbiamo fatto parola, ci comparirà sotto un altro aspetto.

$$2p - \frac{2r}{n} \quad 2p - \frac{6r}{n} \quad 2p - \frac{10r}{n} \quad 2p - \frac{14r}{n} \text{ ec.}$$

S C O L I O.

Dalle seguenti considerazioni si raccoglierà, che avendosi ad abbandonare l'ipotesi delle resistenze costanti, siccome quella, che tira seco degli assurdi; si di mestieri conchiudere, che le resistenze rispondano con qualche relazione alle velocità attuali del pendolo.

Ri-

Riduciamo la cosa a computo, e fondiamolo sopra alcune sperienze registrate dal Sig. Cav. Nevvton nello Scolio generale annesso alla proposizione 31. del secondo libro de' suoi Principj.

Il pendolo ivi descritto, la di cui ghianda era di legno, rimosso come nel primo sperimento dalla linea del piombo per la distanza di due dita, onde nel vuoto descrivesse un arco di quattro dita, dopo 164. oscillazioni è montato nel pieno, cioè a dire nell'aere, per un arco d'un dito, e tre quarti, di modo che l'arco intero percorso nell'ultima reciprocazione era prossimamente di dita $3 \frac{1}{2}$.

Supponiamo, che il ritardamento nasca da una resistenza costante; e procuriamo d'indagarne la precisa misura tanto nell'allegata esperienza, quanto in alcune altre dal citato Autore rapportate; ma prima è d'uopo di cercare il metodo, che ci guidi speditamente alla soluzione del quisto. Giacchè l'arco IQ è di quattro dita, ed il pendolo dopo 164. vibrazioni si riduce a descrivere l'arco MP di dita $3 \frac{1}{2}$;

suppongasi, che nella prima oscillazione la massima velocità della ghianda sia nel punto O, e ci si presenterà l'equazione $IQ - MP = b \cdot OC$. Per avere il valore della coefficiente b , da cui resta affetto l'arco costante OC, giusta la regola prescritta al n°. 10°, si moltiplichì il numero delle oscillazioni, che nel nostro caso è 164., per quattro, e dal prodotto si levi il binario, con che farà $b = 654$; dunque $IQ - MP = \frac{1}{2}$ dito $= 654 \cdot CO$, o sia $CO = \frac{1}{1308}$ parte d'un dito.

Archi descritti dal pendolo di legno nelle sperienze Nevvtoniane espressi in dita

$$4, 8, 16, 32, 64, 128.$$

Numero delle vibrazioni, in cui si perde rispettivamente l'ottava parte del moto,

$$164, 121, 69, 35 \frac{1}{2}, 18 \frac{1}{2}, 9 \frac{1}{3}.$$

Archi rispettivamente percorsi dopo le dette vibrazioni espressi in dita

$$3 \frac{1}{2}, 7, 14, 28, 56, 112.$$

$$654, 482, 274, 140, 72, 36 \frac{2}{3}$$

Misura dell' arco CO negli esperimenti come sopra in parti d'un dito

$$\frac{1}{1308}, \frac{1}{482}, \frac{1}{137}, \frac{1}{35}, \frac{4}{35}, \frac{24}{85}$$

Per le cose dette al n°. 11°. l'arco CO sta alla resistenza costante r come il peso assoluto della ghianda al suo peso specifico, cioè come BE: BG: ma il Sig. Nevvton ci assicura, che la sua sfera di legno era ad un pari volume d'acqua in proporzione di 55: 97, ed assumendo una ragione almeno prossima fra la gravità specifica della palla del legno paragonata con quella dell'aere come 453 $\frac{59}{97}$, e per

ciò essendo BE: BG:: 453 $\frac{59}{97}$: 452 $\frac{59}{97}$, tale sarà parimente la pro-

porzione fra l'arco CO, e la resistenza costante r .

Confrontando insieme ciò, che risulta dalla prima, e dall'ultima esperienza, trovo, che la resistenza supposta costante nel primo caso sta a quella del secondo in ragione di 11: 897. prossimamente.

Questa enorme disparità, che per qualunque ripiego non può mai sanarsi, ci fa abbastanza comprendere, che l'ipotesi assunta è sì fattamente assurda, che destrugge se stessa. Il computo adattato alla esperienza prende per dato, che la resistenza sia costante, e l'esperienza modificando il calcolo, ci fa toccar con mano esser falso il dato, e la resistenza variabile, la quale va crescendo, a misura che il pendolo cammina con maggiore celerità; perchè esso incontra un maggior contrasto, quanto da maggiore altezza discende.

S C H E D I A S M A XXXIII.

PROBLEMA.

Determinare il moto d'un pendolo a cicloide, supposta costante la resistenza, che si oppone alle discese, ed agli ascendimenti verticali.

LE curiose proprietà notate nei pendoli oscillanti colle leggi supposte nell'antecedente Problema, quantunque immaginarie, e discorde dai canoni, de' quali suole la Natura far uso, mi anno dato motivo di cercare in qual maniera dovessero regularsi le resistenze, acciocchè gli archi delle decrescenti reciprocazioni, in cambio di formare una progressione aritmetica, ne costituissero una geometrica. Dopo un qualche giro di raziocinio, che per brevità tralascio, mi sono accorto, che per soddisfare alle condizioni della quistione, fa di mestieri assumere le resistenze in qualunque punto della cicloide per esempio E (Fig. 126.) proporzionali alla forza tangenziale, che stimola il pendolo alla discesa.

Ci venga rappresentata per la verticale EI la gravità specifica, o relativa della ghianda oscillante in un dato fluido: sia IK la resistenza costante, e pongasi $IH = IK$. Poscia condotte alla toccante EN le due perpendicolari KL, HN, si osservi, che se il pendolo discende, dalla forza sollecitante EM dee sottrarsi la resistenza LM: all'incontro quando la ghianda in vigore dell'impeto impresso è obbligata ad ascendere, alla forza tangenziale EM, che si oppone all'ascendimento, bisogna aggiungere la resistenza MN, onde la retta EN dinoti la forza unita, per cui viene ritardato il pendolo nel punto E.

Chiamata pertanto g la gravità specifica EI, ed r la resistenza costante IK, avremo $EK = g - r$, ed $EH = g - r$: ma come $HE : KE :: NE : LE$, e la forza tangenziale EM sta all'arco della cicloide EC in ragion data; dunque sarà nota altresì la ragione fra le rette EL, EN, e l'arco EC. Premessa questa preparazione, io tirerò semplicemente le conseguenze, ommesse le dimostrazioni, che dal metodo adoprato nel precedente problema agevolmente si deducono.

Dico dunque in primo luogo, che se la ghianda comincerà a discendere dal punto di quiete E, e dopo aver percorso l'arco EC monterà per l'arco CF, i due archi EC, CF faranno in ragioni data come $g + r : g - r$. Similmente qualora il pendolo reciprocando discende per l'arco FC, ed ascende per l'arco CG, sarà $FC : CG :: g + r : g - r$, e così successivamente.

2°. Perciò tutti gli archi CE, CF, CG, CO costituiscono una serie geometrica decrescente, il cui esponente resta determinato dalla ragione costante di $g + r : g - r$. Di più le intiere vibrazioni EF, FG, GO

GO formano altresì una serie geometrica decrescente all'infinito, ed in conseguenza di ciò il pendolo continuerà sempre a vibrarsi, senza che si riduca mai ad uno stato di perfetta quiete.

3°. E perchè, se il pendolo altra resistenza non patisse, salvo che la nascente dalla gravità del fluido, in cui sta immerso, tanto ascenderebbe, quanto discende, siccome è facile a dimostrarsi, laonde alla discesa EC risponderrebbe la salita uguale CP, quantunque più tempo impiegasse a scorrere l'arco ECP nel pieno, di quello facesse nel vano; ne seguita, che la differenza FP procede dalla resistenza proporzionale in qualsivoglia luogo alla forza accelerante, o ritardante, e lo stesso dicasi delle altre differenze EG, PO, le quali ponendo l'arco EC = a , e l'arco CF = x vengono espresse dalla seguente progressione

$$a - x, a - \frac{x^2}{a}, a - \frac{x^3}{a^2}, a - \frac{x^4}{a^3}, a - \frac{x^5}{a^4}, \text{ ec.}$$

Questa serie è crescente, ma prese le sue differenze

$$x - \frac{x^2}{a}, \frac{x^2}{a} - \frac{x^3}{a^2}, \frac{x^3}{a^2} - \frac{x^4}{a^3}, \frac{x^4}{a^3} - \frac{x^5}{a^4}; \text{ ec.}$$

formano queste una progressione geometrica decrescente.

4. Il tempo della discesa per la curva EC è maggiore del tempo impiegato nell'ascendimento per l'arco CF, e questi tempi sono in ragione dimidiata degli archi EC, CF, o sia come $\sqrt{g+r} : \sqrt{g-r}$. Non ostante ciò le intiere vibrazioni EF, FG, GO, ec. sono isocrone, conciossiachè sono uguali i tempi consumati nelle due discese EC, FC, ed altresì uguali i tempi spesi nelle due salite CF, CG.

5°. La velocità massima sarà nel punto infimo C della cicloide, e resterà fissata col prendere una media proporzionale fra l'arco EC della discesa, e la forza accelerante EL; ovvero fra l'arco CF della salita, e la forza ritardante corrispondente al punto F, la quale è quarta proporzionale alle tre quantità FC, CE, EL.

6°. Le velocità poi nei punti di mezzo per esempio in G, ed O si ritrovano col descrivere due quarte d'ellissi; la prima per la discesa coll'asse maggiore uguale all'arco EC, ed il minore uguale alla suddetta media proporzionale; la seconda per l'ascendimento con l'ultimo asse comune, e l'altro uguale all'arco CF.

7°. Due pendoli affatto simili, cioè di ghiande, e di fili uguali, che si vibrino nel medesimo fluido, uno percorrendo archi maggiori, e l'altro minori, perderanno una parte proporzionale del loro moto in un pari numero d'oscillazioni. Scenda il primo dal punto di quiete E, e dopo cento vibrazioni pervenga al punto G; di modo che sia EG la quarta parte dell'arco EC: dico, che il secondo, che si parte dal punto di riposo B, dopo cento oscillazioni monterà fino al punto E, e

E e c 2

che

che l'arco BE farà subquadruplo dell'arco BC. La dimostrazione dipende dal n°. 2°. Le sperienze del Sig. Newton non favoriscono punto la nostra supposizione, come se ne può far facilmente il confronto.

8°. Finalmente stando tutte le cose ferme come sopra, se i fili, o le catenelle, che sostentano le ghiande, saranno ineguali, in tal caso i tempi delle vibrazioni nei due differenti pendoli faranno in ragione dimidiata delle lunghezze de' fili medesimi: proprietà, che si verifica anche nel vano.

S C O L I O .

Dalle conseguenze puramente geometriche mi faccio strada alle fisiche. Prima di tutto io noto, che nei punti di quiete per esempio E, F, ec. la resistenza r è necessariamente nulla; perchè il mezzo fluido non ha ripugnanza veruna a persistere nello stato, in cui si trova, nè per quello appartiene alla sua inerzia, non essendo cacciato fuori di luogo; nè per quello concerne la tenacità, ed il sfregamento, mentre non restano le particelle staccate l'una dall'altra, nè si oppongono colla loro asprezza ad un corpo, che sta in riposo. Tutto ciò, che in tale incontro può operare il mezzo, consiste in togliere al solido una parte del suo peso, facendo che il corpo discenda con una gravità relativa minore dell'assoluta. Le altre resistenze anno relazione al moto, ed è un manifesto assurdo, che nel punto di quiete E abbia ad esprimersi la resistenza per la quantità finita LM, come richiede la nostra ipotesi.

Molto meno intendo, qualmente facciasi il gran salto dal nulla al finito, senza passare per i gradi di mezzo. Se dunque nello stato di riposo si fa essere $r=0$, anche nello stato di moto, quando la velocità sarà infinitesima, sarà altresì minima la resistenza, e ad una celerità finita corrisponderà una finita resistenza, nella quale c'entrerà sempre una qualche funzione della velocità.

Cresce l'assurdo per un altro verso; conciossiachè se nel punto di quiete E giusta l'ipotesi la resistenza LM è finita: all'incontro è nulla nel punto infimo C della cicloide, mentre cammina il pendolo colla massima velocità, e cammina per uno spazio minimo orizzontale, senza che sia nè accelerato, nè ritardato dalla sua natural gravità. In sì fatte circostanze ripugna pure l'inerzia del liquido spinto fuori del suo luogo, la tenacità delle particelle fluide, che vengono separate, e disgiunte, e forse anco lo sfregamento; come dunque può essere, che tutte queste resistenze abbiano in tal caso tanta discrezione di permettere al solido libero il passaggio, senza far contrasto al suo moto?

L'ipotesi Nevvtoniana, di cui ho favellato nello Schediasma XXXII. e la quale sottra la resistenza data dalla forza tangenziale, quantunque sia stata assunta dall'Autore piuttosto come matematica, che fisica, è soggetta al primo, ma non già a quest'ultimo inconveniente.

SCHE:

SCHEDIASMA XXXIV. (*)

Osservazioni sopra il moto de' corpi solidi ne' mezzi fluidi.

Nella copiosa ristampa delle Opere del Galileo fatta ultimamente in Firenze Tomo terzo, pag. 331., e seguenti, si trovano registrati alcuni Teoremi dell'incomparabile Geometra Ab. D. Guido Grandi intorno le velocità dei solidi discendenti nei fluidi: e sebbene questa Dottrina è maneggiata nella ipotesi più semplice, prescindendosi dalle resistenze; non ostante ciò parmi, che sia stata stabilita su principi incerti, e mal corrispondenti alle vere leggi del moto; laonde mi sono lasciato indurre a mettere in carta queste mie riflessioni.

Ecco in poche parole la sentenza del lodato Matematico. Discenda il corpo A (Fig. 127.) per un fluido, e paragonate assieme le loro specifiche gravità, abbiano la proporzione di $MG:FG$, onde la differenza MF esprima la forza acceleratrice, con cui il solido A viene nel liquido alla discesa sollecitato. In fatti supponendosi, che la linea MG ci rappresenti il peso assoluto del corpo A nel vano, e la FG il peso parimente assoluto nel vano d'una mole del liquido precisamente uguale al volume del solido A; il peso comparativo, o specifico della palla A nel predetto fluido ci verrà espresso dalla retta MF ; essendo certo, che il mezzo leva al solido tanto di peso, quanto peserebbe una data quantità del fluido, che sottrasse nel luogo occupato dal solido.

Quindi tirata l'orizzontale FH , che passa per il punto F, e ad essa dal punto M inclinata la diagonale MH uguale alla MG , si pretende, che il momento, per cui il mobile A scenderebbe nel vuoto giusta la direzione del piano inclinato HM , s'uguagli al momento, con cui è disposto il corpo A a discendere verticalmente per il mezzo fluido. E la ragione si deriva da ciò, che la forza sollecitante alla discesa in tutti i punti analoghi degli spazi trascorsi, principiando dalla quiete, si trova essere precisamente uguale alla linea MF tanto nell'una, quanto nell'altra ipotesi.

La dimostrazione camminerebbe ottimamente, se fossero pari le circostanze. Per meglio spiegarci, sieno le due palle A, B (Fig. 128.) dello stesso volume, ma di differente peso, le quali si connettano con un filo, che facciasi passare per la girella immobile C; e non si metta
in

(*) Nel mese d'Agosto 1720. comunicò l'Autore col mezzo dell'eccellente Astronomo Sig. Eustachio Manfredi all'acutissimo Geometra P. Ab. D. Guido Grandi le sue Osservazioni sopra il moto de' corpi solidi ne' mezzi fluidi. Si servì questi dello stesso Sig. Manfredi per inviare 'al C. J. la sua Risposta nel mese di Settembre dell'anno medesimo, in cui disendeva la propria sentenza pubblicata nella ristampa delle Opere del Galileo fatta in Firenze l'anno 1718., e finalmente dopo la Replica dell'Autore si dichiarò interamente persuaso.

in conto nè la gravità del filo; nè la frizione della tróclea. Suppóngasi; che la palla A discendendo nel vano faccia poggiare in alto la palla B: egli è manifesto, che con quella stessa velocità, con cui discenderà la prima, salirà altresì la seconda. Ora io dimando con che legge si facciano questi moti. Si dia m la massa del globo A, ed n quella del globo B, ed essendo i pesi proporzionali alle masse, si avrà la gravità comparativa, che spinge abbasso la sfera $A = m - n$.

Ciò premesso, per i canoni dei moti accelerati la forza sollecitante moltiplicata nel tempo è sempre uguale alla quantità del moto, o sia alla velocità moltiplicata nella massa, che attualmente si muove; e la forza medesima moltiplicata nello spazio trascorso equivale al prodotto del quadrato della velocità nella massa posta parimente in moto; ma nel caso nostro non s'imprime solamente il moto alla palla A, che discende, ma di più alla palla B, che con pari celerità è costretta ad ascendere; dunque chiamando, t il tempo, s lo spazio, v la velocità, avremo le seguenti formule $m - n \cdot t = m + n \cdot v$ dalle quali dedurremo

$$m - n \cdot t = \frac{m + n}{2} \cdot \frac{v}{v},$$

tutte le proprietà del moto, che ci siamo proposti d'investigare.

Chi poi volesse considerare la salita del solido B, le formole diventerebbono negative, ed in tal incontro la forza accelerante $n - m$ essendo una quantità negativa ci ammonisce, che il corpo B dee montare in cambio di discendere.

Applicando l'addotta dimostrazione a que' solidi, che calano abbasso ne' mezzi fluidi, io noto, che la forza accelerante, o il peso comparativo non solamente spinge all'ingiù la massa solida, ma obbliga a salire con velocità equivalente una massa fluida eguale al predetto solido, e ad occupare il luogo da esso successivamente abbandonato. Il difetto pertanto, che secondo il mio debole parere si rinviene in tutto il progresso delle dimostrazioni del lodato Matematico, consiste in una semplice inavvertenza, cioè a dire nell'aver solo posto mente alla massa, che piomba abbasso, e non a quella, che poggia in alto.

Ma s'egli avesse rivolto lo sguardo a que' corpi, che per essere più leggieri in spezie del fluido, si trovano obbligati ad ascendere; si sarebbe accorto, che in tale ipotesi il liquido si è quello, che dal suo maggior momento stretto a calare abbasso, spinge il solido all'insù. Perciò la forza sollecitante farà $n - m$, e siccome nell'altro caso s'è messa in conto la massa, che discende; così non veggio, perchè nel nostro debba essere trascurata. Non so capire per qual motivo nella prima supposizione s'adopri la formola $m - n \cdot t = n \cdot v$, e nella seconda non si faccia uso dell'

analoga $\frac{n - m}{n} \cdot t = n \cdot v$ anzi in sua vece si sostituisca la seguente $\frac{n - m}{m} \cdot t = n \cdot v$,

nella

nella quale, quasi che la massa fluida in discendendo non cagionasse principalmente l'effetto, si considera semplicemente l'ascendimento della solida.

In ordine a ciò per determinare il piano declive analogo HM, per cui il mobile liberamente sdruciolando acquisti di passo in passo quei medesimi gradi di celerità, con cui il peso B per il fluido discende, egli è d'uopo diversificare la costruzione del Chiarissimo Autore, prendendo la normale HO, o sia FM non già eguale alla quantità $m-n$, ma

più tosto all'altra $m \cdot \frac{m-n}{m+n}$, la quale deriva dai nostri principj.

Risposta del P. Ab. D. Guido Grandi alle premesse Osservazioni.

La difficoltà mossa dal Sig. Conte Riccato non parmi, che giunga ad oscurare l'idea chiarissima, che abbiamo della forza, con cui scende un solido per un mezzo fluido, analoga a quella, che eserciterebbe sopra il piano da me assegnato.

Se colla funicella CA (Fig. 127.) il corpo A si sospende, e sia il peso del suddetto corpo A come MG; dentro il fluido GB, il cui peso in pari mole al solido sia GF, m'insegna Archimede, e me lo conferma l'esperienza, che la fune suddetta viene tesa con una forza come FM, cioè proporzionale all'eccesso del peso di A sopra il peso del fluido B in pari mole. Similmente inclinata la MH eguale ad MG sopra l'orizzontale FH, se vi pongo sopra lo stesso corpo A, tenendolo colla fune AC parallela al piano HM, perchè non iscorra per esso la forza, che ne sentirà la mano, sarà misurata dall'altezza perpendicolare HO, cioè dalla medesima MF; dunque in amendue i casi è la stessa forza, con cui il corpo A sta in procinto di scendere, e lo stesso momento esercita nel fluido, che nel piano HM.

Ora qui ci avverte il Sig. Conte, che diversamente si applica al moto la forza suddetta nel fluido, che nel piano; perchè in questo non ha da muovere, se non lo stesso corpo A; ma nel fluido, si muove insieme il corpo A all'ingiù, ed una mole pari di fluido B all'insù: e però bisogna distribuire la forza ad ambi i corpi A, B in ragione delle loro masse.

Io dubito, che non si rimetta in campo una partitè già pareggiata, facendo il conto due volte sopra il fluido B eguale in mole al corpo A, se si parla della tendenza di esso; oppure che non si voglia richiamare in scena ciò, che si era accordato di lasciarlo fuori, e prescindere, se si parla del moto attuale del medesimo fluido.

Imperocchè quando si è detto, che la forza, la quale nel fluido tende la funicella CA, non è tutto il peso MG del corpo A, ma il solo eccesso MF sopra il peso GF del fluido B in pari mole, già si è considerata la tendenza del fluido B, che col suo peso GF resiste alla discesa del corpo A, perchè questa l'obbligherebbe a scomodarsi, e salire, per cederli il luogo; e però detratta la forza suddetta GF, che resiste alla

alla discesa del corpo A, il quale per altro con tutta la forza GM tenderebbe a discendere, gli rimane di libera la sola forza MF, con cui esercita il suo momento di scendere, e tira la funicella CA. Non accade adunque più considerare, che la forza MF debba non solo muovere allo ingiù il corpo A, ma obbligare ancora il fluido B alla salita, perchè già si è considerato questo punto una volta, quando si è concluso, che il corpo A non più ha la forza come tutta la GM (quale averebbe, se non dovesse contrastare col fluido G ripugnante alla salita colla sua forza GF) ma come la sola FM, tenendone continuamente impiegata la parte sua GF appunto in rintuzzare l'opposita tendenza del fluido B, la quale essendo equilibrata colla porzione GF della forza GM, con ogni minimo vantaggio di moto attuale, anche infinitamente piccolo, che si consideri nel corpo A, resta poi vinta, ed obbligato perciò il fluido B a salire.

Che se si vuole far conto non del solo cedere, che fa il fluido B per rimanere la sua tendenza in qualsivoglia modo superata dall'intera forza di A, ed obbligata, per dir così, a ritirarsi dalle sue pretese, ma di più del moto attuale, che con una certa velocità ora minore, ed ora maggiore quindi ne segue, e trasporta di fatto in alto il fluido B: eccoci alla resistenza del mezzo, da cui (siccome avverte il medesimo Sig. Conte) prescindeva in quella teoria: che però la considerazione di questa, che sul principio del moto (di cui si tratta principalmente) non è notabile, ma solo nel decorso diventa poi tale, potrà aggiungerli a ciò, che si è dimostrato, senza gettare a terra le stesse dimostrazioni, quasi fondate fossero in falsi principj, e così perfezionare la suddetta Teoria, supplendo ciò, che le manca.

Non sò però, se la strada tenuta dal Sig. Conte sia bastevole a ciò, perchè il fluido è obbligato, mosso ch'ei sia, a salire sempre con maggiore velocità, e quindi si va diminuendo il moto del solido; ma una parte di esso moto gli viene restituita dal fluido, che per di dietro ricorre, e così si entra in una Teoria complicatissima, che non può dipendere dalla formula costante $m - n$ trovata dal Sig. Conte; e

$$m + n$$

dubito, che gli sia per essere ammesso da tutti, che posto un corpo di due libbre in un fluido, che in pari mole pesi una libbra, debba stimarsi la forza, che ha di scendere per esso, come di un terzo di libbra, cioè di 4. once, e non piuttosto di mezza libbra, come sin qui si è creduto, rimanendo l'altra mezza libbra, (e non 8. once) sollevata dal contrappeso d'una pari mole di fluido. Tuttavolta se la ragione del Sig. Conte Riccati convincerà in contrario, bisognerà pure ricredersi.

Solamente avverto, che quando si dice, che alla discesa del solido dentro un fluido sale altrettanta mole di fluido, in rigore non è poi vero, perchè se si muoverà il globo HKIL (Fig. 129.) per uno spazio infinitamente piccolo LO, basterà, che si muova la sola porzio-

ne

ne HLOI del fluido, ed altrettanto ne ricorra dalle parti vicine nello spazio HNIK, il che la natura eseguisce prestissimo, e con minore scomodo, che sia possibile, onde fin ora non è stato necessario, che si muova una mole di fluido pari al solido, ma una parte infinitamente piccola, e con una velocità non maggiore di quella, con cui si è mosso il solido, e però al moto del solido si aggiunge per conto del fluido un'altra quantità di moto infinitamente più piccola. Segua ora il solido a muoversi per un altro spazio infinitamente piccolo; faremo nel medesimo caso di prima: non essendovi necessità, che si muova il fluido, che si muoveva nell'istante precedente, insieme con quello, che si muoverà ora, potendo quello rimanere equilibrato col resto. In somma in ogni istante troveremo, che una parte infinitamente piccola del fluido ha da salire (ed una simil parte ha da discendere) e non è se non per accidente, che si muova una parte notabile di esso fluido per dar luogo successivamente al solido, ed in ciò è differente il caso del moto ne' fluidi dal moto d'un peso attaccato ad una funicella, che passando per una troclea abbia attaccato all'altro termine un peso minore. In questo caso muovendosi in giù il maggior peso, è obbligato a strascicare allo 'nsù il peso minore tutto in un tempo in qualsivoglia istante; ma il solido muovendosi dentro il fluido non fa alzare tutto in un tempo una mole di fluido pari a se, ma a poco, a poco, e nel tempo, in cui discende per tutta l'altezza del suo diametro, la muove tutta a poco per volta. Anzi potrebb' essere il solido in un tal vaso, che non contenesse he'meno tanta mole di fluido pari a se, e pure si potrebbe muovere per esso: come se un vaso di larghezza per ogni verso di once 12., e di altezza di once 15. contenesse un cubo di onces 12. per ogni verso di qualche corpo solido più grave dell' acqua, ed il resto fosse acqua; potrebbe il solido elevato alla superficie cadere al fondo per l'altezza di once 3, e quando così avesse mossa tutta l'acqua, non ne avrebbe alzata la metà della sua mole, non essendovi che 807. once cubiche d'acqua in tutto, quando la mole del cubo è once cubiche 1728.

Il Sig. Bernoulli, non mi ricordo in quale Tomo degli Atti di Lipsia, calcolando il moto de' pendoli dentro i fluidi, computa la forza, che li muove appunto come ho fatt'io, secondo l'eccesso della gravità del corpo mosso sopra quella del fluido in pari mole, perchè avendo mostrato essere la moltitudine delle vibrazioni di pendoli eguali fatte nello stesso tempo in sudduplicata ragione delle forze, conclude poi, che essendo la ragione della gravità specifica del corpo a quella del mezzo come G ad M, il numero delle vibrazioni nel vuoto a quel-

lo delle vibrazioni nel mezzo sarà come $\sqrt{c} : \sqrt{c - m}$. Onde se il Sig. Conte vorrà impugnare la mia Teoria, avrà l'onore nello stesso tempo di correggere quella di un sì celebre Matematico Oltramontano.

Replica alla Risposta del P. Ab. Grandi.

Per essermi spiegato nell'altro mio foglio troppo in ristretto, ho dato motivo al dottissimo P. Ab. Grandi di muovere alcune difficoltà contro la mia Teorica in proposito della discesa de' corpi solidi ne' mezzi fluidi; alle quali m'ingegnerò di soddisfare tenendomi lontano da ogni disputa, ed a solo oggetto di scoprire la verità.

Si mi permesse prima d'ogni altra cosa di esaminare l'ipotesi del celebre Autore nelle sue conseguenze; perchè se taluna d'esse sarà manifestamente assurda, ci renderà sospetti i principj, da' quali è stata legittimamente dedotta. Prend'egli nella Prop. 6^a. pag. 336. a misurare le velocità acquistate da un mobile, che discendendo per un fluido ci avrà speso un tempo determinato, e le paragona con quella, che in tempo pari si sarebbe acquistata nel vano, discorrendo nella seguente maniera.

La retta FG (Fig. 130.) esprima la gravità specifica del fluido, e la FC ci rappresenti la velocità, che nel voto guadagnerebbe qualsivoglia corpo in fine d'un dato tempo, il qual tempo si esponga altresì per la medesima retta FC. Compiuto il rettangolo FU, e prorogate all'infinito le due linee UG, UC, fra esse siccome asintoti descrivasi l'iperbola DFL, che passi per il punto F: interverrà, che se le abscisse GM, Gm esprimeranno le varie gravità specifiche de' solidi, che discendono nel predetto liquido, la di cui gravità specifica è GF; le corrispondenti applicate ML, ml esprimeranno le velocità acquistate nel tempo predetto FC.

La premessa costruzione trae l'origine dalla formola fondamentale $m - n. t = mn$, nella quale n , e t fanno figura di costanti ed m , n di variabili. Quindi presa GM infinita, la velocità acquistata da un corpo infinitamente denso nel fine del tempo FC sarebbe precisamente uguale alla celerità, che in detto tempo si guadagnerebbe nel vano. Se poi la densità del solido fosse uguale a quella del fluido, cioè GM = GF, l'ordinata che nel punto F è nulla, indicherebbe, che il solido collocato in qualunque sito del mezzo fluido starebbe in riposo.

Sin qui tutto cammina ottimamente: ma quando si passa dal positivo al negativo, ci si fa anzi gli occhi l'inconveniente. In vero presa la gravità specifica del solido minore di quella del liquido, onde il corpo immerso ascenda in iscambio di discendere; io posso determinare GN così piccola, che la velocità corrispondente ND acquistata dal mobile ascendente nel fine del tempo FC stia a quella, che acquisterebbe un corpo cadente in pari tempo nel voto, in proporzione maggiore di qualsivoglia data. Questa conseguenza, che viene ammessa dal P. Ab. Grandi nel Corollario secondo, basta da se sola, s'io non m'inganno, a far toccar con mano, che la sua Dottrina non s'accorda colle vere leggi del

del moto, nè colla speranza: Di fatto bisognerebbe, che un corpo leggiero come un sughero salisse nell'argento vivo con una incredibile celerità, e che con un moto prontissimo l'aria montasse per l'acqua, lo che ripugna alle osservazioni.

In oltre un corpo grave posto in un fluido di maggiore gravità specifica intanto ascende, in quanto viene estruso, e cacciato in alto dal maggior momento del liquido. Per altro il corpo più leggiero in ispecie non ha in se stesso alcuna facoltà, o alcuna inclinazione alla salita; e perciò non può mai ascendere con maggiore celerità di quella, con cui possa discendere il fluido, dal quale è spinto ed estruso. Ma certa cosa è, che il fluido non può discendere con maggiore velocità di quello sarebbe in discendendo nel voto, quand'anche il solido immerso si supponga d'una infinita rarità; dunque la velocità del solido ascendente, quantunque rarissimo, non può mai superare la velocità del solido de' gravi cadenti in tempo pari nel vano. Se altrimenti fosse, il predetto solido non poggerrebbe in virtù della espulsione fatta dal fluido più grave, che cala abbasso, ma per una sua natural leggerezza, e con una velocità, che supererebbe di lunga mano quella del fluido discendente in vigore di tutta la sua innata gravità. Sarebbe questa certamente una grande, e bella scoperta in Fisica, se fosse vera.

Tentiamo di sciogliere lo stesso Problema increndo ai nostri principj. Ciò si conseguirà facilmente, presa per mano la formula.

$m - n. t = m + n. n$, in cui supposte costanti n, t , s'assumeranno m, n siccome variabili; onde abbiasi la seguente costruzione.

Sia FC la velocità acquistata da un mobile nel voto in fine del tempo espresso per la medesima FC, e ci rappresenti GF la densità del fluido. Facciasi Fg doppia di FG, e dato compimento al rettangolo Fw, dentro gli assintoti gw, wC descrivasi l'iperbola HFO, che passi per il punto F: dico, che se per esempio l'abscissa GM esprimerà la densità del solido, dall'applicata MO ci verrà esposta la velocità acquistata da esso solido nel fine del tempo FC. Posta GM infinita, la velocità sarà uguale ad FC, e fatta la gravità specifica del solido pari a quella del fluido, la velocità sarà nulla.

Ma presa la densità GN del solido più picciola di quella del liquido, la velocità sarà NP, che allora si troverà precisamente uguale alla velocità FC, ogni qual volta la rarità del solido sarà infinita; così che fatta GN infinitamente picciola, diventi la velocità GQ = FC. Per la qual causa in tale ipotesi il fluido discenderà, prescindendo dalle resistenze, come se discendesse nel vano, e colla stessa celerità verrà spinto all'insù il solido, che si finge infinitamente raro: conseguenze tutte, che si accordano col principio dell'estrusione, e dimostrano la verità del mio assunto.

Da questa Dottrina si cava un Corollario importante, che riuscirebbe falso, mentre fosse vera l'opinione del P. Ab. Grandi: ed è, che

F f 2

im-

immerso il grave A in un fluido B di minore specifica gravità, se fingeremo un fluido D pari in gravità specifica al solido A, ed un solido C egualmente denso come il fluido B; il grave A nel discendere per il liquido B, ed il solido C nell'ascendere per il fluido D, principiando dalla quiete, acquisteranno in tempi uguali un grado pari di velocità. Ciò interviene, perchè la quantità positiva $\frac{A-B}{A+B}$ è uguale

alla negativa $\frac{C-D}{C+D}$, con questo divario però, che all'affermativa ri-

sponderà una forza centripeta, ed alla negativa una centrifuga. Ma secondo il P. Ab. Grandi, la grandezza positiva $\frac{A-B}{A}$ alla negativa

$\frac{C-D}{C}$ avrà la proporzione inversa di A: C; laonde la velocità della

discesa a quella della salita in tempi uguali potrà essere in qualsivoglia ragione.

Il detto fin qui è sufficiente, s'io non erro, per istabilire la mia sentenza: rimane per tanto, che si risponda all'opposizioni.

Dubita il lodato Scrittore, che si metta due volte in conto l'azione del fluido B, ma l'esempio da me recato toglie di mezzo la difficoltà. Fatto passare il filo per la troclea C (Fig. 128.), dal quale siano sospesi i due gravi A maggiore, e B minore, egli è certo, che s'io porrò in D una potenza $= A-B$, che tiri dal basso in alto, si farà l'equilibrio: contuttociò levata la potenza D, s'io vorrò determinare la velocità del peso A nel fine del tempo dato, bisognerà anche per sentimento del P. Grandi, ch'io mi vaglia della formula $\frac{A-B}{A+B} \cdot t = u$.

In vece del peso B sia circondato il corpo A da un fluido, di cui un volume uguale ad A pesi quanto il grave B. Restituita la potenza D, di bel nuovo si rimetterà l'equilibrio. Ma tolta di mezzo essa potenza D, chiaramente apparisce, che siccome nel primo caso non può il corpo A calare abbasso, senza tirar in alto la massa B; così nel secondo non può il peso A farsi strada discendendo per il fluido, senz'alzare una mole di liquido corrispondente alla massa B. La ragione si è, che considerato il grave A in quiete, il suo momento, o la forza sollecitante equivale alla potenza D, nè si muta mai per tutto il tempo della discesa, se non se in quanto viene a distribuirsi ad una massa maggiore. Per la qual causa la predetta forza, o sia impressione sollecitante equivalente sempre alla potenza costante D tanto meno opera, rispettivamente alla velocità comunicata, quanto ha da ahimare una massa più grande.

SCHE-

SCHEDIASMA XXXV. (*)

Delle pressioni, e degli equilibrij de' fluidi.

Quantunque sia malagevole impresa lo spiegare meccanicamente le proprietà de' corpi fluidi, e che i più sublimi Geometri nelle loro dilucidazioni abbiano lasciato molto da desiderare; non pertanto non mi sarà vietato di proporre alcune mie osservazioni, e di spargere un qualche nuovo lume sopra la presente oscurissima materia.

Prima d'ogn'altra cosa fa di mestieri comprendere in che consista la maggior difficoltà. Dai fenomeni impariamo essere i fluidi, a distinzione dei solidi, forniti d'una singolare prerogativa di sfiancare per tutti i versi, e di esercitare la loro forza da tutti i lati: la qual forza è sempre proporzionale all'altezza verticale del fluido sopra incombente. Così i cannoni di piombo, o di rame ad uso delle fontane caricati d'acqua, e lungi oltre una certa misura finalmente si fendono, ed aperto un picciolo buco nella parte d'un vase, esce il liquido con tanta velocità, quanta n'avrebbe acquistata in cadendo liberamente a piombo da una sublimità pari all'altezza del fluido sopra il centro del foro.

Abbiasi un cilindro retto, il cui vano sia pieno di ghiaccio. Ognun sa, che la massa gelata colla sua natural gravità preme il fondo, e non impiega qualsivisia menoma parte della sua azione contro la superficie concava della canna. Il gelo si squagli, ed allora oltreche il fondo soggiace ad una pari pressione, anche alla parte del vaso si addossa il suo carico, giusta la regola testè indicata. Pare adunque, che perseverando tutto intiero, e senz'alcuna diminuzione l'effetto cagionato sul fondo dal peso del ghiaccio, se ne aggiunga un altro spesse fiate assai più gagliardo contro la sponda, computata la somma totale delle pressioni. Ma se la cagione non si muta, l'effetto non dovrebbe mai crescere; altrimenti si mette una eccezzione al celebre ed inalterabile Assioma, che gli effetti prodotti non superano, nè vengono superati dall'energia della causa produttrice, quando questa nel generarli tutta si spende. Per isvolgere il nodo, premetto il seguente

A S S I O M A.

Si dispongano alquanti corpi toccantisi A, B, C (Fig. 131.) uno sopra l'altro verticalmente: è cosa chiara, che il più basso A sostiene il peso di tutti e due i superiori. La gravità non dorme mai, e perciò quan-

(*) Fu composto questo Schediasma l'anno 1741. per isgombrare alcune difficoltà promosse dal P. Vincenzo Riccati, come si raccoglie da due lettere dello stesso Padre, l'una de' 10. Gennaio, e l'altra de' 7. Marzo dell'anno mentovato, dirette al Fratello Co. Giordano.

414
quando impedita non può stimolare le masse alla discesa, impiega tutto il suo vigore nel premere.

S C O L I O .

I fluidi sono composti di minime particelle disgiunte, e staccate, e che fra loro non anno una stretta connessione; laonde sono prontissimi a cedere ad ogni impulso. Se la stilla E (Fig. 132.) non galleggia a fior d'acqua, ma sta in quiete immersa ad una data profondità; egli è certo sostenere essa il filo EF di tutte le gocce, che la caricano a perpendicolo, e in virtù di cotal pressione premer essa tutte le gocce vicine per ogni direzione. Quindi si rende manifesta la differenza tra i fluidi, ed i solidi. Questi siccome composti di particole unite l'una coll'altra, e bene spesso insieme intralciate, *agunt per modum unius*; nè una particella può sfiancare dai lati, mentre non può staccarsi dalle contigue, ed operar separatamente. Là dove ne' fluidi, oltre all'esercitare un'azione comune, ciascuna goccia agisce da se sola, essendo pronta a cedere, da qualunque lato le venga aperta la strada.

TEOREMA PRIMO.

Nelle stesse circostanze dico, che la goccia E circondata dal fluido, persistendo in riposo, è compressa ugualmente per tutte le direzioni.

La dimostrazione presuppone esser le goccioline del fluido perfetto dotate di squisita elasticità. Abbiamo dal premesso Assioma, che la stilla E viene aggravata a piombo dalla colonna fluida EF: ma non ostante il carico, e tutto che sia sostenuta da un appoggio, che cede ad ogni piccolo impulso, ella non si muove nè direttamente all'ingiù, nè obliquamente dai lati, nè cangia ulteriormente figura; dunque perseverando l'equilibrio, lo sforzo del filo verticale EF è contrabilanciato dalle impressioni, che premono tutto all'intorno la gocciola, le quali eguagliando la sua elasticità, vogliono misurarsi dalla gravità della colonna EF: il che ec.

COROLLARIO PRIMO.

Si appoggi la stilla G alla parete del vaso nel punto I: è cosa chiara, che non si turberà l'equilibrio; perchè la resistenza della sponda supplisce alla mancanza delle particole acquee, che da quel lato facean contrasto. E lo stesso dee succedere, quand'anco le pareti non fossero normali al fondo, ma ripiegate, come nella figura, e curve piuttosto che rette; mercecchè in qualunque incontro la massa della gocciola è del pari compressa da tutti i lati, e se altrimenti camminasse la faccenda, non sussisterebbe l'equilibrio.

COROLLARIO SECONDO.

Per discernere qual forza impieghi la stilla G contro la parete del vase nel punto di appoggio I, basta misurare l'altezza del filo GH, e la specifica gravità del liquore. La goccia G è caricata dal peso della colonna fluida GH, e nello stesso tempo compressa da forze uguali, che tutto all'intorno la cingono: ma una di queste forze si è la reazione della sponda nel punto I, la quale equivalendo per una parte allo sforzo della gocciola G giusta la direzione perpendicolare alla linea del contatto, e per l'altra all'aggravamento del cilindro fluido GH; ne nasce di conseguenza, che la parete del vase in I viene pressa dalla stilla G con quello stesso vigore, per cui essa stilla viene aggravata dal peso del filo GH.

SCOLIO PRIMO.

Ed ecco sufficientemente dilucidata la maravigliosa proprietà dei fluidi di premere, e di sfiancare per tutti i versis conciossiachè la goccia E non solamente sostiene il carico delle stille superiori, che a piombo la pressano, ma per mezzo della reazione anco lo sforzo delle inferiori, che come in un torchio la stringono. Oltre ciò bisogna tener conto dei fili orizzontali, ed obliqui, che tutti, e per tutte le direzioni contro essa stilla esercitano una pari azione, ad uno de' quai fili supplisce il contatto della parete. Per la qual cosa le particelle elementari componenti il fluido si contengono in un esatto equilibrio.

SCOLIO SECONDO.

La Proposizione esposta, e dimostrata è talmente seconda, che da essa spontaneamente fluiscono le primarie affezioni dei corpi liquidi. Tutti fanno, che una massa pesante discende, ogni qualvolta si accosta al centro dei gravi, ed al contrario ascende, quando se ne discosta.

E' noto altresì, che un peso non impedito sempre cala abbasso, non cessando mai di operare la gravità innata. Quindi la superficie superiore d'un fluido si mette a livello, e si adatta ad una superficie sferica egualmente distante da quel punto, verso cui in ogni Regione tendono i gravi. Se una parte si mantiene delle altre vicine più sollevata, fa d'uopo investigare la ragione, per la quale la gravità naturale in certi incontri patisce diminuzione, e se ne fa oziosa.

Non si dà forse liquore, che di qualche picciola tenacità non sia fornito, ed oltre ciò i fluidi sono soggetti alle resistenze, ed ai fregamenti, e quanto sono più perfetti, tanto più facilmente si spianano. Mi è venuto fatto d'osservare, che escavata una buca nel mele, sostanza consistente, e che può chiamarsi sem fluida, ci volevano parecchie ore, prima che la superficie si riponesse a livello.

Fa-

Famosa sì è l'esperienza del Galileo, per cui si fa stare a fior d'acqua una lamina piana di metallo, quantunque assai più grieve in ispecie dell'acqua medesima. Si vede tutto all'intorno alzarli un picciolo argine, e sostentarsi l'acqua senza fluire. La lamina unita all'aere occupante il vano della sponda acquae forma un solido più leggieri d'altrettanta mole d'acqua, il quale a guisa di zatta galleggia. Ma bagnata gentilmente la lamina, questa subito si profonda; perchè in tali circostanze l'acqua dell'arginetto non si sostiene, e scorre liberamente.

Mi sovviene d'avere spesso fiato veduto a derivare un rigagnolo per un asciutto canaleto. L'acqua di poco corpo avanzava stentatamente cammino, e con un moto interrotto; conciossiachè tratto tratto si fermava, restando immota per qualche tempo, finattantochè faziato in prima l'alveo bibace, formava essa un grosso labbro, e si alzava a misura di poter superare la scabrosità del fondo. Dappoi fluiva per un piccolo spazio, indi tornava a fermarsi, e ripetendo a passi regolati lo stesso giuoco, appena in una intiera giornata le riusciva di progredir per un miglio.

Molto ci sarebbe da riflettere sopra le superficie dei liquori contenuti nei vasi o scemi, o pieni, o traboccanti, e sopra gli effetti indi nascenti, de' quali ha ragionato a lungo il Borelli nella sua Opera de' moti naturali dipendenti dalla gravità. Nè avrebbero ad ommetterlisi i curiosi Fenomeni delle gocce ora sensibilmente rotonde, ora bislunghe, ed ora schiacciate, che sono tanto più grosse, quanto che si attaccano a corpi più ruvidi, e più pelosi. Alquanto belle osservazioni si leggono in tal proposito nel Trattato dei Barometri del Sig. Dott. Jacopo Piacentini, ora Primario Professore di Medicina nella Università di Padova.

S C O L I O III.

Se tutte le stille, che si rinvergono nella sezione orizzontale qualunque FD (Fig. 133.) del vase ABC pieno d'acqua non sono per ogni verso egualmente premute; dico che non sussistendo l'equilibrio, tutte le particelle del fluido tanto superiori, quanto inferiori alla segnata sezione si metteranno in movimento. La misura delle compressioni, che stringono tutte all'intorno la goccia D si deduce dal filo verticale DE; e perchè si suppone, che la goccia F sia meno premuta, sotterrà essa il filo FG più corto di DE. Prevalerà dunque la maggior forza, e la stilla F colle contigue sarà costretta a cedere, ed a salire, discendendo all'incontro il filo ED, e comunicata l'agitazione a tutto il corpo del fluido, dopo varj bilanciamenti non cesserà mai il moto, se le particelle sotterrate nei posti D, F non faranno del pari compressione: lo che interverrà, mentre la superficie superiore AHC mettendosi a livello, si trovi parallela alla sezione FD.

Non

Non nega già, che l'acqua ammontata in HEC, e non impedita si spiani in discendendo, come per un piano inclinato. Non pertanto il maggior effetto proviene certamente dalla pressione; conciossiachè è molto più grande l'impulso, che spigne in alto la goccia F di quello, che stimola la stilla E a discender obliquamente.

Per la cagione addotta si conserva perenne la corrente dei Fiumi, attesochè somministrando continuamente le fontane, e le vasche nuovo alimento, l'acqua, che sopraggiugne, carica, ed incalza quella, che precede; laonde le gocce d'una qualsivoglia sezione orizzontale non si rinvencono mai egualmente premute, e di conseguenza stanno in un perpetuo moto, senza mai pervenire all'equilibrio. Tre diversi elementi vanno considerati nel corso dei fiumi, cioè la declività del letto, quella della superficie, che si adatta ad una specie di curva asintotica, e per ultimo la forza della pressione, ai quali fanno contrasto le direzioni irregolari, e vorticosse del filone, e le resistenze dell'alveo. Il secondo, e terzo elemento sono sempre in azione, ma non così il primo; perchè massimamente nei fiumi di lunghissimo corso il fondo per tratti orizzontali bene spesso si stende, conforme ci ha resi avvertiti il Guglielmini. Quando fra monti, o in vicinanza d'essi è notevole il pendio del letto, allora i fiumi corrono precipitosi, e con poco corpo d'acqua, e strascicando seco le ghiaie, e i sassi fanno un continuo sforzo per allargarsi. Allo incontro quanto più s'accostano al Mare, tanto camminano più placidi, e più ristretti, ma con maggior profondità, supplendo in tal caso alla mancanza del declive l'accrescimento della pressione.

SCOLIO QUARTO.

M'inoltre ai vasi comunicanti, uno de' quali ci viene rappresentato dalla Figura 134. Il liquore contenuto nel tubo più largo BK conserva un perpetuo commercio con quello del cannello più stretto FG per mezzo del tubo XY. Ora io dico, che ne' predetti vasi i fluidi omogenei, o almeno della specifica gravità stessa si quiereranno ogniquale volta le due superficie IK, LM si accomoderanno allo stesso piano orizzontale. Seguitiamo per poco i popolari pregiudizii, ed immaginiamoci, che predomini il liquore contenuto nel tubo più grande BK, di modo che l'acqua, a cagion d'elempio, sia ridotta a stato di riposo, mentre nel maggior vase si abbassa sino ad RS, e monta nel minore sino a GH. Si concepisca una qualunque goccia O, e condotta l'orizzontale ON, tagli le verticali QO, PN ne' punti O, N. Egli è manifesto, che la goccia O farà per l'una parte premuta con una forza proporzionale all'altezza QO, e per l'altra sosterrà una pressione, che corrisponde all'altezza PN; dunque essendo la prima pressione maggiore della seconda, fa di mestieri, che a quella ubbidisca la goccia O. La qual cosa verificandosi di tutte quante le gocce componenti il liquore, dovrà esso necessariamente discendere nel tubo opposto BK, sinattantochè qualunque stilla O sia del pari premuta per ogni verso, lo che interviene, quan-

Opere Ricc. Tom. III.

G g

do

do le superficie d'ambo i vasi s'adattano alla comune orizzontale IK LM.

Ma se i liquori sono differentemente gravi in ispezie, la sezione TU divida i due liquori, per modo che di sopra ad essa nel sito UG stia il liquore più leggero, e di sotto il più grave. Si prenda in questa sezione la goccia O. Ognuno facilmente comprende, che s'otterrà l'equilibrio, qualunque volta l'altezza a piombo QO del liquor più leggero sopra la goccia farà all'altezza PN del liquor più grave in proporzione reciproca del peso specifico, e non già assoluto proprio del fluido GU, al peso altresì specifico del fluido SBFT. In tali circostanze è agevole il dimostrare, che la goccia O farà egualmente premuta, stando le pressioni in ragion composta dell'altezza verticale, e della gravità specifica del liquore.

Posta poi cotale proporzione reciproca tra le gravità specifiche, e le altezze sopra il confine TU de' due liquori, io dico che qualunque goccia D sosterrà sempre eguali pressioni. Imperocchè chiamate G, g le gravità specifiche dei fluidi più, e meno gravi, si ha per l'ipotesi $g. QO = G. PN$, o sia $g. QD + g. DO = G. PN$, ovvero $g. QD = G. PN - g. DO$: ma $g. QD$ esprime la pressione, che la goccia D sostiene in virtù del filo QD, e $G. PN - g. DO$ la repressione; dunque è necessario, che trovandosi egualmente premuta, stia in equilibrio.

S C O L I O V.

Nella dimostrazione ultima s'è per noi tacitamente supposto, che il confine TU de' due liquori sia parallelo all'orizzonte, e posto in uno de' tubi comunicanti. Ci siamo così adoperati a disegno; poichè non è possibile, che nel caso d'equilibrio il predetto confine sia nel tubo di comunicazione, o fuor di livello. Fingasi collocata nel cannello di comunicazione la separazione CE dei fluidi, e sia questa qualunque superficie o piana, o curva. Si segni la stila A, che in equilibrio supponesi, per la quale passi l'orizzontale XY terminata alle verticali PN, QO prodotte. E' manifesto, che saranno le altezze PX, QY reciprocamente come le gravità specifiche G, g. Prendasi una nuova goccia tra A, E stando ferme le gravità specifiche, s'accresceranno di due quantità eguali le nuove altezze, e per conseguenza sarà maggiormente premuta dal liquor più grave, che dal men grave. Tutto all'opposto interverrà, mentre scelsi una goccia posta tra C, A: dunque dovrà seguir moto, inclinandosi la sezione AE verso F, e la sezione AC verso X. La medesima dimostrazione avrà luogo, se il confine de' fluidi sia bensì in uno de' tubi comunicanti, ma però obliquo relativamente all'orizzonte.

Abbiamo un celebre esempio del bilanciamento dei liquori eterogenei nella costruzione dei Barometri. L'argento vivo, che stagna nel catino, è del pari aggravato per una parte dal peso dell'aere, e dalla elasticità equivalente al peso medesimo, e per l'altra dalla colonna di mercurio, che ad una determinata altezza nel cannello si sostiene; la-

on-

onde dalle due forze pari, e contrarie si genera l'equilibrio. Ed atteso che mutate le circostanze si altera la gravità dell'aria per que' motivi, che non occorre indagare presentemente; in ordine a ciò anche l'argento vivo contenuto nel tubo si abbassa, e si rialza dentro certi limiti.

Qualora si vede estollerli un fluido sopra il consueto livello, sebbene circondato da un liquore della stessa natura, ed ivi reggersi senza discendere, si dica fuori d'ogni dubbio aver esso per qualche esterno accidente perduta una qualche porzione della sua specifica gravità. Nei tubi capillari l'acqua monta più, e meno, quasi inerpiciandosi per la picciola interior cavità del cannello. Se poi debba ciò ascriversi o all'attrazione Nevvtoniana, cuneo che serve per ogni nodo, o pure a cagioni più semplici, e meccaniche, non è ispezione, dietro cui io voglia presentemente spendere il tempo; avvegnachè uscirci troppo dal mio sentiero, se mi pigliassi la briga di sottoporre all'esame le moltissime sperienze in tal proposito registrate dal Sig. Musschenbroeck, e le oscillazioni, che ne vengono dedotte.

Aggiungo un esempio più manifesto. Se l'acqua del Mare si sostituisce alla massima elevazione sotto l'Equatore, e sta sempre più depressa, quanto più ai Poli si va accostando; abbiamo a credere, che il Mare sia composto d'innumerabili fili comunicanti, la specifica gravità de' quali venga passo passo minorata, procedendosi da Settentrione a Mezzogiorno, dallo accrescimento della forza centrifuga.

TEOREMA SECONDO.

Posta la goccia D abbracciata dal fluido, dico che non ostante le pressioni, a cui soggiace, la sua gravità innata sollecita la massa D colla forza consueta, e per la solita direzione verso il centro comune de' gravi. La ragione dipende dall'essere la gravità una forza morta bensì, ma continuamente applicata, e che non cessa mai d'operare: laonde sebbene per qualche tratto di tempo le circostanze portano, ch'ella s'impieghi o nel muovere, o nello ammaccare, o nel premere, e condensare, o che so io, ed in tal guisa generi la forza viva; compiuto però il lavoro, e ridotte le cose alla quiete, come nel caso nostro interviene, torna ad agire come prima, stimolando la goccia D alla discesa, ed aggravando l'ostacolo, che vi si oppone.

ANNOTAZIONE.

In comprovazione della verità posso addurre parecchi esemplj, e fra gli altri quello della stadera, in cui la mano, che regge l'uncino, allora solo sostiene intieramente il carico dei due pesi attaccati alle braccia, quando fra loro si contrabbilanciano, non entrando in conto la mutua azione, e reazione, per le quali uno impedisce la discesa dell'altro.

G g g 2

Di

Di vantaggio sia infissa nel pavimento orizzontale AB (Fig. 135.) la verga elastica CD costituita in sito verticale, a cui s'appoggi il peso D, che la comprima, e la riduca alla minor lunghezza CE, nel qual luogo dopo varie reciprocazioni il moto si estingua, e l'azione del peso sia bilanciata dal contrasforzo della molla. Sinattantochè la palla D, rannicchiando l'elastro da D fino in E, si accosta al piano sottoposto, questo non risente se non se una parte del carico; perchè quella porzione di forza, che si spende nel moto allo ingiù, non s'impiega ad aggravare, altrimenti la cagione del proprio effetto resterebbe superata. Ma quando il corpo D sta in riposo nel sito E, allora tutto il suo peso si addossa al piano; atteso che esercitando esso tutto il suo vigore contro la molla, la molla stessa in virtù della reazione al pavimento AB lo comunica.

COROLLARIO PRIMO.

Ogni particola elementare del fluido viene spinta all'ingiù dal proprio peso, sebbene attesi gl'impedimenti, non succede l'effetto della discesa. Ciò che d'una particella si afferma, dicasi generalmente di tutte insieme. Essendo il liquore omogeneo, il peso di qualunque goccia è proporzionale alla massa: quindi attaccato il vase pieno d'acqua, di qualunque figura egli si sia, al braccio d'una bilancia, per equilibrarlo, si dee porre nella scodella opposta tanto peso, che sia precisamente uguale a quello del vaso continente, e dell'acqua contenuta, nulla importando, che l'acqua si trovi o sciolta o gelata.

COROLLARIO SECONDO.

Messa la goccia nel fluido ad una data profondità, si noti che la forza della natural gravità della stilla non è paragonabile coll'energia delle pressioni, che la predetta goccia tutto all'intorno circondano, e stringono. Lo sforzo di una di queste pressioni, che a tutte le altre dà regola, si misura dal peso del filo verticale: ma un tal peso sta a quello della goccia proporzionalmente (perchè non si dee supporre, che tutti gli elementi d'un liquido omogeneo sieno fra loro con geometrica esattezza uguali) come il numero delle stille contenute nel filo all'unità; dunque se la stilla solitaria è minima almanco fisicamente, la sua gravità, e conseguentemente la sua forza a quella del filo premente è in una proporzione, che può assumersi, siccome minore di qualsivisa data. E molto più si allontana la proporzione, quando si mettano in conto tutte le altre pressioni, che contro la goccia impiegano il loro vigore.

SCO:

SCOLIO PRIMO.

Qui mi si apre l'adito di liberare la Fisica da un confermato pregiudizio. Parecchi Matematici, che mi sono capitati alle mani, spiegarono le azioni dei fluidi contro le pareti, ed i fondi dei vasi per via delle forze equipollenti. Sia la sponda CD (Fig. 132.) o curva, o retta ed obliqua all'orizzonte, alla quale nel punto I si appoggi la goccia G . La linea a piombo IL esprima il peso del filetto verticale HG , e condotta GK normale a CD , ovvero alla toccante del punto I , dal punto L si tiri la LK parallela ad IC , o alla menzionata tangente. Si pretende, che risolvendosi la forza IL nelle due collaterali LK , KI , la seconda sia quella, per cui la goccia G preme la sponda nel punto I , giusta la direzione IK . Se così è, quanto più l'angolo ottuso BCD si accosta al retto, tanto più si minora la forza premente IK , sino a diventar nulla, mentre la parete CD è perpendicolare al fondo per esempio orizzontale BC . In tale incontro la sponda non farebbe in conto alcuno premura, nè la goccia G farebbe nè punto, nè poco stimolata ad uscire dal vase con una direzione parallela all'orizzonte: lo che ripugna alle osservazioni.

Oltre ciò se la stilla G esercitasse contro la parete l'azione esposta per la normale IK , dallo impulso medesimo farebbe ella, almeno sul principio del moto, sollecitata a sbucare dal vase per il forame aperto in I , ed in conseguenza la impressione accelerante starebbe alla forza del filo premente HG come KI : IL . Non avrebbe dunque la gocciola G nè spirito, nè lena bastante per uscire dal vaso colla celerità conveniente alla discesa per la sublimità HG , conforme ci ammonisce l'esperienza, e conforme in progresso dimostrerò.

Non si reptoni stravagante l'asserzione, che dalle cose premesse io sono per dedurre, ed è, che nei corpi fluidi non anno punto che fare le forze composte. Non nego già, che adoperandosi ancora la stilla G (Teorema secondo) a premere la sponda nel contatto I colla sua natia gravità, questa forza non vada risolta nelle due equipollenti IK , KL , mentre il peso della gocciola si esprima per IL : ma avendo notato (corollario secondo del suddetto Teorema), ch'ella posta a confronto con quella delle pressioni è minima, ed inassegnabile, ne siegue, che non se ne dee far caso, e che non alterando in modo alcuno gli effetti, non solo un Geometra, che la considera siccome infinitesima, ma un Fisico altresì, il quale altronde fa quanto sia picciolissima, debbono del pari trascurarla.

Senza il premesso avvertimento, io per me penso, che non ci andasse mai fatto di liberarci dall'equivocazione, e conseguentemente dal paralogismo. Ora forata la parte del vase nel punto I , cessa la reazione del contatto, e si toglie di mezzo l'equilibrio.

Prima dunque ad operare si è la pressione direttamente contraria OG , pari, come più fiate ho replicato, al peso del filo verticale HG ,
la

la quale s'impiega con più efficacia di tutte le altre, che stringono per ogni verso la goccia G ; perchè non trova contrasto, che vi si opponga, e la quale per la direzione OI perpendicolare alla retta CD , o alla toccante della curva CID nel punto I comincia a follecitare al moto la stilla G . Qualmente poi si continui il movimento, e l'accelerazione, a suo luogo m'ingegnerò di spiegarlo. (e)

In ordine alle cose dette abbiassi la goccia S , che tocchi il fondo BC nel punto N , e la parete AB nel punto M . Essa goccia uscirà dal vaso con pari velocità, aperto ad arbitrio il foro nel sito N , ovvero M , colla differenza però, che l'azione principierà da quelle forze premententi, che direttamente si equilibrano colla reazione del fondo in N , o della sponda in M , cioè a dire, se il fondo farà a livello, e retto l'angolo ABC , o dal filo sovraincombente a perpendicolo, o dall'orizzontale giusta la direzione CB .

SCOLIO SECONDO.

Stiamo ben attenti a non confondere il peso totale d'un fluido colle vicendevoli azioni, e reazioni delle particole elementari, che le compongono; conciossiachè quantunque gli effetti, che da ambo i principj dipendono, dalla sola gravità l'origine riconoscano, sono però fra loro affatto dissimili, e regolati con leggi totalmente diverse, consistendo in ciò principalmente la differenza, che si ravvisa fra i corpi solidi, e i fluidi. Il peso assoluto è sempre proporzionale alla quantità della materia, conforme per via delle oscillazioni dei pendoli ha dimostrato l'Ughenio, nè prescindendo dalla evaporazione punto si muta, ogniquale volta a cagion d'esempio un pezzo di metallo di solido diventa liquido. All'incontro le somme delle pressioni notabilmente si diversificano, quand'anche sta salda la medesima massa, ed il fluido alla medesima altezza verticale si sostiene, purchè si muti o la figura del vase, o semplicemente la positura. Questa verità si vuole dimostrare in tutta la sua estensione.

TEOREMA TERZO.

Sieno due vasi $ABC\ abc$ (Fig. 136.) ambo ripieni d'un liquore omogeneo, e sieno D, d i centri di gravità d'amendue le masse fluide; dico, che l'aggregato di tutte le pressioni verticali, a cui soggiacciono gli elementi del fluido contenuti nel vase ABC all'aggregato di tutte le pressioni altresì sofferte dalle particelle comprese dal vase abc sta in proporzione composta delle masse liquide ABC, abc , e delle distanze ED , ed dei centri di gravità D, d dalle supreme orizzontali superficie AC, ac dei liquori.

La

(a) Avea intenzione l'Autore, che non ha poi ridotta ad effetto, di aggiungerla alla presente un'altra Dissertazione.

La massima profondità del fluido ABC si misuri dalla verticale EB, a cui si ponga uguale la retta LM asse della curva, che dee descriversi. Tagliato il solido ad arbitrio colla sezione FIG parallela alla superiore AEC, facciasi $BI = MQ$, ed assunta la linea Z a piacimento siccome unità, sia il rettangolo Z. QR uguale all'area della sezione FIG. In tal guisa si continui l'operazione in ogni punto dell'asse ML, onde nasca la curva MRN analoga al corpo ABC: egli è certo, che qualunque ordinata QR esporrà il numero delle gocce contenute nella sezione corrispondente FG, e che l'intera superficie mistilinea LMRN dinoterà tutta la materia fluida, la quale empie il vaso ABC. Di più segnato il centro di gravità P dell'area LMRN, atteso che per la costruzione quest'area è analoga al solido ABC, i centri di gravità D, P faranno egualmente lontani, il primo dalla suprema superficie AEC del fluido, ed il secondo dall'ultima ordinata LN, laonde faranno eguali le distanze perpendicolari DE, PS.

Sopra la base LMRN s'intenda alzata una cilindroide retta, la di cui sublimità sia eguale all'asse $ML = BE$, e questo solido si tagli con un piano, il quale passando per l'ordinata LN, faccia colla sottoposta base LMRN un angolo semiretto. Dal detto piano si divida la cilindroide in due cunei, e pigliando a considerare l'inferiore tagliato da tanti piani normali alla base LMRN, ed insistenti sopra le applicate QR, quante sono le applicate medesime, si scoprirà, che tali sezioni, atteso l'angolo semiretto, saranno altrettanti rettangoli compresi dalle asisse, e dalle rispettive ordinate della curva MRN, uno de' quali si è il rettangolo LQ. QR.

In questo mentre il detto rettangolo LQR è proporzionale a tutte le pressioni verticali sofferte dalle gocce, che compongono la sezione FG; perchè l'applicata QR esprime il numero di esse gocce, e l'asissa LQ espone il peso del filo EI, da cui le dette pressioni prendon la norma. E verificandosi ciò in tutti i rettangoli del cuneo, ed in tutte le sezioni analoghe del solido; ne segue, che il menzionato cuneo ci rappresenterà l'aggregato delle pressioni verticali, alle quali le stille, che riempiono il vase ABC soggiacciono in solido.

Questo giro di preparazione, e di discorso si applichi al vase *abc*, relativamente alla superficie mistilinea *lmrn*, ed al cuneo indi nascente, e cavate le conseguenze, cioè, che l'area *lmrn* ci rappresenti la quantità del fluido contenuta nel vase *abc*, che il cuneo denoti l'aggregato delle verticali pressioni, e che sieno eguali le distanze *de*, *ps* determinate dai centri di gravità *d*, *p*, si conchiuda, che come il cuneo sopra la base LMRN all'altro sopra *lmrn*, così la somma delle pressioni verticali del fluido ABC a quella del fluido omogeneo *abc*.

Appresso i Geometri fanno, che per la regola del Guldino i due cunei s'aguagliano rispettivamente a due cilindroidi erette sopra le basi LMRN, *lmrn* colle altezze PS, *ps*, per cui distano i centri di gravità P, *p* dei mistilinei LMRN, *lmrn* dalle estreme applicate LN, *ln*; dunque come queste Cilindroidi, così i cunei già descritti, e così gli aggre-

ga:

gati delle pressioni verticali d'ambo i fluidi ABC , abc , i quali aggregati faranno di conseguenza in ragione composta delle aree $LMRN$, $lmrn$, e delle notate distanze PS , ps .

Quinci surrogando in cambio delle distanze PS , ps le uguali DE , de , ed invece delle aree $LMRN$, $lmrn$ le masse fluide analoghe ABC , abc , si ricava, che le somme delle menzionate pressioni faranno in ragion composta delle masse ABC , abc , e delle distanze DE , de ; il che dovea dimostrarsi.

C O R O L L A R J.

I. Se le masse faranno eguali, gli aggregati delle pressioni perpendicolari faranno come le distanze dei centri di gravità dalle sommità dei liquori. E poste eguali le distanze, gli aggregati predetti faranno come le masse.

II. Che se le distanze si troveranno essere in ragione reciproca delle masse, le somme delle dette pressioni faranno eguali.

III. Nei vasi simili le somme delle pressioni serbano la proporzione quadruplicata dei lati omologhi.

IV. Gli aggregati delle pressioni notabilmente si diversificano, mutata solo la positura del vase. S'empia di vino il bicchiero conico A (Fig. 137.), e vi si adatti il coperchio; di modo che inclinandolo, non si spanda il liquore. Capovolto il bicchiero, e collocato nella positura B , è facile a dimostrarsi, che parlando delle verticali, la somma delle pressioni del fluido in A alla somma delle pressioni dello stesso fluido in B sta come l'unità al ternario.

V. Riempiasi il vase abc (Fig. 136.) d'un liquore più grave, o più leggero in ispecie di quello, che cape nel vaso ABC , tanto e tanto gli aggregati delle pressioni sono come il prodotto della massa ABC . DE al prodotto della massa abc . de . Da ciò ponno dedursi varie conseguenze, che tralascio per brevità.

S C O L I O.

Dalle cose dimostrate si ha un nuovo uso dei centri di gravità, i quali concorrono in parte a determinare la misura degli aggregati delle pressioni verticali, a cui soggiacciono i corpi fluidi. In esse va considerato non solamente il peso assoluto del liquore, che è sempre proporzionale alla massa, ma di più anche il peso, che serba relazione al centro di gravità di qualunque corpo, e chiamasi rispettivo; perchè prende norma dalla diversità delle figure.

SCHÉ.

SCHEDIASMA XXXVI.

*Difesa del Corollario II. della Proposizione XXXVII. del Libro II.
dei Principi Matematici della Filosofia naturale
del Cavaliere Isacco Newton.*

IL Chiarissimo Signor Michelotti nella sua dottissima Opera ultimamente data alle stampe fattosi ad impugnare certa Dimostrazione del Signor Keil fondata sopra il Corollario secondo Proposizion 36.
li-

Le date delle lettere manifestano il tempo della Controversia del C. J., prima col Sig. Pierantonio Michelotti, e poi col Sig. Daniele Bernoulli. Le tre ultime lettere, due dell'Autore, ed una del Sig. Bernoulli si leggono stampate in Venezia l'anno 1724. presso Domenico Lovisa nelle esercitazioni matematiche dello stesso Sig. Bernoulli. Questo insegna Letterato esaminata posteriormente a fondo la materia, e conosciuta la verità del Corollario Newtoniano, con sincerità filosofica così si esprime nella sua Idrodinamica, che usò l'anno 1737. sezione 13, §.9.

„ *Licet hic paucis attingere verbis propositionem aliquam ex Princ. math.*
„ *Phil. nat. edit. 2. Newtoni. Auctor hic postquam sententiam suam*
„ *de velocitate aquarum effluentium in prima citati Operis editione ex-*
„ *hibitam mutasset, easque si verticaliter sursum ejiciantur ad integram*
„ *superficies aquae altitudinem ascendere agnovisset in editione secunda,*
„ *alia subiicit verba in libro secundo, propos. 36. coroll. 2. Vis, qua*
„ *totus aqua exilientis motus generari potest, aequalis est ponderi cy-*
„ *lindrica columnellae aquae, cujus basis & foramen EF (vid. fig. 138.),*
„ *& cujus altitudo est 2GI, vel 2GK. Ista sententia a me olim, & ab*
„ *aliis impugnata, ab aliis rursus confirmata. Nunc autem postquam hanc*
„ *aquarum motuum theoriam meditatus sum, lis ita dirimenda mihi*
„ *videtur, ut quum aquae ad motum uniformem pervenerint, qua quid-*
„ *dem hypothesis est Newtoni, tunc recte altitudine 2GI vis illa defi-*
„ *niatur, sed ab initio fluxus, ubi velocitas adhuc nulla est, vis sim-*
„ *plici altitudini GI respondeat, moxque crescente velocitate simul vis*
„ *aquam ad effluxum animans crescat, & tandem ad eam magnitu-*
„ *dinem exurgat, quam Newtonus assignavit. Hec nunc sunt unicui-*
„ *que obvia, quia vis motum aqua generans, de qua Newtonus lo-*
„ *quitur, non potest non esse aequalis vi repellenti, quam vidimus esse*
„ *aequalem a + v. Recte etiam Ill. Riccatus, cum quo mihi de hoc ar-*
„ *gumento res erat, interrogatus; unde vis illa duplæ aquarum alti-*
„ *tudini conveniens oriri possit, quum obturato orificio vi simplicis*
„ *altitudinis urgere manifeste appareat, respondit, distinguendum esse*
„ *statum quietis a statu motus.*

libro 1.^o de' Principj dell' incomparabile Isacco Nevvton, ha condannata come falsa la Dottrina del predetto Corollario. Avendomi sopra di ciò richiesta la mia opinione tal quale si possa essere, parmi, dopo aver fatta una più posata riflessione sopra il passo controverso, che il detto Nevvtoniano sia conforme alla verità, massime nelle circostanze, in cui è stato proferito; mentre per altro la Proposizione citata è soggetta a varie importanti difficoltà. Ho stimato bene comunicare con geometrica libertà il mio sentimento al Sig. Michelotti medesimo, acciò o mi cavi d'errore, o pure sino che la cosa è intera, possa prevenire le opposizioni, che dal suo Antagonista gli potrebbero esser fatte.

Presa per mano la figura del Sig. Nevvton (Fig. 138.), e tralasciate per ora le considerazioni sopra la Proposizione principale, che nell' ultime edizioni si trova corretta, e riformata, nel Corollario primo si stabilisce, che l'acqua uscirà dal vaso con tanta velocità, quanta ne acquisterebbe scorrendo con moto accelerato principiato dalla quiete lo spazio KC, che determina l'altezza, in cui l'acqua viene costantemente mantenuta nel vaso. Sin qui la deduzione è certissima, ed è già stata dimostrata da Sigg. Bernoulli, ed Ermanno, almeno per quello appartiene a' fluidi, che ponno assumersi come composti di particelle fisicamente minime.

Il secondo Corollario; su cui versa la contesa, è concepito ne seguenti termini. *Et Vis, qua totus aqua exilientis motus generari potest, aequalis est ponderi cylindrica columna aqua, cujus basis est foramen EF, & altitudo 2GI, vel 2CK.*

Qui si parla dell'acqua, ch' esce dal vaso precisamente in tanto tempo, quanto ne consumerebbe a cadere con moto accelerato per lo spazio KC, e la ragione, che se ne adduce, chiaramente lo manifesta. *Nam aqua exiliens quo tempore hanc columnam aequat, pondere suo ab altitudine GI cadendo velocitatem suam, qua exilit acquirere potest, cioè a dire, che nel tempo medesimo, in cui l'acqua discendendo dal punto K di quiete in forza della sua natural gravità scorrerebbe lo spazio KC, uscirà dal vaso tanta acqua, che riempirebbe un cilindro, la di cui base fosse il circolo EF del foro, e l'altezza fosse uguale alla doppia GI, o CK.* Si spiega più apertamente l'Autore nel Corollario terzo con quelle parole, *& aqua per foramen EF egrediens, quo tempore gutta cadendo ab I describere potest altitudinem IG, aequalis erit cylindro, cujus basis est circulus EF, & altitudo est 2IG.*

Ora su questa verissima asserzione io non ci so trovare difficoltà; imperocchè esprima per esempio la quantità v quella velocità, che una goccia d'acqua cadendo dal punto I, e scorrendo lo spazio IG s'acquisterebbe nell'ultimo punto G; egli è manifesto per le cose dimostrate dal Galileo, che se la predetta goccia in tutto il tempo impiegato nella discesa IG si fosse mossa con la velocità costante v , avrebbe camminato per uno spazio doppio di GI, ed in conseguenza per la doppia GI possiamo determinare la velocità v ; atteso che ne' moti equabili, che si fanno in tempo determinato, le velocità si misurano dagli spa-

spazi trascorsi. Ma l'acqua esce senza dubbio dal vaso con la velocità v , ovvero $2GI$, e la quantità dell'acqua, ch' esce nel tempo di sopra espresso, è in ragion composta dell'ampiezza del foro EF , e della velocità, o sia della doppia GI ; dunque la quantità scaricata dell'acqua sarà eguale ad un cilindro, la di cui base si è il foro EF , e l'altezza eguale all'altezza GI presa due volte: il che dovea dimostrarsi.

Ciò dimostrato, s'aprirà la strada all'intelligenza della frase Nevvtoniana nello stesso Corollario secondo *Et vis, qua totus aqua exilientis motus generari potest*, ec. Sotto il nome di forza, che genera un qualche moto, secondo il costume del nostro Autore, altro non s'intende, se non la forza sollecitante. Ora posto il tempo costante, la forza è sempre come la quantità del moto, vale a dire, come la massa moltiplicata con la velocità, e stabilita anche la velocità costante, la forza sarà sempre come la massa. Si ricavano questi Teoremi dalla notissima formula $ft = mv$, in cui f è una forza sollecitante, che si suppone agire uniformemente accelerando il mobile, t significa il tempo, m la massa, ed v la velocità. Nel caso del Sig. Nevvton il tempo si determina eguale a quello, che s'impiegherebbe nella discesa dall'altezza IG , e può esprimersi per la doppia IG , che dinota pure la velocità, con cui l'acqua esce dal foro, conservato il fluido nel vaso alla medesima altezza IG ; dunque la forza generante il moto si trova uguale alla massa dell'acqua, ch' esce dal foro nel tempo sopra determinato: ma questa massa per le cose dette è uguale ad un cilindro acqueo di base EF , e d'altezza $2GI$; dunque la forza sollecitante sarà uguale al predetto cilindro: il che ec.

S'io volessi poi determinare la quantità dello scarico, avuto riflesso alla contrazione della vena, ed a qualche altra circostanza, e massime alla diversa ampiezza de' fori, ed alla varia densità, con cui li fluidi escono da vasi; sarebbe d'uopo esaminare da capo a fondo la citata Proposizione Nevvtoniana.

Risposta del Sig. Pierantonio Michelotti all'Autore.

Venezia 1. Novembre 1711.

Io aveva stabilito di aspettare la risposta o del Sig. Cav. Nevvtono da me molto stimato, o del celebre Sig. Giovanni Keill di Londra prima di rispondere a V.S. Illustriss. sopra le cose, che mi fece avanzare nella carta consegnatami benignamente da sua parte dall'Illustriss. Sig. Rizzetti mio riverito Padrone; e la cagione di questa mia meditata dilazione nasceva dalla curiosità, ch'io aveva di vedere, se le cose, che avrebbero potuto rispondere li due nominati Geometri, fossero state le medesime, che quelle, le quali ingegnosamente seppe ritrovare V.S. Illustriss. Ma prevedendo ora, che il tempo diverrebbe forse lunghissimo, a cagione che in Inghilterra non sono ancora arri-

H h h 2

vati

vati gli esemplari della mia Opera colà spediti, risolvo di non tardare d'avanzo a comunicare a Lei tutte quelle ragioni, che mi anno mosso a credere falso il confaputo corollario secondo della Proposizione 36. del libro secondo de' Principj Nevvtoniani, ed esporle in oltre il mio sentimento intorno al ragionamento stimatissimo di V. S. Illustriss. col quale si è sforzata di mostrare vero quello stesso corollario dopo aver fatta (come dice) più posata riflessione sopra il punto controverso. Certamente la forza generante il moto dell'acqua uscente per il foro EF altra non può essere che quella, la quale proviene dalla pressione dell'acqua imminente allo stesso foro EF, cioè dal peso di questa medesima acqua: questo peso poi al peso di tutto il licore contenuto nel vaso ha quella proporzione, che è fra il cilindro di base EF, e di altezza GI, ed il cilindro, la di cui base è il cerchio CD nella figura dell'Ingegnossist. Sig. Nevvtono, e l'altezza CK uguale a GI. Di questa cosa parmi, che niuno de' Geometri possa dubitare. Immaginiamoci primieramente, che il buco EF sia chiuso, sicchè tutto il fondo del vaso sia una base continua: dimando se il fondo CD sia premuto da altra cosa, che dal peso della colonna d'acqua KCDL: certo no. Ma le leggi idrostatiche c'insegnano, che ciascuna parte EF del fondo CD partecipa di codesta pressione totale a misura della sua ampiezza, e la pressione totale, che soffre la base CD, consiste nello sforzo, che fa per scendere il peso di tutta la colonna KCDL, e questo peso sta al peso della colonneta, che ha per base il cerchiello EF, per altezza la GI, come l'ampiezza del cerchio CD all'ampiezza dello stesso cerchiello EF; dunque la parte EF del fondo CD è premuta da una forza eguale ad un cilindro fluido, la di cui base è il cerchiello EF, l'altezza la semplice, e non la doppia GI. Se poi si apre il foro EF, l'acqua uscirà subito certissimamente: ma qual'è la cagione dell'uscita? Senza dubbio la pressione, della quale ora parlava. Imperochè se l'acqua non fosse premuta, non uscirebbe per il peringio più volte menzionato. Ora quella pressione (come ho dimostrato) è uguale al semplice peso del cilindro acqueo, la cui base è il cerchiello EF, e l'altezza la linea GI. Per certo io non vedo, che altra forza possa assegnare l'Illustre Signor Nevvtono diversa da quella, che deesi al peso di tutta la colonna imminente a piombo al buco EF; particolarmente perchè a carte 330. della sua dottissima Opera di prima edizione così scrisse. *Unde consequens est, quod motus aqua totius effluentis is erit, quem pondus aqua foramini perpendiculariter incumbentis generare potest.* Forse la dottrina del corollario in controversia, che fin ora ho provata falsa, cavò il Sig. Nevvtono da una falsissima conclusione a Lei già nota. Perciocchè dopo aver Egli falsamente contro la speranza conchiuso, che l'acqua uscente per il buco EF voltandosi in su potrebbe ascendere alla metà dell'altezza A, soggiunse le cose seguenti (a). *Ee propterea quantitas aqua effluentis quo tempore corpus cadendo describere*

po-

(a) Veda la prima edizione a carte 331:

potest altitudinem $\frac{x}{2}$ A, aequalis erit columna aqua totius AB foramini per-

pendiculariter imminentis. Dal che ne siegue, che nel tempo, che il grave scenderebbe per tutta l'altezza A, ovvero IG nella figura della seconda edizione, uscirebbe dal vaso per il pertugio EF tanta quantità d'acqua, che riempirebbe un cilindro, la di cui base fosse il cerchiello EF del foro, l'altezza uguale alla doppia GI, o CK. Comunque si sia la cosa, il corollario, del quale parliamo, concepito come io l'intendo, al certo non può essere vero. Che se l'incomparabile Sig. Nevvtono volesse intendere per forza generante tutto il moto dell'acqua uscente, non quella che proviene, o ch'è nel peso dell'acqua soprastante al pertugio EF, ma quella che produce l'accelerazione nelle gocce dell'acqua medesima, e che chiamasi acceleratrice, come la forza della gravità (il che pare interpreti V.S. Illustriss.) allora malamente comparirebbe una tal forza, per la quale ciascuna goccia acqua viene accelerata ad una certa velocità, con qualche peso. Poichè fra di loro non sono più comparabili che la linea, e la superficie. Dovrebbe più tosto una forza di codesta sorta essere paragonata con un'altra forza acceleratrice, che con il peso, il quale nasce dalla forza esercitata nella massa. Per esempio dovrebbe compararsi con la forza della gravità ordinaria, con la quale essa ha tal proporzione, che con la linea finita la linea infinita, come potrei dimostrare facilissimamente col mezzo di quelle cose, che il Sig. Gio Bernoulli facilmente Principe (non meno che il Sig. Nevvtono) de' Geometri dell'età nostra produsse negli Atti degli Eruditi pubblicati a Lipsia, dove addusse la ragione, per la quale si deve considerare l'infima goccia d'acqua vicina al pertugio fatto nel fondo del vaso come animata da una forza acceleratrice, fra la quale, e la forza della gravità naturale vi sia quella proporzione, che tengono tra loro l'altezza di tutta l'acqua, e l'altezza della goccia acquosa, che sta per uscire dal vaso, e che dallo stesso Sig. Bernoulli fu considerata come una colonnetta d'altezza infinitamente picciola, come altra volta risposi a V.S. Illustriss., quando voleva impugnare la dimostrazione Bernoulliana. Ma perchè la di Lei mente insigne conosca con maggiore evidenza quanto sia assurdo un simile paragone; aggiungo ciò che siegue, e nel medesimo tempo rispondo al ragionamento sottilissimo, che si degnò farmi presentare dall'Illustriss. Sig. Rizzetti, che riverisco con ogni estimazione, e ringrazio per l'onore, che mi ha fatto, di provedersi di un esemplare della mia Opera. Ella rappresenta, ed in vero benissimo, la velocità dell'acqua uscente dal vaso per la doppia GI, e dimostra pure nobilmente essere la quantità dell'acqua uscita nel tempo, che la goccia d'acqua cominciando il moto dalla quiete nel punto I, percorre lo spazio GI, uguale ad un cilindro, la di cui base è il cerchiello EF del buco, l'altezza uguale alla doppia GI, o CK. Poi soggiugne: per forza, che genera un qualche moto, altro non intende il Sig. Nevvtono, che la forza affrettante; la quale posta sì il tempo, che la velocità costanti, è come la massa: indi esprimendo

do nel caso del Sig. Nevvtono tanto il tempo, quanto la velocità per la doppia GI, e rappresentando la massa dell'acqua per il cilindro di base EF, e di altezza 2GI, conchiude essere la forza, che si ricerca per generare tutto il moto dell'acqua uscente, uguale a quel medesimo cilindro, che ha per base il cerchiello EF, per altezza la doppia GI. Ma io con questo suo medesimo ragionamento potrei dimostrare, che la forza ricercata per generare tutto il moto dell'acqua, ch' esce del vaso, è uguale non solamente al doppio peso della colonna acqua, ma anche al quadruplo, al sestuplo, all'ottuplo ec. di quella medesima colonna d'acqua: il che Ella ben vede quanto sia assurdo; perche una cosa, che in se stessa è invariabile, e determinata, sarebbe variabile, ed incostante. Potrei per esempio dimostrare, che la forza, della quale più volte ho fatta menzione, è uguale ad una colonna d'acqua, che si fa moltiplicando il cerchiello del foro EF per la quadrupla di GI. Concepisca V. S. Illustriss. nella figura del Sig. Nevvtono la GI prolungata in su fino al punto Z, di modo che CZ sia $\equiv 4GI$, e s'immagini, che il Sig. Nevvtono abbia posto il tempo uguale a quello, che impiegherebbe la goccia d'acqua nel cascare dal punto Z di quiete per l'altezza GZ. Ciò premesso, così ragiono alla di Lei maniera. Per forza producente un qualche moto altro non intende il Sig. Nevvtono, che la forza sollecitante al moto, la quale posto il tempo costante è come la massa moltiplicata per la velocità. Nel caso del Sig. Nevvtono ora supposto il tempo, che dura l'uscita dell'acqua, si pone uguale, o si rappresenta per 4GI, la velocità, con la quale esce l'acqua per il foro EF, si pone anche sempre costante, cioè come 2GI; dunque poichè sì il tempo, che la velocità si pongono immutabili, la forza generante tutto il moto dell'acqua sarà uguale alla massa d'acqua, ch' esce in quel medesimo tempo, la quale massa, per essere il mio tempo doppio di quello pone V. S. Illustriss., sarà anche doppia della massa d'acqua, che uscirebbe nel tempo da Lei rappresentato per 2GI; e per conseguenza sarà la forza generante tutto il moto dell'acqua uscente uguale al quadruplo peso d'un cilindro acqueo, che ha per base il cerchiello EF del buco, per altezza la GI. Il che io dovevo provare. In simil modo, assunta la $GZ \equiv n \cdot 2GI$ (n rappresenta qualsivoglia numero) dimostrerò, che la forza ora menzionata è uguale a un cilindro acqueo, che ha per base il cerchiello EF, per altezza la linea 2GI moltiplicata per n , cioè uguale a qualsivoglia peso. Io non dubito punto, ch' Ella esaminare le cose fin qui da me esposte con il suo acutissimo ingegno da me tanto stimato, sia per riconoscere falsa la dottrina dell'ingigne Geometra Sig. Nevvtono contenuta nel secondo Corollario della proposizione 36. del secondo libro degli suoi Principj Matematici di Filosofia naturale da me per altro consideratissimi.

Del resto la prego conservarmi la di Lei consideratissima grazia, ed assicurarsi, ch'io ho una somma estimazione per il suo raro talento.

Con-

Contrarriposta dell' Autore al Sig. Pierantonio Michelotti.

Da qualche tempo io sono debitore a V. S. Illustris. della risposta ad una sua gentilissima lettera, ed avrei prima d' ora adempito a miei doveri, se varie distrazioni non m' avessero impedito di prendere nuovamente per mano la materia controversa, nella quale io bramerei, che la ragione stesse più dal suo canto, che dal mio; mentre ha Ella assunto con la stampa un pubblico ingegno, ed io ho esposto la mia opinione in una privata scrittura. Potrei dunque senza rossore confessare l'inganno, s' avessi saputo scoprirlo; e per parlare con tutta la sincerità, quantunque sia stato da Lei detto tutto quello può dirsi in favore della sua sentenza; non ostante ciò parmi, che non resti in parte alcuna snervata la forza della mia prima dimostrazione. Abbia la bontà di soffrire un altro poco di tedio, per vedere, se mi riesce di collocare in tutto il suo lume la verità, che io con buona fede, e senza preoccupazione prendo a difendere.

Avanti d'entrare nel fondo della controversia stimo bene il premettere primieramente, che ricevo per bella, e per buona la dimostrazione dell' incomparabile Sig. Gio. Bernoulli intorno la velocità, con cui escono i fluidi da' vasi per fori di determinata grandezza; perchè le mie difficoltà cadono sul modo di dimostrare, non sulla conclusione, che è verissima, e già mi sono proposto di consultare questo illustre Geometra sopra una circostanza, che non mi lascia penetrarne interiormente il midollo. Secondariamente io non assumo la difesa di ciò, che possa aver detto il Sig. Newton nella prima edizione de' suoi Principj alla pag. 331. Mi è noto il suo errore, e nello stesso tempo mi è nota la sua lodevole correzione: anzi non mi prendo nè meno la briga di fare l'apologia di tutto ciò, che produce nella Proposizione 36. dell'ultima edizione. Quella sua Cateratta è soggetta a varie importantissime opposizioni, molte delle quali osservo da Lei ottimamente spiegate nella sua bell'Opera, ed alcune altre mi sono venute in mente, che m'ingegnerò di spiegare con miglior occasione. La disputa versa semplicemente sul secondo Corollario, che da Lei si giudica falso, e da me conforme alla verità.

Vis, qua totus aqua exilientis motus generari potest, aequalis est ponderi cylindrica columna aqua, cujus basis foramen EF, & altitudo 2GI, cioè a dire; quo tempore aqua pondere suo ab altitudine GI cadendo, velocitatem suam, qua exilit, acquirere potest. Questi sono i propri termini Newtoniani nel Corollario in questione; veggiamo, se la dimostrazione si possa formare con i principj, anzi con le stesse parole tolte ad prestito da V. S. Illustris, e adattate solamente alla mia figura.

Vis pellens est, ut effectus ipsius, hoc est ut quantitas motus, qui ab ipsa dato tempore generatur: est autem quantitas motus dato tempore generata in ratione composita fluidi dato tempore per orificium EF effluentis, &c.

velocitatis, cum qua fluidum ipsum ex dicto orificio erumpit. Ella già riconosce per sua sì fatta espressione, essendo levata di peso dal suo libro pag. 78. Aggiungasi la seconda presa dalla pag. 177. atqui eodem tempore grave percurrere potest motu uniformi spatium 2GI, ea cum velocitate, quam ex casu per altitudinem IG acquirit. Dunque ella ne cavi le conseguenze, che certamente non saranno diverse da quelle, ch'io anderò deducendo; dunque la forza, che caccia l'acqua fuori del vaso KD per il foro EF in tempo dato, e come sopra determinato, non potrà esprimersi, suorchè per la quantità del moto in detto tempo generata. Vis pellens est ut effectus ipsius, hoc est, ut quantitas motus, qui ab ipsa dato tempore generatur, cioè per la mole dell'acqua, ch' esce nel tempo medesimo moltiplicata nella sua velocità: est autem quantitas motus dato tempore generata in ratione composita fluidi dato tempore per orificium EF effluentis, & velocitatis, cum quam fluidum ipsum ex dicto orificio erumpit: o pure nel nostro caso per la sola mole dell'acqua, che nel tempo assegnato si scarica; atteso che la velocità dello sfogo è sempre costante: ma la quantità dell'acqua, ch' esce nell'accennato tempo, è tanta nè più nè meno, ch'empirebbe il doppio cilindro, la cui base è il foro EF, e l'altezza IG, atqui eodem tempore grave percurrere potest motu uniformi spatium 2GI, ea cum velocitate, quam ex casu per altitudinem IG acquirit; dunque la forza predetta altrimenti non può esprimersi, che per la quantità d'acqua contenuta nel doppio cilindro soprannominato, o per il suo peso; il che dovea dimostrarli.

Esaminata per tutti i versi l'addotta dimostrazione, non ci ho saputo vedere nè pure un'ombra di paralogismo, e ciò spiccherà maggiormente dalla risposta, ch'io sono per dare alle sue obbiezioni; supposto però, che seguitando le sue vestigia si prescinda dalle resistenze, dalla contrazione della vena indicata dal Sig. Nevvton, e confermata dal Sig. Marchese Poleni con replicate sperienze, ed in oltre da qualche altra circostanza finora da Matematici non avvertita, e che si considererà in altro tempo.

La prima è di maggior peso; mentre per quanto vedo non solo dalla sua lettera, ma anche da ciò, che dice alla pag. 112. del suo libro, è quella, su cui principalmente si fonda, ed è come la radice dell'equivocazione. Immaginiamoci, sono sue parole, che il buco EF sia chiuso; sicchè tutto il fondo del vaso sia una base continua: dimando, se il fondo CD sia premuto da altra cosa, che dal peso della colonna KC DL: certo no. Ma le leggi idrostatiche c'insegnano, che ciascheduna parte EF del fondo partecipa di cotesta pressione totale a misura della sua ampiezza, e la pressione totale, che soffre la base CD, consiste nello sforzo, che fa per scendere il peso di tutta la colonna KC DL, e questo peso sia al peso della colonnetta, che ha per base il cerchietto EF, e per altezza la GI, come l'ampiezza del cerchio CD all'ampiezza dello stesso cerchietto EF; dunque la parte EF del fondo CB è premuta da una forza eguale ad un cilindro fluido, la di cui base è il cerchietto EF, e l'altezza la semplice, e non la doppia GI.

Sin

Sin qui ottimamente; ma quand' Ella fa un salto dallo stato di quiete a quello di moto, e soggiunge. *Se poi s' apre il foro, l' acqua uscirà subito certissimamente: ma quale è la cagione dell' uscita? senza dubbio la pressione, della quale ora parlava; imperocchè se l' acqua non fosse premuta, non uscirebbe ec.* Senz' alcun fallo, se io non prendo inganno, ella incorre in un manifesto paralogismo: e la ragione si è; perchè se nel tempo determinato come sopra, ch' io per brevità chiamerò t , cioè in quel tempo, che spenderebbe un grave cadendo dall' altezza IG, non uscisse altra acqua, che quella contenuta nel cilindro, la di cui base è il cerchio EF, e l' altezza GI, avrebbe V.S. Illustriss. tutte le ragioni del mondo. Il punto sta, che in detto tempo esce una doppia quantità d' acqua, e su questo particolare siamo d' accordo; dunque se per la sua dottrina la pressione del fluido contenuto nel cilindro ultimamente nominato è quella, che mette in moto la mole d' acqua, che riempie lo stesso cilindro; per mettere in moto due volte tanta, ci vorrà una doppia pressione. Ed in fatti la cosa sta pur così; giacchè per fare, che per il foro EF si scarichi nel tempo t una doppia quantità d' acqua di quella, che occupava in istato di quiete lo spazio EF. GI, è necessario, che l' acqua ci confluisca dalle parti laterali, ed entrando nel sifone accresca la quantità dello scarico sino al doppio. Ora quest' acqua è spinta da qualche forza, cioè dalla pressione laterale della restante acqua contenuta nel vaso KD sotto la costante altezza GI, e così chi vorrà tener conto di questa forza laterale, che fa un effetto pari a quello cagionato dalla perpendicolare, bisognerà dire, che unite insieme non altrimenti possano esprimersi, che per l' effetto da esse prodotto, cioè per la quantità dell' acqua, che cacciano fuori del vaso nel dato tempo t , o sia per il peso del fluido EF. GI moltiplicato nel binario.

Dimando, nel tempo t quant' acqua esce per il foro EF? Ella mi risponderà certamente il doppio di quella, che occupava lo spazio EF. GI. Nel tempo stesso quant' acqua si dee infondere per le parti superiori, acciò il flusso si conservi in istato manente, e non s' alzi, o si deprima il livello KL? replicherà Ella altrettanto, ed io ripiglierò tutta l' acqua, che successivamente nell' accennato tempo s' aggiunge, forse non preme, forse non è quella, che serve a mantenere il corso perenne? certo che sì. La forza generante questo moto non è ella proporzionale alla quantità d' acqua, che nel tempo stesso per le parti superiori viene equabilmente somministrata? chi ne dubita? dunque conchiuderò: la predetta forza necessariamente s' esprime per la copia d' acqua, ch' esce al di sotto, per quella, che s' infonde al di sopra, vale a dire, per una quantità doppia di quella, che si contiene nel cilindro, che ha per base il cerchietto EF, e per altezza la linea GI.

Io non mi so persuadere, che V.S. Illustriss. sia per negarmi, che l' acqua laterale, cioè quella, che non sovrasta a piombo al foro EF, resti obbligata dalla pressione obliqua ad entrare nella vena, e ad aumentare la quantità dello sfogo; mentre questa è la sua stessa dottrina registrata alla pag. 127. *Cum nulla sit soliditas in parietibus AME, BNF*

(applico le sue parole alla mia figura) non video quid citra miraculum obset, quin aqua in partibus S sese commisceat cum aqua delabente per catarractam, dirò io, per cylindrum EF. GI. Alla pag. 128. osservo una bella sperienza da Lei recata in prova del detto. *Tingantur nimirum partes quadam aqua circa S immisso illuc aliquo colore, mox observabitur tincturam brevi communicatum iri cum aqua in spatio AMEFNB contenta.*

Per procedere più rigorosamente, prendo un pezzo di ghiaccio eguale precisamente in peso a tanta mole d'acqua, quanta potrebbe capire due volte nello spazio cilindrico EF. GI, e chiamo la sua massa m . Faccio, che questo ghiaccio cadendo dal punto di quiete E scorra con moto accelerato la linea IG, giunto che sia al sito G abbia acquistata la velocità u , e vi abbia impiegato il tempo t ; la sua quantità di moto sarà $= mu$, ch'è il prodotto della sua massa, e della sua velocità: ma nel medesimo tempo t si sfoga per il foro EF una quantità d'acqua eguale all'accennato solido di ghiaccio, e tutta esce con la velocità u ; dunque per l'una, e per l'altra parte si faranno in tempo egual generate due quantità di moto eguali con questa sola differenza, che nel primo caso sta costante la massa, e variabile la velocità; nel secondo è variabile la massa, e la velocità costante.

Una sola istanza potrebb' Ella farmi, che fosse di qualche considerazione, e sarebbe, per qual motivo il Sig. Nevvton abbia fissato per costante il tempo t , cioè quello, ch'impiegherebbe un grave a discendere per lo spazio IG, piuttosto che qualsivoglia altro tempo maggiore, o minore, come per esempio nt , nel qual caso verrebbe ad alterarsi l'espressione della forza, che spinge l'acqua fuori del vaso. Per soddisfare anche su questo punto, rifletto, che siccome la gravità, che accelera il ghiaccio, di cui abbiamo fatta menzione, cadente nel vuoto, secondo la Teorica del Galileo opera sempre uniformemente, ed in tempi eguali va generando nel predetto mobile gradi di velocità eguali, stando costante la massa; così la forza espellente l'acqua fuori del vaso agisce anch'essa uniformemente, ed in tempi eguali mette in moto quantità d'acqua eguali, stando costante l'altezza dell'acqua, e conseguentemente la velocità.

Nel primo caso avremo l'equazione differenziale $fdt = mdu$, e nel secondo $Fdt = U dM$, le quali sommate ci danno $fr = nu$, $FT = UM$; ma nella prima la forza sollecitante f si misura dalla massa sollecitata m , onde $f = m$; dunque $r = u$. Nella seconda poi la forza F , che per quello s'è detto, opera in ogni istante uniformemente, non può mai farsi eguale alla massa variabile M , fuori che nell'unico caso, che sia $T = U$, vale a dire che il tempo, e la velocità sieno eguali. Ora la velocità U è costante, uscendo l'acqua sostenuta nel vaso all'altezza costante IG per il foro EF con un grado determinato, ed inalterabile di velocità; dunque resta fissato anche il tempo T : ma per acquistare la velocità U dovrebbe il ghiaccio scendere per lo spazio IG, ed impiegare nella caduta il tempo T ; dunque nella formula $fr = nu$, posta $u = U$, sarà $r = T$, cioè a dire $T = U$, ed in conseguenza nella seconda formula $FT = UM$, $F = M$.

Si

Si vede per tanto la ragione, che ci obbliga a prendere come costante il solo tempo t fra gl' infiniti tempi possibili: ed in fatti tutte le circostanze cospirano a rendere necessaria l'elezione; imperocchè in tal caso la velocità, con cui l'acqua si sfoga, è uguale al tempo, che ci avrebbe speso il ghiaccio naturalmente cadente per acquistarla, e siccome avrebbe esso nel detto tempo scorso lo spazio IG; così l'acqua dee sostentarsi nel vaso alla medesima altezza, e finalmente in questa unica supposizione la forza è uguale alla quantità del moto, e per essere costante la velocità, la forza stessa è uguale alla quantità dell'acqua, che nell'assegnato tempo si scarica.

Rispondendo in tanto ad un'altra obbiezione, facciasi com'Ella comanda, e si cerchi la forza, che opera in ogni momento di tempo per espeller l'acqua dal vaso. Stante l'equazione differenziale $FdT = U dM$, avremo il valore della forza $F = \frac{U dM}{dT}$. Pongasi $dT = nT$, e per n si

esprima una quantità infinitamente piccola; e perchè la quantità del fluido scaricato è sempre proporzionale al tempo dello scarico, sarà $T : M :: dT : nT$; $nM = dM$. Sostituiti questi valori, avrassi la forza $F = \frac{U n M}{nT} = \frac{UM}{T}$: ma per le cose dimostrate $U = T$; dunque $F = M$: il che ec.

La forza dunque sollecitante in qualsivoglia istante l'uscita dell'acqua, s'esprime ottimamente per la massa dell'acqua stessa, che cala: pisce nel doppio cilindro EF. GI. Passiamo ora a considerare ciò, che nasce dalla sua ipotesi. Secondo Lei dobbiamo rappresentare questa forza F per l'acqua contenuta nel cilindro EF. GI, cioè per la metà di quella, che si sfoga nell'assegnato tempo T ; dunque $F = \frac{M}{2}$, ed in con-

seguenza $\frac{MdT}{2} = U dM$, o pure $\frac{MnT}{2} = UnM$: ma $U = T$; dunque

$\frac{M}{2} = M$, il che è assurdo.

Ripiglisi l'espressione $FnT = UnM$, e l'infinitesima n vada crescendo fino a diventare una grandezza finita uguale all'unità: in tale ipotesi, ch'è quella considerata dal Sig. Nevvton, avremo $FT = UM$: ma $T = U$ (stante che il tempo speso da un grave nello scorrere lo spazio IG, come più volte s'è detto, è uguale alla velocità acquistata nel fine di esso tempo); dunque $F = M$, cioè la forza eguale alla mole dell'acqua, che in detto tempo si scarica.

Che se poi alterato ad arbitrio il tempo dello sfogo, si considera la forza, o per parlare più giusto la somma delle forze espellenti l'acqua fuori del vaso; s'esprimcranno queste per la massa dell'acqua M

moltiplicata nel tempo nT , o ch'è lo stesso, per l'acqua, ch' esce nel tempo assegnato, cioè a dire per nM , o per la quantità del moto nMU : nè io so comprendere, che assurdo se ne possa dedurre, e svanisce il preteso inconveniente, per cui Ella pensava, che la predetta forza potesse rappresentarsi per una quantità d'acqua non solo doppia, ma multipla in qualsivoglia modo di quella, che si contiene nel cilindro EF. GI. Che meraviglia è, che a generare una maggiore, o minore quantità di moto ci voglia più, o meno forza, e che la stessa forza costante F espressa ottimamente, come s'è dimostrato, per la massa M produca più, o meno quantità di moto, quando sia obbligata ad agire per un tempo più lungo, o più breve?

Ma questa difficoltà preme ugualmente il Sig. Nevvton, e V. S. Illustriss. La forza che spinge l'acqua fuori del vaso nel tempo T tante volte ricordato, e che dal Sig. Nevvton resta espressa col peso del doppio cilindro acqueo EF. GI, da Lei viene esposta col detto semplice cilindro Si legge alla pag. 112. *Evidens est, vim illam, per quam fluidum ex orificio alicujus canalis effluens certam velocitatem acquirit, eam nempe, quam grave acquireret ex altitudine IG dilapsum, esse aequalem ponderi cylindri ejusdem fluidi, cujus basis aequalis est orificio, per quod fluidum egreditur, altitudo vero aequalis ipsi simplici IG, non autem dupla, quemadmodum existimat Clariss. Keillius nimis fidenter eminentem Geometram Is. Nevvtonum sequutus.*

Ora dirò io, aumentando, o sminuendo il tempo T, starà salda questa forza da Lei esposta per il cilindro acqueo EF. GI? certamente no; altrimenti ne seguirebbe, che prendendo io due tempi uno infinitamente breve, e l'altro infinitamente lungo, onde nel primo uscisse una minima, e nel secondo una massima copia di fluido, la forza, o la somma delle forze, che genera una quantità di moto infinita, non farebbe maggiore di quella, che ne genera una infinitesima: il che è veramente assurdo, nè credo, che possa mai essere da Lei adottato.

Le parole citate servono a togliere di mezzo un'altra sua obbiezione. Ella accusa il Sig. Nevvton, che paragoni una forza accelerante, o per meglio esprimermi, e per levar di mezzo ogni ambiguità, un aggregato di forze acceleranti, prementi, espellenti, o che so io, con un qualche peso; poichè tra di loro non sono più comparabili, che la linea con la superficie. Rispondo in due parole, che in tali espressioni non si guarda un vero paragone d'uguaglianza, ma un paragone di rapporto, o di relazione, in quanto l'una, e l'altra grandezza, sebbene di diverso genere, si può, e si debbe esprimere per lo stesso segno, cioè a dire, o per la stessa specie analitica, o per la stessa quantità geometrica. E' forse nuova ne' Geometri questa licenza? ma come nuova, se nelle parole adottate di sopra Ella stessa se ne vale? La stessa forza dal Nevvton vien paragonata al peso del doppio cilindro acqueo EF. GI, e da Lei al peso del simpio. Sin quì la cosa cammina del pari. Tutta la difficoltà consiste in vedere qual paragone sia più giusto, e sopra di ciò parmi aver detto quanto basta in difesa della sentenza Nevvtoniana.

Re-

437

Resta, che V.S. Illustrissima prenda in buona parte la libertà, ch'io mi arrogo per semplice amore della verità, e rassegnandole i miei rispetti inalterabilmente mi protesto.

Ad Illustrissimum, & doctissimum Com. Riccatum

DANIEL BERNOULLIUS.

14. Februarij 1714.

Semper mihi paradoxum fuit coroll. 2. prop. 36. l. 2. princip. phil. Cel. Nevvt. edit. post. atque visum jure ab Cl. Michelotto impugnatum. Avide proin perlegi litteras Ill. C. Riccati ad Cl. Michelottum datas, & mecum ante 15. circiter dies communicatas, in quibus se demonstrationem prædicti Coroll. dedisse mihi dixerat; sed, quod insignis illius Mathematici pace dixerim, multa in demonstratione ipsius excipienda inter legendum occurrerunt. Certiorem autem velim Virum laudatum non contradicendi pruritu, sed solo veritatis amore agitatum hæc a me scribi. Reperiet me Vir acutissimus (cujus sublimem in omni scientiarum genere cum primis vero in studiis Mathematicis doctrinam semper & agnovi, & admiratus sum) proclivorem ad sententiam suam complectendam, quam ad meam mordaciter defendendam. Verba Corollarii ita sonant: *Vis, qua totus aqua exilientis motus generari potest, æqualis est ponderi cylindrica columna aquea, cujus basis est foramen EF* (Fig. 138.), & *altitudo 2GI, vel 2CK*. Manifestum est, quod foramine EF digito clauso, digitus tantam pressionem sit percepturus, quanta est columnæ aquæ, cujus basis foramen EF, & altitudo simplex GI: digito autem remoto, esse guttulam foramini adstantem, quæ hanc pressionem recipiat, mihi quidem clarum est, nullum discrimen essenziale inter status quietis, & motus videntis; id quod manifestius fiet, si fluidum non vi gravitatis suæ, qua illud carere supponam, sed elasticitate sollicitatum ex vase superius clauso per foramen EF exilire intelligatur. Hæc ratio in contrarium multo validior mihi videtur, quam illa Nevvtoni, qua corollarium suum stabilire contendit, dicens: *nam aqua exilientis, quo tempore hanc columnam æquat pondere suo ab altitudine GI cadendo velocitatem, qua exilit, acquirere potest; huic rationi Cel. Nevvtonus amplum ratiocinium in 3. Coroll. subnectit, quod non satis intelligo, cui tamen illud Nobiliss. Riccati conforme esse video. Hujus demonstratio duobus principiis innititur 1°. quod vis, qua aqua ad exiliendum urgetur, sit æqualis massæ, qua effluxit uniformi velocitate intra tempus constans, quod æquale ponit tempori, quo gutta per altitudinem IG cadit. Hic demonstrandum fuisset, tempus constans æquale ponendum esse tempori definito. Hæc suppositio mihi precaria videtur, nec patet cur non tempus illud constans eadem ratione cuicumque alio tempori æquale poni queat. Ad hoc respondebit forsan Doctiss. Riccatus, aqua*

ea

ea exilit velocitate, quam grave cadens ex altitudine IG acquirit, adeoque pro tempore constante sumendum est illud, quod grave lapsu per eandem altitudinem IG impendit. Sed ostendat, cur non eadem ratione quis dicere posset, aqua ea exilit velocitate, quam grave cadens ex altitudine IG acquirit, adeoque pro tempore constante sumendum est illud, quod grave lapsu per duplicem v. g. altitudinem IG impendit.

Secundum Doctis. Riccati principium est, quod eo tempore, quo grave per altitudinem IG cadit, exeat aqua quantitas, qua contineretur in cylindro, cujus basis est foramen EF , & altitudo $2GI$. Sed nec hoc omni exceptione majus est; priusquam vero dubitandi rationem exponam, examinandus venit modus, quo Ill. C. Riccatus illud demonstrare contendit. Constat ex Galilæi demonstratis grave delapsum ab altitudine IG eam acquirere velocitatem, qua uniformiter currendo tempore, quod lapsu impendit, absolvere queat spatium $2GI$; sed simul secundum Patris demonstrata aqua per foramen EF ea exilit velocitate, quam acquireret grave cadendo per altitudinem IG ; ergo dicto tempore egredietur uniformi velocitate filum aqueum longitudinis $2IG$ duplum proin cylindri aequi, cujus basis est foramen EF , & altitudo GI . Ultima hæc consequentia non tam manifeste vera est, ac prima fronte videtur. Rationem patilo altius petam. Vas $ACDEB$ (Fig. 139.) aqua repletum tribus foraminibus æqualibus C , D , E , per quæ aqua exilit, perforatum est; per foramen C aqua horizontaliter, per foramen D verticaliter deorsum, & per E verticaliter sursum effluit. His positis, apparet eandem quantitatem aquæ per quodlibet foramen esse effluxuram, si nimirum foramina sint in eodem plano horizontali; etenim aqua per unumquodque foramen æquali vi urgetur; hoc quidem de foraminibus C , & D clarum est, minus autem liquet de foramine E , ideo quod aqua in columella ER gravitare videri posset in guttam jam e foramine E egressuram, hancque impedire, ne eadem celeritate effluat, qua aqua fluit per reliqua foramina C , & D . At si attentius res perpenditur, apparet, columellam aqueam ER non impedire, quo minus gutta in E eadem celeritate exiliat, ac per foramen C , vel D , quia guttulae duæ vicinæ semper eadem celeritate ascendere censi possunt, adeo ut guttula præcedens numquam subsequenti resistat; hocque experientia confirmatur, constat enim jactum ERS parabolam infinite acutam formantem constantis permanere altitudinis, id quod non fieret, si prima gutta majore quam subsequentes velocitate exiliret; patet ergo eandem quantitatem aquæ per quodlibet foramen esse effluxuram; quibus prænotatis ulterius observo, tempore t , (quo scilicet grave cadit per altitudinem FC) egredi per foramen E filum seu cylindrum aqueum, cujus basis est foramen E , & altitudo $ER = FC$; eodemque tempore t egredietur per foramen C filum aqueum, cujus longitudo sit $= 2FC$, atque per foramen D dicto tempore t effluet filum aqueum longitudinis $3FC$, id patet ex celeritate, qua guttulas ex foraminibus exilire dixi; ergo cum omnia hæc fila aquea inter se sint æqualia, necesse est ut crassities suas longitudinibus habeant reci-

pro-

proce^{ss} proportionales, adeoque diametros suas habeant in ratione $1, \sqrt{\frac{1}{2}}$

& $\sqrt{\frac{1}{2}}$. Atque hæcenus probavi necessitatem filorum aqueorum exte^{ri}
3

nuationis; restat extenuatio illa pro majori dictorum confirmatione phy^s
sice explicanda.

Sit filum aquæ aR (Fig. 140.) continue verticaliter descenden^{ti}
tis; intelligatur filum aR a tubo in istanti exorto, & ab R versus S
fluente redigi in momento in filum parabolicum aS ejusdem cum aR
capacitatis, sed longius; quod si aqua esset infinite fluida, id est si re-
vera esset divisa in particulas infinite parvas, liquet tunc particulas in-
finitesimas $2b$, $2c$, $2d$, $2e$, &c. a se invicem fore discessuras, & hiatus
infinite parvos $2b2c$, $2c2d$, $2d2e$, &c. inter se relicturas, qui hiatus
majores erunt, vel minores pro ratione distantie puncti S a puncto R .
Sed cum aqua non sit revera in particulas infinite parvas divisa, fiet
ut guttulæ $2b$, $2c$, $2d$, $2e$, &c. divisioni resistent, atque unitæ perma-
neant, contra vero elongentur, hocque modo forment filum continuum
 AC , sed tenuiorem quam est AB , uti id melius per figuras T , & U
exprimitur. Ex hisce jam Illustris. C. Riccati facile videri, quid in
secundo suo principio excipiam, nempe filum cylindricum aquæ ex so-
ramine EF (Fig. 138.) exiliens, etsi longitudinis $2GI$, non esse pro-
pterea duplicis capacitatis cylindruli, cujus basis est foramen EF , & al-
titudo GI , sed ipsis intercedere æqualitatem ob reciprocam bases inter,
& crassities proportionem.

In confirmatione totius ratiocinii experientia indagari posset, an ex
vase supra descripto per quodlibet foramen æqualis quantitas aquæ ef-
fluat, dein an non fila aquea eo tenuiora fiant quo magis ad filum ver-
ticaliter descendens accedunt. Ultima hæc experientia iam ex parte a
Viro Clariss. Poleni (ni fallor) instituta fuit, observante filum aqueum
horizontaliter ex vase effluens subito præ foramine attenuari, ubi hic
videre est (Fig. 141.)

Hæc omnia acutissimo Riccati judicio submissa sunt.

Venetis a. d. 14. Feb. 1724.

Com. Jacobi Riccati ad Doctissimum Virum Danielen
Bernoullium.

EPISTOLA.

Obstupui, Eruditissime Vir, quod cum tu pro Clariss. Michelotto arma sumperis, & difficultates illas, quas ipsi communicaveram, diluendas susceperis, in illum non autem in me tela conjeceris. Puto egregium illum Medicum, & Geometram deseri potius, quam sic defendi maluisse. Ego principia, quibus est usus, ultro, & libenter admisi, unicam ejus conclusionem tamquam principiis minus coherentem erroris arguisse contentus: tu vero fundamenta succutis, & dum de principiorum certitudine dubitas, totum opus radicitus evertis. Duplici vindicis, & adversarii munere fungar, & modo contra Michelottum, modo pro me ipso decertans, me non nisi veritatis causam agere demonstrabo.

In laudato Auctore sequens pronunciatum invenies pag. 78. *Vis pellens est ut effectus ipsius, hoc est, ut quantitas motus, qui ab ipsa dato tempore generatur: est autem quantitas motus dato tempore generata in ratione composita fluidi dato tempore per orificium effluentis, & velocitatis, cum qua fluidum ipsum ex dicto orificio erumpit.*

Adde alterum desumptum ex pag. 177. *Grave eodem tempore percurrere potest spatium duplum motu uniformi ea cum velocitate, quam ex casu per datam altitudinem acquirit.*

Quid ex his sequatur vides. Quod aqua ea velocitate per foramen exiliat, quam acquirit gutta cadens spatium conficiendo æquale altitudini aquæ in vase sustentatæ, Theorema Bernoullianum est; igitur si velocitate acquisita fertur per id temporis, quod in descensum impendit, duplum dicti spatii percurrit, ideoque assignato tempore quantitas aquæ pleno officio exeuntis dupla est ejus quantitatis, quam continet cylindrus orificio circulari superincumbens. Vis itaque eo tempore pellens est, ut quantitas motus generata, hoc est, ut aqua effluens sub constante velocitate juxta Michelotti principia.

Verum tu vim illationis non infirmas, sed principia ipsa laceassis; quæ cum tam Nevvtono, & Michelotto, quam mihi, si lubet, communia sint, me cum Nevvtono conjungis, Michelottum ab utroque separas, nimis fortasse de Amico sollicitus.

Circa quantitatem aquæ fluentis venæ contractionem, & fluidi tenacitatem opponis; sed hæc Michelottum urgent, apud quem de his alium ubique silentium. Ego, dum ipsi morem gererem, non dissimulavi ejus propositionem non nisi quibusdam limitationibus adhibitis admittendam esse. Hæc verba mea sunt. *Supposto però, che seguitando le sue vestigia, si prescindendo dalle resistenze della contrazione della vena..., e da qualche altra circostanza ec.* Cur animadversionem meam tam claris verbis expositam in me convertas ignoro.

Quod

Quod si ab istis circumstantiis abstrahere recusas; me repugnantiam non habebis. Cum vim expellentem aliter metiri non possimus, quam per quantitatem motus dato tempore genitam, tunc minuenda erit vis in ea proportionem, qua minuitur copia fluidi erumpentis. Experimenta me docuerunt, aquam tempore jam a Nevvtono definito ex vase effluentem, si conferatur cum ea, quæ implet cavitatem cylindri orificio normaliter insistentis, simpla longe maiorem esse, ad duplam nunquam pertingere; in aliquibus tamen casibus, quos videre est apud Clariss. Polemum, ita ad duplam accedere, ut differentia parum facienda sit.

Ut primam Michelotti propositionem evertas, asseris, demonstrari debuisse, tempus constans necessario æquale ponendum esse tempori a Nevvtono definito; nam eadem ratione quodcumque aliud tempus tamquam constans designari potuisse, & præsertim illud, quod grave ex dupla altitudine descendit. Huic difficultati in litteris ad Clariss. Michelottum datis diligenter occurri. Cum nulla exceptione, quæ dicta a me sunt, elidantur, quid ultra reponam non habeo. Licuit profecto Michelotto loco citato pag. 78. tempus aliquod determinare pro constante, ut Theorema subiectæ materiæ applicaret; hoc idem mihi, & Nevvtono non licbit? Non ne vides, quod si alicujus momenti sit obiectio, effatum illud, quod vis se habeat ut quantitas motus dato tempore genita, inutile sit, & e manibus Mathematicorum excutitur? Semper enim ex infinitis temporibus, cur unum potius, quam aliud pro constante usurpatum sit, quærere possem, & hac subdola interrogatione demonstrationem quancumque eludere.

Transco ad aliam majoris ponderis oppositionem, quam sic exponis. Manifestum est, quod foramine EF (fig. 128.) digito clauso, digitis tantam pressionem sit percepturus, quanta est columna aquea, cujus basis foramen EF, & altitudo simplex GI: digito autem remoto, esse guttulam foramini adstantem, quæ hanc pressionem recipiat, mihi quidem clarum est, nullum discrimen essenziale inter status quietis, & motus videntis; id quod manifestius fiet, si fluidum non vi gravitatis suæ, qua illud carere supponam, sed elasticitate sollicitatum ex vase superius clauso per foramen EF exilire intelligatur.

Quid de fluidis elasticis sentiendum sit, non est hujus loci inquirere: certum est, eorum leges toto cælo differre a legibus fluidorum non elasticorum. Respondi jam Clariss. Michelotto, qui sententiam suam eodem argumento defenderat, statum quietis cum statu motus confundendum non esse: in primo solam vim verticalem agere, in secundo ad maiorem effectum producendum vim obliquam, & lateralem cum verticali conjungi; quam observationem cum ejus auctoritate, tum ejus experimento pag. 128. munivi. Tu rursus cum Amico pugnans, dum ejus opinionem tutaris, fidem enervas. Ego assertionem meam ita demonstro.

Tempore a Nevvtono definito suprema superficies aquæ foramini imminens usque ad vasis fundum descendet; ergo si nulla esset vis lateralis, tota actio esset illius quantitatis aquæ, quæ implet columnam

foramini normaliter insistentem; igitur dicto tempore hæc quantitas sola per orificium transiret: sed plus aquæ, docente experientia, dicto tempore erogatur; igitur plus aquæ in motu ponitur, ut per foramen exeat; ergo actioni aquæ verticalis addenda est etiam actio obliqua aquæ lateralis. Q. E. D.

Id pariter evinci posset ex aquæ copia superius dicto tempore infundenda, quæ quantitati aquæ erumpentis æqualis est, ut fluxus in statu manente perseveret: aqua autem super infusa rota agit (nulla enim affertur potest ratio, cur pars sit otiosa, & pars in actione posita) ergo necesse est, ut major copia aquæ agat, quam quæ in dicto cylindro continetur, cujus superficies superior dicto tempore majus spatium conficere nequit, quam sit altitudo aquæ in vase stagnantis.

Utrum autem tu conjecturæ innixus, qua putas, discrimen essentielle non intercedere inter statum quietis, & motus, corollarium Newtonianum pro paradoxo habere debueris, tibi judicandum relinquo, præcipue cum ab Illustr. Anglo contractio venæ observata sit.

Cum æ contrariam sententiam propugnare audivissem, existima-
bam te saltem argumentum prolaturum petiitum ex tubis, in quibus cavitas vasis æqualis est aperto foramini. In his vis lateralis, & obliqua locum non invenit. Ab hac difficultate expedire me non potui, nisi experientiam consulendo, quam cum Theoria Newtoniana egregie conspirantem inveni. Sed nimis longum esset totam aquarum effluentium materiam pro dignitate tractare. Hanc spartam adornandam sumpsit summus Vir Bernardinus Zendrinus.

Vbi venæ contractionem explicas, ingenium laudo; in eam enim hypothesein incidisti, quam olim invenit Borellus, & exposuit in libro de motibus a naturali gravitate pendentibus. Hanc enucleandis phenomenonis a Poleno observatis sufficientem non existimo. Hoc unum te moneo, filum aqueum non attenuari, ut figuram frustuli conici acquirat, quæ sententia tua est, & ex assumpta hypothesei sequitur. Postquam vena seu verticalis, seu horizontalis in parva a foramine distantia ad maximam constrictionem, quam pro circumstantiarum varietate pati potest, reducta est, rursus, eodem Poleno observante, dilaturatur, atque dispergitur. Displicet me aliis curis distractum his illustrandis satis oculis suppeditare non posse; quæ raptim, & ex tempore a me scripta sunt, ut humaniter excipias rogo.

Danielis Bernoulli ad Clariss. Com. Jacobum Riccatum.

EPISTOLA.

Quod Objectiones meas contra demonstrationem tuam Coroll. Newtoniani responsione dignari volueris, illud pergratum fuit; nollem autem feram diu reciprocare; videtur enim quaestio talis, ut qui persuaderi nolit, semper amplissimum excipiendi campum reperiat. Secunda hac responsione tibi, Vir Doctissime, molestus non fuisset, nisi monenda quaedam habuisset ad Clariss. Michelottum pertinentia. Scias itaque, me neutiquam arma sumplisse pro Viro illo Celeberrimo propriae suae causae defendendae abunde sufficienti: nec ille defensore opus habet, nec si habuisset, mihi longe inferiori provinciam hanc demandaturus fuisset. Non aliud mihi proposui, quam demonstrationem tuam dicti Corollarii accuratius perpendere, illud solum libertate philosophica usus (addere debuisset, a te ipso rogatus) in praecedenti meo scripto agere contendi. Nunc autem ulterius dicam, me nondum videre, quam in re principia a Clariss. Michelotto adhibita adversentur iis, quae a me dicta sunt.

Ex principiis Viri modo laudati sequitur, quod eo tempore, quo grave cadit ex altitudine FC (Fig. 139.) exeat filum aqueum motu uniformi, & horizontali longitudinis $2FC$; & ego hoc concedo; sed filum istud esse propterea duplo majus cylindro FC. C. tua est consequentia, de qua dubitandi rationem prolixis verbis exposui, ad quam nondum mihi responsum fuit, nisi allegatione experientiae, contra quam postmodum excipiam.

Certe aut ponendum est, solam directionem foraminis efficere posse, ut eodem tempore, plus minusve aquae effluat, aut concolendum, consequentiam tuam falsam esse, medium non datur.

(Hoc ut intelligatur sciendum est, me pro majori explicatione filii contractionis considerasse tubum diversis foraminibus aequalibus, & a summa aquae superficie aequidistantibus, sed diversae inclinatis, perforatum; per quae foramina eodem tempore aequales quantitates aquae fluere, manifestum est; erunt autem fila aquae emanantis eo longiora, ac consequenter eo tenuiora, quo magis accedunt ad lineam verticalem.)

Sed hac alternativa facili experientia decidetur: si posterius, demonstrationem tuam erroneo inniti principio ipse vides: si prius, hac quidem in parte procedere posse videtur, sed pro integra ipsius perfectione demonstrandum est, pro tempore constanti sumendum esse illud, quod grave lapsu per altitudinem FC impendit; sufficientem enim rationem in litteris tuis ad Cl. Michelottum datis nondum vidi. Afferis, Vir Clarissime, ipsum Michelottum idem alia occasione fecisse; locum reperire non potui, nec adeoque scio, an paritas exempli sit concedenda; sed hoc posito, non auctoritatem, rationem peto. Videtur aliam afferi non posse,

Kkk 2

nisi

444
 nisi illam a Nevvtono allatam; quod dicto tempore grave lapsu suo *cum* acquirat velocitatem, qua aqua exilit. Hanc vero rationem nullam esse ita demonstro: ponamus Theorema circa velocitatem aquæ effluentis ita fuisse enunciatum; *velocitas, qua aqua exilit, æqualis est dupla velocitati, quam grave acquirat cadendo ex altitudine* $\frac{1}{4}$ FC. Hic velocitatem aquæ expri-

mendi modus, quamvis minus concinnus, non propterea minus verus fuisset; jam vero ipsissimis tuis verbis, paucis solum mutatis, probabo, pressionem, qua aqua ad egrediendum sollicitatur, non esse duplam, sed simplam cylindri aquei FC. C. In Nevvtoni casu tempus ponitur æquale duplici tempori, quod iufumeret grave cadendo per altitudinem $\frac{1}{4}$ FC;

velocitas, qua aqua exilit, etiam ponitur semper eadem; igitur vis motum aquæ generans æqualis est ponderi aquæ, quæ eodem illo tempore exit ex foramine C; sed moles aquæ dicto illo tempore egressæ est æqualis cylindro aqueo, cujus basis foramen C, & altitudo FC (quod facile demonstratur, posito nimirum falsam esse conjecturam meam de fili contractione) quare etiam vis, quæ totum aquæ exilientis motum generat, æqualis est cylindro aqueo, cujus basis foramen C, & altitudo FC. Q. E. D.

Vides, Vir Doctissime, demonstrationem tuam hæcenus nil esse nilusum verborum.

Quæ dixi, ut probarem, pressionem esse æqualem simplici pressionem cylindri aquei foramini ad perpendicularum imminens, quæque tu titulo oppositionis majoris ponderis honorare voluisti, tanquam non dicta per me considerare licebit, utpote scopo meo minus convenientia; non enim Theorema, uti a Doctiss. Michelotto enunciatum fuit, demonstrare, sed demonstrationem tuam Corollarii Nevvtoniani ponderare, animus fuit; possem tamen, si hanc digressionem facere vellem, argumenta proferre haud repicula pro demonstrando, motum aquæ in vase etsi obliquum (quod tamen nondum constat) ad cylindrum verticalem supra foramen D, nihil contribuere ad pressionem guttæ foramini adstantis; sed hæc forent extra propositum.

Nescio, an experientia doceat, tempore lapsus gravis per spatium FC egredi majorem quantitatem aquæ, quam contineret cylindrus foramini insitens ad perpendicularum: certe ratio contrarium suadere videtur: necdum video, quid in ratiocinio supra exposito desiderari possit. Forsitan tempus illud experientia non recte definitum est, & iusto majus sumptum fuit, nimirum non considerando aerem lapsui resistere.

Vis, qua aqua effluit ex tubo, cujus cavitas æqualis est foramini; non comparari potest cum vi, qua eadem erumpit ex vase, cujus foramen supponitur infinite parvum, non magis ac punctum cum linea. Huiusmodi difficultatem nunquam me urgere potuisse, libenter fateor.

Si experientia circa extenuationem fili se habet, ut dicis, fateor illam nihil conferre pro sententiæ meæ confirmatione, sed & nihil ipsi derogare dico.

Eo-

Locum in Borello, quem ejusdem sententiæ esse asseris, libenter ex te discerem.

Multa habere addenda, sed nolo leviusculis hujusmodi dubiis preciosissima tua tempora diutius morari: hæc & præcedentia maturius per otium examinare, si examine tuo digna censes, poteris

Interim mente, & corpore Vale.

Com. Jacobi Riccati ad Virum Clarissimum Danielem Bernoullium

EPISTOLA ALTERA.

Ab his objectionibus, quas tuo nomine, Eruditissime Vir, paucis ab hinc diebus accepi, facile me expedire possem, nisi prius nonnulla animadvertenda essent, quæ æquivocationem omnem de medio tollant, & ostendant te Clariss. Michelotti sententiam cum mea confundere; neque adhuc scopum designasse, in quem tua spicula dirigeres.

Non aliud tibi proposuisti, ut asseris, quam demonstrationem meam Corollarii Nevvtoniani accuratius pendere: atque ulterius addis, te nondum videre qua in re principia a Michelotto adhibita adversentur his, quæ a te scripta sunt. Hoc profecto non vides, quia ejus librum qua par erat attentione nunquam legisti, & (pace tua sit dictum) quid impugnes, aut quid tueris prorsus ignoras. Tali pacto seras quamdiu liberit recipiabis. Pergis porro: *Ex principis Viri modo laudati sequitur, quod eo tempore, quo grave cadit ex altitudine FC (Fig. 139.), exeat filum æqueum motu uniformi, & horizontali longitudinis 2FC, & ego hoc concedo; sed filum istud esse propterea duplo majus cylindro foramini D=C normaliter insistente, tua est consequentia, de qua dubitandi rationem exposui.*

Hæc, Doctissime Bernoulli, mea consequentia non est, sed citati Michelotti; nam quantitatem liquoris in fluxu manente constituti, dato tempore, per datum foramen, sub data velocitate exeuntis aliter ipse non metitur, quam arcum foraminis in velocitatem ducendo; neque aliam quam sequentem formulam usurpat $q = t^2 u$, in qua sub litteris initialibus exprimuntur fluidi quantitas, tempus, velocitas, & area orificii. Lege, si placet, ejus Operis pag. 75, & sequentes, una cum Corollario pag. 120, & Scholio pag. 121, 122, 123, & rursus quod scribit pag. 169, & quid sequatur intelliges.

Quæro abs te, cur filum horizontale longitudinis 2FC duplam aquæ quantitatem non continet, si cum ea conferatur, quæ in cylindro FC. C continetur? Respondebis ob venæ contractionem, aliasque circumstantias: sed de his apud Michelottum ne verbum quidem. Iccirco admonui, consequentiam illam ex ejus principiis sponte fluentem admittendam nullo modo esse, nisi quibusdam limitationibus adhibitis. Pudet me, quæ semel, atque iterum dixi, tertio inculcare.

Esa-

Esaminata per tutti i versi l' addotta dimostrazione, non ci ho saputo vedere nè pure un ombra di paralogismo, e ciò spiccherà maggiormente dalle risposte, ch' io sono per dare alle sue obbiezioni (Michelotti videlicet). Supposto però, che seguitando le sue vestigia si prescinda dalle resistenze, dalla contrazione della vena indicata dal Sig. Nevvton, e confermata con replicate esperienze dal Sig. Poleni, ed in oltre da qualche altra circostanza sin ora da Matematici non avvertita, e che si considererà in altro tempo.

En verba mea ex litteris ad Clariss. Michelottum datis excerpta luce meridiana clariora. Quid tu ad hæc? Dissimulatione uteris, & eandem semper cantionem canis, dum Michelotti lapsus, quem ego notavi, in me transference conaris invitis Diis, hominibusque. Quæstio erat, an ex hujus Auctoris principiis demonstrari posset assertio Corollarii Nevvtoniani, non qualis revera est, sed qualis ab ipso fingitur, qua de re suo loco redibit sermo: hoc ni fallor clarissime præstiti. Præscinde ab his, quæ vel Michelotto in mentem non venerunt, vel a quibus præscindere voluit, & demonstrationis meæ vitium detege. Tunc eris mihi magnus Apollo. Ulterius progressus sum, principiorumque a me-mutuo sumptorum defectum non dissimulavi; correctionem, quam adhibere oportet, insinavi; quid ultra facere debuerim, ut doceas, flagito.

Sed his missis, cum Achille tuo, hoc est cum argumento illo, quod in secunda scriptura iterum urges, congregiendum est. Putas ex mea sententia sequi, vim expellentem modo per duplam GI (Fig. 138.), modo per simplicam, aut per quamcumque aliam proportionem exponi debere. Id autem ratiocinatione probas, quæ mera cavillatio est. Quid nomine vis intelligas non satis percipio. Si de vi sollicitante loqueris, hæc constans profecto est, & nulli mutationi obnoxia, usquequo omnia in eodem statu permanent, ut supponimus; & aliter exprimi nequit, quam per massam aquæ, quæ, nullis obstantibus resistentiis, ex vase effluere deberet, tempore a Nevvtono definito. In hoc Theoremate nostræ disputationis cardo vertitur. Vel igitur illud admittis, vel falsum putas; nihil enim est medium. Si primum, necum consentis, Michelotti sententiam, immo paternam deseras, uno verbo, Nevvtonianus es. Si secundum, illud invictissime demonstrabo. Quodlibet elige, & te causa cecidisse convincam. Tergiversationi locus non est. Quod si nomine vis intelligis effectum a vi sollicitante productum (non enim de vocabulo quæstio movenda est) tunc vis in hoc sensu accepta erit variabilis. Vim sollicitantem, quæ uniformiter agit, pro tempore actionis suæ majorem, aut minorem effectum gignere, quis indubium vocet? Hoc satis gravitatis exemplo probatur.

Quantitatem aquæ assignato tempore erumpentem, quam abstrahendo a resistentiis, vi sollicitanti æqualem invenimus, tantam esse, ut implere queat duplam columnam foramini EF ad lineam insistentem, illorum sententia fuit, quæ effluxum metiuntur per factum ex velocitate in tempus, & in aream foraminis. Hos inter recenseo Gulielmum, Hermannum, Varignonium, Hughenium, quibus adde, si placet, & Michelottum. Verum isti Auctores excessu peccant.

Cau:

Cautius procedit magnus Nevvtonus; hæc enim habet Propositione 36. casu primo, postquam obliquos motus particularum effluentium, & venæ contractionem consideravit. *Per experimenta, inquit, constat, quod quantitas aqua, qua per foramen circulare in fundo vasis factum effluit, ea est, qua pro diametro venæ cum velocitate prædicta effluere debet.* Ut autem experimenta Teoriz congruerent, aquæ exilientis velocitatem paulisper auget; & cum certum sit aquam superius infundi sine aliquo motu non posse, aquæ velocitatem in circulo AB talem supponit, ac si aqua cecidisset ex puncto quietis I, & spatium IH motu accelerato confecisset. Lineam IH postea determinat Coroll. primo, ut sit AK: CK in duplicata ratione aræ foraminis (per foramen EF venam contractam intelligit) ad aream circuli AB. Quam longe a mente Nevvtoni tu cum tuo Michelotto recesseris, ex dictis patet. Nevvtoniana recito fide historica, non in omnibus probo; nam scio summum Virum in sua cataracta substruenda aliquid humani passum esse; quamquam si cum aliis compareretur, omnes longo intervallo post se relinqueret.

Sententiam tuam, Eruditissime Vir, libenter ex te discerem; nam fere in omnibus tibi aqua hæret, & Scepticorum more aliorum opinionem laceratis, tuam manifestare reformidas. Ais te nescire, an experientia doceat tempore lapsus gravis per spatium IG egredi majorem quantitatem aquæ, quam contineret cylindrus foramini insilens verticaliter. Certe ratio, ut putas, contrarium persuadere videtur, nec dum vides, quid in ratiocinio tuo desiderari possit. Calculum subducere debueras, & ab hac ambiguitate te liberare. Cum experimenta contrarium evincant, ratio tua cum experientia, & cum Natura pugnabit. Sed quænam est hæc ratio? vereor enim, ne nubem pro Junone amplectaris. Verba tua audiamus. Possem argumenta proferre pro demonstrando, motum aqua in vase, essi obliquum (quod tamen nondum constat) ad cylindrum verticalem supra foramen EF, nihil contribuere ad pressionem gutta foramini adflantis. Sic paulatim de loco pelleris: in prima scriptura motum obliquum repudiabas, in secunda de eo dubitas, in utraque statum motus cum statu quietis pro more tuo confundis. Dum particularæ aquæ in vase contentæ quiescunt, tunc fundum æqualiter premunt; at dum aperto ostio effluunt, vis obliqua actionem suam exercet, & aquæ exeantis copiam auget. Utrumque ita evidenter constat, ut non argumenta hand rejicienda, sed demonstrationes omni exceptione majores in medium afferre possem, si per otium liceret. Verum rationibus opus non est, ubi experientia clamar.

Interim finge plus aquæ non exonerari tempore a Nevvtono assignato, quam tu velles, ut tuam sententiam tueri valeas; sequitur vim sollicitantem optime a Clariss. Michelotto definitam per massam, seu quantitatem aquæ, quæ impleat cylindrum foramini ad lineam imminentem, seculis tamen resistentiis. Quid tu, negas ne, an affirmas? Hic rursus tibi hæret aqua; nam de Theoremate Michelotti dubitas, & quæ de pressione scripsisti tamquam non dicta consideras. Meminisse debueras, hanc esse eximii Patris tui doctrinam potius quam Michelotti, ut III. iste Me-

Medicus fatetur pag.112. Verèris fortasse, ne argumentum illud tuum; quod tanti facis, & cui supra respondi, in te retorqueam? Quid, si consequentiam circa effluxum aquæ admittis, qua posita, Michelotti Theorema nullo negotio demonstratur?

Et quoniam tota quæstio, te ipso satente, ad observationes traducta est, si Polenum, quem tibi laudavi, consulere recusas, si Mariottum, quem laudo, non probas, extat celebre Gulielmini experimentum circa finem Tractatus de mensura aquarum fluentium octies repetitum; quod in suos usus transtulit conterraneus tuus Hermanous Phoronomiæ lib.2. Prop.37. Shol.I. Hoc si ad computum reducere non pigeat, quod magni laboris non est, te longe a veritate abesse deprehendes.

Ut igitur tua stet demonstratio, vel dicendum Viros accuratissimos in capiendis experimentis dormitasse, vel Lectoribus imposuisse, vel Naturam ipsam in parallogismum incidisse. Vide quas in angustias te conjicias. Excipe nunc, quod tempus illud experientia non recte definitum, & justo majus sumptum fuit, nimirum non considerando aerem lapsui resistere. Exceptione tua nihil aliud facis, quam argumento ab experientia desumpto pondus addere; nam si effluxus observatus major est, quam cum opinione tua conciliari queat, quamquam aer resistit, hoc impedimento sublato, augeri debet, non minui.

Reliqua in scriptura tua, quæ ut fateris, minus ad rem faciunt, consulto omitto. Quod dicis de foramine infinite parvo nova hypothesis est. In vase Nevvtoniano diameter foraminis ad vasis diametrum assignabilem habet rationem, nec video quid absurdi sequatur, si tota aqua in glaciem concreseat, ea excepta, quæ orificio normaliter imminet, & si aqua per cylindrum medium transeunte in effluxu perenni, & manente constituta, hujus motus leges inquirentur.

Quod ambigis an vena contracta rursus dispergatur, ut dubitationem exuas, citatum Polenum consule. Hoc phenomenon pro sententiæ tuæ confirmatione nihil conferre, sed & nihil ipsi derogare affirmas. Putabam hæc inter se conciliari vix posse. Interea locum Joh. Alphonfi Borelli contractionem venæ tenacitati aquæ tribuentis invenies in libro de moribus naturalibus a gravitate pendentibus prop.226. Borellum deceptum scio; ob id conciliationem tuam falsæ suppositioni innixam, licet non viderim, probare tamen non possum.

Habes, Eruditissime Vir, sententiam meam indicatam potius, quam explicatam: sed tibi pauca. Quod si patientia tua diutius abusus sum, id humanitati tuæ tribue, & vale.

Castisfranci die 20. Martii 1724.

ANNOZZIONE DELL' EDITORE.

Per mettere in un pienissimo lume la verità del Corollario Newtoniano sostenuta dal nostro Autore nel presente Schediasma, farò ricorso al metodo infallibile delle azioni, cioè a dire delle forze applicate agli spazi, illustrato dal Padre Vincenzo Riccati nel suo Dialogo delle forze vive, e della azione delle forze morte.

Sia ACDB (Fig. 142.) un vaso cilindrico ripieno d'acqua, e nel centro del suo fondo CD sia aperto un menomo foro EF, per cui l'acqua trovi l'uscita. C'insegnano i canoni idrodinamici, che le velocità del fluido dentro, e fuori del vaso stanno nella ragione inversa del fondo CD al foro EF; di modo che la prima è picciolissima in paragone della seconda. Dovendosi passare per tutti i gradi dall'una all'altra velocità, la Natura forma in vicinanza del foro EF il gorgo SMEFNT, che trae l'origine dal girare la figura SMEGZ intorno l'asse GZ, che passa per il centro G comune al buco EF, ed al fondo CD del vaso. Rimane immobile l'acqua nei siti SMEC, TNFD, quasi che fosse solida, e l'acqua contenuta nel gorgo si va accelerando, a misura che si trasfuso per sezioni più ristrette MN.

Suppongasì, che la superficie AB del fluido sia calata abbasso per lo spazio minimo HQ, di modo che sia scaturita pel foro EF la quantità d'acqua AR. L'azione della gravità dell'acqua si farà impiegata in tre effetti, cioè a dire nell'imprimere forza viva all'acqua contenuta nel cilindro PT, a quella contenuta nel gorgo SMEFNT, ed all'altra parimente, eguale al cilindro AR, ch'è scappata fuori dal vaso. Quanto più picciola quantità di fluido riempie il gorgo, tanto minore d'esso fluido è la forza viva, e quanto minore è una tal forza viva, altrettanto maggiore si è quella, e dell'acqua PT dentro il vaso, e dell'acqua pari di mole al cilindro AR spacciata fuori pel buco. Quindi l'esito del liquore è più veloce, e più copioso, ed una azione più grande viene in pari tempo esercitata dalla gravità dell'acqua dentro il vaso rinchiusa. Egli è fuori d'ogni dubbio, che il peso dell'acqua, malgrado l'impedimento del vaso, tenta di effettuare la possibile massima azione. A tal oggetto dunque la Natura determina il gorgo SMEFNT di così picciola altezza ZG, che la forza viva dell'acqua, ch'esso comprende, possa trascurarsi fisicamente. Passando dal fisico al geometrico, si supponrà da noi matematicamente minima la detta forza viva, e tale, che relativamente alla forza viva dell'acqua PT sia permesso trasfandarla nei computi. A norma di tale supposizione m'innoltro allo scioglimento del seguente

P R O B L E M A I.

Determinare la velocità, colla quale esce l'acqua da un vaso cilindrico per un foro minimo circolare aperto nel fondo del vaso stesso.

Nel primo istante del moto sia l'altezza dell'acqua $HG = a$, la base del vaso $CD = b$, il foro $EF = c$. Cominci l'acqua a scaturire dal foro, ed essendosi abbassata per lo spazietto $HQ = s$, sia uscita dal vaso la porzione di fluido $AR = bs = m$. Chiamisi U la velocità del corpo d'acqua PT , il quale s'adegua al cilindro $AD = ab$, ed u la velocità della massa infinitesima bs uscita pel buco c .

Ricorrendo al nominato metodo delle azioni, e fatta la riflessione, che mentre il fluido ab è disceso per lo spazio s , la sua gravità ha esercitata l'azione abs , e supponendosi trascurabile la forza viva dell'acqua, che riempie il *gorgo*, avremo per le note formole $abs =$

$$\frac{abU^2 + b^2u^2}{2} \quad (1): \text{ ma come abbiamo di sopra notato, le velocità } U, u$$

scrivano la ragione inversa delle sezioni b, c e dunque si verifica l'equazione $eu = U$, e sostituendo questo valore nella nostra formola, ci si

$$\text{presenta } abs = \frac{ac^2 + b^2s}{2b} \cdot u^2.$$

La massa liquida ab s'è mossa per lo spazio s , e l'acqua bs , che spicca dal foro, s'è conformata in un cilindro, la cui base c , e la lunghezza $\frac{bs}{c}$, che da noi ponesi $= z$. Giacchè $\frac{bs}{c} = z$, ne risulta

$bs = cz = m \quad (2)$, ed $abs = acz$. Si cavi la conseguenza importante, che all'azione abs , che segue in Natura, può con un gioco di metodo sostituirsi l'eguale acz , e in cambio d'essa usarsi sicuramente. Surrogato in luogo di bs il suo valore cz , la nuova formola $acz = \frac{ac + bz}{2b} \cdot u^2 \quad (3)$,

o sia $\sqrt{2abz} = u \quad (4)$ esprimerà la relazione fra le velocità, e gli spazi

corsi dall'acqua cz , ch' esce dal vaso: il che &c.

COROLLARIO I.

Nel principio del moto abbia corso l'acqua, che spicca dal foro, uno spazio x talmente minimo, che sia la quantità bx infinitamente minore di ac . In questa ipotesi la formola (4) si riduce alla seguente

$$\sqrt{2a} \cdot \frac{bx}{ac} = u, \text{ ed eguagliandosi la frazione } \frac{bx}{ac} \text{ ad una grandezza im-}$$

mensamente picciola, manifestamente si scopre, che la velocità u pareggia una parte inassegnabile di quella celerità $\sqrt{2a}$, che viene in progresso dal fluido acquistata. La velocità per altro $\sqrt{2a} \cdot \frac{bx}{ac}$ concepita

dall'acqua cx uscita dal vaso è infinitamente maggiore di quella $\sqrt{2x}$, che avrebbe cagionata nell'acqua cx la sua gravità, essendo

$$\sqrt{2a} \cdot \frac{bx}{ac} : \sqrt{2x} :: \sqrt{b} : \sqrt{c}. \text{ Questa riflessione ci fa toccare con mano,}$$

che la forza viva, ond'è fornita la massa cx , procede da un'azione incomparabilmente più grande di quella, che per lo spazio x verrebbe esercitata dalla gravità di essa massa.

COROLLARIO II.

Inoltriamoci alla supposizione, che le grandezze ac , bx , e conseguentemente anche le due c , x (supponendosi finite le quantità a , b) si corrispondano in proporzione finita, e la formola (4) $\sqrt{2a} \cdot \frac{bx}{ac+bx} = u$

ci addita, che essendo $\frac{bx}{ac+bx}$ quantità finita minore dell'unità, è pa-

rimente finito il valore della velocità u ; ma però sempre più picciolo di $\sqrt{2a}$, al qual valore si va vie più accostando, a misura che s'augmenta la grandezza bx relativamente ad ac . In questo incontro la forza viva dell'acqua uscita cx si eguaglia ad $acx \cdot \frac{bx}{ac+bx}$, e giacchè, con-

forme abbiamo notato, è finita la grandezza $\frac{bx}{ac+bx}$, ed una finita re-

lazione passa fra le quantità c , x , la predetta forza serberà una ragione finita col quadrato c^2 .

COROLLARIO III.

Ma quando bz è divenuta infinita in riguardo ad ac , il che può succedere, anche mentre bz è grandezza minima, purchè s' eguali ad ac^n , e sia l'esponente n positivo, e minore dell'unità, in tal caso avremo $n = \sqrt[2]{2a \cdot \frac{bz}{ac+bx}} = \sqrt[2]{2a}$, e questo è il massimo valore, a cui

può pervenire la detta velocità.

Si offervi poterli asserire con verità, che lo spazio x , quantunque menomo, sia stato passato con equabile velocità dall'acqua scaturita dal foro. Sia per esempio $x = \frac{ac^{\frac{1}{2}}}{b}$; egli è manifesto per le cose dette,

che mentre era $x = \frac{ac^{\frac{1}{2}}}{b}$, la velocità u s'eguagliava a $\sqrt[2]{2a}$; dunque

lo spazio $\frac{ac^{\frac{1}{2}}}{b} - \frac{ac^{\frac{3}{2}}}{b}$ s'è scorso con velocità equabile: ma per ade-

quazione $\frac{ac^{\frac{1}{2}}}{b} - \frac{ac^{\frac{3}{2}}}{b} = \frac{ac^{\frac{1}{2}}}{b} = x$; dunque l'acqua si è mossa per

lo spazio x con equabile celerità.

La forza viva dell'acqua cx scappata fuori, cioè a dire $acx \cdot \frac{bx}{ac+bx} =$

acx , la scopriremo infinita relativamente a quella, onde è fornita l'acqua, che si muove con velocità finita, ma non per anche ridotta equabile, la quale nel precedente Corollario abbiamo avvertito riferirsi a c^2 in proporzione finita.

S C O L I O I

Nella formola (4) $\frac{\sqrt[2]{2abx}}{\sqrt[2]{ac+bx}} = u$ non abbiamo messa a computo

l'azione della gravità dell'acqua, dopo ch'è uscita dal vaso. Egli è d'uopo adunque fingere o che l'acqua scaturita resti priva di quantità, o pure

453

o pure che l'acqua, tosto che è scappata fuori pel buco, sia obbligata
à voltar cammino lungo un canale orizzontale senza patire resistenza
veruna.

S C O L I O II.

Prese le differenze nella formola (1) $abs = \frac{abU^2 + bsu^2}{2}$, dopo aver

in essa sostituito in cambio di bs il suo valore cx , ci si presenterà
 $acd\alpha = abUdU + cxudu + \frac{cdx u^2}{2}$. L'azione adunque elementare $acd\alpha$

cagiona tre effetti, accrescendo la forza viva nelle due masse ab , cx ,
ed imprimendo la forza viva $\frac{cdx u^2}{2}$ nella massa menomissima cdx , che

durante la infinitesima azione $acd\alpha$ spiccia novellamente pel foro. Quan-
do il fluido è pervenuto ad una equabile velocità, i due primi effetti
si annullano, essendo in tal circostanza tanto dU , quanto $du = 0$, e per
conseguenza adempiesi l'equazione $acd\alpha = \frac{cdx u^2}{2}$. Quindi nella detta

ipotesi l'azione minima $acd\alpha$ s'impiega tutta nel generare la forza viva
nell'incremento cdx della massa fluida cx uscita dal vaso. Anzi verifi-
candosi nella nostra supposizione la formola $acx = \frac{cxu^2}{2}$, si può asserire

con geometrica adeguazione, che mentre la velocità del fluido sia di-
venuta equabile, l'intera azione $acx = abs$ s'è spesa nella forza viva
della porzione d'acqua cx scaturita dal vaso.

Dalle cose dette raccogliesi, che se ci proporremo di ritrovare una
forza f , che agendo liberamente per uno spazio elementare cagioni l'ef-
fetto $\frac{cdx u^2}{2}$, la totale azione di questa forza, quando l'acqua equabil-

mente si muove, pareggerà $acx = \frac{cxu^2}{2}$; di modo che all'azione di essa

forza si potrà attribuire tutto il moto dell'acqua uscita. Supponendo il
Cavalier Nevvton equabile la velocità del liquore, egli è fuor di dub-
bio, che quelle parole del famoso suo Corollario, *Vis, qua totus aqua
exilientis motus generari potest &c.* alludono alla forza, di cui parliamo.
Deve poi esser libera la detta forza; perchè potendosi venir prodotta la
forza viva $\frac{cxu^2}{2}$ da infinite forze, ciascuna delle quali eserciti una azione

eguale alla acx , e dicendo assolutamente il Sig. Nevvton, *Vis, qua totus
aqua*

aqua exilientis motus generari potest, fra tutte le mentovate forze si dee intendere certamente quell'unica libera, e non impedita, la cui azione elementare cagiona la forza viva $\frac{cdx u^2}{2}$ nella massa infinitesima cdx , non

altrimenti che la gravità in un corpo, che discende per la linea del piombo.

PROBLEMA II.

Determinare la forza, che agendo liberamente, cagiona la forza viva nell'elemento d'acqua, che nuovamente scaturisce da un vaso per un foro minimo in tempo infinitesimo.

Conciosiachè $\frac{abx}{ac+bx} = \frac{u^2}{2}$, moltiplicando per le quantità eguali cdx , dm , avremo $\frac{acbx dx}{ac+bx} = \frac{dm u^2}{2}$. Lo spazio, pel quale agisce una

forza costante libera, s'eguaglia alla metà di quello, che nel tempo della durata dell'azione si scorre dalla massa dm colla velocità u acquistata in vigore di detta azione. Agendo per uno spazio minimo la forza, che noi cerchiamo, si può considerare come costante, e giacchè la massa $dm = cdx$ nel tempo, in cui segue l'azione, scorre lo spazio dx , la predetta forza a norma delle cose dette agisce per lo spazio $\frac{1}{2} dx$.

Dividendo adunque per $\frac{1}{2} dx$ l'azione $\frac{acbx dx}{ac+bx}$, ne risulterà la forza continuamente applicata, che da noi si nomina $f = \frac{2acbx}{ac+bx}$ (5): il che ec,

COROLLARIO I.

Se nel cominciamento del moto è bx infinitamente minore di ac , o si presenta la forza $f = 2bx$. In tale incontro l'azione $\frac{f dx}{2} = bx dx$,

che genera la forza viva $\frac{dm u^2}{2}$; è una parte minima della azione ele-

mentare $abds = acdx$, impiegandosi il rimanente, cioè per adeguazione tutta l'azione $acdx$ nel complesso dei due effetti nominati nel premesso
Sco-

Scolio II. $abvdu + cxdn = \frac{ac + bz}{c} bvdv$, o per meglio dire nel so-

lo incremento $abvdu$ della forza viva del corpo d'acqua ab , essendo relativamente nullo l'altro effetto $cxdn$.

COROLLARIO II.

Sia lo spazio x cresciuto sì fattamente, che le quantità ac , bz si riferiscano in proporzione finita, ed interverrà, che l'azione $\frac{fdx}{2} =$

$\frac{acbdx}{ac + bz}$ serbi coll'azione elementare della gravità dell'acqua ab , cioè a

dire con $abds = acdx$ la finita relazione, che passa fra le grandezze bz ; $ac + bz$. Conseguentemente nel doppio effetto $abvdu + cxdn = ac + bz$.

$\frac{bvdv}{c} = ac + bz$. $\frac{cxdn}{b}$ si spenderà l'azione $\frac{ac^2dx}{ac + bz}$. Mentre per esem-

pio fosse $ac = bz$, si troverebbe $f = ac$, $\frac{fdx}{2} = \frac{acdx}{2}$, e ciascuno degli

effetti $abvdu$, $cxdn$, che in questa ipotesi sarebbero eguali, richiederebbe l'azione $\frac{acdx}{2}$. La velocità u dell'acqua uscita dal vaso s'egua-

glierebbe a $\sqrt{a}$.

COROLLARIO III.

Finalmente quando è bz infinita relativamente ad ac , il che può verificarsi stando ancora bz dentro i confini delle quantità infinitesime, conforme abbiamo notato nel Corollario III. del Problema I; scopriremo $f = 2ac$. In tale circostanza la velocità u , colla quale l'acqua scaturisce dal buco, è divenuta equabile, e s'eguaglia a $\sqrt{2a}$, siccome appunto suppone l'incomparabile, Sig. Nevvton. Or ecco adunque, che nella supposizione del grande Inglese la forza f pareggia la grandezza $2ac$ a norma della espressione del tanto dibattuto suo Corollario: *Vis, qua totus aqua exilientis motus generari potest, aequalis est ponderi cylindrica columella aqua, cujus basis est foramen EF (Fig. 138.), & cujus altitudo est 2GI, vel 2CK.* Si asserisce in oltre con verità, che questa forza può generar tutto il moto nell'acqua, ch' esce dal vaso; imperciocchè essendo nella ipotesi di $u = \sqrt{2a}$ lo spazio scorso x infinito re-

la-

lativamente a quello passato dall'acqua, mentre era u minore di $\sqrt{2a}$ per una quantità finita minima a piacimento, l'azione acz s'adequa a $\int \frac{f dz}{2}$, e rettamente si afferma, che la forza $2ac$ agendo per lo spazio

$$\frac{1}{2} z \text{ ha prodotto nella massa } cz \text{ la forza viva } cz. \frac{u^2}{2} = cz. c;$$

Impiegandosi tutta l'azione elementare del peso dell'acqua ab , vale a dire $abds = acdz$ nell'unico effetto cdz . $\frac{u^2}{2} = cdz$. a , chiara si scò-

pre la nullità degli altri due effetti $abvdv$, $czudu$. E così in fatti dee intervenire, perchè essendo la velocità v , u divenute equabili, s'egualiano a nulla i loro incrementi dv , du .

Per intero compimento della materia aggiungo la soluzione del seguente

PROBLEMA III.

Determinare la relazione fra gli spazj scorsi dall'acqua, che scaturisce da un vaso per un foro minimo, e i tempi impiegati a percorrerli.

Si nomini t il tempo consumato dal primo elemento di fluido uscito dal vaso a passare lo spazio z , ed essendo $\frac{dz}{n} = dt$, e per l'equa-

$$\text{zione (4)} \quad \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{ac+bz}} = u, \text{ scopriremo } \frac{dz \sqrt{ac+bz}}{\sqrt{2abz}} = dt \text{ (6); e moltiplicando, e dividendo per } \sqrt{ac+bz},$$

$$\frac{acdz + bzdz}{\sqrt{2ab \cdot acz + bz^2}} =$$

$$\frac{\frac{1}{2} acdz + bzdz}{\sqrt{2ab \cdot acz + bz^2}} + \frac{\frac{1}{2} acdz}{\sqrt{2ab \cdot acz + bz^2}} = dt. \text{ L'integrale del termine}$$

$$\frac{\frac{1}{2} acx + bx^2}{\sqrt{2ab \cdot acx + bx^2}} \text{ s' eguaglia a } \frac{\sqrt{acx + bx^2}}{\sqrt{2ab}} \text{ e quello del termine}$$

$$\frac{\frac{1}{2} acx}{\sqrt{2ab \cdot acx + bx^2}} \text{ pareggia la quantità } \frac{ac}{2 \sqrt{2ab^3}} \int \frac{1 + \frac{2}{\frac{\sqrt{ac+bx}-1}{bx}}}{\sqrt{ac+bx}-1},$$

doendosi prendere i logaritmi nella logistica della sottangente = 1;

$$\text{Sarà pertanto } \frac{\sqrt{acx + bx^2}}{\sqrt{2ab}} + \frac{ac}{2 \sqrt{2ab^3}} \int \frac{1 + \frac{2}{\frac{\sqrt{ac+bx}-1}{bx}}}{\sqrt{ac+bx}-1} = t(7);$$

formola, che dinota la proporzione fra lo spazio x scorso dall'acqua, che spiccia dal buco c , ed il tempo t impiegato a percorrerlo: il che ec.

COROLLARIO I.

Mentrè nel cominciamento del móto la grandezza bx è infinitamente minore di ac , la formola (7) prende l'aspetto

$$\frac{\sqrt{acx}}{\sqrt{2ab}} + \frac{ac}{2 \sqrt{2ab^3}} \int \frac{1 + \frac{2 \sqrt{bx}}{\sqrt{ac}}}{\sqrt{ac}} = t. \text{ Ma eguagliandosi}$$

$\frac{2 \sqrt{bx}}{\sqrt{ac}}$ ad una grandezza menoma; abbiamo nella logistica della

$$\text{Surtangente} = 1 \int \frac{1 + \frac{2 \sqrt{bx}}{\sqrt{ac}}}{\sqrt{ac}} = \frac{2 \sqrt{bx}}{\sqrt{ac}}; \text{ dunque effettuati i}$$

necessarj calcoli, $\sqrt{\frac{2cx}{b}} = t$. Questa stessa formola si può agevolmente

dedurre dalla equazione differenziale (6). $\frac{dx \sqrt{ac + bx}}{\sqrt{2abx}} = dt$, cancellan-

do nel numeratore il termine incomparabile bx , ed indi passando alla integrazione. Non lasciamo d'avvertire, che il tempo $\sqrt{\frac{2cx}{b}}$, oltre all'

essere infinitesimo si scopre ancora menomo relativamente al tempo $\sqrt{2x}$, in cui la massa cx stimolata dalla sua gravità avrebbe camminato per lo spazio x .

COROLLARIO II.

Sia cresciuto lo spazio x sì fattamente, che fra le grandezze ac , bx passi una proporzione finita, e dalla attenta considerazione della for-

$$\text{mula (7)} \quad \frac{\sqrt{acx + bx^2}}{\sqrt{2ab}} + \frac{ac}{\sqrt{2ab^2}} \int \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{ac + bx}} - 1}{\sqrt{ac + bx} - 1} = t \text{ ricar-}$$

veremo essere infinitesimo il tempo, in cui l'acqua uscita dal vaso è pervenuta ad una velocità, la quale per il Corollario III. del Problema I. è finita, ma però sempre minore di $\sqrt{2a}$. E vaglia il vero, il primo dei due termini, ai quali s'eguaglia il tempo t , cioè a dire

$$\frac{\sqrt{acx + bx^2}}{\sqrt{2ab}} \text{ è chiaramente minimo. Lo stesso pure si verifica del se-}$$

$$\text{condo termine: } \frac{ac}{2\sqrt{2ab^2}} \int \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{ac + bx}} - 1}{\sqrt{ac + bx} - 1} \text{ ; imperciocchè}$$

$$\frac{\sqrt{ac + bx}}{bx} \text{ eccede l'unità per una quantità finita, e perciò}$$

$$\frac{\sqrt{ac + bx}}{bx} - 1 \text{ s'eguaglia ad una grandezza finita positiva, laonde}$$

$1 + \frac{z}{\sqrt{ac+bx}-1}$ è maggiore dell'unità; e sta dentro i limiti del fi-

nito la differenza, con cui la supera. Quindi $\int 1 + \frac{z}{\sqrt{ac+bx}-1}$ pareg-

gia una quantità finita, e per conseguenza è infinitesimo anche il ter-

mine $\frac{ac}{2\sqrt{2ab^3}} \int \frac{1 + \frac{z}{\sqrt{ac+bx}-1}}{\sqrt{ac+bx}-1} dx$

COROLLARIO III.

Mentre la grandezza bx paragonata con ac è relativamente infinita, la formola (7) si trasforma così: $\frac{z}{2\sqrt{2a}} + \frac{ac}{\sqrt{2ab^3}} \int \frac{4 \cdot bx}{ac} = z$.

Si scoprirà potersi trascurare il secondo termine, riflettendo, che se $\int \frac{4 \cdot bx}{ac}$ fosse eguale a $\frac{4bx}{ac}$, allora il detto secondo termine s' egua-

glierebbe a $\frac{2z}{\sqrt{2a}}$, e serberebbe col primo una determinata proporzio-

ne: ma $\int \frac{4 \cdot bx}{ac}$ è infinitamente minore di $\frac{4 \cdot bx}{ac}$; dunque il secondo ter-

mine è inassegnabile in riguardo al primo, e può cancellarsi nella equazione, onde s' abbia $\frac{z}{\sqrt{2a}} = z$. Abbiamo veduto nel corollario III.

del Problema I, che quando bx è immensamente maggiore di ac , il che interviene, prima che lo spazio x giunga ad essere finito, la velocità del fluido scaturito dal vaso s' eguaglia a $\sqrt{2a}$. Si cavi la con-

M m m 2

se-

seguenza, che essendo $t = \frac{z}{\sqrt{2a}}$, esso fluido fa acquisto della velocità

$\sqrt{2a}$ in tempo infinitesimo, e quindi egli è vero adeguatamente, che l'acqua esce dal vaso con quella velocità, che un grave guadagna cadendo dall'altezza a . S'è parimenti avvertito nel mentovato Corollario, che lo spazio z si corre con equabile velocità. Viene ciò confermato dalla nostra equazione $t = \frac{z}{\sqrt{2a}}$; imperciocchè la velocità è costante,

quando i tempi stanno come gli spazj. Posto $z = 2a$ scopresi $t = \sqrt{2a}$, ch'è quello stesso tempo speso da un grave a discendere dalla sublimità a , principiando dalla quiete. In fatti colla velocità, che un corpo acquista cadendo dall'altezza a , in pari tempo si passa un doppio spazio $z = 2a$.

S C O L I O I.

Essendo $\frac{fdz}{2} = \frac{dmu^2}{2}$, o sia $f dz = dm u^2$, e scorrendosi dalla mas-

sa $dm = edz$ nel tempo dt lo spazio dz colla velocità u , di modo che si verifica essere $dz = u dt$, sostituito in cambio di dz un tal valore nella formola $f dz = dm u^2$, ci si presenterà $f dt = dm u$. Si verifica nel presente incontro, non solo la formola Leibniziana $\frac{f dz}{2} = \frac{dm u^2}{2}$, ma

ancora la Cartesiana $f dt = dm u$, perchè la forza f agisce in qualità di costante per la metà di quello spazio dz , che nel tempo dt impiegato nell'azione viene scorso dalla massa dm colla velocità u acquistata in vigore dell'azione medesima. Quando la velocità u è divenuta equabile, ed eguale a $\sqrt{2a}$, è parimente costante la forza $f = 2ac$. Potremo adunque integrare l'equazione $f dt = dm u$, onde si abbia $ft = mu$. Questa formola s'adatta perfettamente al sopra citato passo del Signor Newton, *Vis, qua totus aqua exilientis motus generari potest, aequalis est ponderi cylindrica columella aquae, cujus basis est foramen EF* (Fig. 138.), *et cujus altitudo est 2GI, vel 2CK*, mostrandoci a dito, che se si vuol trovare la giusta quantità di moto mu , di cui è fornita l'acqua $m = cz$ scaturita dal vaso, bisogna moltiplicare per il tempo t impiegato nell'acquistare esso moto, la forza f , o sia il doppio peso della colonna ac ; onde s'abbia $ft = mu$.

Se per procedere con maggiore esattezza, volesse taluno mettere a computo la forza viva dell'acqua contenuta nel gorgo, bisognerebbe, che prima determinasse la figura del gorgo, ed indi si facesse ad indagare la forza viva del fluido nell'atto, che passa pel gorgo.

Per istabilire la figura del gorgo, ponghiamo in opera il seguente metodo. Supponghasi la forza f divenuta eguale a $2ac$, e sia IG (Fig. 142.) quello spazio, pel quale agendo una forza costante, che determineremo in progresso, sia capace d'imprimere allo strato acqueo com-

preso fra i due circoli orizzontali SZT, KIL la velocità $u = \sqrt{2a}$. Ne segue, che esercitando azione la detta forza per lo spazio IZ, è atta a cagionare nello strato KT la velocità v , di cui è fornita l'acqua prima d'insinuarsi nel gorgo SMEFNT, e che di più essendo v minima relativamente ad u , lo spazio IZ è una parte infinitesima dello spazio IG. Ora per noi s'afferma, che quando tutta l'acqua KSMEFNTL è scaturita pel foro EF, è seguito un effetto tale, come se tutto il nominato liquore fosse passato dalla velocità nulla alla velocità u . S'intenda diviso il gorgo in un numero infinito n di strati, ciascuno eguale di massa allo strato KT, e tagliata IX $\equiv n$. IZ, e condotto per X il piano circolare orizzontale UXY, immaginiamoci distribuita l'acqua UKLY in un numero di strati, ognuno eguale allo strato KT. Chiare fluiscano le conseguenze, che le quantità d'acqua UKLY, KSMEFNTL s'eguagliano, e che nell'istante, che questa ha terminato d'uscire dal vaso, è discesa quella ad occupare il sito in abbandono lasciato. Siano eF, kL due dei nominati strati, e si chiami eF ultimo strato inferiore, kL ultimo strato superiore. Premessa la supposizione, che la forza costante da determinarsi abbia facoltà d'agire solamente dentro del gorgo, o sia per lo spazio IG, e non più, si osservi, che nel momento, che l'acqua KSMEFNTL ha finito di scaturire dal foro, la superficie ef dello strato eF ha scorso dentro del gorgo lo spazio gG, e la superficie corrispondente kl dello strato kL ha scorso dentro del gorgo lo spazio Iq, e che la somma di questi spazi s'eguaglia ad IG. Egli è dunque lo stesso, come se un solo strato fosse stato sollecitato per lo spazio IG. Non altrimenti eguale ad IG sarà l'aggregato degli spazi passati dentro del gorgo dalle coppie degli strati penultimo inferiore, penultimo superiore; antepenultimo inferiore, antepenultimo superiore, e così di seguito; di modo che quando è uscita tutta l'acqua, che dianzi occupava il gorgo, tanti strati, quanti compongono il gorgo stesso, sono stati stimolati da altrettante forze eguali per lo spazio IG, ed an fatto acquisto della velocità $u = \sqrt{2a}$; intervenendo lo stesso effetto, come se tutta l'acqua del gorgo avesse fatto transito dalla velocità nulla alla velocità $\equiv u$.

Giac-

Giacchè la forza costante, di cui si va in traccia agendo per gli spazj IG, IZ cagiona nello strato KT le velocità u, v ,erberanno queste la ragione $\sqrt{IG} : \sqrt{IZ}$; ma le dette velocità stanno come $b : c$; dunque ponendo $IG = g$ avremo $b : c :: \sqrt{g} : \sqrt{IZ}$, e conseguentemente $IZ = \frac{gc^2}{b^2}$. Eguagliandosi a b la sezione ST, agevolmente si scopre essere la massa dello strato $KT = \frac{gc^2}{b}$. Si chiami p la forza

cercata, che operando per lo spazio $IG = g$, imprime nello strato $KT = \frac{gc^2}{b}$ la velocità $u = \sqrt{2a}$, e dalla nota formola $pg = \frac{gc^2}{b}$ a ricaveremo il valore della forza $p = \frac{ac^2}{b}$:

Sia lo strato KT giunto nel sito MN, e chiamata l'ascissa IO = x , e la sezione MN = y , faranno le velocità in MN, EF come $\sqrt{x} : \sqrt{g}$; ma le stesse velocità si devono riferire nella ragione inversa delle sezioni MN = y , EF = c , dunque $\sqrt{x} : \sqrt{g} :: \frac{1}{y} : \frac{1}{c}$ analogia;

che ci somministra l'equazione $y = \frac{c \sqrt{g}}{\sqrt{x}}$, da cui resta determinata

la figura del gorgo.

Cerchiamo ora la quantità della massa fluida, dalla quale il gorgo è riempito. L'elemento della massa contenuta nella porzione di gorgo

SMNT è $ydx = \frac{cdx \sqrt{g}}{\sqrt{x}}$. Quindi integrando avremo la massa SMNT

$= \int ydx = 2c \sqrt{gx} - A$. Si determina la costante A riflettendo; che quando $x = \frac{gc^2}{b^2} = IZ$, è SMNT = $\int ydz = 0$: Questa condi-

zione ci dà $A = \frac{2gc^2}{b}$, e conseguentemente SMNT = $2c \sqrt{gx} - \frac{2gc^2}{b}$

ma

ma la massa $KSTL = \frac{gc^2}{b}$; dunque $KSMNTL = 2c \sqrt{gx} - \frac{2gc^2}{b}$. 463

quando $x=g=IG$. farà l'intera massa contenuta nel gorgo $KSME$
 $FNTL = 2cg - \frac{gc^2}{b}$, o sia adeguatamente $= 2cg$.

Si è per noi fatta la riflessione, che mentre è spiciata pel foro tutta l'acqua $2cg$, che capisce nel gorgo, è seguito lo stesso effetto, come se tutti gli strati componenti il gorgo, ognuno stimolato per lo spazio g dalla forza $\frac{ac^2}{b}$, avessero fatto acquisto della velocità $u = \sqrt{2a}$.

Abbiamo scoperta la somma dei predetti strati $= 2cg$. L'aggregato delle forze degli strati medesimi si rende manifesto coll'avvertire, che se uno strato, la cui massa $\frac{gc^2}{b}$, è animato dalla forza $\frac{ac^2}{b}$, il complesso di tutti

gli strati, cioè a dire la massa $2cg$, verrà sollecitato dalla forza $2ac$, la quale agendo per lo spazio g cagionerà la forza viva $2cg \cdot \frac{u^2}{2} = 2gc \cdot a$,

ed imprimerà nella massa $2cg$ la velocità $u = \sqrt{2a}$.

Deducendosi dalla stabilita figura del gorgo quella stessa forza $f=2ac$, che nel Problema II. indipendentemente dalla figura stessa abbiamo determinata con altro metodo, chiaramente si scopre, che la figura da noi assegnata al gorgo si è quella, che viene effettuata dalla Natura.

Dalla formola $fg = 2cg \cdot \frac{u^2}{2}$ si ricava l'altra $f \cdot g = \frac{2gc}{n} \cdot \frac{u^2}{2}$, la

quale ha luogo anche quando la velocità u non è divenuta equabile; dovendosi considerare come costante la forza f , mentre agisce per uno spazio minimo $= \frac{g}{n}$. In virtù dell'azione d'essa forza adeguatamente

costante deve passare l'acqua $\frac{2gc}{n}$ dalla velocità nulla alla velocità u colla

legge d'un grave cadente, il che necessariamente richiede la figura del gorgo da noi scoperta. S'osservi, che eguagliandosi f ad una funzione dell'incognita z , il suo valore è costante, sino a tanto che non si varia la grandezza di z : ma uscendo pel foro la infinitesima quantità d'acqua $\frac{2gc}{n}$, la z persiste adeguatamente invariabile; dunque mentre esce il

flui-

464
 fluido $\frac{2gc}{n}$; la forza f si può considerarē come costante. A norma di
 ciò s'adempie la formola $\frac{f}{n} \cdot g = \frac{2gc}{n} \cdot \frac{n^2}{2}$, e segue lo stesso effetto, co-
 me se la forza costante $\frac{f}{n}$ stimolasse la massa, che spiccia nuovamente
 dal foro, per lo spazio g , e generasse in essa massa $\frac{2gc}{n}$ la forza viva
 $\frac{2gc}{n} \cdot \frac{n^2}{2}$. Le cose dette di sopra ci fanno toccar con mano, che se
 conforme alla natura d'una forza costante le velocità anno da stare co-
 me le radici degli spazj, a cui s'applica la forza stessa, il gorgo deve
 avere quella figura, che abbiamo determinata.

S C O L I O III.

La forza viva dell'acqua contenuta nel gorgo agevolmente si de-
 duce dalla figura del gorgo medesimo. La forza viva dello strato $kT =$
 $\frac{gc^2}{b}$, il quale si muove colla velocità $U = \frac{cn}{b}$, s'eguaglia a $\frac{gc^2}{b^2} \cdot \frac{n^2}{2}$.

Nel sito MN la velocità dello strato ydx pareggia la quantità $\frac{cn}{y}$, e quin-

di ne risulta la forza viva dello strato suddetto $= ydx \cdot \frac{c^2 n^2}{2y^2} = \frac{c^2 dx}{y} \cdot \frac{n^2}{2}$.

Si sostituiscia in vece di y il suo valore suggeritoci dalla equazione $y =$
 $\frac{c\sqrt{g}}{\sqrt{x}}$, da cui resta determinata la figura del gorgo, e ci si presenterà la

detta forza viva $= \frac{cx^{\frac{3}{2}} dx}{\sqrt{g}} \cdot \frac{n^2}{2}$. Passando alla integrazione, scopriremo

la forza viva dell'acqua KSMNTL $= \int \frac{cx^{\frac{3}{2}} dx}{\sqrt{g}} \cdot \frac{n^2}{2} = \frac{2}{5} \frac{cx^{\frac{5}{2}}}{\sqrt{g}} \cdot \frac{n^2}{2}$

✚ B. Si noti, che la velocità n va considerata come costante, cercan-
 dosi la forza viva dell'acqua contenuta nel gorgo, mentre la velocità n
 nel sito EF in quel tal momento è di determinata misura. Ritrovati il
 valore della costante B riflettendo, che quando $x = \frac{gc^2}{b^2} = IZ$, la

for-

forza viva dello strato KT s'eguaglia a $\frac{gc^4}{b^3} \cdot \frac{n^2}{2}$. Avremo per tanto in ⁴⁶⁵

detta circostanza $\frac{\frac{2}{3}cg \cdot \frac{1}{2}c^3 \cdot \frac{n^2}{2}}{\frac{1}{g^2}b^3} + B = \frac{gc^4}{b^3} \cdot \frac{n^2}{2}$, e per conseguenza

$B = \frac{\frac{1}{3}gc^4}{b^3} \cdot \frac{n^2}{2}$. Sarà adunque la forza viva dell'acqua $KSMNTL =$

$\int \frac{cx^{\frac{3}{2}} dx \cdot \frac{n^2}{2}}{\sqrt{g}} = \frac{\frac{2}{3}cx^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{g}} + \frac{\frac{1}{3}gc^4}{b^3} \cdot \frac{n^2}{2}$, e posta $x=g$, scopriremo la

forza viva dell'acqua, che capisce nel gorgo, $= \frac{\frac{2}{3}cg}{\sqrt{g}} + \frac{\frac{1}{3}gc^4}{b^3} \cdot \frac{n^2}{2}$;

cioè eguale adeguatamente a $\frac{\frac{2}{3}cg}{\sqrt{g}} \cdot \frac{n^2}{2}$;

S C O L I O IV.

Prima d'indagare la velocità, colla quale l'acqua scaturisce pel foro EF , mettendo a computo la forza viva dell'acqua contenuta nel gorgo, egli è d'uopo dimostrare, che quantunque la Natura formi nel fondo del vaso il gorgo $KSMFNTL$, ciò non ostante quando la superficie superiore dell'acqua è discesa per lo spazio minimo $HQ=s$, la gravità dell'acqua infusa entro il vaso ha esercitata l'azione $abs = acz$. Egli è chiaro, che l'azione dell'acqua AL s'eguaglia ad $abs - gbs$. Resta adunque da provarsi, che l'azione della gravità del fluido, che riempie il gorgo, pareggia la quantità gbs . L'acqua $= AR = bs$ uscita dal vaso si conforma nel sito MN in un volume, la lui altezza $= \frac{bs}{s}$,

e quindi scaturita che sia pel foro l'acqua suddetta, lo strato ydx è disceso per lo spazio $\frac{bs}{s}$, e la sua gravità ha effettuata l'azione

$= ydx \cdot \frac{bs}{s} = dx \cdot bs$, la quale si scopre eguale alla massa liquida bs

scappata fuori dal vaso moltiplicata nell' altezza dx dello strato ydx . Verificandosi ciò delle azioni di tutti gli strati, che formano il gorgo, rendesi manifesto, che la somma delle predette azioni s' eguaglia alla grandezza bs moltiplicata nella somma delle altezze d'essi strati, ch'è quanto a dire nell'altezza g del gorgo, onde s'abbia l'azione della gravità dell'acqua occupante il gorgo $= gbs$, conseguentemente l'azione dell'acqua tutta contenuta nel vaso $= abs = acz$.

COROLLARIO

Qualunque sia la figura d'un vaso KSMEFNTL ripieno di fluido, l'azione della sua gravità è sempre eguale al prodotto gbs , e serba la ragione composta dell'altezza verticale g del liquore, della sua superficie superiore b , e dello spazietto parimente verticale s , pel quale la mentovata superficie è calata abbasso. Questo curioso Teorema rende facilissima la dimostrazione, che infusa dell'acqua in due vasi comunicanti di qualsivoglia figura, si formerà l'equilibrio, quando le due superficie superiori dell'acqua nell'uno, e nell'altro vaso s'adatteranno allo stesso piano parallelo all'orizzonte. S'esprimano per b , B le nominate superficie, che stanno fra loro a livello, e se pur è possibile, la superficie b discenda per lo spazietto s , onde nel primo vaso segua l'azione positiva gbs . Egli è chiaro, che da un tal vaso è uscita l'acqua bs , e che essendosi alzato il livello del liquore nel vaso secondo per una quantità d'acqua $= bs$, ha preso questa la forma d'un volume, la cui altezza $= \frac{bs}{B}$. A norma di ciò la gravità dell'acqua contenuta nel secondo vaso

è stata obbligata ad esercitare l'azione negativa $gB \cdot \frac{bs}{B} = gbs$. Ef-

sendo pertanto eguali, e contrarie le due azioni, che succedono ne' due vasi comunicanti, l'una impedisce l'altra, nè segue alcun moto; perchè quanta forza viva genererebbe l'azione positiva, altrettanta ne estinguerrebbe l'azione eguale negativa.

SCOLIO V.

Ora riesce agevolissimo il determinare la velocità, colla quale l'acqua zampilla fuori del vaso, senza trascurare la forza viva dell'acqua, che capisce nel gorgo. Avremo pertanto $abs = acz = \frac{ab - bs - bg}{2} \cdot \frac{U^2}{2}$

+ $\frac{2cg}{3} + cz \cdot \frac{n^2}{2}$, e sostituendo in vece di U^2 il suo valore $\frac{c^2 n^2}{b^2}$, ed ef-

fettuate le dovute operazioni $\frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{ac - cs - gc + \frac{2bg + bz}{3}}} = u$, e cancellati i termini cs , gc incomparabili, l'uno con ac , l'altro con $\frac{2}{3} \cdot bz$,

$$\frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{ac + \frac{2}{3}bg + bz}} = u.$$

COROLLARIO I.

Se la quantità bg è infinitamente minore di ac , si verificano tutte le conseguenze contenute nei Corollarj del Problema I.

COROLLARIO II.

Suppongasi, che bg corrisponda ad ac in proporzione finita, e nel principio del moto, quando bz è minima in paragone di ac , ci si presenterà

$$u = \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{ac + \frac{2}{3}bg}}, \text{ la quale velocità sta a quella, che abbiamo deter-}$$

minata nel Corollario I. del Problema I., come $\sqrt{ac} : \sqrt{ac + \frac{2}{3}bg}$.

Se essendo cresciuto lo spazio z , le grandezze ac , bg , bz avranno fra loro una relazione finita, si scoprirà altresì finita la velocità $u =$

$$\frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{ac + \frac{2}{3}bg + bz}}; \text{ ma però minore di quella, che sta espressa nel Co-}$$

rollario II. del Problema I. nella proporzione di $\sqrt{ac + b} : \sqrt{ac + \frac{2}{3}bg + bz}$.

Finalmente quando bz farà infinita relativamente ad ac , e per conseguenza ancora relativamente a bg , il che può verificarsi mentre bz è minima, troveremo, come nel Corollario III. del citato Problema, $u = \sqrt{2a}$.

COROLLARIO III.

Sia bg minima, e nello stesso tempo infinita in confronto di ac , e sul cominciare del movimento, quando bz può trascurarsi rispettivamente ad ac , sarà $u = \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{\frac{1}{3}bg}} = \frac{\sqrt{3az}}{g}$, cioè a dire infinitamente mi-

nore della celerità $= \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{ac}}$, che supponendo poterli neglegere la for-

za viva dell'acqua contenuta nel gorgo, abbiamo scoperta nel Corollario I. del Problema I. La velocità per altro del presente Corollario è maggiore di quella $= \sqrt{2z}$, che acquisterebbe la massa cz sollecitata per lo spazio z dalla sua gravità.

Seguiterà altresì ad esser minima la velocità $u = \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{\frac{1}{3}bg}}$, quando

bz serba relazione finita con ac , e perchè divenga finita essa velocità; bisognerà, che bz riguardi bg con proporzione finita, onde s'abbia $u =$

$$\frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{\frac{1}{3}bg + bz}}.$$

Divenuta poi che sia la quantità bz infinita rispettivamente a bg ; il che interviene stando ancora dentro i confini delle grandezze minime lo spazio z , ne risulterà, come nel Corollario III. del Problema I., $u = \sqrt{2z}$.

COROLLARIO IV.

Fingasi finita l'altezza g del gorgo e finattantochè farà infinitesimo lo spazio z , avremo $u = \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{\frac{1}{3}bg}}$, e l'acqua uscita cz si muoverà con una minima velocità.

Ac.

Acciocchè la celerità del liquore giunga ad un valore finito, egli è d'uopo, che sia parimente finito lo spazio z , ed in tal circostanza

ci accorgeremo essere $u = \frac{\sqrt{2abz}}{\sqrt{\frac{2}{3}bz + bz}}$ sempre minore di $\sqrt{2a}$:

Solamente quando fosse $z = \infty$, avrebbe l'acqua scaturita *ex fati* lo acquisto dopo un tempo infinito della velocità equabile $= \sqrt{2a}$.

S C O L I O VI.

Observandosi, che l'acqua, che zampilla fuori d'un vaso per un foro picciolo, perviene così presto alla equabile celerità, che il senso non sene accorge; egli è evidente, che la Natura determina minima l'altezza g del gorgo, ricavandosi dai sovrapposti Corollarj, che l'acqua guadagna la velocità equabile $\sqrt{2a}$, dopo aver corso uno spazio inassegnabile in tempo infinitesimo, purchè non esca dai limiti delle quantità immensamente picciole l'altezza g del gorgo suddetto.

S C O L I O VII.

Siccome nell'indagare le leggi delle vibrazioni delle corde sonore si suppone minima matematica la forza, che le stimola al moto, e le conseguenze geometriche, che si deducono, s'adempiono poi fisicamente, quando alla forza infinitesima si sostituisce la forza minima fisica; non altrimenti le proprietà, che si sono scoperte, fingendo infinitamente piccioli il foro aperto nel fondo del vaso, e l'altezza del gorgo, si verificheranno fisicamente, se il foro c sarà assai ristretto relativamente alla capacità del vaso, e l'altezza g del gorgo assai picciola.

Collo stesso metodo delle azioni si può trattare il caso, quando il foro c , e la base b del vaso cilindrico si riguardano in proporzione finita: ma con ciò si sorpasserebbero quei confini, dai quali la presente Annotazione vien circonscritta.

SCHE:

SCHEDIASMA XXXVII.

De' fochi primarj, e secondarj delle lenti sferiche.

LETTERA I.

*Che servì di risposta ad una del celebre Sig. Marchese Giovanni Poleni;
scritta all'Autore li 28. Settembre dell'anno 1716.*

PER soddisfare pienamente al desiderio di V^S. Illustrissima sarebbe necessario riformare in gran parte la Diottrica, scienza non per anche ridotta all'intera sua perfezione. Sin ora non sono stati considerati, se non i fochi principali nelle lenti sferiche, mentre le paraboliche, l'iperboliche, e le elettriche, sopra di cui tanto è stato scritto, sono bensì le migliori, quando l'oggetto sia un punto indivisibile; ma qualor si supponga di certa determinata grandezza, diventano assai peggiori dell'ordinarie. Il celebre Cristiano Ughenio è stato il primo, che si sia messo a considerare i fochi chiamati da me secondarj, ed a misurare l'aberrazione de' raggi, che nasce dalla figura sferica, ma non è credibile quanto le sue conclusioni sieno dalla verità lontane, non perchè le sue dimostrazioni geometriche odorino di paralogismo; ma perchè vinto dalla difficoltà della materia, fonda il suo discorso sopra una falsa supposizione, che debba cioè considerarsi come nulla, ovvero infinitamente piccola la grossezza della lente.

Supposta una facilissima maniera di trovare i fochi principali, e secondarj, non è credibile quante verità importanti ci si presentino, e quanti errori si dileguino per questa strada: sebbene molto più mi resta da scoprire di quello ho scoperto, e molti Teoremi sono così ardui, che fin ora non ho potuto superarli nè per via d'Analisi, nè col mezzo della Geometria.

E per dar un saggio della premessa dottrina, m'ingegnerò d'applicarla al nostro proposito, se non con tutta l'esattezza Geometrica, almeno con tanta, che potrà supplire al bisogno, restringendomi ad una sola refrazione, essendo facile l'estenderla a' casi più composti.

Sia dunque la linea circolare GF (Fig. 143.) quella, che divide due mezzi, uno più raro, l'altro più denso. Sia BC l'oggetto espresso da una linea, in cui debbano considerarsi varj punti. In primo luogo considero il punto di mezzo A, e tirato il raggio ADQ, che passa per il centro D del segmento GF, non sarà esso soggetto a qualsivisa refrazione.

Immaginiamoci due raggi da una parte, e dall'altra dell'asse AD allo stesso infinitamente prossimi; s'uniranno essi all'asse nel punto Q, che farà il foco principale del punto A.

Si-

471

Similmente fatta riflessione al punto C, è tirata la retta CDP, che passerà per il centro D irrefratta, i raggi, che si partono dal punto C, infinitamente prossimi all'asse GL, s'uniranno in P foco principale del punto C; e così quelli del punto B s'uniranno in R: onde dovendosi dir lo stesso di tutti gli altri punti dell'oggetto BC, la curva PQR sarà la curva de' fochi principali.

COROLLARIO I.

Se le distanze DA, DB, DC faranno o eguali, o quasi eguali; come accade quando l'oggetto è lontanissimo dal centro della superficie refringente GF, la curva PR sarà un arco di cerchio, com'è facile a dimostrarsi. Nelle altre ipotesi dipenderà dalla figura dell'oggetto to BAC.

COROLLARIO II.

Considero di bel nuovo il punto medio A, e perchè oltre a' raggi, che diffonde infinitamente prossimi all'asse, illumina anche tutta la curva GF, vediamo cosa succede ne' due raggi estremi AF, AG. Questi per le leggi della refrazione si congiungeranno in un punto di mezzo tra D, e Q, per esempio nel punto O, e li raggi refratti saranno GO, FO, e tutti i raggi, che cadono dal punto A nelle porzioni di curve GE, EF, verranno ad unirsi con l'asse principale ne' punti di mezzo tra O, e Q, così che la retta OQ sarà l'ampiezza di foco del punto A, che raggia sopra tutta la curva GEF, o sia l'aberrazione de' raggi per causa della figura.

Passo ora al punto estremo C, il di cui asse è CLDP. Tirato il raggio estremo CF, prendo l'arco LH uguale all'arco LF, e li due raggi CH, CF si uniscono nel punto M. Egli è certo, che li raggi incidenti dal punto C nell'arco HLF s'uniranno a due a due con l'asse CP ne' punti di mezzo tra M, P, e parimente quelli del punto B ne' punti di mezzo tra N, R.

Resterebbero da considerarsi i raggi, che dal punto C cadono nella porzion della curva GH, come sarebbe il raggio CG, che rifratto verrebbe a congiungersi con l'asse CP nel punto e; ma perchè questo raggio, come altresì tutti gli altri tra G, ed H, è solo, e non ha il raggio corrispondente dalla parte opposta, così non può egli dipingere immagine, e non serve che a turbare la pittura, quando s'incontra da e sino in γ.

COROLLARIO III.

Li fochi M, O, N sono chiamati da me secondarij: e perchè al punto A corrisponde il foco O del raggio estremo AF refratto in FO, ed

ed alli punti E , B li fochi M , N ; corrisponderanno altresì a tutti i punti dell'oggetto BC i loro fochi secondarij, che faranno tutti nella curva MON .

Questa curva viene rappresentata ottimamente dalla figura, ed è composta di due parti MO , ON , che formano un angolo curvilineo nel punto O ; e la ragione si è, che l'ampiezza del foco QO appartenente al punto A è la massima, giacchè massima è l'apertura della lente EF ; e per la stessa causa, come che l'apertura LF , LH del punto estremo C è la minima, così alla stessa risponde la minima ampiezza di foco MP . Non farà frattanto difficile l'indagare la natura della curva MON .

Lo spazio compreso tra le due curve PQR , MON , e le due rette MP , NR è quello, che circoferisce li fochi di tutti li punti dell'oggetto BAC , in maniera che preso in detto spazio un punto ad arbitrio, sarà facile il determinare quale sia il punto dell'oggetto, e quali li due punti corrispondenti della lente egualmente distanti dal loro asse, a cui il punto del foco appartiene.

Per esempio il punto d è il foco de' due raggi, che uscendo dal punto C dell'oggetto, vanno ad incontrare la lente ne' due punti egualmente distanti dall'asse CL situati fra L , F , ed L , H .

A questo passo ci si fa innanzi una quistione non men curiosa; che astrusa, e confusa nel determinare in qual sito si formi l'immagine più distinta. L'esperienza c'insegna non essere il suo luogo in PQR , e molto meno in MON , ma piuttosto in un sito di mezzo fra le dette due curve, come *deg*. In fatti ricevuta in carta l'immagine, dov'è più chiara, e distinta, per esempio in e , se a poco a poco si accosta la carta alla lente, o da essa si allontana, non si scapella tutta in una volta l'immagine, ma si conserva per qualche spazio, quantunque sempre più confusa; segno evidente, che la più distinta immagine non è nè in Q , nè in O . Essendo certo, che nel sito inferiore al punto Q , e nel superiore al punto O non si può formare immagine, perchè non si fa intersezione de' raggi simili; ne segue, che principandosi a dipingere l'oggetto in MON , e terminandoli la pittura in PQR , ne' siti predetti l'immagine sarà confusa, e la maggior distinzione sarà in un punto medio, come e , sebbene poi riesca difficilissimo il determinarlo geometricamente.

Da ciò si rende manifesta l'imperfezione delle nostre lenti, nelle quali i fochi principali restano turbati da secondarij, ed i secondarij da principali. Per esempio li due raggi BG , BI , che refratti in GN , IN formano il foco secondario N , prodotti che sieno, il primo viene a cadere in S fuori dell'immagine PR , il secondo in a dentro l'immagine stessa; onde il primo fa, che l'immagine non sia ben terminata, il secondo, che sia confusa.

Le premesse meditazioni servono mirabilmente a dimostrare la mia asserzione, che ogni punto della retina riceve più forte impressione dal Sole in parte eclissato; sebbene poi è minore la parte, che riceve l'impressione.

Sia

Sia per tanto BC il diametro del Sole, ed HI l'apertura della lente, PQR la linea de' fochi principali, *deg* quella de' secondarj, rispondendo l'ampiezza di foco cQ all'apertura HI. Figuriamoci, che s'eclissi parte dell'oggetto BC, di modo che s'impicciolisca la linea luminosa BC, altro non accaderà, se non che si scancellino da una parte, e dall'altra i fochi contenuti a cagion d'esempio da' due mistilinei Pdku, Rgib; onde lo spazio, che comprende tutti i fochi nella presente ipotesi, sarà Ukib. Nel rimanente starà ferma l'ampiezza di foco cQ, e le curve Ub, Ki, come pure tutte l'altre, che compongono il prenominato spazio, riceveranno dai raggi quasi la stessa impressione di prima; mentre lo scancellarsi una parte dell'immagine non leva la forza a' raggi, che dipingono l'altra parte, che si conserva. Ho detto quasi, perchè so, che resterebbero tolti di mezzo alcuni raggi di poco momento appartenenti a' punti lucidi eclissati, e che obliquamente venivano a cadere nello spazio ukib, almeno nelle lenti ordinarie, perchè nell'occhio ciò non accade, come toccheremo in progresso. Sarà dunque minore lo spazio delle immagini, ma non minore l'impressione: il che cc.

Di più stando pure l'oggetto BC, come sopra, in parte eclissato, si faccia maggiore l'apertura della lente da H' sino in G, e da I sino in F; ed in questo caso non diventerà più grande l'immagine vb, come nè meno la ki, ma solo crescerà l'ampiezza de' fochi, come per esempio il punto lucido A in cambio dell'ampiezza di foco Qe, avrà l'ampiezza QO, e così tutti gli altri proporzionatamente: onde lo spazio de' fochi non sarà più ukib, ma UMNb, ed in conseguenza la linea PR, oltre l'antica impressione, verrà a ricevere tutti que' raggi, che refratti dalle curve GH, IF vengono a congiungersi nello spazio fra le curve MON, *kei*, ed indi di nuovo separati scrivono la curva Ub: farà dunque maggiore l'impressione, supposto l'oggetto in parte eclissato, mentre si ammette, che in questo caso sia maggiore l'apertura della lente, e della pupilla: il che cc.

Quest'asserzione tanto più trova luogo nell'occhio, quanto che la Natura corregge con una mirabile sagacità i difetti delle lenti ordinarie con levare l'ampiezza de' fochi, e renderla nulla. Tutti i raggi dunque, che partono da tutti i punti dell'oggetto, e cadono sopra la curva GF, i di cui fochi rispettivamente nelle lenti di vetro vengono a formare lo spazio PMNR, dalla Natura vengono obbligati ad unirsi nella linea *deg*, o almeno in uno spazio indefinitamente picciolo, così che quanto più aperta sarà la pupilla, resterà introdotta maggior quantità di raggi, ed in conseguenza la retina *deg*, in cui tutti i fochi vengono a finire, riceverà una maggior impressione. Non è maraviglia dunque, se nell'occhio è sempre distinta, e ben terminata l'immagine; mentre il punto A dell'oggetto in vece di stendere tutti i suoi fochi per la linea QO, li restringe nel solo punto e, con che si toglie la confusione, perchè ogni punto della retina altri raggi non riceve, se non quelli, che partono da un solo punto dell'oggetto.

Opere Riccati T.III.

Ooo

Co-

Come poi la Natura ottenga l'intento, non è difficile da spiegarci con i Canoni della Diottrica, supposti nuovi Teoremi, che io andrò indicando; mentre farebbe troppo prolissa la dimostrazione.

Primo sia una lente convesso-convessa composta di due archi di cerchio dello stesso diametro ACBD (Fig. 144.) dico, che se si allontaneranno le due porzioni ACB, ADB, di maniera che si formi la figura ACBFDE tutta solida, e della stessa materia refringente, quanto più si discosteranno fra loro li due archi ACB, EDF, tanto minore sarà l'ampiezza de' fochi, fino ad un certo segno però, mentre avremo la minima aberrazione, quando l'asse CD sarà eguale a due semidiametri, e le due porzioni ACB, EDF sieno parti opposte d'una sfera. Che se si facesse ancora maggiore la distanza, e l'asse CD fosse più grande del diametro della sfera suddetta, l'ampiezza de' fochi tornerebbe a crescere: onde si scopre manifestamente la ragione, per cui la Natura ha dato la figura sferica, e non lenticulare a tutto il complesso degli umori dell'occhio.

In secondo luogo la varietà delle refrazioni, per cui si passa prima dall'aria all'umor acqueo, indi al più denso, ch'è il cristallino, e di nuovo al più raro, cioè al vitreo, cagiona due maravigliosi effetti: primo, che si abbrevia in maniera l'aberrazione, che diventa quasi nulla, o almeno minima; secondo, che la linea de' fochi, in cui si dipinge l'immagine, s'accosta tanto alla superficie interiore dell'occhio, che quasi s'unisce con la convessità del diafrano, e termina nella retina, che viene a vestire l'umor vitreo; altrimenti sarebbe stata obbligata la Natura ad allontanare la retina dall'occhio, e formarci due tubi in capo con grave incomodo dell'organizzazione. Si aggiunga, che l'umor di mezzo, vale a dire il cristallino, nè ben solido, nè ben fluido, è disposto a diversi strati d'inequal densità, più rari verso la superficie, e più densi verso il centro, come si scopre, quando si scioglie a poco a poco nell'acqua; onde il raggio viene a patire innumerevoli refrazioni, e con ciò la Natura ottiene tanto più facilmente i divisati effetti, massime avendo formata la lente del cristallino in maniera, che la parte più ottusa è voltata verso gli oggetti, e la più acuta verso la retina. Con questi principj non senza difficoltà dimostrati per via di Geometria ordinaria, avendo sperimentata inutile l'analisi, io sono venuto in cognizione della vera teoria della visione, e solo mi resta da considerare con qual artificio la Natura corregga il difetto, che nasce dall'aberrazione Nevvtoniana, sopra di che non ho saputo per anco soddisfare a me stesso.

Con l'occasione, che mi si è presentata, ho stimato bene d'indicare a V.S. Illustrissima le verità da me ritrovate, affine di sentire il suo prudentissimo parere.

Nell'estratto, che ho per le mani, della grand'Opera del Sig. Ermano io ci trovo più difficoltà di quello io supponeva, per mettere in tutto il suo lume, e con la dovuta brevità non solo i gran principj, di cui è seconda, ma inoltre la mirabile industria, con la quale
adatt-

475

adatta i principj a' Problemi particolari; tanto più che i Teoremi sono espressi in una forma sì sublime, e sì generale, che non si poteva attendere, se non da un soggetto tanto versato nell' interior Geometria.

Avrà finalmente V. S. Illustrissima la bontà di compatire il lungo tedio, che con le presenti le reco, e di credermi a tutta prova.

L E T T E R A II.,

*Colla quale l' Autore rispose ad una lettera del Sig. Marchese Poleni
data de' 18. Marzo dell' anno 1717.*

Non avea V. S. Illustrissima alcun motivo di replicare alla mia lunga, e pur troppo noiosa lettera; sì perchè in essa altro non si conteneva, che una semplice risposta ad una sua antecedente; come pure perchè mi sono abbastanza note le sue dotte occupazioni: ond' io non pretendo mai di frastornarla da' suoi studj più serj, acciò perda il tempo, e l' opera intorno le mie speculazioni da me conosciute, e confessate per debolissime. Gli uffizj di scusa per tanto, che Ella per sua bontà passa meco in questo incontro, sono effetti della sua benignità, e non di qual si sia obbligazione.

Osservo nel tempo stesso la difficoltà, che da Lei s'incontra nelle materie diottriche. Ella pensa, che le curve, in cui si terminano i sochi, sieno più remote dalla pupilla, che non è la retina, e che non ostante ciò l'immagine paria distinta, perchè sia quasi la stessa l'azione de' raggi, o urtino questi nella retina nel punto preciso della loro congiunzione, o poco prima, o poco dopo, e di ciò averse ne esperienza nella Camera oscura, ove l'immagine, che sembra la più perfetta, non apparisce in un punto indivisibile, ma in qualche sensibile distanza. Saggiunge poi, che sminuita la grandezza d'un oggetto luminoso, minor copia di raggi viene a ferir l'occhio; ma che quelli, che pur vi giungono, non mutano natura a causa di quelli, che si perdono.

Già sa V. S. Illustriss., che quando geometricamente si parla, si tocca il preciso, e quando poi si fa passaggio dalla Geometria alla Fisica, il preciso si cambia in prossimo. Le sue osservazioni sono vcrissime, ed io non sono persuaso, che l'occhio sia una struttura così perfetta, di modo che in esso non abbia a notarsi qualunque minimo difetto: dirò bensì, che le mancanze sono insensibili, e corrette a bello studio dalla Natura con un'arte impareggiabile; onde chi si prende la briga di contemplarlo più da presso, dee prescindere da quelle piccole imperfezioni, ed indagarne la conformazione in tutto il rigore di Geometria, giacchè scoperto per questa strada l'artificio inimitabile, con cui è stato organizzato dalla Natura, dall'occhio puramente ideale può far passaggio al reale, e considerare, che non ostante la contumacia della materia fisica, la visione è così perfetta, che poco più sincera si sperimenterebbe in un occhio lavorato da una scrupolosa Geometria.

Per cagion d'esempio sia vera l'ipotesi di V. S. Illustrissima, che i raggi non vanno ad urtare nella retina nel punto preciso della loro unione: sarà frattanto necessario, ch'Ella confessi, che la loro unione si faccia in un sito così prossimo alla retina, che fra un punto, e l'altro non ci sia distanza sensibile, e che un punto possa prendersi per l'altro fisicamente; altrimenti come potrebbe spiegarsi il difetto de' Presbiteri, e de' Miopi, ne' quali si sa, che i raggi o troppo tardi, o troppo presto si uniscono, e dee in conseguenza esser corretto con le lenti convesse, o concave.

Nella Camera oscura non è maraviglia, che si osservi l'immagine con quasi egual distinzione in qualche spazio sensibile. Le lenti di vetro, che anno una grande ampiezza di foco sono la cagione di questo effetto; conciossiachè li raggi, che vengono da varj punti dell'oggetto, e si rifrangono da varj punti della lente, si uniscono in diverse distanze, onde nello sparire d'un foco, alterandosi la distanza, supplisce l'altro, ma pure l'immagine s'osserva mal terminata: non così nell'occhio, in cui dalla Natura resta corretta qualsivisia aberrazione soggetta a' sensi.

In prova di ciò debbo notare essere la Natura più delicata nelle sue operazioni di quello c'immaginiamo. Sin qui la Diottrica non ha messo in uso, se non lenti imperfette; mentre le caustiche del Carrefio, quand'anche potessero ridursi alla pratica, il che mi sembra impossibile, riuscirebbero peggiori dell'altre, supposto che l'oggetto non fosse un punto. Dopo dunque d'aver esaminate le lenti circolari di vetro, e scoperte le loro mancanze, mi sono avanzato a considerare quelle, che sono composte di due diafani, cioè di vetro, e d'acqua ricordate dall'incomparabile Sig. Nevvton. Applicata ad esse la mia Teoria, ho scoperte alcune loro ammirabili proprietà, che mi sembrano degne della sua erudita curiosità.

Sieno due pezzi di vetro lavorati, come nella Fig. 145., eguali, o ineguali, poco importa, purchè sieno soggetti ad una certa geometrica determinazione li semidiametri delle circonferenze tanto esterne, quanto interne, che compongono le accennate lunule, ed in oltre possano perfettamente unirsi li due vetri a formare una lente intiera, in cui la cavità, che verrebbe a restar vuota nel mezzo, da me si suppone riempita d'acqua. Sia la retta AB asse della lente, ed il raggio infinitoamente prossimo, e parallelo ad AB si congiunga con l'asse stesso nel punto E. Prendo una data apertura DB, che farà sempre la medesima anche ne' seguenti casi, e condotto il raggio CD parallelo ad AB, ho scoperto col calcolo, e con l'affezione geometrica, che questo dopo quattro refrazioni verrà ad unirsi con l'asse in F, e la distanza FG sarà maggiore di EG; così che EF farà l'aberrazione corrispondente all'apertura BD nella nostra ipotesi, che io chiamerò negativa; perchè il raggio estremo CD si unisce con l'arte in maggior distanza dall'infinitamente vicino. Fra li due vetri immaginiamoci frapposto un tubo cilindrico vuoto nel mezzo HH, come nella figura 146., e se sarà E. il foco del raggio infinitoamente prossimo, F sarà il foco del raggio estre-

mo

mo CD; onde essendo la distanza FG minore di EG, tutto al riverbo del caso antecedente, chiamerò positiva l'aberrazione EF.

Comprenda V. S. Illustrissima, che passandosi ne' predetti due casi dall'aberrazione negativa all'affermativa, egli è necessario, che si dia un terzo caso, e che in una determinata altezza del tubo HH, che non è difficile a ritrovarsi per via d'Analisi, o di Geometria, i due raggi, uno infinitamente prossimo all'asse, e l'altro CD, da' quali viene determinata l'apertura BD della lente, s'uniscano nel medesimo punto; ed i due punti F, E si confondano, ed in conseguenza l'aberrazione diventi nulla. Ho detto nulla, non perchè io creda, che la predetta costituzione di lente acqueo-vitrea sia perfettamente caustica, essendo che i raggi paralleli, che vengono ad urtar nella lente fra due punti B, D, non an precisamente il loro foco nel punto medesimo, in cui concorrono i due raggi prossimo, ed estremo, ma non oltante ciò deviano così poco, che se il punto dell'unione di tutti i raggi non è lo stesso geometricamente, almeno può prendersi per tale fisicamente. Nelle lenti comuni di vetro a misura dell'apertura della lente cresce l'aberrazione; onde all'arco BD corrisponde maggior ampiezza di foco, di quella risponde all'arco minore BI: ma nelle nostre sino al punto I va crescendo l'aberrazione, e da I in D torna a decrescere, di modo che come abbiamo detto, i due punti B, D anno lo stesso foco. Aggiungasi, che nelle lenti acqueo-vitree l'aberrazione è assai minore, che nelle volgari, e spesse fiate, se il calcolo non m'inganna, in eguali circostanze, e in proporzione come uno a dieci, onde per tutti i capi si manifesta la perfezione delle nostre lenti.

Restava solo a vedersi, se l'esperienza corrispondeva alla Teorica, tanto più che io sospettava, che non venisse a turbare il tutto quella forte di aberrazione, che dal suo Autore chiamasi Nevvtoniana, e che non dipende dalla figura, ma dalla varia refrangibilità. Il Sig. Giovanni Rizzetti ne prese sopra di se il carico, e fabbricati i vetri, trovò il modo d'adattarli, che potessero facilmente ricever l'acqua nel loro vano, e discostarsi uno dall'altro a misura del bisogno.

Per quello poi mi assicura V. S. Illustriss., che il Sig. Niccolò Bernoulli, che degnamente occupa la cattedra delle Matematiche in cotesia Università, ha qualche stima particolare della mia debolezza, ciò è tutta cortesia del mentovato Sig., a cui per una sì buona disposizione io rendo le dovute grazie. Per conto mio la piccola contesa avuta seco non ha punto alterato il concetto, che di già aveva dentro me stesso formato dalla sua abilità; ed incontrerò volentieri l'occasione di servirlo, tanto più, quanto per ora è fatto de' nostri.

Io sono dietro alla soluzione d'un arduo Problema sfuggito alla perspicacia de' Sig. Nevvton, ed Ermanno, che ci anno pensato sopra, ma non ne sono venuti a capo, forse per non aver essi nelle mani un metodo di separar le variabili, che potesse estendersi alla seguente questione. Posto, ch'un pendolo si vibri in una cicloide, e che la resistenza del mezzo sia come la velocità del mobile, determinare in ogni punto del.

della curva la velocità del pendolo stesso. Quando la cicloide si finga stesa in una linea retta, la curva delle resistenze è stata creduta dal Sig. Nevvton prossimamente una ellissi, e dal Sig. Ermanno una curva trascendente fin ora ignota, come dallo Scolio pag. 338. Ambidue si sono ingannati; mentre variandosi la ragione della resistenza alla velocità attuale del mobile, che sebbene si pone costante, può però prenderli in qualunque data ragione a misura della maggiore, o minore tenacità del fluido, si varia anche la curva delle velocità, e delle resistenze; onde infinite curve parte Algebraiche, e parte trascendenti, ponno soddisfare al quistito. Per due diverse strade sono pervenuto alla bramata soluzione, di cui mi sono invaghito, avendo scoperte alcune cose fin ora ignote a' Geometri, fra le quali il seguente Teorema, che le curve per esempio paraboliche, il di cui esponente è immaginario, dipendono nella lor costruzione dalla quadratura del cerchio, e non sono curve immaginarie, come tal uno si farebbe dato a credere. Se V. S. Illustrissima parteciperà questo Problema al Sig. Bernoulli, ed avrà la bontà di ~~farmi sapere~~ il suo sentimento, l'ascriverò a sommo favore, e se mi verrà da Lei comandato, le trasmetterò, se non altro l'analisi, con la quale si può facilmente far passaggio all'affezione Geometrica.

E' pregata finalmente V.S. Illustrissima a darmi notizia di qualche novità letteraria, come altresì di ciò, che da Lei si va meditando; mentre io col solito ossequio mi protesto.

SCHEDIASMA XXXVIII.

Omnes radii paralleli in sphaeram incidentes duplicem refractionem pariuntur.

SIt sphaera AC (Fig. 147.) cujus axis ACD transiens per centrum B: duo omnes radios axi parallelos, qui veniunt ex medio rariori, & incident in superficiem sphaerae densioris, geminam refractionem pati, ita ut nullus reflectatur, quacumque posita proportionem refractionis.

Sit diameter FBK normalis ad axem, & radius EF infinite proximus rectae tangenti circumum in puncto F sit postremus ex incidentibus, qui inflexus a prima refractione perveniat ad punctum D, secetque in puncto G inferiorem circuli peripheriam, & cum FD ad DB sit in ratione refractionis, quacumque possit esse haec ratio, dico

Primo praedictum radium refractum FG in puncto G novam pati refractionem.

Secundo, quod servata eadem refractionis lege, si radius ex puncto F incidat in quodcumque punctum arcus FG, inter F, & G, refractionem pati.

Ad utramque assertionem demonstrandam per centrum B, & per punctum G agatur recta BGH, & ex puncto D ad rectam BH demittatur per-

perpendicularis DH : dico GD ad DH esse in proportionē refractionis FD ad DB. Producta GB usque ad peripheriam in I, ducatur FI. In triangulo DFB angulus ad punctum F, seu angulus GFK insitit arcui circulari GK, & in triangulo FGI angulus FGI insitit arcui FI: sed prædicti arcus GK, FI sunt æquales, anguli enim GBK, FBI oppositi ad verticem sunt æquales; ergo angulus BFD est æqualis angulo FGI: rursus in iisdem triangulis DBF, IFG anguli ad puncta B, & F sunt æquales, utpote recti, primus ex constructione, secundus, quia est in semicirculo; ergo triangula DBF, IFG sunt similia: sed triangulo IFG est simile etiam triangulum DHG ob æquales angulos ad punctum G, & insuper angulos rectos ad puncta F, & H; ergo triangulum GDH simile est FDB; ergo $FD : DB :: GD : DH$. Hinc si per punctum G ducatur GL parallela ipsi HD, erit GL radius refractus puncti G.

Cum autem linea DH sit normalis ad BH, evidens est, facta eadem constructione, radium GL esse ultimum refractum: quod erat demonstrandum.

S C H O L I O N.

Poterat etiam demonstrari eadem propositio ex mirabili circuli proprietate, scilicet, quod sumpto ad libitum puncto G, & ducta FGD, rectangulum DFG semper est constans, & æquale duplo quadrato FB. Hoc autem patet ex sequenti analysi.

Sit $BC = a$, $CD = x$, rectangulum $ADC = 2ax + x^2$: sed rectangulum $ADC =$ rectangulo FDG ; ergo $FDG = 2ax + x^2$, sed quadratum FD æquale duobus quadratis FB , DB , hoc est $2a^2 + 2ax + x^2$; subtrahæ rectangulum $FDG = 2ax + x^2$, remanet rectangulum $DFG = 2a^2$: quod erat demonstrandum.

S C H E D I A S M A XXXIX.

Dell' analogia fra i suoni, ed i colori, e del vero metodo di filosofare in Fisica.

L E T T E R A I.

Del Padre D. Gio: Bernardo Tisenti C. R. S. all' Autore.

HO scorsa ultimamente l'Ottica del Sig. Nevvton, in cui bisogna certamente ammirare la scelta delle sperienze così ingegnose, che vi si trovano, così connesse, così cospiranti ad uno scopo, e tanto circostanziate. Mi par in oltre di poter dire, riguardo ad alcune cose, ciò che del Descartes dicea Leibnizio, ch'ella c'introduce nell'Anticamera della verità: in fatti o non potiamo noi del tutto entrare in quest'anticamera, o non vi è altra porta da penetrarvi, che per i Fenomeno-

nomeni, e per la Geometria. Ma un Físico, credo io, devè andar più lungi, col fabbricar qualche Teoria sopra i Fenomeni, e particolarizzare le idee astratte della Geometria. Per avventura Descartes ha inteso questo più del Sig. Nevvton, e attaccatosi fortemente al suo gran Principio dell' Idee chiare, e distinte, che si prendono unicamente da una meccanica soggetta ai sensi, si abbandonò troppo alle Ipotesi, e alle analogie dei moti sensibili. Ma se la natura si potesse per questa via di una intelligibil meccanica seguitare, io non vedo perchè non dovesse coltivarsi il suo metodo. Il Sig. Nevvton medesimo nelle Quistioni dopo l' Ottica pare più pender a questo metodo, che ad altro, quando vuol rendere ragioni fisiche di qualche Fenomeno. Lo vediamo supporre ora un Fluido etereo per esplicar la Gravità, e l' azione de' corpi sù la Luce, con una certa gradazione di densità nelle parti di esso fluido, ora efflujj intorno la calamita, ec. Può essere, che io intraprenda a spiegar la sua ottica più fisicamente di quello egli ha fatto. Io stabilisco per Principio, che i Fluidi Naturali sono eterogenei, che un tal fluido è la Luce, le cui parti varian perciò in grossezza, e forza, o vibrazione. Un certo tremore nel timpano, o nei nervi dell' Udito porta il senso di un certo suono, e se vi è un certo accordo nelle vibrazioni delle corde sonore, questo ci cagiona un grato sentimento. Perchè non potrebbe essere altrettanto de' Nervi Ottici percossi dai raggi con un certo grado di forza, o separatamente, o più insieme? E certo si sente un qualche accordo di colori, che diletta, come uno di suoni, ch'è grato. Se a V. S. Illustrissima non riuscisse di troppo incomodo, ardirei pregarla di qualche suo saggio sù l' analogia dell' impressioni del fluido aereo sù l' orecchio coll' impressioni del fluido luminoso sù l' occhio, ed in oltre, ch' Ella si prendesse la pena di esaminar due luoghi del suddetto Libro del Sig. Nevvton, che sono consimili; uno nell' Ottica stessa (1); l' altro nelle Quistioni (2), ove si parla dell' alternativa del Lume nel rifletterli, e nel trasmetterli delle lamette trasparenti. Puòssi intendere ciò, che dice l' Autore, del Fluido etereo elastico, colle cui vibrazioni ora cospiri, ora no il moto dei raggi? ovvero ha V. S. Illustrissima qualche nuova spiegazione d' un fatto così sorprendente? Egli mi pare la cosa più strana del mondo, e il Fenomeno più difficile di tutta l' Ottica. Come la stessa lametta o aerea, o di acqua, o d' altro sottil mezzo, solo perchè a tutte le parti della sua superficie non corrisponde la stessa grossezza, hassi da tingere quì d' un colore, là d' un altro con l' ordine, e successione, che si dice nella sperienza? E se vi cada sopra un solo lume omogeneo, per esem-

(1) Pag. 279. (io mi servo dell' edizione latina di Londra 1719.) dopo alcune cose: *cumque radius aliquis sit in ea vibrationis parte, quae cum motu suo conspirat, tum eum per superficiem refringentem facile transmitti, &c. Opt. Lib. 2. Part. 3. Prop 12.*

(2) Quest. 29. pag. 376. *At haec, quod radii luminis alternas habeant facilioris reflexionis; & facilioris transmissus vires, &c.*

esempio, rosso, o violetto; perchè si fanno un sì, un nò quelli anelli rossi, o violetti, restando in mezzo a' loro que' vuoti, per cui passano gli stessi colori, che vanno a dipingere sopra una superficie bianca posta di dietro altri anelli pure rossi, o violetti opposti a que' vuoti rimasti fra i primi della lametta? Anzi perchè quella parte della lametta, che trasmette il lume di un colore, riflette un altro? ed altre maraviglie. Io le confesso, che mi sembra quì la Natura affettare se mai la massima oscurità, e bizzarria di condotta. Ho cercata, e dimandata ad altri sempre inutilmente qualche meccanica ragione, (io voglio dire sciolta dalla cortina di qualità occulte, come sarebbe un' attrazione, di cui non si ha idea) in somma qualche ragione appoggiata ad idee di corpo, e di moto, non ad idee indefinite di Geometria, come sono x , od y nell' Analisi, prima che si abbiano determinate. Se si può spiegare meccanicamente la riflessione, e la rifrazione del Lume, perchè non si può rendere ragione di un Fenomeno, ch'è solo un accidente di quelle? E' pure un accidente di quelle proprietà, che il lume con una certa incidenza sopra il mezzo differente rifrangasi, e con un'altra più obliqua riflettasi. Ma questo ancora quanto è strano? Conoscendo io i progressi di V. S. Illustrissima in ogni parte delle più belle cognizioni naturali, ed ancora la facilità, con la quale è solita benignamente impartire ad altri i suoi lumi, non ho avuta difficoltà a dimandarle sopra tal materia il suo sentimento; nè dubiterò a rettificare sopra di esso i miei pensieri, o a cangiar qualunque Ipotesi io potessi aver concepita. Attendereò con tutto il suo comodo le sue grazie, e con tutto il possibile rispetto mi dico.

Padova 6. Luglio 1736.

. LETTERA II.

Dell' Autore al Padre D. Gio. Bernardo Tisenti.

Dopo un lungo soggiorno in Friuli restituitomi finalmente a Casa trovo un gentilissimo foglio di V. S. Reverendissima, in cui varj particolari si comprendono, ai quali non si vuole rispondere, come dir fogliamo, su due piedi: tanto più che bisognerebbe entrare in una delicata quistione intorno i metodi di filosofare in Fisica, e spiegare alcuni de' più astrusi, e complicati Fenomeni dell' Ottica. Nevvtoniana.

Nella presente lettera dirò qualche cosa concernente l' analogismo tra il suono, e la luce, sopra la quale in altro tempo ho io seriamente pensato, senza poter mai soddisfare a me medesimo.

Nei suoni tre proprietà io considero, cioè a dire primieramente il tuono, che si varia in passando dal grave all' acuto, o al rovescio: secondariamente il piano, ed il forte, secondo che l' impressione nel nostro orecchio, persistendo lo stesso tuono, si fa più risentita, o più lan-

P. p. p.

gui-

guida; in terzo luogo la diversità, che passa fra suono, e suono, come per esempio quella, che si ravvisa fra la tromba, ed il violino.

Ognuno sa, che la prima affezione dipende dai tempi, e la seconda dalla maggiore, o minore espansione dell'onde aeree, alla quale corrisponde il maggiore, o minore stiramento delle fibre del sensorio. Su questo punto ho io data fuori una dissertazione inserita nei supplementi al Giornale d'Italia, investigando, qualmente la forza degli obbietti venga modificata dalla reazione degli Organi. La terza affezione è più malagevole da concepirsi; conciossiachè dannosi suoni totalmente differenti, i quali fra loro convengono, e nel tempo delle oscillazioni, e per la forza, che obbliga le nostre fibrille a piegarsi egualmente. Con tutto ciò essendo facile a capire, che le onde dell'aria possono in maniere innumerabili incresparsi, a misura che vengono messe in moto dai corpi sonori diversamente tremanti, così che oltre il reciprocare del fluido elastico, ed oltre il dilatarsi in cerchio, ad ogni sua particella s'imprima un tremito, ed una subsultazione diversa, formeremo almeno in ~~confuso~~ una qualche idea della varietà de' suoni, che ci seriscono le orecchie.

Non occorre però lusingarsi, che possiamo particolarmente sapere in quale precisa disposizione si disponga l'increspamento dell'aria, ogni qual volta per noi si sente il suono d'una trombeta, o di un violino: aggiungerò solamente, che ci si apre la strada di spiegare per qual cagione alcuni suoni si giudichino dolci, e soavi, ed altri aspri, ed inconfonditi. Una corda d'intestini si chiama falsa, quando divisa, per cagion d'esempio, in due parti eguali, una metà rende un suono, e l'altra un'altro; di modo che non essendo la funicella per tutta la sua lunghezza uniforme, in toccandola tutta intiera risponde con due differenti suoni, che in un solo noioso, ed ingrato si confondono. Similmente se movendo lentamente il cavicchio d'un Violino andiamo fregando con l'arco la corda corrispondente, s'ode uno stridore aspro, ed insolfribile, il quale altro non è, che una mistura, e confusione di tutti que' tuoni, che alla fune successivamente stirata convengono. Per la diversità de' suoni poi si osservi, che un violino toccato col dito fa un suono, e con l'arco un altro tanto differente, quanto lo rendono due differenti stromenti: lo che succede per la varia impressione, che alla corda resta comunicata specialmente dall'archetto, che è una specie di lega.

Passo ora a considerare la luce: e siccome non ci arrecano difficoltà le impressioni più forti, o più fiacche dello stesso genere dipendenti dalla energia più grande, o più picciola degli oggetti; così passando secondo il sentimento di V. S. Reverendissima una qualche analogia fra i suoni differenti, e le varie modificazioni del lume, o vogliam dire i colori, se questi con i diversi increspamenti dell'etere spiegar si debbono, ricadiamo nelle ipotesi del Cartesio, o simili. In questo mentre ella battendo una nuova strada, suppone essere eterogenei i fluidi naturali, e fra essi la luce, le cui parti variano in grossezza, e forza, o vibrazione.

Se

Se noi vogliam procedere per idee chiare, e distinte, diremo, che la forza di due atomi di luce sta in ragione composta delle masse, e delle velocità o semplici, o duplicate (non essendo questo nè il tempo, nè il luogo di decidere la famosa controversia), dunque sarà dotata di forza maggiore una particella di luce, che cammina sotto masse pari con maggiore celerità, e conseguentemente se noi prenderemo quella, in cui risiede la velocità massima, patirà essa la massima refrazione, e sveglierà nel nostro occhio il sentimento del colore violetto più scuro, e più vicino al negro, o sia alla privazione del lume. Temo forte, che l'ipotesi mal s'adatti agli sperimenti; e per darne un saggio, se noi con l'occhio armato d'un Telescopio siamo aspettando l'emersione d'un Satellite dall'ombra, e dal corpo di Giove, la luce, che si parte dal Satellite per giugnere a noi c'impiega, mentre si propaghi in tempo, lo spazio di alquanti secondi, e la prima ad arrivare alla nostra pupilla farà certamente quella, le di cui particelle sono dotate della massima velocità, o della massima forza: per la qual causa si dovrebbe vedere il disco della Lunula gioviale tinto di violetto, indi di turchino, poi di verde, aureo, giallo, e rosso secondo la serie de'colori, e finalmente bianco, qualora la retina è ferita nel tempo medesimo dalle particole luminose di tutti i generi, e si fa un'impressione media fra le più gagliarde, e le più languide. Ora io so, che così in fatto non interviene.

Nè mi si dica, che tutti gli atomi del lume procedono con pari celerità, e che la diversità della forza dee desumerfi dalle masse, cioè dalla maggior quantità di materia, che una particella luminosa rispetto all'altra contiene sotto pari volume; perche io bramerei capire come le più dense siano soggette ad una maggior refrazione, ed a molti altri giuochi, che giusta la Teorica del Cav. Nevvton fa di mestieri ammettere nella luce. Aggiungo, che la maggior forza degli obbietti lucidi consiste nella quantità delle particelle, che di conserva piegano, ed incurvano le fibrille dell'occhio, e cento di esse, che fossero più dense, faranno lo stesso effetto, come un maggior numero di più rare, senza che si capisca il motivo, per cui le più dense abbiano a produrre il color violetto, e le più rare il rosso, non ostante che la fibra medesima sia sollecitata da una pari forza.

Bisogna per tanto ricorrere, per ispiegare la diversità dei colori, a qualche altra modificazione degli atomi luminosi, adattando cioè a dire le speculazioni Cartesiane, ovvero contentandosi di ricevere il principio Nevvtoniano, che i raggi sono tali di lor natura.

Io per dirle il vero sono da lungo tempo persuaso, che i colori altro non sieno, che un velamento di chiaro, ed oscuro, e ne ho sperimenti, che non mi lasciano dubitare di tal verità, ch'è un principio d'esperienza, vale a dire una ipotesi d'occhi, e non di cervello. Con questo principio alle mani mi riesce di spiegare ugualmente i fenomeni e più semplici, e più complicati. D'un solo voglio fare ora parola. Se mentre il Sole è prossimo all'orizzonte, io ci tengo fermo per qual-

che tempo lo sguardo, indi chiudo le palpebre, mi si presenta un gentilissimo color rosato: ma se io mi metto avanti gli occhi un oggetto nero, per esempio il mio Cappello, mi comparisce il violetto. Rimosso il Cappello torna in campo il color di rosa, e così succede tante volte, quante mi piace di ripetere l'osservazione, finattantochè dura sensibilmente la impressione fatta dallo sfrenato lume Solare nel fondo del mio occhio. Desidererei, che qualche Filosofo Nevvtoniano mi rendesse ragione di sì fatta apparenza.

Ma per profeguire l'analogia della luce, e del suono, io nulla trovo nel lume, e nei colori, che corrisponda ai tuoni, ed alle musiche consonanze. Sono queste regolate su i tempi, sì quali secondo me o non trovano luogo nell'Organo della vista, come in quello dell'udito, o almeno non abbiamo Criterio. Egli è vero, che si nota un qualche accordo, e se vogliam dirla armonia fra i colori, ma pare a me, che si appoggi ad una cagione affatto diversa. La Natura ha una scala di colori principando dal chiaro, e procedendo allo scuro, della quale il Sig. Nevvton ha fatto menzione. Ora io penso, che bene s'accordinino insieme i colori vicini ad essa scala, e malamente i lontani. Mal s'accoppia il rosso col turchino, ed ottimamente il verde col giallo, e così vadasi discorrendo de'colori principali, ed anche de'secondarij.

La lettera si fa ormai troppo prolissa, e mi riferbo di scrivere un'altra volta sopra gli altri particolari. Intanto ho l'onore di rassegnarmi.

Castelfranco 6. Agosto 1736.

LETTERA III.

Del Padre D. Giovan Bernardo Tisenti all'Autore.

Io non porto così lungi, che forse V. S. Illustrissima ha pensato; l'analogia fra i colori, ed i suoni, ma solamente restringomi al parallelo dell'azione dell'Aria sopra i Nervi Acustici, e di quella della Luce su 'l Nervo Ottico. Credo, che le oscillazioni di questo più, e meno pronte, più, e men dilatate possano eccitar l'idee di differenti suoni. Ma io concepisco insieme, che nella Luce (la quale inchino a credere una emanazione) sianvi particelle eterogenee, che solamente per una differente grossezza possano contribuire alla differenza delle suddette vibrazioni del Nervo Ottico; le quali tutte insieme il bianco, e separate, o diversamente fra di loro composte varj colori primigenj, o varie composizioni di colori ci facciano sentire. Io credo in oltre, che la sola grossezza nelle particelle della lucida emanazione le renda diversamente refrangibili, nè le parti dei corpi colorati (intendo parti menome) sieno tutte atte a concepir i tremoti di tutte le parti lucide, ma quali più, quali meno, ed altre sì, altre no; e quindi non tutte sieno idonee a rifletter ogni lume, nè pertanto a rappresentar ogni colore.

lore: in quella maniera, che non ogni vibrazione di Aria mette in moto ogni corda.

Non so come V. S. Illustrissima spieghi la Rifrazione: ma non convengo con Lei, che i raggi composti di particelle più grosse debban essere i più rifrangibili; io dico, che questi sono i più deboli, ed affumo per li più deboli, i composti di particelle più sottili, e delicate. Nevvton direbbe, che questi son più soggetti all' attrazione del mezzo refrangente, e pertanto più si rifrangono; ma io non ho mai amato di servirmi di un termine così vago, e così poco significante in bocca di un Filosofo, com'è quello di *Attrazione*.

Mi piace moltissimo la idea di V. S. Illustrissima su l' accordo di que' colori, che son prossimi nella scala de' sette primarj; per accordo intendo un accoppiamento di colori grato alla vista. E qui trovo un' altra analogia coi suoni. Vi è un numero determinato di tuoni, il cui vario accoppiamento fa diverse consonanze; quelli io chiamo suoni elementari, o Primogcnj: i Pratici li fanno otto. La natura ha pure un numero determinato di colori, e talvolta la union delle vibrazioni, che può risultare nel Nervo Ottico, può cagionare una grata sensazione per mezzo della vista.

Il Fenomeno dei colori immaginarj, Rosco, o Violetto, proposto mi da V. S. Illustrissima non mi succede sempre in un modo; ma nel sistema dei varj tremori, e della lor forza, e languidezza nelle fibrille dell' occhio la spiegazione non credo, che sia impossibile, nè molto difficile. Le impressioni dal lume Solare si fanno tutte insieme per tutti i colori, ma chiuse le palpebre, togliesi alle impressioni già fatte la comunicazione col lume esterno, ond' è, che si dovrebbero perder tutte, non venendo sempre avvivate dalla fonte del Lume. Ma come le impressioni non sono tutte ugualmente forti, così non tutte insieme si estinguono, e si vde quel color, che risulta dalle restanti, e dalle ultime a ctinguerfi. Ma perchè frapposto il cappello tra me, ed il Sole, veggio tosto un altro colore, e rimosso, torna in campo quel di prima? Io osservo, che il cappello non può agire certamente su' l' fondo del mio occhio tra per esser nero, e perchè io tengo chiuse le palpebre; ma solamente egli può sospendere l'azion del lume Solare, che opra su' l' mio occhio, anche essendo chiuse le palpebre. Quando dunque cessa questo di agire per la frapposizione di un oggetto opaco, le fibrille si riducono a poco a poco a quella languida vibrazione, da cui dipende la percezion di un colore più debole, come l' azzurro, ed il violetto; la qual istessa languida vibrazione cessando infine del tutto, svanisce ogni apparenza di colore. Rinnovasi poi di tratto in tratto, rimuovendo il cappello, quel colore rosso, perchè, anche chiuse restando le palpebre, il lume Solare anima, e avvisa di nuovo la forza delle vibrazioni impresse la prima volta; ma non le anima, nè avvisa tutte, perchè altrimenti dovrebbe scorgere il bianco, o il puro chiaro, che da tutte risulta. Io non so vedere, che in altra maniera possa mutar le impressioni, o le disposizioni dell' occhio la interposizion di un cappello. Se qualche parte del lume Solare non agi-

agisce su'l fondo dell'occhio, malgrado l'ostacolo delle palpebre chiuse, non vi potrà giugner nè meno l'ombra del cappello, per far una spezie di velamento al chiaro, come V. S. Illustrissima per avventura ha supposto. E se qualche parte del lume Solare, che ho dirimpetto, ancor agisce sul fondo del mio occhio chiuso, perchè non potrà questo turbare, o cangiarsi le disposizioni prima introdotte, e in conseguenza la sensazione, che lor corrisponde? Io non ho osservato farsi sempre questo cangiamento di rosso alla scoperta, in violetto dietro il cappello; ma talvolta di rosso in giallo, e di giallo in varj colori incerti fino al nero totale; e pure ho sempre usato dello stesso cappello. Ma io voglio attribuir questo all'aver aperti, e chiusi gli occhi troppo spesso in poco tempo; e troppe impressioni in conseguenza anno potuto concorrere a questo effetto; nè perciò saria facile esaminar un soggetto divenuto per questa via troppo composto.

Quanto all'ipotesi dei velamenti di chiaro, ed oscuro, realmente non comprendo, che siano altra cosa, che mezzi, o strati pellucidi di differente densità, e ~~estensione~~ ^{estensione}. E questi non possono colorire il lume, che li trapassa, se non rifrangendolo. Che altro è un velo nero, per cagione di esempio, a traverso di cui si riguarda la neve, o qualche altro oggetto? Ed eccoci all'altra ipotesi dei raggi di differente disposizione a rifrangersi, o a passare per mezzi trasparenti. Per uno di questi mezzi alcuni raggi avranno più facile trasmissione, che riflessione, e vice versa per un altro.

Ho scritto in fretta, e senza studiar tutta la chiarezza, scrivendo a V. S. Illustrissima, la quale è ottimamente informata di tutti i Sistemi, e può in ogni caso supplire al mio difetto di espressione. Ma soprattutto le lascio un'intera libertà su li miei pensieri, non cercando io, che di rettificarli sopra la norma, che le piacerà di prescrivermi. Sono frattanto con un pienissimo rispetto.

Padova 11. Agosto 1736.

L E T T E R A IV.

Dell'Autore al Padre D. Giovan Bernardo Tisenti.

Comunque si spieghi la refrazione, io so, che le particelle componenti la luce in aprirsi la strada attraverso d'un corpo diafano, parte continuano il loro viaggio giusta la direzione dell'angolo dell'incidenza, parte si riflettono, parte si rifrangono, e nell'atto di rifrangersi si dispergono, piegandosi alcune più, ed alcune meno verso la perpendicolare.

Vorrebbe V. S. Reverendissima, che tutti questi effetti da una sola ragione dipendessero, e che la diversa grandezza delle suddette particelle fosse bastante a soddisfare a tutti i fenomeni. Non si muovono esse certamente con varia celerità, conforme ho dedotto io dalle apparenze delle Lune di Giove. Ella non si mostra inclinata a credere, che siano dotate di dif-

differente densità, ma piuttosto, che la loro diversa forza consista nel maggiore, o minor volume. Conforme che le supposizioni sogliono assumere ad arbitrio, nè si prende mai la briga di dimostrarle; così farebbe una discortesia il negare a Lei la sua ipotesi. Io non sono per far ciò, ma potrebb'essere, che lo facciano altri più delicati in via di metodo.

Almeno fa di mestieri esaminare le conseguenze. E qui nasce una Questione, se le più grosse, o le più minute particole luminose sieno le più refrangibili. Io non sono per deciderla così facilmente. Se ho detto, per dir qualche cosa, che quelle di maggior mole patiscono una più grande refrazione, ne sono stato indotto non già da una dimostrazione, ma da una secondo me plausibile conghiettura. E' pregata ad avvertire, che quanto il mezzo è più tenue, o meno tenue, altrettanto la luce soffre minor refrazione; cosicchè i raggi, che maggiormente si piegano, sono quelli, che ad una maggior resistenza si trovano soggetti. Perchè dunque la sua sentenza fosse vera, bisognerebbe provare, che lo stesso mezzo sia minor contrasto, e meno s'oppona al passaggio degli atomi lucidi, a proporzione che quelli sotto un maggior volume contengono più di materia.

Assumendo poi Ella, che i raggi diversamente refrangibili acquistano nell'atto dell'inflattersi una differente disposizione, la quale in altro certamente non può consistere, salvo che nel vario moto, e tremito delle particole luminose; avanza cammino, e professa di spiegare con ciò la scala dei colori.

A buon conto la sola varia grossezza non basta: e siccome nell'aere non diremo mai, che le parti più massiccie di questo fluido imprimano nel nostro orecchio il suono, per esempio d'una trombeta, e le più minute quello d'un gravecembalo, ricercandosi un non so che di più, cioè la differente modificazione, ed increpamento delle onde aeree; così nella luce ci vuole una qualche cosa analoga consistente nel diverso moto, e tremore delle sue particelle, per render ragione della varietà dei colori. Con ciò nulla si dice di nuovo, e si tenta di conciliare due Sette, adattando agli esperimenti Nevvtoniani le spiegazioni Cartesiane.

Il Cavalier Nevvton persuaso dalle sue osservazioni, che i raggi non sian tutti egualmente refrangibili, e che per questo capo rascano i diversi colori, si è messo ad indagare quali fra essi raggi sian capaci d'una maggior, o minor riflessione, quali ad un maggior, o minor incurvamento, e quali si trasmettano, o non si trasmettano per i fluidi, e per le laminette trasparenti. Con tali fenomeni alla mano da lui giudicati fondamentali è passato a dilucidare gli altri più composti, appoggiandosi sempre ai principj d'esperienza, senza prendersi la briga di più oltre filosofare, e cercare inutilmente in che precisamente consista la natura delle particelle luminose dotate delle menzionate differenti proprietà.

Ed in vero procede Egli ottimamente per quello riguarda al metodo; conciossiachè l'insinuarsi più addentro, e farsi ad indovinare le intime configurazioni, grandezze, e moti delle particelle costituenti li

cor-

corpi fisici, altro non è, che lusingarsi di saper ciò, che non può mai sapersi. Ai giorni nostri dai Dotti di miglior sapore si lasciano sì fatte speculazioni minute ai Francesi, che se ne mostrano oltre ogni credere invaghiti, e si compiacciono più di Romanzi filosofici, che d'una soda Filosofia.

Diceva in una sua lettera il celebre Leibnizio, che ogni qual volta in certi incontri non ponno ridursi le cose ai primi elementi Geometrici, e Meccanici, egli è d'uopo prender per base de' nostri raziocinj un qualche principio fisico, vale a dire o uno sperimento ben circostanziato, o un'effetto, di cui si abbia una sufficiente notizia. Così Egli, considerate le proprietà de' seltri, che imbevuti d'un liquore lo separano da un altro eterogeneo, si è fatto strada a spiegare le secrezioni animali, fondandosi sulla legge dell'uniformità, con cui in casi simili suole operar la Natura. Similmente il Sig. Nevvton nei due passi da V. S. Reverendissima nella sua prima lettera allegati, per dare una qualche idea delle vicende della più facile riflessione, e della più facile trasmissione, è ricorso alle vibrazioni del mezzo o cospiranti, o contrarie a quelle del lume.

Quanto a me s'io non adotto le speculazioni Nevvtoniane, ciò nasce, perchè parmi di avere alle mani alcuni principj d'esperienza e più semplici, e più generali, e più secondi in tale materia. Forse io m'inganno, ma sin ora rendo facilmente ragione di certi fenomeni alla mia maniera, ai quali il mio corto intendimento non sa applicare le massime Nevvtoniane.

Se guardo un'obbietto bianco, e ben illuminato attraverso d'un fumo, d'una nebbia, o d'una lamina di quel vetro, che si chiama girasole, mi comparisce tinto di giallo, o di rosso. L'esperienza è certa, e chiara, e mi si presenta sempre la stessa, ogni qual volta mi cade in umore di ripeterla. Comprendo agevolmente, che i raggi riflessi dall'obbietto bianco, in passando a cagion d'esempio per il fumo o più denso, o più raro, non ponno conservar intatto il loro candore; ma debbono in qualche modo alterarsi, e farsi vedere diversamente. In questo mentre non vo io in traccia della loro varia modificazione, non avendo dati, per rinvenire in che consista fuori di me, e molto meno dentro di me, come cioè per l'interposizione del fumo si cangi l'interna affezione della mia anima.

Quando poi leggo le osservazioni dell'Hallejo, il quale costituito nel fondo del Mare in giorno sereno, vedea rossa la superficie superiore della sua mano; senz'altri raggi capisco, che così aveva a succedere; perchè dovea generare il rosso, in guardando il chiaro del Sole attraverso dell'acqua più opaca, e scura. Io non dirò, che l'acqua trasmette i raggi rossi, e riflette i verdi; conciossiachè vi si oppone la seconda parte della speranza, per cui l'Inglese vedeva la parte inferior della mano di color verde. Se l'acqua, che giace al disotto tingea la mano, riflettendo la luce verde; egli è necessario, che la luce stessa passasse prima liberamente per il corpo dell'acqua superiore, altrimenti non avrebbe-

be-

489

be mai potuto risfletterfi dall'inferiore. E fe così è, non dovèva la mano mirarfi in virtù de'raggi trasmessi o rossa, o verde, ma d'una tinta di mezzo infra due. Per la stessa strada spiego i colori immaginari, e lascio a V. S. Reverendissima il dilucidare più minutamente il fenomeno.

Raccordo a V. S. Reverendissima la mia divozione, e mi dico:

Castelfranco li 28. Agosto 1736.

L E T T E R A V.

Del Padre D. Gio. Bernardo Tisenti all' Autore.

Per rispondere qualche cosa alla stimatissima lettera di V. S. Illustrissima, farollo brevemente in tre capi, che sono il mio modo di concepir per ora la rifrazione in quella parte, che le faceva difficoltà, secondo il fenomeno di Hallejo mentovato nella sua, e terzo il metodo, che io credo distinguere la Filosofia dalla Storia, e dalla Geometria.

Dove i raggi si accostano alla perpendicolare nel risfrangerfi, trovano minore resistenza, e ciò, quanto più sono composti di particelle minori. Ciò, che io provo così. E' di fatto, che il lume passando dall'aria nell'acqua, si frange, accostandosi alla perpendicolare. Dunque ci trova meno di resistenza, che nell'aria. Ma l'opposto accadendo a'corpi sensibili, ciò non potrà avvenir al lume, che per la sua esterna piccolezza, come già se n'appose il Cartesio. Dunque se questo lume non è omogeneo, come si stabilisce dal Nevvton, quello, ch'è più sottile, soffrirà ancora minore resistenza nell'acqua, cioè quanto più si scosta dalla natura de'corpi sensibili, tanto più se ne allontanerà dalla legge. Onde potrà farsi questa legge in Ottica: quanto più denso è il mezzo, in cui passano i raggi, tanto meno loro resiste, e quanto son essi più sottili, ancora meno. E' dunque la resistenza nel passar dal raro nel denso in ragion composta reciproca della sottigliezza del lume, e della rispettiva densità del mezzo.

Venendo al fenomeno d'Hallejo (intendo i colori della sua mano sott'acqua) poco veramente egli è circostanziato, almeno secondo, che lo riferisce il Nevvton nella sua Ottica. E certamente V. S. Illustrissima spiega così questo, come altri, abbastanza felicemente co' suoi principj; ma della solidità loro converrebbe giudicare non dipendentemente da alcuni, ma da quanti fenomeni è possibile unir insieme. Ne' colori prismatici ho trovata non piccola difficoltà a farvi l'applicazione dei mezzi più, e meno illuminati, quando si velano l'un l'altro; ma in cambio di questo, ritrovo degli altri fenomeni, che non si conciliano agevolmente colla Teoria Nevvtoniana. Sia un di questi, se così vuole, il mentovato nella sua lettera. Nondimeno, non potrebbe egli dirsi, che i raggi rossi, e i loro vicini doretti, e gialli passano liberamente per

Opere Ricc. Tom. III.

Q q q

l'ac-

l'acqua del mare fino ad una grande profondità, e fin che qualche corpo differente dall'acqua rislettali? La mano dell'Hallejo dalla sua parte superiore doveva dunque rislettere questi, e tingersi di un rosso carico, quanto più ella era profondamente sott'acqua; ma roseo gli appariva, com'ei riferì al Nevvton, perchè col lume rosso una parte del violetto, e dell'azzurro fin là giungeva, che forse più oltre in minor copia sarebbe giunta fino a quell'altezza, a cui solamente li raggi rossi potrebbero penetrare. Questo roseo non era per avventura così bello, che una qualche piccola porzione di verde non si frammischiasse, ma il rosso predominante facesse col blò, che tinta fosse di roseo più, che d'altro color composto. Io dico, che la porzion di verde, la quale arrivava alla mano superiore, doveva esser piccola, e dobole; imperciocchè ogni strato di acqua dalla superficie fino a quello, in cui la mano dell'Inglese si ritrovava, doveva rislettere del verde, ma insieme con qualche copia di azzurro, e violetto proporzionale alla profondità degli strati sotto la prima superficie (cioè, che fa il verdemare). E perciò a misura, che c'inoltriamo sot'acqua, dovremo ritrovare un verde meno impuro, che si rislette abbastanza copiosamente dai molti strati inferiori, com'era quello, che dall'acqua più profonda dava nella parte inferior della mano del nostro Osservatore, nè il rosso, doretto, e giallo, che si trasmettevan col rosso; o il violetto, e l'azzurro, che per la più grau parte eranli rislettuti, dovevan confonder la tinta verde della sua palma.

Quanto al metodo di filosofare in Fisica, io credo, che i principi di fatto, come si chiamano, od i fenomeni più generali, non siano quelli, in cui debba finire la fisica risoluzione, ma per esser paghi, si debba procedere ad una ulteriore spiegazione di questi stessi, che sia appoggiata non ad idee matematiche, ma fisiche, io voglio dire, alle nozioni naturali, e semplici dell'estensione, e de' suoi modi. Se sopra di queste possa stabilirsi un'ipotesi, che il tempo, e le osservazioni confermino, o non distruggano, io non veggio, perchè ella debbasi escludere dai Sistemi Filosofici, che non sono finalmente un trattato di Geometria. Il male farebbe ostinarsi a difendere l'Ipotesi *invita Minerva*, e far valere per una cosa di fatto ciò, che non è, se non un pensier filosofico. Le cause fisiche non possono, che spiarfi per via d'ingegno, e di ragionamenti probabili su le traccie dei Fenomeni raccolti in una quantità sufficiente. La Storia della Natura, e la Geometria si esercitano bensì, l'una su le osservazioni naturali circostanziate colla maggior esattezza, e l'altra sopra tutto quello, che ne' Fenomeni ha rapporto colla quantità; e quindi potranno certamente l'una, e l'altra somministrare un grande ajuto alla Fisica: ma dopo tutto l'ufficio di questa sarà sempre lo specular su le cause, ed il Fisico avrà dritto di estender le sue specolazioni, e ricerche fin dove lo può portare la curiosità d'intendere la Natura, ed in conseguenza oltre i limiti delle pure notizie storiche, e delle geometriche cognizioni.

Io metto tutto questo sotto i riflessi di V. S. Illustrissima prontissimo a riformarlo, s'Elia penserà altrimenti, non essendo questi miei, che

che pensamenti provisionali, ed ancora non ben digeriti. Frattanto mi dico con tutto il rispetto

491

Padova 18. Settembre 1736.

LETTERA VI.

Dell' Autore al Padre D. Gio. Bernardo Tisenti.

Mi permetta V.S. Reverendissima, che per me si dia cominciamento dall'ultimo capo della sua lettera, in cui ti parla del modo di filosofare in Fisica. Io seguitando le vestigia del nostro Galileo sono pochissimo amico delle ipotesi, le quali, siccome parti della immaginazione, introducono una Filosofia fantastica. Mi sono preso la briga d'esaminare parecchie supposizioni di molti Valentuomini, ed avendole scoperte o mancanti, ed imperfette, o ripugnanti ai fenomeni, o fra loro contrarie, ho avuto finalmente la buona sorta di liberarmi una volta dal comune pregiudicio.

Ma per non uscire dalla materia, ch'abbiam per le mani, Ella è pregata ad avvertire, che il Cav. Nevvton, il quale da ogni ipotesi si mostra affatto alieno, dando corso a' suoi pensamenti, non ha saputo scalfare l'intonveniente. Egli per una parte facendosi a spiegare la rifrazione per via delle sue attrazioni, ha dovuto ammettere, che il lume tanto minor resistenza incontri, quanto penetra un mezzo trasparente più denso, stando tutte le altre cose pari: sentenza abbracciata anche da V.S. Reverendiss., che pone la resistenza nel passare dal raro al denso in ragion reciproca composta della sottilighezza della luce, e della respettiva densità del mezzo.

Per un altro verso poi volendo l'Inglese salvare il moto dei corpi celesti, i quali descrivono intorno i loro centri orbite, che in se stesse ritornano, laonde nelle loro rivoluzioni non incontrano resistenza di sorta alcuna; s'è trovato in necessità di supporre i Cieli vuoti d'ogni sensibil materia.

Se così è, venga il raggio ACB (Fig. 148.) dal Sole A, e passando per gli spazj vani, urti in C nella estima superficie della nostra Atmosfera. Sia DCE toccante del punto C, e normale ad essa sia la retta CF, la quale va a terminare nel centro della Terra F.

Ora la densità dell'acre in C, per quanto sia picciola, sarà infinitamente maggiore di quella di uno spazio inane; dunque ammesso il Canone da Lei stabilito, agevolmente si dimostra, che nella prima refrazione il raggio AC tanto alla perpendicolare s'accosta, che forma con essa un angolo infinitesimo: per la qual causa gli abitanti della Terra situati in I, ai quali giugne il raggio spezzato ACI, vedrebbero sempre il Sole nel vertice, qualunque fosse l'inclinazione del raggio incidente AC. Curioso spettacolo farebbe il mirare il Sol nascente comparire di salto sul Meridiano, ed ivi fermarsi immobile tutta la giornata;

Q99 2

iu-

indi con un altro salto improvvisamente, ed in un batter d'occhio tramontare.

Aggiungasi, che dopo aver il raggio AC sofferta la prima refrazione, camminerebbe sempre per la normale CIF, ed incontrandosi negli strati d'aria più densa, o nella superficie d'un'acqua stagnante, continuerebbe senza mai più rompersi per la medesima perpendicolare il suo viaggio.

Già V. S. Reverendiss. s'accorge in quali assurdi vadano a terminare le due posizioni Nevvtoniane accoppiate insieme, e quanto delle ipotesi possiamo fidarci. Per dire frattanto qualche cosa intorno il suo Canone, a me pare, che con ammetterlo s'incontra nel medesimo inganno, in cui, trattando d'altra materia, è caduto Aristotile.

Osserva costui, che quanto il mezzo era più raro, altrettanto i gravi discendevano con maggiore velocità, e percorrevano in minor tempo uno spazio dato: e perciò inavvedutamente ha conchiuso, che in un mezzo infinitamente tenue, o sia nel vuoto il moto si farebbe in istante. Ma s'egli avesse avvertito essere limitata la forza della gravità; altro non avrebbe potuto inferire, se non che in un tempo qualunque dato s'acquista dal mobile una velocità finita, che nel vuoto è la più grande, che possa mai acquistarsi, e nel pieno sempre minore, e minore, quanto è più grande la resistenza, che dalla forza della gravità dee sottrarsi.

Applicando al caso nostro la riflessione fatta, mi sembra manifesto, che la forza, per cui il lume si propaga nel vacuo, è nel suo genere determinata. Mi esprimo così, perchè non intendo di decidere la questione, se la luce si propaghi in un istante, ovvero in tempo; sapendo che le quantità tanto finite, quanto infinite possono essere fra loro nella medesima data ragione. Ora mentre il lume cammina per un diafano di densità inassegnabile, la sua forza, qualunque essa sia, non trova intoppo, e perciò impiega tutta se stessa senz'alcuna diminuzione. Ma quando la menzionata forza ha da spingere le particelle luminose per un diafano denso, io dimando come possa essa aumentarsi, ed acquistare nuovo vigore. Il mezzo trasparente è bensì disposto a ricevere l'impresione del lume, e ad opporvisi colla sua reazione, ma non mai ad avvalorar la sua forza, purchè non si voglia cancellare l'assioma, che l'azione è sempre uguale, e contraria alla reazione.

Bisogna per tanto confessare, che una porzione della forza del lume debba impiegarsi a vincere la resistenza del mezzo, e l'altra, che rimane, a penetrarlo; laonde anche in questo incontro abbia dalla forza totale a sottrarsi la resistenza.

Nè vedo cosa ci abbiano da fare le attrazioni Nevvtoniane; conciossiachè un corpo qualunque B (Fig. 149.) cammini giusta la direzione AC determinante l'asse del moto, che passa per il centro di gravità B; ed urti obliquamente nel punto E d'un fluido più denso EF, indi a poco a poco si vada insinuando, e lo penetri: io dico, che se l'aggregato di tutte le resistenze, le quali nella immersione si oppongono alla parte AEC, è maggiore dell'aggregato di tutte le resistenze, le quali fan-

fanno contrasto all'altra parte ADC, l'asse AC si ripiegherà dal canto della perpendicolare EF; cosicchè inclinandosi passo passo, cambierà direzione, e continuando finalmente il viaggio per linea retta, sarà soggetto ad una specie di refrazione.

Ma se le somme delle resistenze delle due porzioni AEC, ADC fossero pari, ovvero le prime dalle seconde venissero superate, in sì fatti incontri o il mobile non si svierebbe dal suo cammino, o si spezzerebbe discostandosi dalla normale EF. Il primo caso per lo più ha luogo ne' corpi regolari, ed omogenei, e negl' irregolari frequentemente gli altri due: e perchè la refrazione sia più grande, o più piccola, e si faccia più da un lato, che dall'altro, ci contribuisce la grandezza dei corpi, e molto più la figura, e la posizione.

Quest' avvertenza ci somministra il modo semplice di spiegare la refrazione, e la diffrazione del lume. Alcuni atomi lucidi (lasciando da parte quelli, che si riflettono) seguivano la loro strada dal raro al denso senza rompersi, e chiamansi trasmessi; altri poi più, o meno si frangono: e per renderne la ragione, basta il supporre, che tutte le particelle della luce non siano lavorate su un torno, e che siano fra loro diverse di grandezza, di figura, e di posizione. Con ciò possiamo soddisfare agli accennati fenomeni, senza ricorrere a cagioni misteriose, ed ignote, dagli Inglesi secondo me fuor di bisogno introdotte.

Per quello appartiene al Cartesio, quantunque egli nella conclusione convenga col Nevvton, e con V.S. Reverendiss., discorda però nei principj. Si diede il Francese a credere, che l'aria, in quanto è villosa, facesse alla luce maggior resistenza dell'acqua, e degli altri corpi trasparenti, i quali sebbene più densi assai, non anno però i minimi componenti tanto flessibili, e tanto fra loro intralciati. Forse se ne potrebbe prender conghiettura da' misti viscosi, e tenaci, siccome l'olio, il quale benchè più leggiere in ispezie dell'acqua, niente di meno a causa della sua tenacità più fortemente rifrange il lume. In questo mentre essendo cosa notissima agli Astronomi, che passando un raggio dall'etere all'aria, piega verso la perpendicolare; mi farei volentieri ad interrogare i Cartesiani, s'eglino pensano, che la materia sottile sia più villosa, e teugnente della nostr'aria.

Ho proposto l'esperimento dell'Hallejo, e l'altro dei colori immaginarj per metter in chiaro, che chi si mette a spiegare i due fenomeni coi principj Inglesi, se pure nettamente esplicar si possono, dee servirsi di parecchie supposizioni, che danno indizio della mancanza del sistema, il quale s'imbrogia anche nelle cose più semplici. Ella però nell'altro sistema del chiaro, e dell'oscuro non crede, che si renda ragione quanto basta dei colori prismatici: ma se si prende a considerare la loro genesi nei casi più semplici; si scopre con facilità il meccanismo della Natura.

Castelfranco 7. Ottobre 1736.

L E T T E R A VII.

Del Padre D. Gio. Bernardo Tifenti all' Autore.

Convegno con V. S. Illustrissima, che non bisogna facilmente fidarsi dell' Ipotesi; ma quanto dovremmo noi rigettare d'ingegnose specolazioni, e che anno tutta la verisimiglianza in Fisica, se vogliamo ristriccerli al fatto solo, e al dimostrativo? In oltre l'ipotesi non mettendo nulla in fatto, ne mai essendo una proposizione assoluta, ma relativa ai soli fenomeni, che sappiamo, si potrà sempre abbandonarla, quando ne vengano alla luce de' nuovi, che non siano con quella compatibili. Che se alcuni anno voluto più tosto tirar la Natura per forza alla loro ipotesi, che riformarla, o abbandonarla del tutto, tal sia di loro: e questa sarà colpa dell' artefice, come si suol dire, non dell' arte. Quando nella risoluzione analitica di un Problema io mi so a ricercare, se quel, che ho supposto, sia *quel punto*, o quella linea, che si dimandava, non so altero, ch' esaminare, se a quel punto, o a quella linea convengano le condizioni del Problema. Così a pari, se in una Question Fisica io trovassi, che quello ho supposto, si adatta alle condizioni, che ne conosco: perchè avrei io torto ad adottare, come si fa, provisionalmente la mia supposizione?

Io avea stabilito questo Canone, che la resistenza trovata dal lume nel passaggio per differenti mezzi è in ragion composta, reciproca della loro densità, e diretta della sottigliezza dei raggi, imperciocchè quanto il mezzo è denso, o di maggiore specifica gravità, *ceteris paribus*, e quanto minori sono le particelle lucide, di cui è composto il raggio (secondo la ipotesi, che ora ho in vista) tanto più i raggi si accostano alla perpendicolare, passando da un mezzo non denso in un più denso; e ciò costantemente in reiterate sperienze, non a caso, nè per diffrazione di raggi, o costituzione di superficie refragenti. Ella sa la celebre disputa, che fu tra il Signor De Fermat, e Descartes, e che finalmente i dotti si dichiararono per quest' ultimo, restando la maggior parte persuasi dal ragionamento meccanico del Sig. Descartes, il quale dall' accostamento alla perpendicolare argomentava la minore resistenza del mezzo, in cui quello facevasi: imperciocchè ogni corpo dee a quella parte accostarsi, da cui meno se gli resiste, in quella maniera, che una sfera sensibile si scosta dalla perpendicolare in quel mezzo, ch'ella trova maggior difficoltà a penetrare. Nulla valsero contro di questa evidenza le sottigliezze del Signor di Fermat, che metteva in campo le cagioni finali, volendo, che i seni d'incidenza, e di refrazione seguitassero la ragione inversa delle resistenze ne' due mezzi, per cui la luce viaggia, acciò v'impiegasse il men di tempo, che fosse possibile.

Le difficoltà, che ha questa Teoria, ed al mio Canone oppone V. S. Illustrissima, o non sono direttamente contro di me, che non determino nulla intorno al vacuo, o non mi pajono insolubili. Io avea det-

detto, che il lume va più veloce ove trova minore resistenza, e perciò più veloce nell'acqua, che nell'aria, e più ancora nel vetro, che nell'acqua; e in effetto si è questa una conseguenza dell'accostarfi più alla perpendicolare, mentre il seno refratto essendo minor dell'incidente, la velocità verticale si dee aumentar dopo la refrazione, com'è facile dimostrar: effetto da Nevvtoniani attribuito alla maggior attrazione del più denso, la qual agisce per direzioni verticali. Ella mi domandava, d'onde nasce quest'aumento di velocità del lume in un mezzo, che non può se non colla opposizione delle sue parti ritardare il mobile, che vi entra: dico, che quì la minor perdita tien luogo di guadagno, se si considera, che la luce è spinta incessantemente da nuovi, e nuovi, gradi di forza, che risiede nella sua sorgente, e che la perdita di moto, la quale si fa, per esempio, nell'aria dalla luce rispetto a quello, ch'ella vi ha, ed acquista, è maggiore di quella perdita, che da essa luce si fa nell'acqua rispetto al moto, con cui vi entra, e che se si continua ad aggiugnere. Non ispiegherò per ora fisicamente il modo, in cui questa faccenda può andare, ma non credo sia difficile ritrovarne qualche cagione meccanica nella diversa fermezza delle parti, e struttura de' pori, che sono ne' due mezzi differenti. Il P. Malebranche aveva pensato, che un mezzo fluido, e sottile, ch'è propriamente quello, per cui passa il lume, si trovasse sparso in tutti li corpi diafani in una quantità reciprocamente proporzionale alla densità loro; e che il lume perciò premuto di vantaggio da questo fluido nel diafano raro, in cui più abbonda, fosse obbligato a cedere verso la perpendicolare nel diafano più denso, ove la resistenza del suddetto fluido men' abbondante fosse ancora minore. Ma io ritrovo in tutto questo troppo di libertà Gallicana, e poco di meccanica precisione. Non farebb'egli più semplice il dire, che le parti di un fluido meno denso sono più agitate, o più capaci di ricever agitazione, che quelle di un fluido più denso, ma che può permearsi con tutte le direzioni in tempo, che le piccole particelle di lume non gl'imprimono alcun moto, o ne sono meno distratte dal suo cammino, e meno della sua forza spogliate?

Ha in oltre opposto assai acutamente V.S. Illustriſs. l'assurdo, che seguirebbe nelle apparenze del Sole, dal combinare insieme il vuoto Nevvtoniano con l'accostamento de' raggi alla perpendicolare, ove questi entrano in un mezzo più denso; imperciocchè, dic' Ella, il vuoto nulla avendo di densità, e l'atmosfera terrestre avendone una infinita per rapporto al vuoto, se la rifrazione porta tanto più il raggio verso la perpendicolare, quanto più grande è la differenza tra la densità del primo, e secondo mezzo, ne seguirà, che la rifrazione dal vuoto nell'atmosfera sarà massima, o l'angolo rifratto infinitamente piccolo, e perciò coincidente colla stessa perpendicolare. Per verità ciò seguirebbe ancora dal mio Canone, che porta l'angolo rifratto tanto minore nel mezzo più denso, quanto maggior è la differenza fra la densità de' due mezzi; ma come questo Canone esprime la facilità del passaggio reciprocamente proporzionale alla densità dei mezzi corporei, e resistenti al lume, ed il

vuoto non è mezzo corporeo, nè resistente; (della qual natura io non riconosco alcun mezzo) così tal assurdo non può seguitar dal mio Canone, che fa una comparazione di due mezzi corporei, e per il rapporto della lor tessitura alle particole lucide più, e men resistente. Per altro supposto il vacuo, che non può toglier nulla al moto del lume, io dico, che quando da quello in un mezzo corporeo passasse il lume, si rifrangerebbe a *perpendiculo* contro l'osservazione Astronomica; perocchè la nuova resistenza sarebbe sempre maggior di una, ch'è nulla. Ma di ciò veggano quelli, cui sta a cuore difender questo mezzo incorporeo.

Diranno forse costoro, che l'assurdo dedotto da V. S. Illustrissima sussisterebbe, quando la cagion della rifrazione *ad perpendiculum* fosse semplicemente l'aumento di densità in un mezzo sopra quella dell'altro; onde il lume fortisce; ma poichè la cagione n'è solamente l'attrazione del mezzo, in cui entra, e questa è limitata, non può, che produrre un effetto finito, facendo accostar il lume alla perpendicolare proporzionalmente a quella forza attrattiva, che va crescendo a misura della vicinanza dell'*atmosfera alla terra*, e non facendolo coincider con essa perpendicolare, perchè in questo caso la detta forza dovrebbe essere un massimo, o infinita: in quella maniera, che dal farsi la discesa de' gravi più presto ne' mezzi più rari, non ne segue, che il moto de' gravi debba farsi in istante ne' mezzi infinitamente tenui, o nel vano; imperciocchè la forza dell' gravità non è infinita, ma limitata.

Quello, che ho accennato della più difficile disposizione al moto nelle parti di un mezzo più denso, onde il lume abbia a perdersi men del suo moto, può confermarsi con quello Ella osserva dell'olio, che sebbene meno grave in ispezie dell'acqua, rifrange nondimeno più fortemente; la tenacità di quel fluido fa, che si tengano più unite le sue parti, e quindi fa una stilla, o un filo più seguente, che l'acqua; ne nascerà dunque in ciascuna parte una minor disposizione al moto, per essere ciascuna raccomandata a molte altre; e perciò meno resisterà al passaggio di un corpo delicatissimo, come il lume, che non fa presa sopra di loro, e da cui son esse meno mobili, che le parti più sciolte di un altro fluido. L'etere, che si diffonde per il gran cammino della luce dal Sole a noi, ha più di ogni altro fluido noto questa disposizione nelle sue parti ad esser mosse, e quindi potrà far più di diversione di forza, o ritardo al passaggio della luce, col trasferire in se parte del di lei moto, più di quello possa far l'aria, o l'atmosfera, in cui li raggi si rifrangono perciò *ad perpendiculum*.

Tutto ciò ho scritto fin ora più per rispondere qualche cosa a V. S. Illustrissima, da cui so, che molto posso imparare, che per esser in effetto perfuaso di alcuna spiegazione; il meccanismo mi è sempre piaciuto in Fisica, perchè appaga più delle Qualità occulte; ed i principj di sperienza assunti senza spiegazione non mi pajono esser tutto quello, che si può desiderare, quando non sono semplicissimi. Le rassegnò il mio più sincero ossequio, e sono

Padova 30. Novembre 1736.

LET-

L E T T E R A V I I I.

Dell' Autore al Padre D. Giovan Bernardo Pifenti.

Soggiungo un' altra avvertenza intorno il metodo di ben filosofare in Fisica. Salva sempre la miglior opinione, secondo me, incombenza principale d' un Fisico si è l' andar in traccia delle leggi della Natura, collo scoprimento delle quali, oltre che si sparge un lume sopra le materie particolari, s' acquistano anche delle cognizioni per un sistema generale, e si promovono le Arti a beneficio dell' umana società. Le leggi della Natura si deducono o da' primitivi originali principj, o dai fenomeni ben accoppiati; o finalmente dalle leggi già dimostrate, colla di cui scorta ci facciamo strada ad altre ignote, con l' ajuto però di certi metodi, de' quali troppo lunga cosa sarebbe il farne parola.

Ora con tali mezzi messe in chiaro le regole, di cui nelle sue operazioni la Natura si serve, quando di conseguenza, e per via di corollario ci si manifestasse anche il Meccanismo; confesso, che s' avrebbe tutto ciò, che può desiderarsi: ma di rado ci riuscirà lo svelarlo; perchè non abbiamo nè sensi così perspicaci, nè dati sufficienti per internarci nell' intima struttura dei corpi, e nella figura, disposizione, e moti delle particelle componenti. Nè bisogna farla da indovini; conciossiachè c' è un grado minimo di probabilità, che fra le innumerabili ipotesi fin ora fatte, e che finger si possono, la buona sorte ci guidi a quell' unica, che tra tutte è la germana, e la vera.

Aggiungasi, che non ho mai veduto a cavarli dalle ipotesi le leggi della Natura; ho veduto bensì colle leggi della Natura alla mano restar le ipotesi convinte frequentemente di falsità. Chi mai ha saputo inventarne una, per cui si spieghino con chiarezza le forze centrali, le elastiche, ec.? e pure ne sono pieni i libri, ed intorno la gravità, ch' è un fenomeno a prima vista sì semplice, io più di dodici potrei contarne. La similitudine da Lei addotta d' un Problema geometrico mi sembra alquanto lontana. In Geometria abbiamo i dati fermi, coi quali si procede al quisto; ed ogni qual volta la stessa condizione s' adempie in Fisica, camminiamo con piede sicuro. Ma essendo i fenomeni que' dati, che si adoprano nella investigazione delle leggi naturali, con essi rare fiate si perviene alla scoperta del meccanismo: laonde fa di mestieri contentarsi di quello, che si può sapere, ed abbiain tanto che fare in tal proposito, che non ci avanza tempo da perdere in architettare ipotesi che giusta il detto del Galileo sono belle, ed ingegnose, ma non dimostrate, nè dimostrabili.

Ben è vero, che siccome la Geometria si vale de' suoi Postulati; così la Fisica spesso premette alle sue ricerche alcune posizioni semplicissime, ed evidenti, che si assumono se non in qualità di assiomi, almeno in quella di petizioni, le quali ragionevolmente non ponno essere contrastate. Tale si è la da me adottata nella precedente lettera, con cui mi sono ingegnato

di

di render ragione della trasmissione, della refrazione, e della diffrazione del lume, vale a dire che le minime particelle lucide non sieno tutte nè d'una grandezza, nè d'una figura. Credo poi, che debba annoverarsi fra primi principj, o almeno fra le verità dimostrate, che tanto più resistono i mezzi fluidi, quanto sono più densi, e più tenaci; dipendendo la loro reazione dalle regole della comunicazione del moto. Mettendo in conto la sola inerzia, trovo, che la resistenza serba la ragione composta della massa del fluido, e d'una quantità, che sta di mezzo fra il quadrato, ed il cubo della celerità di quel corpo, che a traverso del liquido s'apre il passaggio. Nè vedo per qual motivo abbia ad eccettuarsene la luce, quasi che la Natura per essa abbia stabilito un canone a parte: e ciò tanto meno dee crederci, quanto che i pori del diafano non sono maravigliosamente disposti in tutte le direzioni per dar transitto alla luce in qualsivoglia positura, e sotto qualsiasi angolo. Questa sentenza è già screditata, ed io penso, che gli atomi luminosi a guisa di tanti piccolissimi cunei s'insinuino nel diafano, disgiungano la contiguità delle sue particelle, e le mettano in moto, e in tremito con tanto maggiore difficoltà, quanto esse sono più massiccie, e tegnenti. Se ne ha un chiaro indizio dal calore, che nel passaggio della luce i mezzi contraggono, e dalla loro sensibile rarefazione. Quindi si scopre, che stando tutte le cose pari, i fluidi sono assai più trasparenti dei solidi; mentre per l'esperienza del Sig. Halley si sa, che la luce penetra l'acqua salsa ad una grande profondità, lo che non interviene nel vetro, che alla grossezza d'un palmo notabilmente s'infosca, per quanto sia limpido, e puro.

Ecco il metodo insegnato a Noi Italiani dal Galileo. Egli nelle sue Opere, e particolarmente nel Saggiatore ne ha sparso i semi. Oltre il passo citato intorno le ipotesi, afferma, che non è uffizio del Fisco l'indagare l'essenza delle cose, ma semplicemente render conto delle loro proprietà, ed affezioni: che la Natura è inesorabile, e non è disposta ad accomodarsi alle nostre fantasie: che il suo libro è scritto in cifra geometrica, e chi non è peritissimo in questa Scienza non isperi di penetrarne il misterio. Altrove dice, che la semplicità, ed il magistero intesi dalla Natura non sono quelli, che intendiam noi: che non si può fare un passo, quando l'esperienza non si congiunga colla ragione: che non bisogna affrettarsi in tirare conseguenze dai fenomeni; ma cavarne soltanto quelle, che spontaneamente ne fluiscono: che la Natura agevolmente si scopre nelle sue operazioni più semplici, e che con queste passo passo c'incamminiamo alle più composte, ed involute: che finalmente in Fisica si vuol procedere a posteriori, e per via d'Analisi, e che tanto più questa Scienza sarà perfetta, quanto meno verità insegnerà.

In questo mentre tornando alle refrazioni, per me non credo, che nella sentenza del Cartesio, e del Nevvton possa mai evitarsi l'assurdo, che io ho detto, delle refrazioni Astronomiche; conciossiachè per sua parte non era l'Inglese talmente cieco, che non vedesse essere i Cieli pieni di materia di luce, ed intanto ha posto in essi il vano per escludere la materia sottilile. E per dire il vero, che bisogno c'è d'ammettere in quel

gran

gran tratto due sostanze diverse, cioè l'etere, ed il lume: anzi i Cartesiani stessi vogliono, che la luce altro non sia, che un moto, una pressione, un ondeggiamento della materia sottile. Non c'è dunque Setta Filosofica, che collochi ne' Cieli due sortì di materia, essendo o l'una, o l'altra soverchia, e tutta la gran quistione si riduce al puro nome. Per discorrere colla maggiore semplicità, io giudico, che la luce sia la grande atmosfera del Sole, in cui nuotano i Pianeti, e la quale viene intersecata dalle altre atmosfere luminose delle Stelle fisse, che abbracciano, e stringono per così dire il nostro Vortice, perchè il lume d'esse Stelle, che sono tanti Soli, viene certamente ai nostri occhi. Mi persuado altresì, che dalla luce dipenda il moto de' Pianeti, e la loro forza centrale, e ne prendo la conghiettura da ciò, che la forza del lume, e le forze centrali decrescono colla medesima legge, vale a dire in ragione reciproca duplicata delle distanze. Se ci sia poi, o no il vacuo disseminato, nulla rileva, quantunque a me paja assai più conforme ai fenomeni la opinione Epicurica.

Se così è, in qualunque maniera si propaghi la luce, o per via d'emanazione, o per via dei tremori dell'etere, secondo le varie ipotesi, le quali io non approvo, nè condanno, quando i Cieli sian riempiti d'una sola materia, che o sia lume, o veicolo del lume; è cosa chiara, che nel diffonderli che fa la luce per quegli immensi spazj non incontra alcun corpo, che le faccia intoppo, e conseguentemente cammina liberamente, senza essere soggetta a veruna resistenza.

Ma quando entra nella nostr'aria, non può negarsi, ch'essa non urti in una materia diversa fornita d'inerzia, e di tenacità, che vi si oppone, e le fa contrasto. Se dunque nella estensione de' Cieli è nulla la resistenza, ed è sensibile nell'aere, e pure non ostante ciò per le osservazioni Astronomiche il raggio si torce verso la perpendicolare; bisogna dire col Barrovio, ed altri suoi seguaci, che la faccenda vada al rovescio di quello pensano i Cartesiani, ed i Nevvtoniani.

Nè mi si opponga il principio meccanico, che ogni corpo si piega da quella parte, dove trova minor resistenza; atteso che parmi d'aver provato abbastanza nell'antecedente mia lettera, che l'assioma non è generalmente vero, anzi che nel caso nostro ripugna alle nozioni della comunicazione del moto, e delle resistenze. S'immagini V. S. Reverendiss., che una nave spinta dal vento con uniforme celerità sia obbligata a passare obliquamente dall'acqua dolce alla salsa, io dimando verso qual parte si muterà la sua direzione. Per me sono persuaso, che si piegherà verso quel lato, in cui trova maggior resistenza; perchè ivi più che dall'altro canto si minora la velocità. L'esperimento della palla cacciata da un arcobugio dall'aria nell'acqua viene rapportato in tante maniere, e ci entrano tanti elementi, che nulla si può conchiudere. Noto semplicemente, che la luce passando dal raro al denso sotto qualunque angolo, almeno in parte si rifrange. Non così fa un corpo solido, che mentre l'angolo dell'incidenza sia picciolo, in cambio d'immergerli, si riflette: segno manifesto, che quand'anche s'attuffa, vi si accoppia sempre il ribalzo, e la riflessione.

Non

Non senza il suo perchè ho dimandato da qual cagione venga accresciuta la velocità della luce nel mezzo più denso, mentrella ci passa da un mezzo più raro, per esempio dal vetro al diamante. Ella ingegnosamente risponde, che la minor perdita sta in luogo di guadagno, ed avrebbe tutte le ragioni del mondo, ogni qual volta due raggi venissero ambo dal vuoto, ed uno cadesse obliquamente per modo di esempio nell'aere, e l'altro nell'acqua. All'incontro quando un raggio ha già penetrata l'aria, e perduta quella porzione di velocità, qualunque ella sia, che corrisponde alla resistenza dell'aere, torno a dimandare come, o per qual motivo guadagni una nuova maggiore velocità, qualora passa nell'acqua. Una delle due dobbiam dire, o che la luce ha una propria innata celerità, che viene estenuata dagl'impedimenti, i quali totalmente rimossi, intiera di bel nuovo si acquista, e rimossi in parte, almanco s'accresce: ovvero si d'uopo ricorrere alle attrazioni Newtoniane. Nella prima ipotesi s'ascrive alla luce quella proprietà, che a' suoi Atomi attribuiua Epicuro, e si cancella l'assoma, per cui si stabilisce, che un corpo persevera nello stato, in cui si trova, quando non ne viene rimosso da un agente estrinseco. Nella seconda è evidente, che non si rende delle refrazioni quella ragione appoggiata ad idee di corpo, e di moto, ch'ella desidera.

Comprende V. S. Reverendissima, che la maniera, con cui spiego le refrazioni, e le diffrazioni, cioè a dire per la maggiore, o minore resistenza, che si oppone ad una parte più che all'altra del raggio luminoso, la quale sa che si ripiegghi piuttosto in un senso, che nell'altro, non è soggetta a tale difficoltà, nulla importando, che nel passaggio da un mezzo all'altro la velocità, o la facilità del lume sia alquanto più grande, o più picciola; perchè l'effetto, secondo me, segue in quel menomissimo strato, che divide i due mezzi, finattantoche l'atomo lucido sia totalmente immerso, e non si trovi parte in un fluido, e parte in un altro.

E ricordandole gli attestati della mia servitù, mi protesto.


Castelfranco li 18. Decembre 1736.

L'Autore in altre cose occupato non finì mai di trascrivere quest'ultima lettera, nè la inviò al Padre Tisenti.

Fine del Tomo Terzo.

616070








Fig. 15




Fig. 16



Fig. 18




Fig. 20






Fig. 21







22. H G F

Fig. 25.





Fig. 23.













Fig. 29.













100-10198









Fig. 62.











Fig. 63.





























Fig 103




Fig 104




Fig 105



Fig 106




Fig 107




Fig 108




Fig 110




Fig 111




















Fig 112
















Fig. 137.




Fig. 140.




Fig. 141.








Fig. 143.




Fig. 144.



Fig. 147.




Fig. 149.




Fig. 148.

Abate Gio Conouchi fupra in L.







Palchetto		Armadio
BIBLIOTECA PROVINCIALE		
Num. d'ordine		



